

Mitteilungen

des entomologischen Vereines

POLYXENA

Sitz: Wien VII. Neubaugürtel 24-26.

Vereinsabende jeden Donnerstag.

1. Jahrgang.

Erscheint jeden ersten Donnerstag des Monats.

N^o 9.

Bemerkenswerte Aberrationen.

Alle Rechte vorbehalten!

Reinigt die Güter des Herrn
 Offiziers Ladil, der im Juni
 ge. feldman. Linsen, eine bepu.
 und glückliche Fahrt hat, von
 von im Jahre, für die große
 in der feldman. Linsen.
 Aberrationen zu bringen, die
 so beim Leben vorkommen.
 Fig. 1. Lat. neptis L. ab.
 Die Vorderflügel sind fast
 vollständig gelblich, der Hal-
 birkel weißlich, fast
 normal, auf der Hinterflü-
 gel ist die innere Linie
 nach außen verschoben,
 der bekannt. Hinterflügel ebenfalls, gegen die Wurzel bloß weißlich. beide
 Linien, mit der Wurzel etwas verschoben, die Hinterflügel weißlich, nicht von
 bei Linsen auf Linsen V breit, unterbreiten. Ich benenne die beiden Gattungen mit
 nicht ist Linsen, daß sie sehr selten vorkommen, nicht, habe mir jetzt die für
 nicht vor.

Fig. 1.





Fig. 2.



Die Hinterflügel sind fast
 V breit, unterbreiten (wie bei
 Lat. puerpera oder fulminea.)
 Fig. 2. Lat. puerpera Girona
 ab. Vorderflügel gelblich,
 beim aufschlagen weißlich, aber
 ist weißlich-braun gefleckt,
 fünfzig fünfzig Linien
 abnorm, fast weißlich
 großer Schwärzflügel mit drei
 Linien der Costalrandes sehr
 weiß. Hinterflügel fast weiß,
 nur gegen die vordere
 mit Flügeln in mehreren
 Größe und Farbe etwas gelb.
 Fig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1_9](#)

Autor(en)/Author(s): Kysela Emanuel

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Aberrationen. 1](#)