

März.
Unter der abblätternden Rinde eines alten *Acer pseudoplatanus* L. fand ich zahlreiche Raupen von *Pamene regiana* Z. im Ueberwinterungs- und zugleich Verpuppungskocon; die Raupe bewohnt nicht häufig eine kleine Wespe mit schwarzem Thorax, gelbem Abdomen und ebensolchen Pedes. (*Microdus annulator*.)

Gelegentlich einer Ski-Tour in die umliegenden Berge beobachtete ich, daß die Fichten vom Herbst her, von der Raupe eines Kleinschmetterlings zu leiden haben.

Im November und Dezember lassen sich die kleinen mattbraunen Rp. auf Fäden hinunter, um oft auf hohem Schnee zu landen. (*Epiblema tedella* Cl. ? deren Rp. ist ja grün.)

April.

Entdecke in vorjährigen hohlen Stengeln des *Carduus palustris* L. zahlreiche Zellen der *Megachile tagopoda* L., die Biene ist schon vollkommen entwickelt und harrt wohlgeschützt wärmerer Zeit, denn erst im Juni entsticht sie ihrer dunklen und engen, mit Erdbeerblättern mollig agstapezierten Klause, ihr ärgster Feind ist der Ohrwurm, welcher manchmal die ganze Brut, das ist 4—12 Zellen plündert.

Dem Kampfe ums Dasein scheinen mir manche Schmarotzer nicht gewachsen zu sein, denn ich konnte beobachten, wie eine gelbe Schlupfwespe vergebens die harte Coconwand des *Eriogaster lanetris* L. anfeuchtete, um hindurchzukommen, sie mußte elend umkommen, ebenso jene Tachine, welche in der dicken Gespinnstwand einer *Cucullia asteris* Schiff. stack.

Am 12. fand ich am Fuße einer alten Birke auf sehr nassem Grunde ein eben geschlüpfes ♂ der *Brachionycha nubeculosa* Esp. An Ulmenstämmen, wo ich um diese Zeit sonst nur ♂♂ des *Biston hirtaria* Cl. fand, saß ein ♀ von *pomonaria* Hb.

Am 16. köderte ich zum erstenmale ein *Taeniocampa munda* Esp. In einem *Salix caprea*-Busche saß ein ♀ der *Lobophora carpinata* Bkh.

20. Es schlüpfen die niedlichen, dunklen, mit goldgelben Flecken gezierten *Pamene regiana* Z. im ruhenden Zustande des Falter bilden diese 2 Flecken auf den VII. die Gestalt eines goldenen Apfels. Unter der Borke einer alten Birke finde ich zahlreiche Rp. der *Argyresthia goedartella* L., als Verpuppung wählten sich die Raupen den Kork des Sammelgläschens, in welchen sie sich einbohrten und verpuppten.

27. In der Dämmerung beobachtete ich ein ♀ der *Selenia bilunaria* Exp., wie es an einen dünnen Zweig des *Alnus incana* DC. seine länglichrunden, gelbgrünen und mattglänzenden Eier ablegte, wobei es mit den Flügeln flatterte.

Mai.

8. Ich klopfte von Lärchenbäumen einige Raupen, so *Plusia ain* Hochw., *Dendrolimus pini* L., *Lymantria monacha* und einige *Micro*.

11. Gelegentlich eines Köderganges klopfte ich einige Büsche von *Prunus spinosa* L. in einen Schirm, wobei ich u. a. ein Exemplar der seltenen *Adela albicinetella* Mn. erbeutete. Unter abstehender, von *Cossus cossus* L. zerfressener Rinde einer großen Esche finde ich eine alte Ansiedlung der *Epicnaptera tremulifolia* Hb., sehr alte, ganz verfallene, einige geschlüpfte vorjährige, auch einige von Tachinen bewohnt gewesene, sowie 4 frische Puppen und daneben ein eben geschlüpfes großes ♀, welches besonders graue Färbung zeigte.

17. Es finden sich noch einige erwachsene Rp. der *Plusia ain* Hochw. an den untersten Aesten isoliert stehender Lärchenbäume in beiläufig 800 m Seehöhe. Nachts klopfte ich eine Anzahl Rp. der *Rhizogramma detersa* Esp. von freistehenden Berberitzensträuchern, sie kommen erst bei völliger Dunkelheit hervor.

19. Eine *Gonodontis bidentata* Cl. ♀ fing ich abends an den Blüten des wolligen Schneeballs (*Viburnum lantana* L.)

21. Auf einer sehr nassen Wiese fing ich ein albinotisches Exemplar des *Thanaos tages* L. von semmelgelber Färbung. (s. Kranchers Jahrbuch 1910)

22. Ich leuchtete in den feuchten Mürzauen, wobei eine Menge Falter, meist Spanner aufflogen, u. a. *Rapta temerata* Hb., *bimaculata* F., *Larentia sitera* Hufln., *testacea* Don., *Selenia tetralunaria* Hufln., *Lobophora halterata* Hufln., *Grapholita albersana* Hb. etc.

24. Am Bohnhöllicht in Bruck a. d. Mur fange ich ein ♂ der *Spilosoma mendica* Cl. Ein ♀ des *Euplocamus anthracinalis* Sc. legte viele, in lichtbraune Wolle eingebettete, länglichrunde und gelbe Eier. Die Puppe der *Scaria lineata* Sc. ist derart lebhaft, daß der auf einen glatten Tisch gelegte Cocon durch die schnellen rotierenden Bewegungen der Puppe gleichsam davonläuft. Verpuppt sich die Raupe im Dunkeln, so bleibt, wie ich beobachtete, der sonst gelbe Cocon weiß. Die winzigen Falter der Lärchenminiermotte *Coleophora laricella* Hb. schlüpfen des Nachts.

27. Ein ♂ der *Epiblema tetraguetrana* Hw. ging im Cyankaligläse mit einem bereits toten ♀ eine Kopula ein. (s. Zeitschrift für wissensch. Insektenbiologie 1908 Heft 7, p. 269.) Die in Endtrieben von *Salix* sp. eingewickelten Raupen von *Plastenis retusa* L. sind ungeachtet ihres Schutzes fast immer von einem *Microgaster* bewohnt, gerade das Versteck der Raupe wird der Wespe den Aufenthaltsort verraten, denn die meisten in zusammengesponnenen Blättern lebenden Arten, wie *Plusia moneta* F., *modesta* Hb., *Scotosia vetulata* Schiff. haben viel von Schmarotzern zu leiden. An einem Fichtenstocke, mitten in einem mit *Calluna* und *Vaccinium* bewachsenen Waldschlage saß eine frische *Mamestra glauca* Hb. und zwar an der wagrechten Schnittfläche des Stockes.

28. Unter Anderem fange ich am Acetylenlichte: *Larentia salicata* Hb., *Pechipogon barbalis* Cl., *Acidalia remutaria* Hd., *Scoparia sudetica* Z., etc. Es schlüpfen *Sterrhopterix standfussi* H. S. deren Säcke ich an Büschen von *Rhamnus* sp. fand.

31. Ich leuchtete im Trabachgraben, einem Seitentale der Mürz, Spanner flogen meist im Dunkel des Waldes, was bei wolkenlosem Himmel meist der Fall zu sein pflegt; von der Ausbeute nenne ich nur: *Larentia luctuata* Hb., *silacea* ab. *insulata* Hw., *unangulata* Hw., *Tephroclystia assimolata* Gn., *Drymonia trimacula* v. *donanae* Hb.

Juni.

3. Zum Acetylenlicht kommen u. a. in den feuchten Mürzauen: *Hydrilla palustris* Hb. in 6 frischen ♂ Exemplaren, an den niedrig aufgehängten Köder kamen die wenig beweglichen ♀♀ nicht, vielleicht bevorzugen sie reinen Honigköder, den ich nächstes Jahr versuchen werde.

5. Am Innenfenster des Stiegenhauses flatterte eine *Hadena illyria* Frr. Es verpuppen sich zahlreiche, in den Endtrieben von *Rhamnus cathartica* L. eingewickelte Rp. der *Scotosia vetulata* Schiff., die meisten ergeben

aber noch im Raupenzustande 10-15 weißgelbe Tönnchen, aus welchen eine kleine, langgestreckte schwarze Wespe mit gelben Füßen erscheint. (*Limneria juniperata* Hor.); Es schlüpfen die von modernem Holze lebenden Räumchen des *Euplocamus anthracinalis* Sc., ebenso die zierlichen, goldgefleckten Falterchen der *Angyresthia goedartella* L., darunter die ganz und gar goldene *ab-splondida* Reutti.

9. Ein Besuch des Trawiestales (Hochschwab) ergab der frühen Jahreszeit wegen nur Weniges, *Parnassius mnemosyne* L. (Flugzeit desselben bis August!) *Larentia tophaeata* Hb. *Hemaris scabiosae* Z. etc. nebst einem großen Strauß herrlich duftender Aurikeln (*Primula auricula* L.) hier «Petergstamm» genannt.

14. Am Stuhleck (1783 m) südlich von Mürzzuschlag dessen Fauna und Flora eine sehr arme ist, wendete ich den ganzen Tag Steine, ohne etwas anderes als 4 frische *Agrotis simulans* Hufn. nebst einer sehr großen *pronuba* L. zu erbeuten; letztere spannt entsprechend der längeren Lebensdauer der Raupe in diesen unwirtschaftlichen Höhen wegen (1700 m) 62 mm (sonst 55 mm). Es fanden sich noch eine Menge Caraben, welche ich für einen Coleopterologen nebenbei mitnahm, so: *catenulatus* Sc., *intricatus* L., *cancellatus* Ill., *arvensis*, Hbst. und *v. silvestris* Panz., alle mehr oder weniger aberrierend.

18. Ein Besuch des nördlich von Mürzzuschlag gelegenen Kaarls (1396 m) ergab: *Larentia luctuata* Hb., *Gnophos sordaria* Thubg. *v. mendicaria* H. S., *Hemaris scabiosae* Z., bereits geschlüpfte Puppen der *Plusia* an Hochenw. an den Endtrieben von jüngeren Lärchenbäumen; ferner *Tephroclystia assimolata* Gn., *virgaureata* Dbl.; *lariciata* Frr., *Pyrausta nigralis* F., *Crambus conchellus* Schiff., *pyramidallus* Fr., *Euxanthia hamana* L., *Scardia boleti* F., *Zanclognatha grisealis* Hb. und *Epiblema tadelle* Cl. welche zu hunderten ihren Hochzeitsreigen um eine 3 m hohe Fichte vollführten. Mehrere große Raupen von *Parnassius apollo* L. sonnten sich am heißen Gipfelfelsen, doch nahm ich sie nicht mit, da das Zuchtergebnis meist ein schlechtes ist.

19. Aus einem, am Gartenzaun gefundenen Sack der *Acanthopsyche opacella* H. S. kommen eine Menge kleiner Räumchen hervor, welche sich aus dem Materiale des mütterlichen Sackes die ersten winzigen Säcke anfertigen, manche laufen auch ohne einen solchen umher und sind recht lebhaft. Mehrere, an *Salvia glutinosa* L. gefundenen *Plusienraupen* erweisen sich alle als *chrysis* L., welche heute schlüpfen.

26. Es schlüpfen *Dyschorista fissipuncta* Hw., die Raupen fanden sich im Mai unter dem Dache einer Holzhütte, neben welcher knapp eine Weide steht; die Falter sind sehr variabel, manche lichtgrau bis ganz schwarz (ab. *nigrescens* Tutt.), sie gehen im Zuchtkasten in Kopula ein.

(Schluss folgt).

Vereins-Nachrichten.

General-Versammlung.

Die diesjährige VI. ordentliche Generalversammlung findet am **Dienstag, den 15. März 1910** um 8 Uhr abends im Vereinslokale statt.

Bei der am 15. März stattfindenden ord. Generalversammlung wird die Vereinsvertretung neu gewählt werden. Die Wahl erfolgt nur mittels Stimmzettel, welche dieser Nummer beiliegen. Sollte die für 8 Uhr einberufene Generalversammlung nicht be-

schlußfähig sein, so findet um 9 Uhr eine zweite statt, welche bei jeder Stimmenanzahl beschlußfähig ist. Die auswärtigen Herren Mitglieder werden höflichst ersucht, sich an der Neuwahl durch das Einsenden der ausgefüllten Stimmzettel recht zahlreich zu beteiligen.

Die beiliegenden Wahl- und Abstimmungszettel müssen bis spätestens am 15. März 1910, abends 8 Uhr in unseren Händen sein und zwar müssen dieselben entweder persönlich abgegeben oder per Post eingesendet werden.

Herr P. Kasperek, Wien, stellt folgenden Antrag: Die General-Versammlung wolle beschließen: Die Vereinsmitteilungen erscheinen vom 1. Mai an alle 14 Tage; die Deckung der Mehrauslagen ist aus Inseraten einzubringen und zwar haben die Mitglieder pro Zeile 6 Heller und Nichtmitglieder das dreifache zu entrichten.

Anmerkung der Vereinsleitung: Wie aus dem Rechenschaftsbericht klar ersichtlich, betragen die Kosten der Zeitung mehr als die Einschreibgebühren und Mitgliedsbeiträge; den doppelten Betrag durch Inseratengebühren einzubringen, dürfte wohl unmöglich sein, abgesehen davon, dass diese Massnahme kaum den Beifall der Mitglieder finden dürfte, der Verein aber auch zu Steuerleistungen herangezogen werden könnte. Im Übrigen bitten wir, davon überzeugt zu sein, daß die Vereinsleitung stets bestrebt ist, nach Massgabe der ihr zur Verfügung stehenden Mittel ihr Möglichstes zum Ausbau der Vereinszeitung beizutragen.

Am 15. März findet die Neuwahl der Vereinsvorsteherung statt. In genauer Kenntnis der durchaus korrekten Geschäftsführung und in dankbarer Anerkennung der in jeder Beziehung energischen und zielbewußten Vertretung unserer Vereinsinteressen durch die bisherige Vereinsleitung, faßte das aus der Mitte der Mitglieder gebildete Komitee den einstimmigen Beschluß, die bisherigen Funktionäre wieder zu wählen, soweit dieses sich bereit erklärten, eine auf sie fallende Wahl anzunehmen. Da jedoch mehrere Herren privater Verhältnisse wegen nicht mehr kandidieren, so stellte das Komitee für sie Herren auf, die Gewähr dafür bieten, daß sie das in sie gesetzte Vertrauen voll erfüllen. Die P. T. Mitglieder werden daher ersucht, ihre Stimmen auf folgende Herren zu vereinigen:

Obmann: Friedrich Harmuth.

Stellvertreter: Adolf Kibitz.

Schriftführer: Franz Glaser.

Stellvertreter: Josef Prammer.

Kassier: August Chaloupka.

Stellvertreter: W. A. Kalabus.

Bibliothekar: Anton Schmuttermayer.

1. Ausschuß: Johann Hoffmann

2. Ausschuß: Josef Fol.

3. Ausschuß: Josef Finger.

1. Ersatzmann: Heinrich Berger.

2. Ersatzmann: Rudolf Howorka.

3. Ersatzmann: Anton Straka.

4. Ersatzmann: Karl Töpfel.

1. Revisor: Karl Stephan.

2. Revisor: Ferdinand Kreysl.

An die P. T. Mitglieder! Diejenigen Mitglieder, welche mit der Zeitung einen Posterlagschein erhalten, werden damit höflich aufmerksam gemacht, daß sie mit ihren Beiträgen im Rückstande sind und ersucht, sich bei Ueberweisung der Mitgliederbeiträge des Erlagscheines zu bedienen.

Wir teilen unseren P. T. Mitgliedern mit, daß unser Verein ein Konto der k. k. Postsparkassa mit Nr. 56.351 besitzt und ersuchen, sich desselben bei Geldsendungen zu bedienen. Posterlagscheine stehen auf Wunsch zur Verfügung.

Denjenigen Herren, welche ihre Kästen auf die von Herrn Ronnicke in Nr. 9 beschriebenen Weise auskleiden wollen, besorgt dies die Kartonfabrik »Stößler u. Sonntag« Wien, XIV., Ullmannstrasse 1, um den sehr mäßigen Preis von ca. 40 h per Kasten.

Neue Mitglieder:

Entomologischer Verein Offenbach a. M. Restaurant Nitschke, Biebererstraße 69.

Die Vereinsleitung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [5_11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym

Artikel/Article: [Vereins-Nachrichten. 42-43](#)