

BILDTEIL



Bild 1: Braunbär. Foto: B. Gutleb.



Bild 2: Feldhase. Foto: H. Brunner.



Bild 3: Mornellregenpfeifer. Foto: H. Brunner.




Bild 4: Waldohreule. Foto: H. Brunner.



Bild 5: Schwarze Kreuzotter. Foto: B. Gutleb.



Bild 6: Bergmolch-Männchen. Foto: B. Gutleb.



Bild 7: Steingreßling. Foto: H. Frei.



Bild 8: Segelfalter. Foto: W. Stuck.



Bild 9: Großer Eisvogel. Foto: W. Stuck.



Bild 10: *Nymphula stagnata*. Foto: S. Erlebach.



Bild 11: *Catoptria margaritella*. Foto: S. Erlebach.



Bild 12: *Philopotamus ludificatus*, eine besonders kontrastreich gezeichnete Köcherfliege. Foto: B. Depisch.



Bild 13: *Purpuricenus kaehleri* (Bockkäfer, Cerambycidae). Foto: S. Steiner.



Bild 14: *Ochthebius melanescens* (Langtaster-Wasserkäfer; Hydraenidae). Foto: M. A. Jäch.



Bild 15: *Paederus fuscipes* (Kurzflügelkäfer, Staphilinidae). Foto: E. Wachmann.



Bild 16: *Xylodrepa quadripunctata* (Aaskäfer, Silphidae). Foto: E. Wachmann.



Bild 17 und 18: *Nebria reichii fasciatopunctata*, Larve und Imago (Laufkäfer; Carabidae). Fotos: W. Paill.



Bild 19: *Duvalius exaratus* (Laufkäfer; Carabidae). Foto: W. Paill.



Bild 20: *Euroleon nostras* (Netzflügler; Neuropterida). Foto: W. Paill.



Bild 21: Larven der Netzflügelmücken (Blephariceridae) haben charakteristische Haftorgane. Im Bild die drei Arten *Haplothrix lugubris* (die kleinste Larve, oben), *Liponeura chordata* (Mitte) und *Liponeura cinerascens minor* (unten). Foto: B. Depisch.



Bild 22: *Anthidium montanum* Morawitz, 1864, Männchen auf *Lotus corniculatus*. Erstfund für Kärnten: Hohe Tauern, Großes Fleißtal, Piste nördlich Stöfflkaser (47°02'49"N, 12°52'34"E, 1.950 m), 26. Juli 1999. Foto: A.W. Ebmer.



Bild 23: *Echthrus reluctator* (Schlupfwespe) sticht in Holz. Foto: M. Schwarz.



Bild 24: Eine *Formica rufa* – Königin (Rote Waldameise) versucht als temporärer Sozialparasit nach ihrem Hochzeitsflug und Flügelabwurf in ein Nest von *Formica fusca* einzudringen, wird aber von den Wirtsameisen heftig angegriffen. Foto: E. Ottinger.



Bild 25: Raubwanze (*Rhinocoris iracundus*), an Honigbiene saugend. Foto: H. Pruscha.



Bild 26: Südliche Buntschrecke (*Poecilimon ornatus*) aus dem Kotschnatal, Karawanken. Foto: H.-M. Berg.



Bild 27: Eintagsfliegen-Larve (*Ephemerella mucronata*).
Foto: P. Weichselbaumer.



Bild 28: Larve der Steinfliege *Perla grandis* (Plecoptera). Foto: B. Depisch.



Bild 29: Die Larven der Schaumzikaden (Aphrophoridae) schützen sich vor Feinden, indem sie sich in einem selbsterzeugten Schaumnest verbergen. An Kräutern und Gräsern findet man vorwiegend die Arten der Gattungen *Philaenus*, *Neophilaenus* und *Lepyronia*, während die Arten Gattung *Aphrophora* ihre Schaumnester zumeist auf Sträuchern und Bäumen errichten. Erstere werden im Volksmund oft als „Kuckucksspeichel“, letztere als „Tränende Weiden“ bezeichnet. Foto: W. E. Holzinger.



Bild 30: Bergsingzikade (*Cicadetta montana*). Foto: W. E. Holzinger.



Bild 31: Der Südliche Blaupfeil (*Orthemum brunneum*) ist eine stark gefährdete Segellibelle, die vornehmlich warme Wiesengraben der Tieflagen bewohnt, aber auch gelegentlich an Sand- und Kiesgruben angetroffen werden kann. Foto: H. Brunner.



Bild 32 :
Paarungsrund der
Kleinen Pech-
libelle (*Ischnura
pumilio*).
Foto: H. Brunner.



Bild 33: Dohlenkrebs (*Austropotamobius pallipes*). Foto: W. Köstenberger.



Bild 34: Urzeitkrebs (*Lepidurus apus*). Foto: E. Eder.



Bild 35: Karpatskorpion (*Euscorpius carpathicus*). Foto: Ch. Komposch.



Bild 36: Weibchen der Kreuzspinne *Araneus alsine*. Foto: Ch. Komposch.



Bild 37: *Atypus muralis* (Tapezierspinne), Weibchen. Foto: Ch. Komposch.



Bild 38: Der Landblutegel *Xerobdella lecomtei* (Hirudinea) ist der einzige terrestrische Egel unserer Breiten. Foto: Ch. Komposch



Bild 39: Südliches Riesenaug (Megabunus armatus). Foto: Ch. Komposch.



Bild 40: Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi). Foto: Ch. Komposch.



Bild 41: Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*). Kleinsee bei St. Kanzian. Foto: P. Mildner.



Bild 42: Geweihschwamm (*Spongilla lacustris*). Abfluß des Großen Treimischerteichs bei Klagenfurt. Foto: P. Mildner.



Bild 43: Kolonie von *Plumatella casmiana* (Moostierchen; Bryozoa) aus dem Sablatnigmoor. Foto: P. Mildner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Publikationen Naturschutz Kaernten](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [1999_RL](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Bildteil. 81-96](#)