

T. ROTTENBURG, C. WIESER, P. MILDNER und W. E. HOLZINGER (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens

Naturschutz in Kärnten 15: 625 - 626 ? Klagenfurt 1999

Vorläufiges Verzeichnis der Egelartigen Gliederwürmer Kärntens

(Annelida: Hirudinea & Branchiobdellida)

Hasko NESEMANN

Erforschungsstand	?
Nachgewiesene Arten	20

Nr	Art
	HIRUDINEA
	Rhynchobdellida
	Glossiphoniidae
1	<i>Glossiphonia complanata</i> (Linnaeus, 1758)
2	<i>Glossiphonia concolor</i> (Apáthy, 1888)
3	<i>Hemiclepsis marginata</i> (O.F.Müller, 1774)
4	<i>Theromyzon tessulatum</i> (O.F.Müller, 1774)
5	<i>Helobdella stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)
6	<i>Alboglossiphonia heteroclita</i> (Linnaeus, 1758)
7	<i>Alboglossiphonia hyalina</i> (O.F.Müller, 1774)
	Piscicolidae
8	<i>Piscicola geometra</i> (Linnaeus, 1758)
9	<i>Piscicola haranti</i> Jarry, 1960
10	<i>Cystobranchnus respirans</i> (Troschel, 1850)
	Arhynchobdellida
	Hirudiniformes
	Haemopidae
11	<i>Haemopsis sanguisuga</i> (Linnaeus, 1758)
	Hirudinidae
12	<i>Hirudo medicinalis</i> Linnaeus, 1758
	Haemadipsidae
13	<i>Xerobdella lecomtei</i> Frauenfeld, 1868
	Erpobdelliformes
	Erpobdellidae
14	<i>Erpobdella octoculata</i> (Linnaeus, 1758)
15	<i>Erpobdella testacea</i> (Savigny, 1822)
16	<i>Trocheta</i> sp.*
17	? <i>Dina punctata</i> Johansson, 1927*
	Salifidae
18	<i>Barbronia weberi</i> (Blanchard, 1897)*
	BRANCHIOBDELLIDA
	Branchiobdellea
	Branchiobdellidae
19	<i>Branchiobdella hexodonta</i> Gruber, 1883
20	<i>Branchiobdella pentadonta</i> Whitman, 1882
	(<i>Branchiobdella balcanica sketi</i> Karaman, 1970)*
	(<i>Branchiobdella italica</i> Canegallo, 1928)*

Trocheta sp.* aus Lavamünd wurde in der Literatur angegeben. Möglicherweise handelt es sich hierbei um die in der Steiermark weit verbreitete *T. riparia* Nesemann, 1993.

? *Dina punctata* Johansson, 1927*: Ein Fund eines Jungtieres im Apriacher Bach (leg. Dr. W. Graf) könnte zu dieser im norditalienischen Gewässersystem weit verbreiteten Art gehören.

Barbronia weberi (Blanchard, 1897)*: Asiatische Art, eingeschleppt im Millstätter See.

Branchiobdella balcanica sketi Karaman, 1970)* und *Branchiobdella italica* Canegallo, 1928: Diese beiden Taxa sind noch nicht aus Kärnten nachgewiesen, kommen aber in unmittelbar angrenzenden Gebieten von Italien und Slowenien vor. Mit ihrem Auftreten in Kärnten kann wegen dem Nachweis des Dohlenkrebses gerechnet werden.

ANSCHRIFT DES VERFASSERS

Hasko Nesemann, Univ. f. Bodenkultur, Abt. Hydrobiologie, Max-Emanuelstr. 17, A-1180 Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Publikationen Naturschutz Kaernten](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [1999_RL](#)

Autor(en)/Author(s): Neseemann Hasko

Artikel/Article: [Vorläufiges Verzeichnis der Egelartigen Gliederwürmer Kärntens \(Annelida: Hirudinea & Branchiobdellida\). 625-626](#)