

Aufzählung von Pilzen aus der Umgebung von Hallstatt.
(Jänner 1952)

- Amanita muscaria L. Am Boden, Klauswald bei Hallstatt, IX.
- Boletus elegans Schum. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- B. viscidus L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Calvatia caelata Morg. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- Cantharellus cibarius Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Clavaria aurea Schäff. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- C. formosa Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Echerntal bei H., XI.
- Clitocybe geotropa Bull. Klauswald bei H., X.
- Cl. gilva Pers. Am Boden, Klauswald bei H. IX. Besonders grosse Exemplare, Hutdurchmesser 11cm.
- Cl. laccata Scop. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- Collybia velutipes Curt. An Stämmen, Hirschbrunn bei H., X.
- Cortinarius (Dermocybe) cinnamomeus L. Echerntal bei H., XI.
- C. (Phlegmacium) fulmineus Fr. Am Boden, Klauswald bei H. IX.
- C. (Dermocybe) raphanoides Pers. Auf dem Boden, Klauswald bei H., IX.
- C. (Telamonia) rigidus Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- C. (Dermocybe) spec. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- C. (Hydrocybe) spec. Auf Waldboden, Malerweg bei H. X.
- C. (Phlegmacium) spec. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- C. (Dermocybe) subferrugineus Batsch. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
- C. (Dermocybe) venetus Fr. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Craterellus infundibiliformis Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Cr. lutescens Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Cyathus striatus Huds. Auf morschem Holz, Burgstall bei Pürgg, X.
- Fomes annosus Fr. An dürren Stämmen von Salix grandifolia, Hirschbrunn bei H., X. An Fichtenstrünken, Klauswald bei H. IX.
- F. unguilatus Schäff. An Fichtenstrünken, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI. Klauswald bei H., IX.
- Galera tenera Schäff. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- G. spec. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
- Geaster fimbriatus Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Gyrocephalus rufus Jacq. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
- Hebeloma crustuliniforme Bull. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
- H. longicaudum Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.

- Helotium Rerbarum* Fr. Auf durren Stengeln (einer Composite), H., XI.
Hygrophorus (Limacium) agathosmus Fr. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
H. (Hygrocybe) conicus Scop. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
H. (Hygrocybe) eburneus Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
H. (Limacium) erubescens Fr. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
H. (Limacium) hypothejus Fr. Auf Waldboden unter *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.
H. (Limacium) lucorum Kalchbr. Auf Waldboden unter *Larix*, Malerweg bei H., X.
xH. (*Limacium*) *pustulatus* Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
H. imbricatum L. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
H. repandum L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Echerntal bei H., XI.
Inocybe geophylla Sw. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.
I. sindonia Fr. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
Lactarius camphoratus Bull. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
L. deliciosus L. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.
L. pyrogalus Bull. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
L. scrobiculatus Scop. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.
L. vellereus Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Echerntal bei H., XI.
Lenzites sepiaria Jacq. An Fichtenstämmen, Klauswald bei H., IX.
Lepiota procera Scop. Auf Waldboden, Burgstall bei Pürgg, X.
Lycoperdon gemmatum Batsch, auf Waldboden, Klauswald bei H., IX, Marienruhe bei H., X, Echerntal bei H., XI.
L. pyriforme Schöff. An Stümpfen, Echerntal bei H., XI.
Marasmius confluens Pers. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
M. perforans Huds. Auf Fichtennadeln, Klauswald bei H., IX, Echerntal und Grubfeldweg bei H., XI.
M. prasmiosmus Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX. Besonders grosses Exemplar, Stiel 17cm lang.
Mycena calopus Fr. An *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.
M. pura Pers. Am Boden, Klauswald bei H., IX.
M. rosella Fr. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
M. stannea Fr. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
Naucoria spec. Zwischen Moos an durren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X, auf Waldboden, Malerweg bei H., X.
Paxillus atrotomentosus Batsch, an durren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
Penisphora gigantea Masee, an Rinden, Hirschbrunn bei H., X.
Phialea cyathoides Gill. Auf durren Stengeln (einer Composite) H., XI.

- Pholiota caperata* Pers. Auf Waldboden, Klauswald bei H., IX.
x*Ph. lucifera* Lasch. An *Fagus silvatica*, Marienruhe bei H., X.
Ph. radicata Bull. Auf dem Boden, Klauswald bei H., IX.
x*Pleurotus porrigens* Sacc., Syll. Fung., vol. 5 (1887) 314. - Carl. Rea, Brit. Basidiom. (1922) p. 449. - *Calathinus porrigens* Quélet., Enchirid. fung. (1886) p. 46. Auf Strünken im Klauswald bei H., X. Entspricht der Abb. in Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Pl. 259A. Nach Carl Rea l.c. in Schottland gemein, auf dem europäischen Kontinent selten.
Polyporus imberbis Bull. Auf morschem Holz, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
Polystictus hirsutus Schrad. Auf morschen Zweigen von *Fagus silvatica*, Marienhöhe bei H., X, an Hirnschnitten abnorm gewachsen, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI, an dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
P. unicolor Fr. An dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
P. versicolor L. An Buchenstrünken, Klauswald bei H., IX.
x*Poria rhodella* Sacc. Syll. Fung. vol. VI (1888) p. 302, Carl. Rea, Brit. Basidiom. (1922) 601, Bourdot et Galz., I. Hymen France (1922) 622, nr 973. - *Polyporus rhodellus* Fries, Syst. mycol., vol. I. (1822) p. 380. Auf morschen Fichtenstämmen in grösserer Ausdehnung, Klauswald bei H., X. Entspricht der Abb. in Bull., Hymen. de France, tab. 442, fig. D und Fries, Icon. sel. Hymen., vol. II, tab. 189, fig. 2. Nach Bourd. et Galzin, l.c. wäre es möglich, dass letztere Abb. zu *Poria purpure* Hall. gehört.
Oudemansiella mucida Hoehn. syn. *Armillaria mucida* Schrad. Auf Stämmen von *Fagus silvatica*, Marienhöhe bei H., X.
Russula Queletii Fr. Echerntal bei H., XI. Neben normal gefärbten auch Blässlingeweiss (weiss).
Stropharia aeruginosa Curt. Auf Waldboden, Malerweg bei H., X, in einer ringlosen Form (f. *exannulata* Ulbr.); Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
Trametes cinnabarina Jacq. Auf dürren Ästen, Grub bei H., X.
T. gibbosa Pers. An Strünken von *Picea*, Sommeraukogel bei H., X.
T. rubescens Schw. An dürren Stämmen von *Salix grandifolia*, Hirschbrunn bei H., X.
Tremella lutescens Pers. An dürren Ästen, Hang unter Lämmermayrhöhle bei H., XI.
Tricholoma terreum Schff. Auf Waldboden, Echerntal bei H., XI.
Ustulina vulgaris Tul. Auf morschem Holz, Klauswald bei H., IX.

- - - - -

Die mit X bezeichneten Arten sind bemerkenswert und selten. Herr Hofrat Dr. Karl Keissler führte die Bestimmungen durch, wofür ihm die Bot. Station Hallstatt herzlichsten Dank ausspricht.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [126](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Festschrift Hofrat Dr. Karl Keissler Nr. 3. Aufzählung von Pilzen aus der Umgebung von Hallstatt, \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 126\) 1-3](#)