

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT. Nr. 238.

DIE PFLANZENGESELLSCHAFTEN AUF DEM MONTE TITANO
IN
S A N M A R I N O

1963

Von Regierungsrat Dr. Friedrich M O R T O N

Auf dem Monte Titano der Republik San Marino finden sich Reste ursprünglicher Pflanzengesellschaften. Da der Fremdenverkehr immer weitere Kreise zieht, wird von diesen kleinen Beständen bald nicht mehr viel übrig bleiben.

Daher bringe ich hier die flüchtigen Aufzeichnungen, die ich während eines kurzen Aufenthaltes im Mai 1952 machen konnte.

Aufnahme Nr. 2172.

Monte Titano. Am Steige zum letzten Turme. Exposition: West. Boden-
neigung: 10-20% anstehender Fels. Felsenheide. Aufnahmetag: 21.5.
1952.

Amelanchier ovalis	70	f	1	1
Anthyllis Vulneraria ssp.				
rubriflora		fl	1	1
Asparagus acutifolius		f	1	1
Bromus erectus var. longifolius W.		fl	3	3
Campanula sibirica		fl	.	1
Centaurea bracteata		fl	1	1
Ceterach officinarum		fr	1	1
Cornus sanguinea	80	fl	1	1
Corylus A. vellana	90	f	2	1
Crataegus monogyna		fl	1	1
Ephedra nebrodensis var. Villarsii		f	1	4
Euphorbia cyparissias		fl	1	1
Festuca glauca		fl	3	3
Fraxinus Ornus	160	f	2	1
Galium corruadaefolium		fl	1	2

Hedera		f	1	1
Helianthemum apenninicum Mill.		fl	1	2
Helichrysum italicum		flKn	1	2
Helleborus foetidus		f	1	2
Hieracium pilosella s .l.		fl	1	1
Hippocrepis comosa		fl	1	2
Juniperus communis		fr	1	2
Phleum phleoides		flA	1	1
Polygala nicaeensis v.adriatica		fl	1	1
Potentilla hirta		f	1	3
Quercus Ilex	80	f	2	1
Cerris	60	f	2	1
pubescens		f	2	1
Rhamnus Cathartica		f	2	1
Silene italica		fl	1	1
Sorbus Aria	90	f	2	1
Spartium junceum	verblühende	fl	1	1
Stachys recta		fl	1	1
Teucrium Chamaedrys		f	1	3
Thymus longicaulis Presl		fl	2	2
moesiacus Velen.		fl	3	3
Tragopogon porrifolius		fl	.	1
Tunica Saxifraga		fl	1	2
Ulmus cf.scabra	80	f	1	1
Flechten:				
Lecanora crassa				

 Ein durch Schnitt und Beweidung zerstörter Mischwald, in dessen breiten Lücken sich ein Brometum erecti mit einem Festucetum breit gemacht hat.

Aufnahme Nr.2173.

Unweit voriger.Buschgehölz beim letzten Turme.Expositor;West.
 Bodenneigung:10 .Aufnahmetag:21.5.1952.

Acer monspessulanum		f	2	1
platanoides		f		1
Amelanchier ovalis	unreife	fr	1	1
Arabis hirsuta	uuuuuuuu	fr	1	1
Asparagus acutifolius		f	1	1
Bromus erectus var.longi-				
florus Parl.		flA	2	3
Ceterach		fr	1	1
Cornus sanguinea	25-75	fl	1	1
Coronilla Emerus		fl	2	2
Corylus	150	f	2	2
Crataegus Monogyna		f	2	1

Auch hier haben wir es mit einem zerstörten Mischwald zu tun, der durch Schnitt und Beweidung zu einem kümmerlich Buschgehölze wurde.

Unzugängliche Absturzfelsen gegen den Steinbruch hin. Aufnahme-
tag: 21.5.1952.

Moose: (am oberen Absturzrande):

Eurhythmium Dr. Fritz Knie pubvandenkerichthophnllachst für die Bestimmung der Moose!

[illegible]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [238](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Die Pflanzengesellschaften auf dem Monte Titano in San Marino. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 238\) 1-3](#)