

ARBEITEN AUS DER BOTANISCHEN STATION IN HALLSTATT.Nr.272.

PFLANZENGEOGRAPHISCHE BEOBACHTUNGEN ZWISCHEN SOLAGNA UND  
BASSANO DI GRAPPA IN VALSUGANA

Von Regierungsrat Dr.Friedrich MORTON

1965

Zwischen Solagna und Bassano di Grappa wurden einige Beobachtungen gemacht, die einen kleinen Beitrag zur Pflanzengeographie dieses Tales bilden sollen.

Aufnahme Nr.2216.

Bei Solagna.Geröllhang mit grossen Blöcken.Exposition:Nord.  
Bodenneigung:40 Grade.Grösse der Aufnahmefläche:20 mal 20 m.  
Aufnahmetag:30.Mai 1957.

Achnatherum Calamagrostis 3, la <sup>x</sup>	fr	2	2
Biscutella laevigatala, 2	fl	1	1
Bupthalmum salicifolium la	fl	.	1
Campanula linifolia lc <sup>x</sup>	fl	1	3
Cerasus Mahaleb l <sub>2</sub>	f	2	1
Coronilla Emerus 100é200 la <sup>x</sup> , 2	fr	3	4
Euphorbia cyparissia la	fr	.	1
Fraxinus Ornus 100-150 lc	f	2	1
Galium Mollugo la	fl	1	1
Rubus sp.	f	2	1
Sesleria varia la	f	3	5
Stachys recta la, 2	fl	1	1

1a:4;1a,2:2;1a<sup>x</sup>,2:1;1c:2;1c<sup>x</sup>:1;3,1ax:1.

Besonders verdient das Vorkommen der schönen *Campanula linifolia* hervorgehoben zu werden.

Aufnahme Nr.2217.

Bei Solagna.Steilhang mit Schutt und Blöcken.Bodenneigung:30-35  
Grade.Aufnahmetag:30.5.1957.Grösse der Aufnahmefläche:20 mal 20 m.

<i>Campanula linifolia</i>	1c <sup>x</sup>		fl	1	1
<i>Carex flacca</i>	1a		fr	1	1
<i>Carpinus Betulus</i> -300	1a		f	2	1
<i>Chrysanthemum vulgare</i>			fl	1	1
<i>Clematis recta</i>	1a <sup>x</sup> 2		fl	1	1
<i>Cornus sanguinea</i> 150	1a		fr	2	2
<i>Coronilla Emerus</i>	1a <sup>x</sup> 2	unreife	fr	2	2
<i>vaginalis</i>	1a		fl	1	2
<i>Cotinus coggygria</i>	1c,2		ffr	2	1
schöne Bäumchen bis 180!					
<i>Erica carnea</i>	1a		f	2	2
<i>Fraxinus Ornus</i> -300	1c		ffr	2	2
<i>Galium Mollugo</i> s.l.	1a		ffl	1	1
<i>Geranium sanguineum</i>	1a		fl	1	2
<i>Globularia cordifolia</i>	1a <sup>x</sup>		f	1	3
<i>Inula hirta</i>	1a <sup>x</sup> 1c		flKn	1	1
<i>Leontodon hispidus</i>	1a		fr	1	1
<i>Ligustrum vulgare</i> 100	1a		fl	1	1
<i>Paliurus aculeatus</i>	1c		ffr	2	1
Bäumchen bis 200!!					
<i>Quercus pubescens</i> 100	1a <sup>x</sup> 2		f	2	1
<i>Robinia Pseudacacia</i> cult.			f	2	1
<i>Sesleria varia</i>	1a		ffr	4	4
<i>Stachys recta</i>	1a,2		fl	1	1
<i>Viburnum Lantana</i> 100	1a	unreife	fr	2	1
<i>Vicia cracca</i>	1a		fl	1	1
<i>Tortella tortuosa</i>	1a		f	1	3

la:14;la<sup>x</sup>:1;la<sup>x</sup>,2:3;la,2:1;lc:2;lc,2:1;la<sup>x</sup>,ic:1;lc<sup>x</sup>:1.

Zweifelloes stand hier früher ein lichter Mischwald. Hervorzuheben ausser der Campanula linifolia die prachtvolle Entwicklung von COTINUS und PALIURUS, die hier ausgesprochene Bäumchen bilden.

Aufnahme Nr. 2218.

Solagna; unweit der Caduta Massi. Exposition: Nord. Boden- neigung: 25-30 Grade. Grösse der Aufnahme- fläche: 20 mal 20 m. Aufnahme- tag: 30.5.1957.

Amelanchier ovalis	la <sup>x</sup>	fr	2	1
Brachypodium silvaticum	la	fl	1	1
Campanula linifolia	lc <sup>x</sup>	fl	1	1
Carpinus Betulus 200/300	la	f	3	3
Castanea sativa -500		fl	2	1
Cotinus coggygria	lc, 2	fr	1	1
Bäumchen -200				
Cornus sanguinea 200	la	f	2	1
Coronilla Emerus		f	2	1
Corylus 100-200	la	f	2	1
Crataegus oxyantha 100é200	la	f	2	1
Erica carnea	la	f	2	2
Fraxinus Ornus 200	lc	f	2	1
Globularia cordifolia	la <sup>x</sup>	f	1	1
Hippocrepis comosa	la <sup>x</sup>	fl	1	1
Juniperus communis 80	la	f	2	1
Lotus corniculatus	la	fl	1	1
Paliurus 80-150	lc	fr	2	1
Prunus spinosa 80-100	la	f	2	1
Sarothamnus scoparius 60/80	la <sup>x</sup> , la	f	2	1
Teucrium Chamaedrys	la <sup>x</sup> , 2	f	1	2
montanum	la <sup>x</sup>	f	1	1
Thesium bavarum	la	fl	1	1
Viburnum Lantana 200	la	fr f	2	1

la:11;la<sup>x</sup>:4;la<sup>x</sup>,2:2;la<sup>x</sup>,la:1;lc:2;lc<sup>x</sup>:1;lc,2:1.

Auch hier liegen Fragmente eines Mischwaldes mit starkem Hervortreten transalpiner Arten vor. Die Hölzer werden natürlich geschnitten.

Aufnahme Nr. 2219.

Unweit Solagna, gegen Bassano di Grappa. Unzugängliche Felswand mit Neigung 80-90 Grade. Exposition: Nord. Grösse der Aufnahme- fläche ca. 8 mal 15 m. 85% Fels. Aufnahme- tag: 30. Mai 1957.

Asplenium Trichomanes	la	fr	1	1
Campanula linifolia	lc <sup>x</sup>	fl	1	2
flore albo		fl	1	1
Coronilla Emerus -150	la <sup>x</sup> , 2	f	2	1
	unreife	fr	1	1
Fraxinus Ornus 50	lc	f	2	1
Leontodon hispidus	la	flfr	1	2
Phyteuma betonicifolium	la <sup>x</sup>	fl	1	1
Sesleria varia	la	ffr	1	2
Thesium bavarum		fl	1	1
Moose		f	1	2

la:4;la<sup>x</sup>:1;la<sup>x</sup>,2:1;lc:1;lc<sup>x</sup>:1.

Die Felswand bietet den typischen Aspekt an ähnlichen Orten. Auch hier leuchten die Blüten der schönen Campanula linifolia.

Aufnahme Nr. 2220.

Ungefähr 2 km flussabwärts von Solagna. Unzugänglich. 30% Fels. Boden-  
neigung: 40-45 Grade. Exposition: Nordost. Aufnahmetag: 30.5.1957.

Anthyllis Vulneraria	la	fl	1	1
Campanula linifolia	lc <sup>x</sup>	fl	1	2
Carpinus Betulus 200	la	f	2	1
Erica carnea	la	f	1	2
Globularia cordifolia	la <sup>x</sup>	ffr	1	2
Phyteuma betonicifolium	la <sup>x</sup>	fl	1	1
Sesleria varia	la	ffr	4	4
Silene Cucubalus	la	fl	.	1
Teucrium Chamaedrys	la <sup>x</sup> , 2	f	1	2

la:5;la<sup>x</sup>:2;la<sup>x</sup>,2:1;lc<sup>x</sup>:1.

Der Steilhang wird grossenteils von einem Seslerietum einge-  
nommen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [272](#)

Autor(en)/Author(s): Morton Friedrich

Artikel/Article: [Pflanzengeographische Beobachtungen zwischen Solagno und Bassano Di Grappa in Valsugana. \(Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt Nr. 272\) 1-4](#)