

## Bibliographie Botanik und Naturschutz 1996 und 1997

zusammengestellt von H. R. HÖSTER, Wennigsen

Der Bundesfachausschuß Botanik hat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, künftig jährlich in dieser Zeitschrift eine Bibliographie Botanik und Naturschutz zu veröffentlichen. Bei der nachfolgenden Zusammenstellung wurden etwa 50 wissenschaftliche Zeitschriften mit regionalen und teilweise auch überregionalem Bezug ausgewertet im Hinblick auf relevante Literatur. Damit sind noch längst nicht alle Zeitschriften aus dem deutschsprachigen Raum erfaßt und es fehlen insbesondere noch die sog. „Graue“ Literatur sowie Diplomarbeiten der Fachhochschulen und Universitäten. Diese Lücken sollen in den nächsten Jahren geschlossen werden.

Aber bereits die in diesem Heft enthaltene Zahl von 420 Arbeiten zeigt deutlich, wie hoch der Anteil der botanischen Naturschutzliteratur ist. Es gibt heute für fast alle Bereiche Spezialisten, deren Arbeitsergebnisse allgemein zugänglich sind, wenn man nur weiß, in welchen Zeitschriften oder sonstigen Veröffentlichungen diese zu finden sind. Die Bibliographie Botanik und Naturschutz soll den Zugang zur Fachliteratur erleichtern und zu weiteren Forschungen anregen.

### Folgende Zeitschriften wurden ausgewertet:

- Abhandlungen der Delattinia
- Angewandte Botanik
- Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs
- Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde
- Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker
- Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft
- Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft
- Berichte des Botanischen Vereins zu Hamburg
- Biologie in unserer Zeit
- Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern
- Bryologische Mitteilungen carolinea
- Drosera
- Floristische Rundbriefe
- Garten + Landschaft
- Gleditschia
- Hausknechtia
- Herzogia
- Hessische Floristische Briefe
- Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen
- Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg
- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen
- LÖBF-Mitteilungen
- Limprichtia
- Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Radebeul)
- Mitteilungen aus der NNA
- Mitteilungen Botanischer Verein Berlin-Brandenburg
- Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg
- Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft
- Mitteilungen Landesverein Sächsischer Heimatschutz
- Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt
- Natur und Landschaft
- Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern
- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt

- Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg  
 Naturschutz und Landschaftsplanung  
 Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern  
 Naturschutzarbeit in Sachsen  
 Naturschutzreport Thüringen  
 Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau  
 Naturwissenschaftliche Rundschau  
 NNA-Berichte  
 Rheinische Naturforschende Gesellschaft  
 Schriftenreihe Bayerisches Landesamt für Umweltschutz  
 Stadt und Grün  
 Tuexenia  
 Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie  
 Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg  
 Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung  
 Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz
- ABTS, U. W. und J. HEINRICH (1996): Zur Moosflora der Eternit- und Betonziegdächer des Niederrheinischen Tieflandes (Nordrhein-Westfalen). *Bryologische Mitteilungen* Nr. 2: 5-10
- ACKERMANN, W. (1997): Einsatz eines Geographischen Informationssystems im Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogramm. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 143: 223-230
- AHRENS, M., W. SCHRÖDER und L. MEINUNGER (1996): *Tortula brevissima* Schiffn. – Über Neufunde in Deutschland. *Bryologische Mitteilungen* Nr. 1: 31-38
- ANT, H. und H. WEDECK (1996): Änderungen in der Artenzusammensetzung der Ackerunkrautvegetation sowie der Schneckenfauna auf Kalkböden nördlich von Hamm (Westfalen) zwischen 1969 und 1994. *Tuexenia* 16: 497-507
- APFFELSTAEDT, F. und K. G. BERNHARDT (1996): Vegetations- und populations-biologische Untersuchungen zur Dynamik von Naturwaldzellen und Windwurfflächen in Nordrhein-Westfalen. *Tuexenia* 16: 43-63
- ARN, D., A. GIGON und D. GUT (1997): Zwiebelgeophyten in Rebbergen der Nordostschweiz: Artenschutz und naturnaher Weinbau. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* 6: 65-74
- BADER, D. und M. FLADE (1996): Pflege- und Entwicklungsplanung für Brandenburgs Großschutzgebiete – Funktion, Inhalte, Arbeitsweise, Umsetzung. *Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg*. 5 (3): 10-21
- BARTH, H. (1997): Auswirkungen des Skilanglaufs auf die Vegetation in Feuchtgebieten. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 143:205-212
- BARTH, U., A. FRISCH, T. GREGOR und E. SCHÄFER (1996): Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (*Sedum villosum* L.) in Hessen und der bayerischen Rhön. *Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft* 66/67: 55-68
- BARTHA, D. (1996): Die ausgestorbenen und gefährdeten Baum- und Straucharten in Mitteleuropa. *Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft* 82: 43-49
- BASTIAN, O. (1997): Gedanken zur Bewertung von Landschaftsfunktionen – unter besonderer Berücksichtigung der Habitatfunktion. *NNA-Berichte* 10 (3), 106-125
- BAUER, S., S. HAHN, G. KUNERT und C. MÜLLER (1997): Floristische und faunistische Untersuchungen im Gebiet des ehemaligen Truppenübungsplatzes Rothenstein bei Jena. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* 34: 33-39
- BAUMANN, K. (1996): Kleinseggenriede und ihre Kontaktgesellschaften im westlichen Unterharz (Sachsen-Anhalt). *Tuexenia* 16: 151-177
- BECKER, C. (1996): Magerrasen-Gesellschaften auf Zechstein am südlichen Harzrand (Thüringen). *Tuexenia* 16: 371-401
- BECKER, R. (1997): Zur Verbreitung der Armluchteralgen (*Characeae*) im Weser-Ems-Gebiet. *Floristische Rundbriefe* 31: 69-79
- BEHM, A (1997) Naturnahe Forstwirtschaft in Bayern. Die Erhaltung forstlicher Genressourcen integriert in die praktische Waldbewirtschaftung. *LÖBF-Mitteilungen* 22 (4): 40-47
- BELOW, H., H. H. POPPENDIECK und C. HOBOHM (1996): Verbreitung und Vergesellschaftung von *Oenanthe conioides* (Nolte) Lange im Tidegebiet der Elbe. *Tuexenia* 16: 299-310
- BERG, C. (1997): Wie beeinflusste der Mensch die Flora Mecklenburg-Vorpommerns. *Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs* 35: 159-172
- BERNHARDT, K. G., J. TESMER, C. RUTH und H. SCHURBOHM (1996): Die Vegetation der „Karrenderfer Wiesen“- Inventarisierung des Zustandes 1994-1995. *Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern* 32: 84-100
- BETTINGER, A. (1996): Die Auenwiesen des Saarlandes. *Tuexenia* 16: 251-297
- BEUG, H. J. (1996): Wie haben sich im Hochharz die Sattelvermoorungen gebildet? *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* 8: 193-198
- BEUG, J. (1996): Die Stillgewässer des Ems-, Aller- und Leinetals im vegetationskundlichen Vergleich. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* 8: 45-60
- BIERMANN, R. (1996): *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. in Silbergrasfluren ostfriesischer Inseln. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* 8: 61-68

- BILL, H. C., P. SPAHN, M. REICH und H. PLACHTER (1997): Bestandsveränderungen und Besiedlungsdynamik der Deutschen Tamariske, *Myricaria germanica* (L.) Desv., an der Oberen Isar (Bayern). Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 137-150
- BISCHOFF, A. (1996): Zur Regeneration von Biozöosen belasteter Agrarökosysteme – Ergebnisse aus dem Projekt STRAS unter besonderer Berücksichtigung der Segetalvegetation. NNA-Berichte 9 (2), 12-23
- BLISCHKE, H., C. BRAUNS, O. KISSLING und C. VEEN (1997): Beitrag zum Pflege- und Entwicklungsplan für den Rödel. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 34 (1): 25-38
- BOCKHOLT, R., U. FUHRMANN und G. BRIEMLE (1996): Anleitung zur korrekten Einschätzung von Intensitätsstufen der Grünlandnutzung. Natur und Landschaft 71: 249-251
- BÖHMER, H. J. (1997): Zur Problematik des Mosaik-Zyklus-Begriffes. Natur und Landschaft 72: 333-338
- BOHNSACK, K. und S. KRAUSE (1996): Wald- und Forstgesellschaften des immissionsgeschädigten Naturschutzgebietes Schwarze Heide – Kriegswiese. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F. 15: 87-102
- BOLBRINKER, P. (1997): *Lemna turionifera* und *minuta* – zwei neue bzw. zu erwartende Wasserlinsen in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 93-96
- BORSDORF, W. (1996): Verbreitungskarten sächsischer Moose II. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F. 15: 127-150
- BOTSCH, H. J., P. HAGENBUCH, H. M. ROTH und B. WILD (1997): Naturraumbezogene Auswertung der Biotopkartierung Flachland. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 143: 220-222
- BRACKEL, W. v. und M. BRUNNER (1997): Geobotanische Dauerbeobachtung in Grünflächen der Stadt München. Stadt und Grün 46: 107-116
- BRAHMS, M. (1996): Das Feuchtgrünlandschutzprogramm des Niedersächsischen Umweltministeriums. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 16: 53-56
- BRANDT, I. (1996): Praktische Grünlandbewirtschaftung. Nutzungsregime, Folgen für den Pflanzenbestand und Nutzergruppen. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 185-188
- BRANDT, I. (1996): Zum Vorkommen von *Wolffia arhiza* (L.) Wimmer und *Azolla filiculoides* Lam. in Bergedorf und den Vierlanden. Berichte des Botanischen Vereins zu Hamburg 16: 81-85
- BREITFELD, M. (1996): *Pentaglottis sempervirens* (L.) TAUSCH et L. H. BAILEY im Vogtland verwildert. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F. 15: 193-196
- BRENNENSTUHL, G. (1997): Zur Verwilderung von *Prunus mahaleb* L. aus aufgegebenen Sauerkirschen-Anpflanzungen. Floristische Rundbriefe 31: 51-54
- BRIEMLE, G. (1997): Wieviel Düngung „verträgt“ ein artenreicher Kalkmagerrasen der Schwäbischen Alb? Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 201-225
- BRIEMLE, G. (1997): Zur Anwendbarkeit ökologischer Wertzahlen im Grünland. Angewandte Botanik 71: 219-228
- BRONNER, G., R. OPPERMANN und S. RÖSLER (1997): Umweltleistungen als Grundlage der landwirtschaftlichen Förderung. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 357-365
- BRUNNER, B., F. SCHARFE und W. SCHLUND (1997): Landschaftspflege und Sukzession! – Das Pflege- und Entwicklungskonzept für das NSG „Dallauer Tal“. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 135-155
- BUCHWALD, R. (1996): Basikline Pfeifengraswiesen (*Molinietum caeruleae*) und ihre Kontaktvegetation im weiteren Alb-Wutach-Gebiet (Hochrhein, SW-Deutschland). I. Verbreitung, Synsystematik und Verbrachung der Pfeifengraswiesen. Tuexenia 16: 179-225
- BUDER, W. (1997): Ergebnisse des ersten Durchganges der selektiven Biotopkartierung in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Radebeul, 131 Seiten
- BUDER, W. und I. KUHNERT (1996): Ergebnisse der selektiven Biotopkartierung in Sachsen und ihre Nutzung im Naturschutz. Naturschutzarbeit in Sachsen 38: 3-12
- BÜHLER, F. und G. BRIEMLE (1997): Schnellansprache von Feuchtgrünland. Botanische Charakterisierung ein- bis dreischüriger Wiesen. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 49-53
- BURKART, M. und J. PÖTSCH (1996): Zur floristischen Gliederung und Syntaxonomie der Brenndoldenwiesen in der unteren Havelaue. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 283-296
- BUSCH, C. (1996): Veränderung der Vegetation durch militärischen Übungsbetrieb. NNA-Berichte 9 (1), 78-90
- BÜSCHER, D., G. H. LOOS und R. WOLFF-STRAUB (1997): Charakteristik der Flora des Ballungsraumes „Ruhrgebiet“. LÖBF-Mitteilungen 22 (3): 28-35
- CHRISTENSEN, E. (1996): Neuer Fund der Betarübe an Schleswig-Holsteins Ostseeküste. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg 24: 30-38
- CLAUSNITZER, U. (1996): Zur bachbegleitenden Vegetation von Beke und Waidbach. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 17-34
- DANIELS, F. J. A. (1997): Zur Bedeutung von Flechten und Moosen bei der naturschutzrelevanten Gebietsbewertung. NNA-Berichte 10 (3), 95-100
- DEGENBECK, M. (1996): Infrarotluftbilder von Steuobstbeständen. Stadt und Grün 45: 122-124
- DEGLER, J. (1996): Anmerkungen zur Taxonomie und Bestimmung von Schaf-Schwingel – i.w.S. (*Festuca ovina* agg.) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Schleswig-Holsteins. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg 24: 1-29

- DENGLER, J. (1996): Das *Festuca ovina*-Aggregat in Mecklenburg-Vorpommern – Bestimmungsschlüssel und Kartieraufwurf. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 89-96
- DENYS, C., C. THIES, R. FISCHER und T. TSCHARNTKE (1997): Die ökologische Bewertung von Ackerrandstreifen im integrierten Landbau. Mitteilungen aus der NNA 8 (3), 2-11
- DENYS, C., T. TSCHARNTKE und R. FISCHER (1997): Die Besiedlung von Wildkräutern durch Insekten in eingesäten und selbstbegrüntem Ackerrandstreifen und im Getreideacker. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 411-418
- DIERSCHKE, H. (1996): Syntaxonomische Stellung von Hochstauden-Gesellschaften, insbesondere aus der Klasse *Molinio-Arrhenatheretea* (*Filipendulion*). Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 145-158
- DIERBEN, K. (1996): Bestimmungsschlüssel der Torfmoose in Norddeutschland. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 50: 1-86
- DORMANN, C. F. (1997): Sandrohr (*Calamagrostis epigejos* (L.) Roth) in Trockenrasen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin: Bestandsstruktur, ökologische Auswirkungen und Pflegemaßnahmen. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 207-217
- DÖSCHER, K., T. BRÜNING und A. GERLACH (1997): Zur Phänologie von Halophyten der niedersächsischen Nordseeküste. Tuexenia 17: 147-158
- DOYLE, U., U. HERPIN, B. MARKERT, U. SIEWERS, H. LIETH und H. BAU (1996): Monitoring der Schwermetallbelastung in der Bundesrepublik Deutschland mit Hilfe von Moosanalysen am Beispiel des Konzentrationsmusters von Blei. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 17-23
- DREGER, F. (1997): Aktuelle und potentielle Hydrophytenvegetation wasserführender Sölle in der Uckermark. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 6: 142-146
- DÜRHAMMER, O. (1997): Die Moosflora der Gipfelregion des Großen Arbers. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 44: 79-98
- DÜRR, A. (1997): Die Umsetzung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der kommunalen Bauleitplanung. Mitteilungen aus der NNA 8 (2): 56-69
- ECKERT, G. und H. JACOB (1997): Reduktion von *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. in Kalkmagerrasen – ein Beitrag zur Verbesserung der Beweidbarkeit basiphiler Wacholderheiden der Schwäbischen Alb. Natur und Landschaft 72: 193-198
- ENDRESS, H. (1996): Zur Bestandssituation von Gebirgsorchideen in den thüringischen Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt sowie im Landkreis Kronach (Oberfranken). Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 33: 76-79
- ENDTMANN, J. (1996): Zur Bestimmung der einheimischen *Pyrola*-Arten. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 79-88
- ERZ, S. (1996): Sukzession von Weinbergsbrachen. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 19-25
- ERZBERGER, P. (1996): Moose Mecklenburg-Vorpommerns VIII: *Hedwigia stellata* Hedenäs. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 147-152
- EWALD, J. (1996): Graslahner – Rasengesellschaften in der montanen Waldstufe der Tegernseer Kalkalpen. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 115-133
- FEICKERT, U. und J. KÖPPEL (1996): Können (fiktive) Wiederherstellungskosten von Biotopen plausibel und zuverlässig ermittelt werden? Natur und Landschaft 71: 51-58
- FELLENBERG, U. (1997): Erhaltungsarbeit für seltene Baumarten. NNA-Berichte 10 (2), 32-37
- FILODA, H., H. W. KALLEN und S. BELKE (1996): Wiesen-schutz und Heuvermarktung. Schutzprogramm für traditionell bewirtschaftete Feuchtwiesen. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 133-138
- FISCHER, A. (1997): Vegetationskunde als Grundlage der forstlichen Nutzung. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 9: 107-122
- FISCHER, U. (1997): Das Vorkommen bedrohter höherer Pflanzen im NSG „Peenewiesen bei Gützkow“. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 47-66
- FLEISCHNER, A. (1996): Einsatz von Exmoor-Ponys in der Landschaftspflege. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 33: 73-76
- FRAHM, J. P. (1996): Hängemoose in Mitteleuropa. Bryologische Mitteilungen Nr. 2: 39-42
- FRANK, D. (1996): Kartieranleitung zur aktuellen Erfassung der Farn- und Blütenpflanzen in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 9-14
- FRIEBEN, B. (1996): Organischer Landbau – eine Perspektive für die Lebensgemeinschaften der Agrarlandschaft? NNA-Berichte 9 (2), 52-59
- FRIELINGHAUS, M. (1996): Zur Bedeutung des Offenland-Wald-Verhältnisses in Brandenburg. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 37: 253-257
- FRÜND, H. C. (1996): Dachbegrünung als Lebensraum für Tiere? Stadt und Grün 45: 92-96
- GAGGERMEIER, H. (1997): Flora und Vegetation in den Naturschutzgebieten „Großer Arbersee und Arberseeewand“ und „Riesloch“. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe 144: 28-38
- GARVE, E. und R. v. D. MEIJDEN (1997): *Ludwigia natans* ELLIOTT bei Hannover sowie Hinweise zur Bestimmung adventiver *Ludwigia*-Arten. Floristische Rundbriefe 31: 9-12
- GARVE, E. und A. PELZER (1996): Artenhilfsmaßnahmen für hochgradig gefährdete Farn- und Blütenpflanzen im Regierungsbezirk Hannover. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 16: 272-273
- GARVE, E. und D. ZACHARIAS (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen des ehemaligen Amtes Neuhaus (Mittelbebe, Lkr. Lüneburg). Ergebnisse einer 1994 durchgeführten Detailkartierung. Tuexenia 16: 579-625

- GARVE, E. und D. ZACHARIAS (1997): Kartierungen der Flora im ehemaligen Amt Neuhaus 1994 und 1995. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 17: 126-128
- GEHLKEN, B. (1997): *Ambrosia artemisiifolia* L. und *Panicum miliaceum* L. in einer Wegmalvenflur (*Urtico-Malvetum neglectae* LOHM. in TX. 1950 ) in Spiekershausen (Gemeinde Staufenberg/Südniedersachsen). Floristische Rundbriefe 31: 159-161
- GEHLKEN, B. (1997): Die Verwendung des Forstbegriffs in der Pflanzensoziologie, der Vegetationskunde und der Landschaftsplanung. Natur und Landschaft 72: 550-555
- GEISLER-STROBEL, S., J. GRAS und F. HERBST (1997): Bergbaufolgelandschaft und Naturschutz in den östlichen Bundesländern – Defizite und Lösungsansätze, dargestellt am Beispiel der Tagebauregion Goitzsche bei Bitterfeld. Natur und Landschaft 72: 235-238
- GEROWITT, B. (1996): Ökologische Auswirkungen von Ackerbausystemen am Beispiel des interdisziplinären Forschungsvorhabens INTEX. NNA-Berichte 9 (2), 23-31
- GERSTBERGER, P., H. D. HORBACH und W. WURZEL (1996): Taxonomie, Verbreitung und Ökologie von *Poa supina* Schrader in Nordost-Bayern. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 47-54
- GETTNER, S. und K. HEINZEL (1996): Vorschlag zur Arbeitsweise mit der Biotoptypen-Kartierung als Grundlage für Landschaftspläne in Schleswig-Holstein. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg 24: 39-62
- GEYER, H. J. und A. M. SCHULTE (1997): Die Zierliche Glanzleuchteralge (*Nitella gracilis* (SMITH) AG.) im Hochsauerlandkreis. Floristische Rundbriefe 31: 175-178
- GIGON, A., R. LANGENAUER und C. MEIER (1996): Blaue Listen der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Arten der Roten Listen; Probleme und Chancen. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 295-300
- GISEKE, U. und U. RENKER (1997): Biotopflächenfaktor für die Innenstadt. Garten + Landschaft 107 (7), 21-23
- GLIEMEROTH, A. K. (1997): Paläoökologische Aspekte der Einwanderungsgeschichte einiger Baumgattungen während des Holozäns nach Europa. Angewandte Botanik 71: 54-61
- GOLDAMMER, J. G., S. MONTAG und H. PAGE (1997): Nutzung des Feuers in mittel- und nordeuropäischen Landschaften. Geschichte, Methoden, Probleme, Perspektiven. NNA-Berichte 10 (5), 18-38
- GOLDAMMER, J. G., H. PAGE und J. PRÜTER (1997): Feuerersatz im Naturschutz in Mitteleuropa – Ein Positionspapier. NNA-Berichte 10 (5), 2-17
- GOLISCH, A. (1996): Buchenwälder im Kreis Lippe (NRW) mit einer Übersicht über die *Quercus-Fagetum*. Tuexenia 16: 3-24
- GRABHERR, G. (1997): Vegetations- und Landschaftsgeschichte als Grundlage für Natur- und Landschaftsschutz. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 9: 37-48
- GRUB, A., J. PERRITAZ und F. CONTAT (1996): Förderung der Segetalflora auf ertragreichem Boden am Beispiel von Ackerschonstreifen. Angewandte Botanik 70: 101-112
- HAAP, I. (1997): Die Lindenstelle bei Mössingen, Lkr. Tübingen, als schützenswerter Orchideenstandort. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 441-457
- HAAREN, C. v., U. JANßEN, E. HAUBFLEISCH und R. HORN (1997): Naturschutzfachliche Erfolgskontrollen von Pflege- und Entwicklungsplänen. Erfahrungen im Rahmen einer beispielhaften Durchführung an den Eifelmaaren. Natur und Landschaft 72: 319-327
- HABER, W. (1996): Von der Schwierigkeit der Abwägung zwischen Eingriffen in Natur und Landschaft. Zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 287-294
- HABER, W. (1996): Die Landschaftsökologen und die Landschaft. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 297-310
- HACKEL, H. und I. DANELUK (1996): Die Efeu-Sommerwurz, *Orobanche hederæ* Duby – neu für Südbayern. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 193-194
- HÄDER, D. P. (1996): Aquatische Ökosysteme und globale Klimaveränderungen. Biologie in unserer Zeit 26: 215-221
- HAENSCHKE, J. (1996): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau III. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 9: 49-66
- HAKES, W. (1996): Multivariate Ordinationsmethoden zur Analyse von Veränderungen in der Vegetationsstruktur. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 12-19
- HAMMEL, S. (1997): Zur Vergesellschaftung von *Lactuca saligna* L. an einem süddeutschen Wuchsort. Floristische Rundbriefe 31: 171-174
- HARDTKE, H. J., W. HEMPEL, A. IHL und P. A. SCHMIDT (1996): Ergebnisse der Viertelquadranten-Kartierung in Sachsen – erste Verbreitungskarten für ausgewählte Arten. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N:F: 15: 17-38
- HARDTKE, H. J. und F. MÜLLER (1996): Zur Verbreitung ausgewählter Arten der Elbuferflora im Dresdner Raum. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F. 15: 103-126
- HÄRDTLE, W. (1996): Vorkommen und Bestandesentwicklung seltener Waldarten im nördlichen Schleswig-Holstein. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg 24: 63-80
- HÄRDTLE, W., H. BRACHT und C. HOBOHM (1996): Vegetation und Erhaltungszustand von Hartholzauen (*Quercus-Ulmetum* Issl. 1924) im Mittelbegebiet zwischen Lauenburg und Havelberg. Tuexenia 16: 25-38
- HEIDT, E., R. SCHULZ und H. PLACHTER (1997): Konzept

- und Requisiten der naturschutzfachlichen Zielbestimmung, dargestellt am Beispiel einer Agrarlandschaft Nordostdeutschlands (Uckermark; Brandenburg). Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 263-272
- HEINRICH, W., R. MARSTALLER, R. BÄHRMANN und L. KRAUTWURST (1997): Das Naturschutzgebiet „Leutratl“. 60 Jahre Schutz – 25 Jahre Forschung. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 34: 65-92
- HEMP, A. (1996): Ökologie, Verbreitung und Gesellschaftsanschluss ausgewählter Eiszeitrelikte (*Cardaminopsis petraea*, *Draba aizoides*, *Saxifraga decipiens*, *Arabis alpina* und *Asplenium viride*) in der Pegnitzalb. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 233-267
- HENGEL, U. VAN (1996): Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ genehmigt. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 33: 53-56
- HENKER, H. (1996): Erstnachweise und Einbürgerungen bemerkenswerter Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 135-140
- HENKER, H. (1997): *Rubus hallandicus* – neu für Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 105-106
- HENRICHFREISE, A. (1996): Uferwälder und Wasserhaushalt der Mittelelbe in Gefahr. Natur und Landschaft 71: 246-248
- HERZOG, F. und A. OETMANN (1997): In-situ-Erhaltung von Streuobst – Synergien zwischen Naturschutz und der Bewahrung genetischer Ressourcen. Natur und Landschaft 72: 339-345
- HICKLER, T., T. SCHMOLL und R. WALTHER (1997): Das Naturschutzpotential eines Kerngebietes im Großprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 34: 109-116
- HIEMEYER, F. (1996): Königsbrunner Heide und Garchinger Heide – ein Vergleich. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 219-228
- HILBIG, W. (1996): Die Vegetation mehrjähriger Ackerbrachen und ihre Veränderung im Verlaufe eines fünfjährigen Beobachtungszeitraumes. Angewandte Botanik 70: 57-75
- HILBIG, W. (1997): Auswirkungen von Extensivierungsprogrammen im Ackerbau auf die Segetalvegetation. Tuexenia 17: 295-325
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1997): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) IV. *Orobanche*-Arten. Hessische Floristische Briefe 46: 33-41
- HOBBOHM, C. und W. HÄRDTLE (1997): Zur Bedeutung einiger ökologischer Parameter für die Artenvielfalt innerhalb von Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. Tuexenia 17: 19-52
- HOFMEISTER, H. (1996): Ackerwildkrautschutz auf der Wernershöhe (Niedersächsisches Berg- und Hügelland) im Jahr 1995. NNA-Berichte 9 (2), 43-46
- HOLST, F. und E. ZABEL (1996): Das Slater Moor bei Parchim – ein Gebiet mit besonderer floristischer und pflanzensoziologischer Bedeutung. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 69-72
- HOLZ, I. (1997): Moosflora und -vegetation der Lias-sandsteinfelsen und -blöcke des Ferschweller Plateaus (Naturpark Südeifel). Limprichtia 9: 1-112
- HOLZ, R., C. HERMANN und G. MÜLLER-MOTZFELD (1996): Vom Polder zum Ausdeichungsgebiet: Das Projekt Karrender Wiesen und die Zukunft der Küstenüberflutungsgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 32: 3-27
- HÖLZEL, N. (1996): Zur floristischen Struktur, Ökologie und Dynamik alpischer Karbonat-Trockenkieferwälder der Klasse *Erico-Pinetea*. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 79-98
- HOMM, T. und S. RÄTZEL (1997): *Fissidens viridulus* und *Acaulon triquetrum* – Zwei Neuentdeckungen für die Moosflora von Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 119-121
- HORLITZ, T. und H. DE VRIES (1996): Grenzübergreifendes Naturschutzkonzept für die Neue Hanse Interregio. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 197-206
- HORN, A. und W. SCHMIDT (1996): Waldbodenpflanzen als Nährstoff- und Schwermetall-Indikatoren in Buchennaturwäldern Niedersachsens. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 25-30
- HORN, K., O. ELSNER, L. MEIEROTT, M. SCHMID und W. WURZEL (1996): Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung von *Taraxacum nordstedtii* Dahlst. in Bayern. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67:269-288
- HÜBSCHEN, J. und A. SCHMIDT (1997): Biotopverbund im Ruhrgebiet LÖBF-Mitt. 22 (3): 65-71
- HÜGIN, G. und H. HÜGIN (1996): Neue Höhenrekorde für Ruderal- und Segetalpflanzen in den Alpen. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 161-174
- HUNDT, R. (1996): Zur Veränderung der Wiesenvegetation Mitteldeutschlands unter dem Einfluß einer starken Bewirtschaftungsintensität. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 127-144
- HÜPPE, J. (1996): Geobotanische Überlegungen bei der Erstaufforstung bisher landwirtschaftlich genutzter Anbauflächen. LÖBF-Mitt. 21 (3): 29-32
- HUSICKA, A. und A. VOGEL (1997): Refugien unter Weidezäunen? Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen an Weiderändern. LÖBF-Mitt. 22 (2): 41-47
- IHL, A. und H. J. HARDTKE (1996): Viertelquadranten-Kartierung in Sachsen – erfolgreiche Zwischenbilanz nach zwei Jahren. Naturschutzarbeit in Sachsen 38: 41-48
- ISSELSTEIN, J. und M. HOFMANN (1996): Zur Etablierung und Konkurrenzkraft des Gewöhnlichen Löwenzahns (*Taraxacum officinale* Web.) im Grasland. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 519-526

- JÄGER, E. J. und M. H. HOFFMANN (1997): Schutzwürdigkeit von Gefäßpflanzen aus der Sicht der Gesamtareale. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 225-232
- JANOWITZ, H. (1996): Vegetationskundliche und geomorphologische Untersuchungen an schwermetallhaltigen Halden des Sangerhäuser Reviers und der Mansfelder Mulde. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 33 (2): 15-24
- JEDICKE, E. (1996): Rote Listen in Deutschland. Bearbeitungsstand, Bilanz und Weiterentwicklung in Bund und Ländern. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 361-370
- JURGEIT, F., F. EPPERT und W. HAENSCHKE (1997): Geschützte Natur in der Mulde. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 34 (Sonderheft): 50-61
- KAISER, T. (1996): Die potentielle natürliche Vegetation als Planungsgrundlage im Naturschutz. Natur und Landschaft 71: 435-439
- KAISER, T. und A. FISCHER (1997): Eignung von Schafen (Skudde und Merinofleischschaf) für die Landschaftspflege auf extensiviertem Niedermoorgrünland. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 38: 172-177
- KALLEN, H. W. (1996): Die Gelbe Bartsie *Parentucellia viscosa* (L.) CARUEL neu in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 133-134
- KALLEN, W. und P. FISCHER (1997): Rückblick auf die Verbreitung der Silberscharte – *Jurinea cyanoides* – in Norddeutschland. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 89-92
- KATZUR, J. (1997): Bergbaufolgelandschaften in der Lausitz. Naturraumpotentiale und Naturressourcen im Braunkohlenrevier. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 114-121
- KELLERER, C. und H. ALBRECHT (1996): Ausbreitung von Pflanzen der landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Rindergülle. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 729-736
- KIEHL, K. (1997): Vegetationsmuster in Vorlandsalzwiesen in Abhängigkeit von Beweidung und abiotischen Standortfaktoren. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 52: 1-142
- KIEBLING, J. und K. M. STETZKA (1997): Die Moosflora des Forstbotanischen Gartens Tharandt – Vorkommen, Ökologie, Gefährdung. Limprichtia 10: 5-176
- KIFFE, K. (1997): Ein Neufund von *Carex pseudobrizoides* in Mecklenburg-Vorpommern und ein Bestimmungsschlüssel der Arten der Sektion *Amoglochin*. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 97-104
- KINDER, M., I. VAGTS, H. CORDES und B. KÜVER (1997): Zur Biologie und Ökologie des Knollen-Fuchschwanzes (*Alopecurus bulbosus* GOUAN) an der deutschen Nordseeküste. Drosera 97: 1-19
- KINTZEL, W. (1996): Der Hainwachtelweizen-Saum (*Trifolium medii-Melampyretum nemorosi*) – eine seltene Saumgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 49-56
- KINTZEL, W. (1997): Das *Convolvulo-Brometum carinatis* ass. nov. – ein neuer ruderaler Halbtrockenrasen in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 33-38
- KLEIN, M., U. RIECKEN und E. SCHRÖDER (1997): Begriffsdefinitionen im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 229-237
- KLEINEVOSS, K., W. TOPP und J. BOHAC (1996): Buchen-Totholz im Wirtschaftswald als Lebensraum für xylobionte Insekten. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 5: 85-95
- KLEINSCHMIT, J. (1997) Erhaltung von Waldbaum- und Straucharten in Niedersachsen. LÖBF-Mitt. 22 (4): 30-35
- KLOCKE, A. (1997): Laubwald-Gesellschaften trockenwarmer Standorte im nördlichen Sollingvorland und im Wesertal bei Bodenwerder. Tuexenia 17: 59-79
- KLOTZ, E. (1997): Standortsverbesserung für einen Saumpfärlapp-Fundort im Schwäbisch-Fränkischen Wald. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 227-232
- KNÖRZER, K. H. (1996): Beitrag zur Geschichte der Grünlandvegetation am Niederrhein. Tuexenia 16: 627-636
- KOCH, M. (1996): Zur Ausbreitung des Dänischen Löf felkrauts (*Cochlearia danica* L.) als Küstensippe in das Niedersächsische Binnenland. Floristische Rundbriefe 30: 20-23
- KOCH, M. (1997): Kurznotiz zur südlichen Ausbreitung des Dänischen Löf felkrauts (*Cochlearia danica* L.) in Nordrhein-Westfalen. Floristische Rundbriefe 31: 136-138
- KOCH, M. und K. G. BERNHARDT (1996): Zur Entwicklung und Pflege von Kalkmagerrasen. Natur und Landschaft 71: 63-69
- KOHLER, A. und H. TREMP (1996): Möglichkeiten zur Beurteilung des Säuregrades und der Versauerungsgefährdung von Fließgewässern mit Hilfe submerser Makrophyten. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 195-203
- KONOLD, W. (1996): Gewässerauen – Bedeutung und Funktion. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 37: 146-153
- KONOLD, W. (1997): Wässerwiesen, Wölbäcker, Hackäcker: Geschichte und Vegetation alter Kulturlandschaftselemente in Südwestdeutschland. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 53-61
- KONOLD, W. (1997): Genese und Wandel der Oberlausitzer Kulturlandschaft. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 35-44
- KOPERSKI, M. (1996): Bryologisch interessante Sekundärstandorte in Bremen. IV. Friedhöfe. Floristische Rundbriefe 30: 163-173
- KOPERSKI, M. (1996): Bemerkungen zu *Scleropodium cespitans* (Müll. Hall.) L.F. Koch. Bryologische Mitteilungen Nr. 1: 28-30
- KOPERSKI, M. (1996): Terrestrische Vorkommen von *Dicranoweisia cirrata* (Hedw.) Lindb. in der

- norddeutschen Tiefebene. Bryologische Mitteilungen Nr. 1: 45
- KOPERSKI, M. (1996): *Bryum demaretianum* Arts in der norddeutschen Tiefebene. Bryologische Mitteilungen Nr. 2: 29-32
- KÖPPEL, J. und K. MÜLLER-PFANNENSTIEL (1996): Perspektiven des Herstellungskostenansatzes. Ein vielseitig verwendbarer Baustein der Eingriffsregelung? Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 340-350
- KÖPPLER, D. und A. SCHWABE (1996): Typisierung und landschaftsökologische Gliederung süd- und west-exponierter Jura-„Steppenheiden“ mit Hilfe von Vegetationskomplexen. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 159-192
- KORNECK, D. und C. WEINGART (1996): Die Kassuben-Wicke (*Vicia cassubica* L.) in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 45: 22-25
- KORSCH, H. (1996): Das *Ranunculus polyanthemos*-Aggregat in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 18-21
- KORSCH, H. (1996): Hinweise zum Anfertigen von Belegen bestimmungskritischer Sippen. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 15-17
- KOSMALE, S. (1997): Westsachsens Wiesen im Wandel der Zeiten. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 26-31
- KRATOCHWIL, A. und T. AßMANN (1996): Biozöologische Untersuchungen in Hudellandschaften des nordwestdeutschen Tieflandes. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 229-237
- KRATOCHWIL, A. und T. AßMANN (1996): Biozöotische Konnexen im Vegetationsmosaik nordwestdeutscher Hudellandschaften. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 237-282
- KRATOCHWIL, A. und A. SCHWABE (1997): Die Bedeutung von biozöologischen Untersuchungen für die naturschutzfachliche Bewertung von Landschaftsausschnitten. NNA-Berichte 10 (3), 61-94
- KRAUSE, S. (1996): Zur Verbreitung und Ökologie von Heufler's Streifenfarn (*Asplenium x alternifolium* WULFEN nssp. *heufleri* (REICHARDT) ALZPURU et al.) Floristische Rundbriefe 30: 114-128
- KREMKAU, K. (1997): Pflege- und Entwicklungsplanung in Wald-Naturschutzgebieten. Natur und Landschaft 72: 78-84
- KRESS, J. C. und A. v. KÜCHLER (1997): Kompensationsflächen im Flächennutzungsplan. Verfahren zur Bestimmung des Bedarfs an Kompensationsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 243-246
- KRUPINSKA, K. (1997): *Cannabis sativa* L. Nutzpflanze mit Vergangenheit und Zukunft. Biologie in unserer Zeit 27: 123-129
- KULP, H.-G. (1997): Ackerwildkrautvegetation als Indikator ressourcen-schonenden Ackerbaus auf Sandböden. Mitteilungen aus der NNA 8 (3), 18-25
- KUNDEL, W. und R. KESEL (1997): *Vulpia bromoides* (L.) S. F. GRAY im Bremer Grünland. Floristische Rundbriefe 31: 151-156
- KÜPPER, F., H. KÜPPER und M. SPILLER (1996): Eine aggressive Wasserpflanze aus Australien und Neuseeland *Crassula helmsii* (KIRK) COCKAYNE. Ein neuer Fund in Westfalen. Floristische Rundbriefe 30: 24-29
- LAKMANN, G. und U. CORDES (1996): *Ludwigia palustris* (L.) ELLIOTT in Nordrhein-Westfalen und im Raum Osnabrück. Floristische Rundbriefe 30: 65-79
- LEHMANN, I. und E. SCHREIBER (1996): Die Hainbuche (*Carpinus betulus* L.) in landschaftsprägenden und besonders schutzwürdigen Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 143-146
- LINDLAR, A. (1997): Standörtliche Differenzierung epilithischer Moosgesellschaften und Wandel der Moosflora im Siebengebirge. Limprichtia 8: 1-99
- LISBACH, I. und C. PEPLER-LISBACH (1996): Magere Glattgraswiesen im Südöstlichen Pfälzerwald und im Unteren Werraland. – Ein Beitrag zur Untergliederung des *Arrhenatheretum elatioris* Braun 1915. Tuexenia 16: 311-336
- LITTERSKI, B., A. ABDANK, W. WIEHLE und C. BERG (1997): Zusammenstellung geobotanischer Diplomarbeiten, Gutachten und Forschungsberichte aus dem Gebiet Mecklenburg-Vorpommerns der Jahre 1991 bis 1995. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 133-156
- LOOS, G. H. (1996): Sind *Juncus gerardii* LOISEL. und *Plantago winteri* WIRTG. obligate oder fakultative Halophyten? Floristische Rundbriefe 30: 154-157
- LOOS, G. H. (1997): Zur Taxonomie der Goldnesseln (*Lamium* L. subgenus *Galeobdolon* (ADANS.) ASCHERS.). Floristische Rundbriefe 31: 39-50
- LÖRCHER, K. W., H. P. ROHMANN und K. SCHESNY (1996): Primärbesiedlung der Mücken-Händelwurz. Eine Studie im Rahmen des Magerrasen-Pflegeprojekts „Drakenberg“. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 172-178
- LOSKE, K. H. und D. LEIFELD (1996): Fließgewässer und Gräben in der Gemeinde Langenberg. Eine Gewässer-Entwicklungsplanung. LÖBF-Mitteilungen 21 (1): 58-69
- LUDWIG, G. (1996): Literatur zu den Moosen Mitteleuropas I. Bryologische Mitteilungen Nr. 2: 47-54
- LUDWIG, W. (1997): *Cerastium siculum* GUSS. an einem Straßenrand bei Marburg (TK 5218/21). Hessische Floristische Rundbriefe 46: 42-45
- LÜBENAU-NESTLE, R. (1996): Neuere Beobachtungen am Wuchsort von *Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. Bryologische Mitteilungen Nr. 1: 46
- LUICK, R. (1996): Extensive Rinderweiden. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 37-45
- LUNAU, K. und S. WACHT (1997): Signalfunktion von Pollen. Biologie in unserer Zeit 27: 169-181
- LÜTKEPOHL, M., J. PRÜTER, W. PFLUG, J. TÖNNIEBEN und U. HANSTEIN (1996): Entwicklungskonzept für die

- im Eigentum des Vereins Naturschutzpark befindlichen militärischen Übungsflächen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. NNA-Berichte 9 (1), 105-121
- LÜTKEPOHL, M. und A. STUBBE (1997): Feuergeschichte in nordwestdeutschen *Calluna*-Heiden unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. NNA-Berichte 10 (5): 105-114
- MANG, F. W. C. (1996): Zur Kenntnis von *Crataegus ovalis* KITAIBEL (1799) und der bisher bekannten Verbreitung in Deutschland. Floristische Rundbriefe 30: 36-39
- MANN, G. (1996): Die Rolle begrünter Dächer aus zoologischer Sicht. Stadt und Grün 45: 97-101
- MANN, G. (1996): Die Rolle begrünter Dächer in der Stadtökologie. Biologie in unserer Zeit 26: 292-299
- MANN, G. (1997): Aus einem Kiesdach wurde ein Naturdach. Stadt und Grün 46: 235-238
- MANZ, E. (1997): Vegetation ehemals militärisch genutzter Übungsplätze und Flugplätze und deren Bedeutung für den Naturschutz. Tuexenia 17: 173-192
- MARKERT, B., J. OEHLMANN und M. ROTH (1997): Biomonitoring von Schwermetallen – eine kritische Bestandsaufnahme. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 1-8
- MAU, I. (1996): Zur Biotopneuschaffung im Naturschutzgebiet Schnaakenmoor. Berichte des Botanischen Vereins zu Hamburg 16: 55-80
- MEINECKE, E. (1996): Anwendung der Eingriffsregelung bei Baumaßnahmen in Flurneuerungsverfahren. Mitteilungen aus der NNA 7 (2): 20-24
- MEINUNGER, L. und W. SCHRÖDER (1996): Bemerkenswerte Moosfunde in Deutschland. Bryologische Mitteilungen Nr. 1: 39-44
- MELZER, A. (1997): Wasserpflanzen und Gewässerversauerung an den Arberseen. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 144: 99-110
- MELZHEIMER, V. und U. LOHWASSER (1997): *Ranunculus auricomus* agg. – kritische Anmerkungen zum gegenwärtigen Stand der Forschung. Floristische Rundbriefe 31: 89-98
- MENZLER, K. (1996): Erstnachweis von *Scorzonera humilis* L., der Niedrigen Schwarzwurzel, in Hessen (auf TK 5116/42). Hessische Floristische Briefe 45: 53-58
- MEYER, K. und F. H. HELLWIG (1996): Untersuchungen zur Rhizomorphologie und Wachstumsstrategie von Geophyten des Göttinger Waldes. Tuexenia 16: 65-71
- MEYER, N. und U. VOIGTLÄNDER (1996): Zur Verbreitung und Soziologie des Rankenden Lerchensporns (*Corydalis claviculata* (L.) LAM. et DC.) in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 73-78
- MEYER, S. (1996): Pflanzengesellschaften und ökologische Gesellschaftskomplexe oligotroph- und mesotroph-saurer Kleinmoore des Niedersächsischen Tieflandes. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 7-24
- MICHELS, C., H. J. ALBERS und P. SCHÜTZ (1996): Effizienzkontrolle von Maßnahmen zur Hochmoornaturierung. LÖBF-Mitteilungen 21 (4): 26-33
- MICHELS, C. und U. RAABE (1996): Das Breitblättrige Knabenkraut als Indikatorart für nordrhein-westfälische Feuchtwiesen. Ein Beitrag zur Erfolgskontrolle des Feuchtwiesenschutzprogramms. LÖBF-Mitteilungen 21 (2): 28-34
- MICHIELS, H. G. (1996): Gebüschgesellschaften in den Hochlagen des Mangfallgebirges. Tuexenia 16: 73-85
- MILLER, U. J. und J. PFADENHAUER (1997): Renaturierung von Kalkmagerrasen. Zur Vorhersage der gelenkten Sukzession durch Aufbringung von diasporenhaltigem Mähgut. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 155-163
- MIRSCH, A. (1997): Vegetationskundliche Untersuchungen auf Heide-Brand-Flächen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ im Hinblick auf Brand als Pflegemaßnahme. NNA-Berichte 10 (5), 119-128
- MOHR, H. (1996): Sind Landpflanzen durch erhöhte UV-Strahlung besonders gefährdet? Biologie in unserer Zeit 26: 240-244
- MÖLLER, H. (1997): Reaktions- und Stickstoffzahlen nach Ellenberg als Indikatoren für die Humusform in terrestrischen Waldökosystemen im Raum Hannover. Tuexenia 17: 349-365
- MÖLLER, J. und M. FIDDICKE (1996): Der Übungsplatz Altranft – Bedeutung und Gefährdung eines kleinen militärischen Ausbildungsgeländes. Natur und Naturschutz auf Truppenübungsplätzen, Folge 8. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. 5 (3): 29-33
- MÖSELER, B. M. und R. WINGENDER (1997): *Euphrasia frigida* PUGSLEY im Rheinischen Schiefergebirge. Floristische Rundbriefe 31: 82-88
- MÜHLE, H. (1996): Vorschläge zu einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung der Landwirtschaft unter Berücksichtigung von Naturschutzaspekten. NNA-Berichte 9 (2), 5-10
- MÜHLENBERG, M. (1997): Zur Rolle der Ökologie als Grundlage für den Naturschutz. NNA-Berichte 10 (1), 53-62
- MÜLLER, F. (1996): Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von Sachsen. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F. 15: 151-192
- MÜLLER, F. (1996): Beitrag zur Moosflora der Moor- und Feuchtgebiete im Südostteil der Dübener Heide. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 9: 67-84
- MÜLLER, F. (1996): Bemerkenswerte Moosfunde aus Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 153-156
- MÜLLER, J. (1996): Zum Vorkommen von *Carex melanostachya* WILLD. im Mittelelbegebiet. Floristische Rundbriefe 30: 83-90
- MÜLLER, J. und P. POSCHLOD (1997): Wiederbesiedlung von gerodeten Talflächen im Mittelgebirge. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 63-70
- MÜLLER, J., I. VAGTS und E. FRESE (1997): Pflanzliche Re-

- generationsstrategien und Besiedlungsdynamik in nordwestdeutschen *Calluna*-Heiden nach Brand. NNA-Berichte 10 (5), 87-104
- MÜLLER, R. (1996): Die Schachblumen im Junkernfeld. Berichte des Botanischen Vereins zu Hamburg 16: 86-94
- MÜLLER-MOTZFELD, G., J. SCHMIDT und C. BERG (1997): Zur Raumbedeutsamkeit der Vorkommen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 33: 42-70
- MÜLLER-STARCK, G. (1997): Genetische Kriterien für die Erhaltung forstlicher Genressourcen. NNA-Berichte 10 (2), 21-25
- NAUMANN, G. (1997): Generhaltung durch Biotoppflege. Maßnahmen zugunsten seltener Baum- und Straucharten im Bereich des Forstamtes Bad Münnstereifel. LÖBF-Mitteilungen 22 (4): 66-68
- NIEMEYER, F. (1997): Erfahrungen mit dem Feuereinsatz im Neustädter Moor. NNA-Berichte 10 (5), 82-86
- NOHL, W. (1996): Halbierter Naturschutz. Natur und Landschaft 71: 214-219
- OCHSMANN, J. (1997): Ein Bestand von *Centaurea x Psammogena* GAYER (*Centaurea diffusa* LAM. x *Centaurea stoebe* L.) am NSG Sonnenstein (Thüringen). Floristische Rundbriefe 31: 118-125
- OSTENDORP, W. (1997): Auswirkungen von Wintermahd auf den Nährstoffhaushalt von Seeufferröhrichten des Bodensee-Untersees. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 227-234
- OTTE, A. (1996): Die Kennzeichnung der Vegetation ländlicher Siedlungen in Bayern über ökologische Zeigerwerte. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 205-214
- OTTE, V. (1996): Moose und Flechten aus dem Alvensleber Hügelland. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 28-30
- PANEK, N. und A. FREDE (1997): Mindestkosten für die Sicherung und Erhaltung der Naturpotentiale in der Agrarlandschaft. Berechnet am Beispiel des Kreises Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 133-137
- PANTEN, H., J. P. SCHNITZLER und R. STEINBRECHER (1996): Wirkung von Ultraviolettstrahlung auf Pflanzen. Naturwissenschaftliche Rundschau 49: 343-348
- PARDEY, A., E. HACKER und B. SCHIPPERS (1996): Beispiel einer lokalen Biotopverbundplanung. Schutz und Verbundkonzeption „Galmeifluren“ für den Raum Stolberg (Rheinland). LÖBF-Mitteilungen 21 (3): 50-55
- PARTZSCH, M. und E. G. MAHN (1997): Welchen Einfluß haben Flächengröße, Entwicklungszeit und standörtliche Vielfalt isolierter Offenstandorte auf die floristisch-phytozoologische Struktur xerothermer Vegetationskomplexe? Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 93-99
- PASSARGE, H. (1996): Bemerkenswerte Ruderalgesellschaften am Potsdamer Platz/Berlin. Tuexenia 16: 539-552
- PASSARGE, H. (1997): Veränderte Saumgesellschaften im märkischen Fagion-Areal. Tuexenia 17: 239-249
- PATZELT, A., F. MAYER und J. PFADENHAUER (1997): Renaturierungsverfahren zur Etablierung von Feuchtwiesenarten. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 165-172
- PEINTINGER, M., I. STRANG, M. DIENST und C. MEYER (1997): Veränderung der gefährdeten Strand-schmielengesellschaft am Bodensee zwischen 1989 und 1994. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 75-81
- PETERS, M. (1997): Aspekte der Entwicklung initialer Bestände des *Junco baltici-Schoenetum nigricantis* auf der Nordseeinsel Borkum. Tuexenia 17: 137-145
- PETERS, M. und N. HECKER (1996): GIS-gestützte Vegetationsanalysen auf den Ostfriesischen Inseln. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 69-78
- PFADENHAUER, J., H. ALBRECHT und K. AUERSWALD (1997): Naturschutz in der Agrarlandschaft – Perspektiven aus dem Forschungsverbund Agrarökosysteme München (FAM). Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 9: 49-60
- PHILIPPI, G. (1996): Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B. S. G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. carolina 54: 45-52
- PLACHTER, H. (1997): Naturschutz im Abseits? Biologie in unserer Zeit 27: 306-316
- POSCHLOD, P. (1996): Das Metapopulationskonzept – eine Betrachtung aus pflanzenökologischer Sicht. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 5: 161-185
- POSCHLOD, P., S. BONN, S. KIEFER, S. FISCHER, A. FUCHS, A. K. JÄCKEL, D. LILIENTHAL und U. TRÄNKLE (1997): Die Ausbreitung von Pflanzenarten und -populationen in Raum und Zeit am Beispiel der Kalkmagerrasen Mitteleuropas. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 9: 139-158
- POTT, R. (1997): Von der Urlandschaft zur Kulturlandschaft – Entwicklung und Gestaltung mitteleuropäischer Kulturlandschaften durch den Menschen. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 5-26
- POTT, R. (1996): Die Entwicklungsgeschichte und Verbreitung xerothermer Vegetationseinheiten in Mitteleuropa unter dem Einfluß des Menschen. Tuexenia 16: 337-369
- POTT, R. und M. PETERS (1997): Dünendurchbrüche und ihre Bedeutung für die Vegetations- und Landschaftsdynamik. Raum-zeitliche Diversität am Beispiel der Nordseeinsel Norderney. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 69-74
- PRASSE, R. (1996): *Rumex confertus* WILLD., ein Bestandteil der wildwachsenden Flora Berlins und Brandenburgs. Floristische Rundbriefe 30: 80-82
- PREEN, A. v. (1996): Erstaufforstung aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege. LÖBF-Mitteilungen 21 (3): 33-39
- PUSCH, J. und K. J. BARTHEL (1996): Zur floristischen Situation des salzbeeinflussten Gebietes zwischen Riethnordhausen und Hackpüffel. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 38-42

- RADERSCHALL, R., H. BEHRENDT, M. FRIELINGHAUS, W. PAGENKOPF und B. WINNIGE (1997): Ein modulares Konzept zur variablen Gestaltung von Gewässerrandstreifen. 1. Teil: Grundlagen. 2. Teil: Anwendung in drei Einzugsgebieten Brandenburgs. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 38: 76-81, 161-166
- RASKIN, R., G. LENNARTZ, C. PAULSON und P. TAUZ (1996): Bemerkenswerte Moose aus dem Pautenbacher Venn (Hohes Venn, Kreis Aachen). Bryologische Mitteilungen Nr. 2: 33-38
- REBELE, F. (1996): *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth auf anthropogenen Standorten – ein Überblick. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 753-763
- REHBEIN, R. und C. BERG (1997): Bemerkenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften aus dem Rostocker Raum I: *Melampyrum cristatum* L. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 7-16
- REHBEIN, R., B. LITTERSKI und C. BERG (1996): Bemerkenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften aus dem Uecker-Randow-Kreis. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 57-68
- REICHHOFF, L. und A. FEDERSCHMIDT (1996): Zur Vegetation und Fauna des Olbitzgrabens und angrenzender Gebiete. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 9: 85-112
- REICHHOFF, L. und S. SCHLOSSER (1996): Schutz und Nutzung der biologischen Vielfalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 33 (1): 3-10
- REIF, A. (1997): Zielkonflikte im Naturschutz am Oberrhein. Kontroversen und ihre Ursachen am Beispiel der Trockenaue bei Breisach. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 101-107
- REIF, A., R. KATZMAIER und D. KNOERZER (1996): „Extensivierung“ in der Kulturlandschaftspflege. Begriffsdiskussion am Beispiel von Allmendweiden im Südschwarzwald. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 293-298
- RIEGER, E., W. PLEINER und B. ELLINGER (1997): Beweidungsvarianten mit Schafen und Ziegen auf Trockenrasen/Halbtrockenrasen (GLB Mühlenberg bei Brodowin). Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. 6: 90-98
- RIEGER, W. (1996): Ergebnisse elfjähriger Pflegebeweidung von Halbtrockenrasen. Natur und Landschaft 71:19-25
- RILKE, S. (1997): *Salsola collina* PALL. (Chenopodiaceae) – Bemerkungen zum Adventivvorkommen in Deutschland und ihre Abgrenzung zu *Salsola kali* L. Floristische Rundbriefe 31: 99-111
- RISTAU, K. und M. SCHMIDT (1996): Aufstellung über seltene, bemerkenswerte und schöne Bäume, Gehölze und Alleen in Dessau und deren Wertung. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 9: 5-44
- RODENKIRCHEN, H. (1996): Auswertung forstlicher Rekultivierungsversuche auf einer schwermetallreichen Schwefelkies-Bergbauhalde. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 417-424
- ROST, S. (1996): Die Halbtrockenrasen des Elbingeröder Kalksteingebiets (Harz) im Rahmen ihrer Kontaktgesellschaften. Tuexenia 16: 403-432
- ROTH, D. (1996): Agrarraumnutzungs- und -pflegepläne – ein Instrument zur Landschaftsplan-Umsetzung. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 237-242
- ROTH, D. und W. BERGER (1996): Vergütung ökologischer Leistungen der Landwirtschaft – weshalb und wie? Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 107-112
- ROTH, D., H. ECKERT und M. SCHWABE (1996): Ökologische Vorrangflächen und Vielfalt der Flächennutzung im Agrarraum – Kriterien für eine umweltverträgliche Landwirtschaft. Natur und Landschaft 71: 199-203
- RUMPF, H. (1997): Generhaltungsarbeit bei einheimischen Straucharten. NNA-Berichte 10 (2), 38-41
- RUNGE, F. (1996): Über die Auswirkung einer Kalkdüngung auf die Vegetation eines Eichen-Hainbuchenwaldes. Tuexenia 16: 39-41
- RUNGE, F. (1997): Änderungen der Flora eines Entwässerungsgrabens infolge jährlicher „Räumung“. Floristische Rundbriefe 31: 67-68
- RUTHSATZ, B. (1996): Veränderungen der Vegetationsdecke eines Schwingrasens über Torfstichgelände nach Wassereinstau. Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen im Mürmes-Moor (Vulkaneifel). Tuexenia 16: 117-150
- RYL, H. und J. SCHUBOTH (1996): Suche alter Obstsorten im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Erste Ergebnisse 1995. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 33 (1): 11-20
- SACKWITZ, P. (1997): Wiederfund des gestreiften Klees (*Trifolium striatum* L.) im Niedersächsischen Hügell-/Bergland bei Elkershausen. Floristische Rundbriefe 31: 13-16
- SAUERBECK, K. O. (1997): Die Pflanzengesellschaften der großenteils geschützten Wälder und Wiesen an der Körtsch zwischen Stuttgart-Degerloch und Leinfelden-Echterdingen. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 421-440
- SAVELSBERGH, E. (1997): *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. (Vierblättriges Nagelkraut) – Ein Neuling der Aachener Stadtfloren. Floristische Rundbriefe 31: 157-158
- SCHAFFRATH, J. (1996): Zur Erhaltung und Wiederentwicklung von Auwäldern im brandenburgischen Odertal. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. 5 (3): 22-28
- SCHALLER, F. (1997): Lebensrecht und Artenschutz. Biologie in unserer Zeit 27: 317-321
- SCHEPKER, H., I. KOWARIK und E. GARVE (1997): Verwildierungen nordamerikanischer Kultur- Heidelbeeren (*Vaccinium* subgen. *Cyanococcus*) in Niedersachsen und deren Einschätzung aus Naturschutzsicht. Natur und Landschaft 72: 346-351
- SCHUEURER, M. (1997): Die botanische Erforschung des Arbergebietes. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 144: 26-27
- SCHUEURER, M. (1997): Flora und Vegetation am Gipfel des Großen Arbers. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Heft 144: 39-60

- SCHEUERER, M. (1997): Flora und Vegetation im Naturschutzgebiet „Kleiner Arbersee“. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft 144: 61-78
- SCHLENTHER, L., B. MARSCHNER, C. HOFFMANN und M. RENGER (1996): Ursachen mangelnder Anwuchserfolge bei der Aufforstung der Rieselfelder in Berlin-Buch – bodenkundliche Aspekte. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 349-359
- SCHLUND, W., F. SCHARFE und B. BRUNNER: (1997): Der Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Roßweiher“: Ein Beispiel für Naturschutzmanagement im Regierungsbezirk Karlsruhe. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 71/72 : 119-133
- SCHLÜTER, U., A. BARTH und H. HEBBELMANN (1996): Rekulтивierung von Hausmülldeponien. Neue Versuche für Vegetationsansiedlungen in Hannover. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 280-286
- SCHMIDT, C. (1996): 2. Beitrag zur Moosflora Westfalens und angrenzender Gebiete. Bryologische Mitteilungen Nr. 1: 4-27
- SCHMIDT, G. (1996): Naturschutz in Ballungsräumen. Stadt und Grün 45: 616-621
- SCHMIDT, L. (1997): Von der Brache zum Eichen-Birkenwald. 20 Jahre Entwicklung ohne menschlichen Eingriff. Naturwissenschaftliche Rundschau 50: 394-397
- SCHMIDT, P. A. (1996): Zur Systematik und Variabilität der mitteleuropäischen Erlen (Gattung *Alnus* MILL.). Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 82: 15-42
- SCHMIDT, P. A. (1997): Naturnahe Waldbewirtschaftung. Ein gemeinsames Anliegen von Naturschutz und Forstwirtschaft? Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 75-83
- SCHMIDT, P. A. und A. KRAUSE (1997): Zur Abgrenzung von Herkunftsgebieten bei Baumschulgehölzen für die freie Landschaft. Natur und Landschaft 72: 92-95
- SCHMIDT, P.A., A. GNÜCHTEL, W. WAGNER und D. WENDEL (1997): Vorschläge zur Weiterentwicklung des Systems waldbestockter Naturschutzgebiete im Freistaat Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege, Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Radebeul
- SCHMIDT, W. (1997): Bedeutung von Schutzgebieten für die Arterhaltung bei Baum- und Straucharten. NNA-Berichte 10 (2), 49-57
- SCHMIEDEKNECHT, A. (1996): Beziehungen zwischen standörtlichen Grundlagen und spontaner Vegetation im Tagebauggebiet „Goitsche“ (Sachsen, Sachsen-Anhalt). Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 399-406
- SCHMITT, H. P. (1997): Erhaltung forstlicher Genressourcen in NRW. LÖBF-Mitteilungen 22 (4): 22-26
- SCHMITZ, U. und G. VERBÜCHELN (1997): Flora und Vegetation am Altrhein bei Düsseldorf- Urdenbach. LÖBF-Mitteilungen 22 (4): 85-96
- SCHOLZ, H. (1997): *Bromus pseudosecalinus* – auch in Deutschland. Floristische Rundbriefe 31: 17-20
- SCHOLZ, P. und W. WESTHUS (1996): Floristische Kartierung in Thüringen – eine Zwischenbilanz. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 33: 61-64
- SCHOPP-GUTH, A. (1997): Diasporenpotential intensiv genutzter Niedermoorböden Nordostdeutschlands – Chancen für die Renaturierung? Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 97-109
- SCHREIBER, K. F. (1997): 20 Jahre Erfahrung mit dem Kontrollierten Brennen auf den Brachflächen in Baden-Württemberg. NNA-Berichte 10 (5), 59-71
- SCHUBOTH, J. (1996): Besonders geschützte Biotope nach § 20c BNatSchG. Kritischer Überblick der Umsetzung und Definitionen in den Bundesländern. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 325-335
- SCHUHWERK, F. (1996): Kommentierte Liste der bayerischen *Hieracium*-Arten. Teil I: Taxonomisches Konzept, Arten des Subgenus *Pilosella* a – f. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 137-152
- SCHULTE, U. (1997): Naturwaldzellen im Ruhrgebiet. Untersuchungskonzeption und erste Ergebnisse. LÖBF-Mitteilungen 22 (3): 86-92
- SCHULTE, W. et al.; AG RICHTLINIEN DER GESELLSCHAFT FÜR ÖKOLOGIE (1997): Richtlinien für eine naturschutzbezogene, ökologisch orientierte Stadtentwicklung in Deutschland. Natur und Landschaft 72: 535-549
- SCHULZE, G. (1996): Wildrosen (*Rosa* L.) in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 28: 1-98
- SCHUPP, D. (1996): Mehr Lebensraum für Wildkräuter: Neue Formulierungen für kommunale Verordnungen über die Straßenreinigung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 16: 271
- SCHUPP, D. (1996): Naturschutz an landeseigenen Gebäuden: neuer Runderlaß des Umweltministeriums. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 16: 269-270
- SCHÜTZ, P. und R. BEHLERT (1996): Effizienzkontrolle von Biotoppflege- und entwicklungsplänen. LÖBF-Mitteilungen 21 (2): 55-63
- SCHÜTZ, P. und M. OCHSE (1997): Effizienzkontrolle von Pflege- und Entwicklungsplänen für Schutzgebiete in Nordrhein-Westfalen. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 20-31
- SCHWABE, A. (1997): Zum Einfluß von Ziegenbeweidung auf gefährdete Bergheide-Vegetations-Komplexe: Konsequenzen für Naturschutz und Landschaftspflege. Natur und Landschaft 72: 183-192
- SCHWAHN, C. und U. v. BORSTEL (1997): Möglichkeiten des Zusammenwirkens von Naturschutz und Landwirtschaft bei der Erhaltung montanen Grünlands. Natur und Landschaft 72: 267-274
- SCHWOON, G. (1997): Sicherung, Pflege und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen infolge von Straßenbauvorhaben. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 17: 174-183
- SLUSCHNY, H. (1996): Die Echte Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris* MILL.) – Blume des Jahres 1996. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 13-16

- SMETTAN, H. (1996): Ein Beitrag zur Flora der Chiemgauer Alpen. Floristische Rundbriefe 30: 94-110
- SOPPA, B. (1997): Situation der Waldbaumarten in Norddeutschland. NNA-Berichte 10 (2), 16-20
- SPEIER, M. (1996): Paläoökologische Aspekte der Entstehung von Grünland in Mitteleuropa. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 199-220
- SPEIER, M. (1997): Die nacheiszeitliche Entwicklung der Gehölzflora in Norddeutschland. NNA-Berichte 10 (2), 5-15
- SPETHMANN, W. (1997): Gefährdet Hybridisierung die Erhaltung von Baum- und Straucharten? NNA-Berichte 10 (2), 26-31
- SPRINGER, S. (1996): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften in Südbayern. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 289-299
- SSYMANK, A. (1997): Anforderungen an die Datenqualität für die Bewertung des Erhaltungszustandes gemäß den Berichtspflichten der FFH-Richtlinie. NATUR und LANDSCHAFT 72: 477-480
- STECH, M. (1996): Die Moosflora des Botanischen Gartens Bonn. Herzogia 12: 207-220
- STEFFAN-DEWENTER, I. und T. TSCHARNTKE (1996): Profitieren Wildbienen oder Honigbienen von der Flächenstilllegung in der Landwirtschaft? Natur und Landschaft 71: 255-261
- STEIF, K. (1996): Verkehrsbegleitendes Grün als Todesfalle für Vögel. Natur und Landschaft 71: 527-532
- STENDER, S., P. POSCHLOD, E. VAUK-HENTZELT und T. DERNEDDE (1997): Die Ausbreitung von Pflanzen durch Galloway-Rinder. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 173-180
- STEBING, L. und A. VOGEL (1996): Quecksilbergehalte in Böden und Pflanzen im Bereich historischer Bergbaugelände des Nordpfälzer Berglandes. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 115-122
- STORM, C. (1996): Eine Fallstudie zur Voraussage von Vegetationsmerkmalen auf der Grundlage von Standortdaten. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 99-126
- SUKOPP, H. und A. LANGER (1996): *Campanula rapunculoides* – ein Apophyt in der Vegetation Mitteleuropas. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 25: 261-276
- SUNDERMEIER, A. und E. G. MAHN (1997): Die Bedeutung der horizontalen und vertikalen Vegetationsdichte für den Blüherfolg von Xerothermasarten. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 181-188
- TACKENBERG, O., P. POSCHLOD und G. KARSTE (1997): Veränderungen der subalpinen Vegetation und Landschaft des Brockens (Harz). Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 27: 45-51
- TARA, K. und K. ZIMMERMANN (1997): Brachen im Ruhrgebiet. LÖBF-Mitteilungen 22 (3): 16-21
- TÄUBER, T. (1996): Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen auf militärischen Übungsflächen im NSG Lüneburger Heide (Rote Fläche 2). NNA-Berichte 9 (1): 59-78
- TÄUSCHER, L. (1996): Beitrag zur Gewässerökologie des Elbe-Havelwinkels (Sachsen-Anhalt). Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 33 (2): 40-50
- TEVINI, M. (1996): Erhöhte UV-B-Strahlung: Ein Risiko für Nutzpflanzen? Biologie in unserer Zeit 26: 245-254
- THIELMANN, G. und J. RÖMBKE (1996): „Ökotechnische“ Maßnahmen zur Unterstützung der Wiederansiedlung von Heidevegetation nördlich von München. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 69-73
- THIERY, J. (1996): *Woodsia ilvensis* in Niedersachsen wiederentdeckt. Floristische Rundbriefe 30: 129-131
- TISCHEW, S. (1996): Analyse von Mechanismen der Gehölzsukzession auf Braunkohlentagebaukippen. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 407-416
- TRAXLER, A. (1997): Einsatz von vegetationsökologischem Monitoring für die Erfüllung der Berichtspflicht gemäß der FFH-Richtlinie. Natur und Landschaft 72: 499-501
- TREIBER, R. (1996): Beiträge zur aktuellen Verbreitung von *Rosa stylosa* Desv., *Rosa jundzillii* Bess., *Rosa agrestis* Savi und *Rosa micrantha* Borr. ex Sm. im Südwesten Baden-Württembergs. Tuexenia 16: 87-104
- TREIBER, R. (1997): Vegetationsdynamik unter dem Einfluß des Wildschweins (*Sus scrofa* L.) am Beispiel bodensaurer Trockenrasen der elsässischen Harth. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 83-95
- TSCHARNTKE, T., H. J. GREILER, I. STEFFAN-DEWENTER ET AL. (1996): Die Flächenstilllegung in der Landwirtschaft – eine Chance für Flora und Fauna der Agrarlandschaft? NNA-Berichte 9 (2), 59-72
- UHLEMANN, I. (1996): Zur *Taraxacum*-Flora von Sachsen I. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker N.F.15: 39-86
- VEITH, D. (1997): Wacholderheiden auf der Münsinger Alb. Auswirkungen von Beweidung und Pflegemaßnahmen. Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 71/72: 193-199
- VERBÜCHELN, G., W. AHRENDT und K. VAN DE WEYER (1996): Der aktuelle Zustand der basenarmen Quell-, Heide- und Übergangsmoore in NRW. Biotopüberwachung mittels Leitarten und Leitgesellschaften. LÖBF-Mitteilungen 21 (4): 18-25
- VÖGE, M. (1997): Vegetationskundliche und populationsbiologische Untersuchungen im Hohendeicher See in Hamburg. Tuexenia 17: 109-123
- VOGEL, A. und L. STEUBING (1996): Risikobewertung: Quecksilber und Arsen in Böden, Nutzpflanzen und -tieren aus geogen belasteten Gebieten. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 31-35
- VOGEL, K., B. VOGEL, G. ROTHHAUPT und E. GOTTSCHALK (1996): Einsatz von Zielarten im Naturschutz. Auswahl der Arten, Methode von Populationsgefährdungsanalyse und Schnellprognose, Umsetzung in der Praxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 179-184
- VOGEL, P. (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf

- den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. *carolinea* 54: 37-44
- WAGNER, A., I. WAGNER und J. PFADENHAUER (1997): Minerotrophe Bergkiefernmoore im süddeutschen Alpenvorland unter besonderer Berücksichtigung ihrer syntaxonomischen Stellung. *Tuexenia* 17: 81-107
- WAGNER, I. (1996): Zusammenstellung morphologischer Merkmale und ihrer Ausprägungen zur Unterscheidung von Wild- und Kulturformen des Apfel- (*Malus*) und des Birnbaumes (*Pyrus*). Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 82: 87-108
- WALDHARDT, R. (1996): Empfehlungen zum Management von Ackerbrachen der EU-Flächenstilllegung in Deutschland. *NNA-Berichte* 9 (2), 31-37
- WALTHER, K. (1996): Vegetationsentwicklung an der Bille östlich Hamburg. Ergebnis einer pflanzensoziologischen Untersuchung auf 44 Dauerbeobachtungs-Flächen von 1990-1994. *Berichte des Botanischen Vereins zu Hamburg* 16: 5-32
- WALZ, U. (1997): Landschaftsveränderungen im Vogtland. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 20-26
- WARNING, D. (1996): Die Entwicklung von Vegetation und Boden auf ehemaligen Ackerflächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Ergebnisse einer Chronosequenzanalyse. *Tuexenia* 16: 451-495
- WARTHEMANN, G. und B. KRUMMHAAR (1997): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen im NSG „Untere Schwarze Elster“. Teil I: Vegetation. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 34 (1): 3-14
- WARTHEMANN, G. und U. WÖLFEL (1997): Flora und Vegetation der Muldeau. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 34 (Sonderheft): 12-16
- WEBER, H. E. (1996): Neue oder wenig bekannte Brombeerarten (*Rosaceae*, *Rubus* L.) in Bayern und darüber hinausgehenden Verbreitungsgebieten. *Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft* 66/67: 27-45
- WEBER, H. E. (1996): Beitrag zur Brombeerflora von Nordbayern. *Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft* 66/67: 175-192
- WEBER, H. E. (1996): Die Gattung *Rubus* im mittleren Schwarzwald mit Nachbargebieten. *carolinea* 45: 9-36
- WEBER, H. E. (1997): Hecken und Gebüsche in den Kulturlandschaften Europas – Pflanzensoziologische Dokumentation als Basis für Schutzmaßnahmen. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* 9: 75-106
- WEGENER, U. (1997): Feuerschutz zur Pflege von Trockenrasen. *NNA-Berichte* 10 (5), 54-58
- WEGENER, U. und W. EBERSPACH (1996): Die Wiesenkuhschelle *Pulsatilla pratensis* (L.) MILL. Im Nordharzvorland – ihre Förderung durch Pflegemaßnahmen. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 22-27
- WEISS, J. (1996): Landesweite Effizienzkontrollen in Naturschutz und Landschaftspflege. *LÖBF-Mitteilungen* 21 (2): 11-16
- WEISS, J. und P. SCHÜTZ (1997): Effizienzkontrollen im Rahmen der Entwicklung von Industriebrachen. *LÖBF-Mitteilungen* 22 (3): 22-27
- WELK, E. (1997): *Myosotis sparsiflora* J.C. MIKAN ex POHL – eine Charakterpflanze des mitteldeutschen Trockengebietes. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 2: 20-30
- WELLER, F. (1997): Grundzüge der Entwicklung landwirtschaftsprägender Nutzungsformen in Südwestdeutschland. *Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie* 27: 27-34
- WENZEL, H. (1996): Naturschutz und Pflanzenschutzmittel. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* 33: 44-52
- WENZEL, H. und W. WESTHUS (1996): Wieviel Urwald braucht Thüringen? Vorstellungen zu einem Totalreservatskonzept. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* 33: 85-94
- WESTHUS, W., F. FRITZLAR, J. PUSCH, T. VAN ELSSEN und C. ANDRES (1997): Binnensalzstellen in Thüringen – Situation, Gefährdung und Schutz. *Naturschutzreport Heft* 12: 1-193
- WESTHUS, W., R. HAUPT und E. REISINGER (1996): Gedanken zum Schutz historischer Waldnutzungsformen in Thüringen. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* 33: 40-43
- WESTPHALE, R. (1997): Entwicklung von naturnahen Kleingartenanlagen. Mitteilungen aus der *NNA* 8 (3): 37-44
- WICKE, G. (1997): Stand des Ackerwildkrautschutzes in Niedersachsen. *Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen* 17: 241-244
- WIEGLEB, G. (1996): Leitbilder des Naturschutzes in Bergbaufolgelandschaften am Beispiel der Niederlausitz. *Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie* 25: 309-319
- WIEGLEB, G. (1997): Leitbildmethode und naturschutzfachliche Bewertung. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* 6: 43-62
- WILDE, H. (1997): Fransenzianvorkommen im LSG „Süßer See“. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* 34 (2): 57
- WILLECKE, S., M. S. ROHNER, H. E. BACK und M. SÖNTGEN (1996): Verbesserung des Naturschutzes auf militärischen Liegenschaften – mit Beispielen aus der Modelluntersuchung des Truppenübungsplatzes Baumholder. *Natur und Landschaft* 71: 517-526
- WIMMER, W. (1997): *Myriophyllum heterophyllum* MICHAUX in Niedersachsen und Bremen sowie seine Bestimmung im vegetativen Zustand. *Floristische Rundbriefe* 31: 23-31
- WINKELMANN, S. und H. WEDEL (1996): Das Zusammenwirken von Landwirtschaft und Naturschutz für ein Programm zur Extensivierung im Raum Sieben Berge/ Vorberge/ Sackwald. *NNA-Berichte* 9 (2), 38-43
- WITTIG, R. (1996): „Naturnahe“ Pflege und Gestaltung städtischer Grünflächen. Die Verwässerung eines geobotanischen Fachbegriffes. *Stadt und Grün* 45: 433-435
- WITTIG, R. (1996): Schutz der Vegetation temporärer Heideweiler durch Biotop-Neuschaffung.

- Naturschutz und Landschaftsplanung 28: 112-117
- WITTIG, R. (1997): Vegetationskunde als Grundlage für Naturschutz und Freiraumplanung im besiedelten Bereich. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 9: 61-74
- WITTKAMP, J. und U. DEIL (1996): Zur Dorfvegetation in Nordbayern und Südthüringen. Tuexenia 16: 509-538
- WOLF, A. (1997): Konzept zur naturschutzgerechten Nutzung des Grünlandes im Nüstenbachtal bei Moosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Veröffentlichungen Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg 71/72: 157-192
- WOLFRAM, C. (1996): Die Vegetation des Bottsandes. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 51: 1-111
- WOLLERT, H. (1996): Zur Vegetation der Moore im Bereich der Lobusnath zwischen dem Krakower und Malchiner Hauptendmoränenbogen im Raum Carlsdorf-Nienhagen (Mittelmecklenburg). Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 29: 35-48
- WOLLERT, H. (1997): Zum Vorkommen wärmeanspruchsvoller ruderaler Halbtrockenrasen des Verbandes *Convolvulo-Agropyron* Görs 1966 in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 30: 17-32
- WORBES, M. (1996): Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte und Sukzessionsdynamik von Gebüsch auf ehemaligen Halbtrockenrasen. Verhandlungen Gesellschaft für Ökologie 26: 189-195
- WULF, M., D. LÜTTSCHWAGER, J. FORKERT und R. F. HÜTTL (1996): Untersuchungen zum Deckungs- und Transpirationsgrad ausgewählter Pflanzenarten der Krautschicht in Kiefernbeständen. Angewandte Botanik 70: 165-171
- WURBS, A. und M. GLEMNITZ (1997): Nährstoffgehalte alter Ackerbrachen auf Sandböden und ihre Bedeutung für die Vegetationsentwicklung. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 6: 233-245
- ZACHARIAS, D. (1997): Erfassung seltener Baum- und Straucharten im Rahmen des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogrammes und die Erhaltung der heimischen Gehölzartenvielfalt. NNA-Berichte 10 (2), 42-48
- ZANDER, M. (1996): Zur genetischen Identifizierung der *Salix bicolor* EHRH. Ex WILLD. – Vorkommen vom Brocken. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 1: 31-37
- ZEHM, A. (1997): Zur Koinzidenz von Sandvegetation, ihrer Struktur und Heuschrecken-Zönosen (Orthoptera) in der hessischen Oberrheinebene. Tuexenia 17: 193-222
- ZERBE, S. (1996): Synanthropes Vorkommen von *Calamagrostis villosa* (Chaix) J. F. Gmelin im Nordspessart. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 66/67: 93-96
- ZERBE, S. und T. SCHACHT (1997): Kreidebrüche auf Jasmund (Insel Rügen). Nutzungsgeschichte, Vegetation und Naturschutzaspekte. Naturschutz und Landschaftsplanung 29: 325-330
- ZICKERMANN, F. (1996): Entstehung und Ökologie der Heidemoore mit *Narthecium ossifragum* in Nordwestdeutschland. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 8: 25-44
- ZIMMER, W. (1997): Funktion und Bedeutung der Isoprenabgabe durch Pflanzen. Biologie in unserer Zeit 27: 34-39
- ZUCCHI, H. (1996): Ist die Silberlinde rehabilitiert? Zur Diskussion um das Hummelsterben an spätblühenden Linden. Natur und Landschaft 71: 47-50 J

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Pulsatilla - Zeitschrift für Botanik und Naturschutz](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Höster H. R.

Artikel/Article: [Bibliographie Botanik und Naturschutz 1996 und 1997 45-59](#)