

Bibliographie Botanik und Naturschutz 1998 und 1999 zusammengestellt von H. R. HÖSTER, Wennigsen

- ADAM, T. (1999): Das Entstehen der Streuobstwiesen in Südwestdeutschland. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 21-37.
- AG FFH-Verträglichkeitsprüfung (1999): Handlungsrahmen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Praxis. Natur und Landschaft **74**: 65-73.
- ALBRECHT, H., F. MAYER und A. MATTHEIS (1999): *Veronica triphyllos* L. in the Tertiärhügelland landscape in southern Bavaria – an example for habitat isolation of a stenoeceous plant species in agroecosystems. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **8**: 219-226.
- ALTMOOS, M. (1999): Netzwerke von Vorrangflächen. Ein methodischer Rahmen zur Planung und Optimierung von Gebietssystemen für den Naturschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 357-367.
- ALTMOOS, M. und W. DURKA (1998): Prozeßschutz in Bergbaufolgelandschaften. Eine Naturschutzstrategie am Beispiel des Südraumes Leipzig. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 291-297.
- AMMERMANN, K. et al. (1998): Bevorratung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich in der Bauleitplanung. Natur und Landschaft **73**: 163-169.
- ANDERLIK-WESINGER, G., H. ALBRECHT und J. PFADENHAUER (1998): Vegetationsentwicklung bestehender und neuangelegter Raine auf der FAM-Versuchsstation Klostersgut Scheyern. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 273-280.
- ANDERSEN, M. (1997/98): Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Düne am Rimmelsberg“. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 88-122.
- Arbeitsgruppe Forstlicher Luftbildinterpretieren, AFL (1998): Luftbild-Interpretationsschlüssel. Bestimmung der natürlichen Altersklasse von Waldbeständen im Color-Infrarot-Luftbild (CIR-Luftbild). LÖBF-Mitteilungen 1/98: 45-50.
- Arbeitsgruppe Forstlicher Luftbildinterpretieren, AFL (1999): Luftbild-Interpretationsschlüssel II. Bestimmung der natürlichen Altersklasse und der Baumarten von Waldbeständen im Color-Infrarot-Luftbild (CIR-Luftbild). LÖBF-Mitteilungen 4/99: 51-56.
- ASCHE, N. und A. SCHAFMEISTER-BERGMANN (1998): Aspekte des Stoffhaushaltes von Mittelgebirgsmooren und Auswirkungen der Bodenschutzkalkung auf ein Moor. LÖBF-Mitteilungen 4/98: 29-37.
- ASSEBURG, M. (1999): Praktische Schutzmaßnahmen für Bäume bei Straßenbauvorhaben. Mitteilungen aus der NNA **10**: 82-85.
- BAESE, K. (1999): Aspekte der Agrarphänologie in Norddeutschland. NNA-Berichte **12**: 3-10.
- BARTHEL, M. (1998): Botanischer Garten Schellerhau – Artenschutz im Osterzgebirge. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 96-100.
- BASTIAN, O. (1999): Landschaftsfunktionen als Grundlage von Leitbildern für Naturräume. Natur und Landschaft **74**: 361-373.
- BAUER, J. und U. STRATMANN (1998): Das Kölner Grün- und Freiflächensystem. LÖBF-Mitteilungen 1/98: 84-93.
- BAUMANN, H. und W. WAHRENBURG (1999): Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Arten sandiger Äcker am nördlichen Schönbuchrand. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **155**: 63-80.
- BAUMANN, K. (1999): Vegetation, Verbreitung und Gefährdung basenreich-nährstoffarmer Sümpfe im sachsen-anhaltinischen Harz. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 31-44.
- BAUMANN, M. und K. M. STEZKA (1999): Die Wassermoosvegetation in anthropogen verschiedenen beeinflussten Bächen des Erzgebirges. Limprichtia **12**: 1-164.
- BAUMANN, W. et al. (1999): Naturschutzfachliche Anforderungen an die Prüfung von Projekten und Plänen nach § 19c und § 19d BNatSchG (Verträglichkeit, Unzulässigkeit und Ausnahmen). Natur und Landschaft **74**: 463-472.
- BAUMGART, J. (1998): Landnutzungskonzept für die Gemarkung Hatzfeld-Holzhausen in Nordhessen – ein Beitrag zum Kulturlandschaftsschutz. Natur und Landschaft **73**: 443-449.
- BAUMGÄRTEL, R. und A. ZEHEM (1999): Zur Bedeutung der Fließgewässer-Dynamik für naturnahe Rheinufer unter besonderer Betrachtung der Schwarzpappel (*Populus nigra*) und Sandrasen. Natur und Landschaft **74**: 530-535.
- BECK, R. (1998): Erstfunde von *Dryopteris remota* (A. Br.) Druce (Entferntiedriger Wurmfarne, Verkannter Dornfarne) im baden-württembergischen Keuperland. Floristische Rundbriefe **32**: 1-6.
- BECKER, T. (1998): Die Pflanzengesellschaften der Felsfluren und Magerrasen im unteren Unstruttal (Sachsen-Anhalt). Tuexenia **18**: 153-206.
- BECKER, T. (1998): Zur Rolle von Mikroklima- und Bodenparametern bei Vegetationsabfolgen in Trockenrasen des unteren Unstruttals (Sachsen-Anhalt). Gleditschia **26**: 29-58.

- BECKER, T. (1999): Die Xerothermrassen-Gesellschaften des unteren Unstruttalles und einige ökologische Gründe für ihre Verteilung im Raum. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 3-29.
- BEHM, A. (1999): Gehölze regionaler Herkunft in der freien Landschaft – Ergebnisse einer Podiumsdiskussion. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung **40**: 131-136.
- BEHRE, K. E. (1999): Vegetationsgeschichte und Paläoökologie – ihre Beiträge zum Verständnis der heutigen Vegetation. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 245-266.
- BEINKER, O. (1997/98): Zur Vegetationskunde der Dünen im Listsand der Insel Sylt. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 128-166.
- BEINLICH, B. (1998): Schweine-Freilandhaltung als dynamischer Faktor. Ein Überblick zum aktuellen Kenntnisstand. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 263-267.
- BERG, C. (1998): Die Moosflora des Darßwaldes. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern **34**: 69-77.
- BERG, C. und W. KINTZEL (1999): Vergleichende vegetationskundliche Untersuchungen im FND Hühnerberg (Lewitz) 1972 und 1997. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 7-12.
- BERG, C., H. SLUSCHNY und H. WOLLERT (1998): Vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern – Empfehlungen zum Erhalt und zur Pflege ihrer Lebensräume. II. Zur Situation und Pflegebedürftigkeit der Zwergstrauchheiden in Mecklenburg-Vorpommern. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern **41**: 1-10.
- BERG, K. und V. KROOG (1999): Entwicklungs- und Handlungskonzept für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege an Kreisstraßen. Natur und Landschaft **74**: 11-17.
- BERGER, A. (1999): Zur Entwicklungsgeschichte des Naturschutzgedankens im lokalen Kommunikationsraum 1918 – 1933. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 170-174.
- BETTINGER, A. (1999): Botanischer Artenschutz im Landschaftsstrukturwandel am Beispiel des Saarlandes. Pulsatilla Heft 2: 34-41.
- BIERMANN, R. (1999): Vegetationsökologische Untersuchungen der *Corynephorus canescens*-Vegetation der südlichen und östlichen Nordseeküste sowie der Kattegatinsel Laesoe unter besonderer Berücksichtigung von *Campylopus introflexus*. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 59: 1-148.
- BLÜMEL, C. (1999): Zur aktuellen Flora und Vegetation der nährstoffarmen Seen Mecklenburg-Vorpommerns. Teil 1: Vom Aussterben bedrohte Sippen. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 81-106.
- BLÜMEL, C., S. KIPHUTH und K. BROZIO (1999): Floristische Mitteilungen aus Greifswald und Umgebung I. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 71-80.
- BLUMRICH, H. und G. WIEGLEB (1998): Initiierung von Zwergstrauchheiden in der Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 291-300.
- BOHLBRINKER, P. (1998): Die Rote Wasserlinse (*Lemna turionifera*) auf den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 111-116.
- BOHLBRINKER, P. (1998): Ein neues Vorkommen des Quirl-Tännel (*Elatine alsinastrum*) in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 117-118.
- BOHLBRINKER, P., B. FUNK und H. WOLLERT (1998): Floristische Mitteilungen aus Mittelmecklenburg XVII. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 135-138.
- BÖHMER, H. J., S. RAUSCH und U. TRETER (1998): Dynamik eines Bergwaldes am Monte Cimino. Fünf Jahrzehnte ungestörter Bestandsentwicklung in einem ehemaligen Nutzwald im Valle di Gressoney/Aosta. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 309-315.
- BORCHERS, U., B. M. MÖSELER und G. WOLF (1998): Diasporenreservoir in Fichtenforsten und Eichen-Hainbuchenwäldern. Einsatzmöglichkeiten für forstliche Rekultivierungsflächen. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 10-16.
- BORGGRÄFE, K. (1998): Entwicklungspotential der Ufervegetation an ausgebauten kleinen Fließgewässern Norddeutschlands durch die Reduktion der Gewässerunterhaltung am Beispiel der Ise. NNA-Berichte **11**: 88-96.
- BORRMANN, K. (1998): Geheimakte „*Evonymus europaea*“ (1937). Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 145-146.
- BÖSSNECK, U. und T. SCHIKORA (1998): Burg- und Stadtmauern in Weißensee (Lkr. Sömmerda) – ein Ökosystem im Konflikt zwischen Natur- und Denkmalschutz. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **35**: 72-80.
- BRÄMER, R. (1998): Landschaft zu Fuß erleben. Brauchen wir gesondert ausgewiesene Naturerlebnisgebiete? Natur und Landschaft **73**: 47-54.
- BRANDES, D. (1998): *Parietaria judaica* L. – Zur Morphologie, Ökologie und Soziologie einer verkannten nitrophilen Saumpflanze. Tuexenia **18**: 357-376.
- BRANDES, D. (1999): Standortfaktor Stickstoff – Nitrophytenvegetation in Europa. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 305-320.
- BRANDES, S. (1998): Die Bedeutung des Stadtgrüns für den Naturschutz. Mitteilungen aus der NNA **9**: 50-56.
- BRANDT, H. und K. HEINZE (1998): Naturschutzgebiete am Rande der Großstadt. Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Berlin. Stadt und Grün **47**: 585-590.
- BRANDT, P. (1999): Anwendung der „Grünen Gentechnik“ ohne ökologische Risiken? Biologie in unserer Zeit **29**: 151-157.
- BRÄUER, G. (1998): Bestandsentwicklung heimischer Orchideen. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 10: 5-16.
- BRÄUER, I. et al. (1999): Populationsgröße und Aussterbe-

- risiko gefährdeter Pflanzenarten in Niedersachsen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 505-510.
- BRAUN, M., J. LOESER und C. WAGNER (1997/98): Dummerdorfer Ufer – Leitkonzept für den Arten- und Biotopschutz einer historischen Hudelandschaft. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 39-69.
- BRIEMLE, G. (1999): Aulendorfer Extensivierungsversuch: Ergebnisse aus 10 Jahren Grünlandausmagerung. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 63-94.
- BRIEMLE, G. (1999): Auswirkung zehnjähriger Grünlandausmagerung. Vegetation, Boden, Biomasseproduktion und Verwertbarkeit der Aufwüchse. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 229-237.
- BRIEMLE, G. (1999): Vereinfachte Ansprache von Extensivgrünland mittels Indikatorpflanzen. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung **40**: 34-37.
- BRINKEL, F. (1998): Wie werden dörfliche Freiräume in Zukunft aussehen? Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **35**: 65-71.
- BROCKSIEPER, R. und M. WOIKE (1999): Kriterien zur Auswahl der FFH- und Vogelschutzgebiete für das europäische Schutzgebietssystem „Natura 2000“. LÖBF-Mitteilungen 2/99: 15-26.
- BRUELHEIDE, H. und T. FLINTROP (1999): Die Verpflanzung von Bergwiesen im Harz. Eine Erfolgskontrolle über fünf Jahre. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 5-12.
- BÜCHTING, A. J. (1998): Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland. Biologie in unserer Zeit **28**: 16-21.
- BULLMER, E. und C. HOBOTHM (1998): Die Pflanzengesellschaften der Wiesen und Ufer an einem „renaturierten“ Bachlauf (Wiedau-Bruchwiesen bei Botherl im Kreis Rotenburg). NNA-Berichte 11: 139-148.
- BUSCHBOM, U. (1999): Sekundärstandorte heimischer Vegetationseinheiten im Botanischen Garten als Versuch eines Naturschutzbeitrages. Mitteilungen aus der NNA 10: 47-59.
- BUSKE, C. und R. RAABE (1999): Ökologische Baubegleitung. Möglichkeiten und Grenzen bei der Realisierung von Straßenbauprojekten. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 367-371.
- BUTTLER, H. (1999): Erstfund von *Lapsana communis* L. subsp. *intermedia* (Bieb.) Hayek für Deutschland mit einer Übersicht über die Gattung. Floristische Rundbriefe **33**: 3-7.
- BUTTSCHARDT, T. K. (1998): Prozeßschutz in Siedlungsräumen? Eine Diskussion aus anthropozentrischer Sicht. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 324-327.
- BUTTSTEDT, L. und M. JENTZSCH (1998): Zur Flora, Fauna und Gebietsausstattung des Naturschutzgebietes „Hackpflücker See“ und seiner Umgebung. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **35** (1): 3-10.
- CHRISTENSEN, E. (1997/98): *Tellima grandiflora* (Pursh) Douglas ex Lindley auch in Schleswig-Holstein. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 169-173.
- CHRISTIANSEN, U. und M. RÜHS (1998): Potentielle natürliche Vegetation (pnV) als Mittel der Raumgliederung in Kulturlandschaften. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 77-82.
- COCH, T. (1998): „Verzeitlichung des Naturschutzes“. Provokante Neuorientierung oder vielleicht auch nur „ein Stück weit Opportunismus?“ Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 362-363.
- COCH, T. und J. HIRNSCHAL (1998): Besucherlenkungskonzepte in Schutzgebieten. Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise der Erarbeitung. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 382-388.
- CONERS, H., D. HERTEL und C. LEUSCHNER (1998): Horizontal- und Vertikalstruktur des Grob- und Feinwurzelsystems von konkurrierenden Buchen und Eichen in einem Mischbestand. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 435-440.
- DAHL, H. J. (1999): Wichtige Entwicklungen im niedersächsischen Naturschutz 1977 – 1999. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 19: 161-162.
- DAHL, H. J. und D. SCHUPP (1999): Naturschutz hat Geschichte. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 19: 124-129.
- DEHNEN-SCHMUTZ, K. (1998): Nichteinheimische Pflanzen auf Felsen und Mauern mittelalterlicher Burgen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 523-528.
- DEIL, U. (1999): Synvikarianz und Symphylogenie – Zur Evolution von Pflanzengesellschaften. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 223-244.
- DENGLER, J. (1997/98): Neues von den schmalblättrigen Schwingel-Sippen (*Festuca ovina* agg. und *F. rubra* agg.) in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Schleswig-Holstein und Hamburg. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 6-32.
- DENGLER, J. (1998): Bemerkenswerte Gefäßpflanzenfunde in der Xerothermvegetation von Mecklenburg-Vorpommern. Teil I. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 87-110.
- DENGLER, J. (1998): Der Geschützte Landschaftsbestandteil „Mühlenberg“ bei Brodowin – Flora, Vegetation und Bedeutung für den Naturschutz. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **7**: 149-158.
- DENGLER, J. (1998): Zur Unterscheidung von *Phleum pratense* s. str. und *Phleum bertolonii*. Floristische Rundbriefe **32**: 7-12.
- DENGLER, J. und HÜNERT, C. (1997/98): Ein bemerkenswerter Trockenhang in Kiel-Elmschenhagen mit zwei für Schleswig-Holstein neuen Gefäßpflanzenarten. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 80-87.
- DENZ, O. (1998): Monitoring walddreicher Feuchtgebietsvegetation im Nordraum des Rheinischen Braunkohlenreviers 1986-1996. Tuexenia **18**: 85-93.
- DIERSCHKE, H. (1999): Klassifikation und systematische Ordnung von Pflanzengesellschaften. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 19-38.
- DIERSSEN, K. und H. RECK (1998): Konzeptionelle Mängel und Ausführungsdefizite bei der Umsetzung der

- Eingriffsregelung im kommunalen Bereich. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 341-345, 373-381.
- DIERSSEN, K., K. JENSEN und M. TREPPEL (1999): Die Bedeutung der Vegetationskunde für den Naturschutz. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 331-352.
- DIETMANN, T. et al. (1999): Skipistenuntersuchung Bayern – eine Zwischenbilanz. Natur und Landschaft **74**: 58-64.
- DILG, C. (1998): Epiphytische Moose und Flechten als Bioindikatoren der Luftqualität im Stadtgebiet von Bonn. Limprichtia **11**: 1-150.
- DILG, C. (1999): Kartierung epiphytischer Moose und Flechten im Stadtgebiet von Bonn. Decheniana **152**: 105-115.
- DOHRENBUSCH, A. (1998): Der Beitrag von Erstaufforstungen zum Klima- und Wasserschutz. Mitteilungen aus der NNA 9: 35-43.
- DOPICHAY, U. (1999): Zustandsbeschreibung ehemaligen Intensivgrünlandes in den Belziger Landschaftswiesen mit Hinweisen zu Pflegemaßnahmen. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **8**: 64-72.
- DRACHENFELS, O. von (1998): Erstaufforstungen in Niedersachsen aus naturschutzfachlicher Sicht. Mitteilungen aus der NNA 9: 43-46.
- EBEL, F. (1999): Erhaltung der Artenvielfalt – eine traditionelle Aufgabe des Botanischen Gartens der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mitteilungen aus der NNA 10: 62-64.
- EIGNER, A. (1999): Die Bedeutung historischer Bauerngärten für die Erhaltung alter Kulturpflanzen. Mitteilungen aus der NNA 10: 22-24.
- EISELE, W. (1998): Vorläufiger Schlüssel zur Bestimmung der Seggen (*Carex spec.*) Baden-Württembergs nach vegetativen Merkmalen. Floristische Rundbriefe, Beiheft **5**: 1-26.
- ELLWANGER, G. (1999): Verpflichtung zur Durchführung und Umfang der FFH-Verträglichkeitsprüfung am Beispiel des Rohstoffabbaus im „Gipskarst bei Osterode“. Natur und Landschaft **74**: 478-484.
- ENDRESS, H. (1999): Zur gegenwärtigen Verbreitung des vom Aussterben bedrohten Moorklees (*Trifolium spadicum* L.) im südlichen Thüringen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 64-65.
- ERBES, G. und H. W. LOUIS (1999): Gewässerunterhaltung als Eingriffstatbestand? Überlegungen am Beispiel Rheinland-Pfalz. Natur und Landschaft **74**: 436-442.
- ERDTMANN, J. und W. HIEKEL (1999): 60 Jahre Naturschutzgebiet „Vessertal“. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 109-140.
- ERSCHBAMER, B. und H. SCHERER (1999): Diasporenbank-Untersuchungen an Standorten der Innsbrucker Küchenschelle (*Pulsatilla oenipontana* D.T. & Sarnth.). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 417-423.
- ERZBERGER, P. (1998): Die Moosflora des Hochmoores Struth (Kreis Siegen-Wittgenstein) 1934 und 1996. Natur und Heimat **58**: 21-30.
- EWALD, J. (1999): Soziologie und Standortbindung subalpiner Fichtenwälder in den Bayerischen Alpen. Tuexenia **19**: 107-125.
- EWALD, J. und M. REUTHER (1999): Gradienten von Vegetation und Standort und ihre Beziehungen zum Kronenzustand von Bergwäldern in den Bayerischen Alpen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 39-52.
- FELDMANN, R. und A. KRONSHAGE (1998): Landesweite Projekte zur Erfassung und Kartierung der Fauna und Flora in Nordrhein-Westfalen. LÖBF-Mitteilungen 1/98: 52-62.
- FELINKS, B. und G. WIEGLEB (1998): Welche Dynamik schützt den Prozessschutz? Aspekte unterschiedlicher Maßstabebenen – dargestellt am Beispiel der Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 298-303.
- FIEDLER, W. (1998): Inhalte von Landschaftsschutzgebietsverordnungen. Mitteilungen aus der NNA 9: 46-50.
- FISCHBECK, G. (1999): Landwirtschaftlicher Pflanzenbau und biologische Vielfalt. Biologie in unserer Zeit **29**: 177-183.
- FISCHER, A. (1999): Sukzessionsforschung: Stand und Entwicklung. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 157-177.
- FISCHER, A. und S. KLOTZ (1999): Zusammenstellung von Begriffen, die in der Vegetations-Dauerbeobachtung eine zentrale Rolle spielen. Tuexenia **19**: 3-11.
- FISCHER, P. (1998): Sandtrockenrasen von Binnendünen in der Unteren Mittelelbe-Niederung zwischen Dömitz und Boizenburg. Tuexenia **18**: 119-151.
- FISCHER, P. (1999): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde und Gefährdungen von Trockenrasenarten im mecklenburgischen Elbtal. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 55-58.
- FISCHER, U. (1998): *Rhynchospora fusca* – Wiederfund auf Hiddensee und ehemalige Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 123-126.
- FISCHER, W. (1999): Beiträge zur aktuellen Flora der Gegend um Havelberg. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 56-69.
- FORWICK, J., I. LEYER und B. M. MÖSELER (1999): Entwicklungsbilanz eines entwässerten Niedermooses am Beispiel des Naturschutzgebietes Kalkarer Moor-Arloffer Bruch. Decheniana **152**: 83-96.
- FRAHM, J. P. (1998): Bemerkenswerte Moosfunde in der Umgebung Bonns. Decheniana **151**: 95-107.
- FRAHM, J. P. und N. J. STAPPER (1998): Das Laubmoos *Dichelyma capillaceum* nach 70 Jahren an seinem einzigen Fundort in Deutschland wiedergefunden. Decheniana **151**: 109-113.
- FRANKE, R. und D. POHL (1999): Die „Karte über naturschutzrechtlich besonders geschützte Bereiche in Niedersachsen (M. 1:50.000)“ wird digitalisiert. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 87-89.
- FREBEL, T. und U. GOOS (1999): *Ajuga pyramidalis* L. (Pyramiden-Günsel) in der Leucht – ein Neufund im niederrheinischen Tiefland. Floristische Rundbriefe **32**: 126-128.

- FRIEDT, W. und W. LÜHS (1999): Perspektiven molekularer Pflanzenzüchtung. Züchterische Optimierung von Ölpflanzen. *Biologie in unserer Zeit* **29**: 142-150.
- FRIELINGHAUS, M. (1998): Bewertung, Schutz und Pflege von Söllen. Bedeutung von Feuchtbiosphären in der Agrarlandschaft Nordost-Deutschlands. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 389-392.
- FRITZ, R., H. TREMP und A. KOHLER (1998): Klassifizierung und Bewertung der südbadischen Rheinseitengewässer mit Wasserpflanzen. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 117-122.
- FROMM, A. und S. TISCHEW (1999): Pflanzliche Wiederbesiedlung und Sukzessionsabläufe. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **36** (Sonderheft): 49-52.
- FROMM, A., E. G. MAHN und S. TISCHEW (1998): Zwergbinsen-Gesellschaften in ehemaligen Braunkohlentagebauen der Goitsche. *Vegetationsdynamik grundwasserferner Kleingewässer*. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 393-399.
- FUHR-Bossdorf, K., R. WALDHARDT und A. OTTE (1999): Auswirkungen der Landnutzungsdynamik auf das Potential von Pflanzengemeinschaften und Pflanzenarten einer peripheren Kulturlandschaft (1945-1998). *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **29**: 519-530.
- FUKAREK, C. (1998): Die Verbreitung der Ackermoose im Raum Wuppertal (Nordrhein-Westfalen). *Herzogia* **13**: 81-88.
- GANZERT, C. (1998): Probleme und Potentiale für eine nachhaltige Agrarlandschaftsentwicklung – Konzept für einen überregionalen Vergleich von Modellvorhaben. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 13-24.
- GARNIEL, A. und U. HAMANN (1997/98): Aufruf zum Sammeln von Armeleuchteralgen in Schleswig-Holstein. *Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg* **25/26**: 174-177.
- GEIER, M., K. H. KOLB und K. H. SPITZL (1998): Naturschutzgroßprojekt Hohe Rhön, Lange Rhön, Bayern. *Natur und Landschaft* **73**: 341-349.
- GEITHNER, A. und D. TUTTAS (1998): Studien an einer Population der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) im Orlatal (Thüringen). *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **35**: 94-98.
- GEORGE, K. (1998): Streuobstwiesen. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **35** (1): 44-52.
- GERKEN, R. (1999): *Asplenium trichomanes* subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis et Reichstein – erstmals in Norddeutschland nachgewiesen. *Floristische Rundbriefe* **33**: 17-22.
- GIGON, A. (1999): Positive Interaktionen in einem alpinen Blumenpolster. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* **11**: 321-330.
- GIGON, A. und R. LANGENAUER (1999): Blaue Listen: ein neues Naturschutzinstrument und Hinweise für die Erarbeitung und Anwendung. *NNA-Berichte* **12**: 113-120.
- GLEMNITZ, M. (1998): Bedeutung von Bodenreaktion und Nährstoffgehalt für das Vorkommen von Arten der Sandtrockenrasen auf Brachflächen. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 529-535.
- GLIEMEROTH, A. K. (1999): Der weite Weg der europäischen Waldbäume. *Biologie in unserer Zeit* **29**: 12-17.
- GÖRKE, C. (1999): Mykozönosen von Wurzel und Stamm von Jungbäumen unterschiedlicher Bestandsbegründungen. *Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg* **155**: 81-96.
- GOTTSCHLICH, G. (1999): Ergebnisse von Revisionsstudien an Herbarmaterial der Gattung *Hieracium* L. aus Mecklenburg-Vorpommern. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 59-70.
- GRABHERR, G. und K. REITER (1999): Aktuelle Aspekte der Vegetationskartierung, der Fernerkundung und geographischer Informationssysteme. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* **11**: 353-366.
- GRAU, S. (1998): Überblick über Arbeiten zur Landschaftszerschneidung sowie zu unzerschnittenen Räumen in der Bundes-, Landes- und Regionalplanung Deutschlands. *Natur und Landschaft* **73**: 427-434.
- GREGOR, T. und W. SEIDLING (1999): 50 Jahre Vegetationsentwicklung eines Eichen-Albestandes im ostthessischen Bergland. *Tuexenia* **19**: 193-205.
- GRIESE, T. (1999): Das Feuchtwiesenschutzprogramm – Herausforderung an Landwirtschaft und Naturschutz. *LÖBF-Mitteilungen* 3/99: 11.
- GROSS, M. et al. (1998): Kooperationsmodell für eine erfolgreiche Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen in einem landwirtschaftlich geprägten Naturschutzgebiet. *LÖBF-Mitteilungen* 3/98: 31-35.
- GROTHER, R. (1999): Bildungsarbeit in Botanischen Gärten – ein Beitrag zum Naturschutz. *Mitteilungen aus der NNA* **10**: 65-72.
- GRUEHN, D. (1998): Zur Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Flächennutzungsplanung. *Natur und Landschaft* **73**: 170-174.
- GRÜNER, I. und F. J. A. DANIELS (1998): Die Vegetation der Quellen und Bäche des Schöppinger Berges (nordwestliches Münsterland). *Natur und Heimat* **58**: 71-86.
- GRUPPE, O. et al. (1998): Gewässerrandstreifenprojekt Ostrügenschke Boddenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern. *Natur und Landschaft* **73**: 302-311.
- GRUTTKE, H. et al. (1999): Perspektiven bundesweiter Roter Listen – Ergebnisse eines Symposiums des Bundesamtes für Naturschutz. *Natur und Landschaft* **74**: 281-284.
- GÜNZL, B. (1999): Einfluß von Nutzung und Struktur der Fichtenwälder des Hochharzes auf die epiphytische Flechtenflora. *Tuexenia* **19**: 127-151.
- GÜTHLER, W. und S. TSCHUNCKO (1999): Landschaftspflegeverbände in Bayern. Zehn Jahre Erfahrungen in der Kooperation von Naturschutz, Landwirtschaft und Kommunalpolitik. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 80-84.
- GUTSER, D. und J. KUHN (1998): Schaf- und Ziegenbeweidung ehemaliger Mäher (Buckelwiesen bei Mitlenwald): Auswirkungen auf Vegetation und Flora, Empfehlungen zum Beweidungsmodus. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 85-97.
- GUTTE, P. und A. SICKERT (1998): Der Leipziger Auen-

- wald – Bestand und Pflege. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 80-85.
- CZIK, A. (1998): Reaktionen charakteristischer Flußauen-gräser auf verschiedene Stressoren in Abhängigkeit von der Streßinduktion. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 397-405.
- HAAREN, C. von und H. BRENKEN (1998): Räumliche Konzepte zur Realisierung von Belangen des Naturschutzes in Agrarlandschaften. Beispiel: Umsetzungskonzept für den Feuchtgrünlandschutz in Niedersachsen. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 197-204.
- HACHTEL, M., K. WEDDELING und B. M. MÖSELER (1999): Flora und Vegetation des Rheinufer bei Bonn. Decheniana **152**: 65-81.
- HACKERT-KORDE, K. (1998): *Serratula tinctoria* – Neufund für die Hansestadt Wismar. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 48.
- HAENSCHKE, J. (1998): Ergebnisse der Biogeographischen Kartierung im Stadtkreis Dessau. III. Biogeographische Kartierung ausgewählter Pflanzenarten im Stadtkreis Dessau in den Jahren 1985 – 1994. III. Teil. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 10: 17-24.
- HAMMEL, S. (1999): Die Vegetation des Naturschutzgebiets „Schützinger Spiegel“ und seiner Randgebiete. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 175-198.
- HAMPE, A. und F. BAIRLEIN (1999): Starke phänotypische Differenzierungen in disjunkten Populationen des Faulbaums (*Frangula alnus*, *Rhamnaceae*): Resultat seiner postglazialen Wiederbesiedlung Mitteleuropas? Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 59-64.
- HANDKE, U. et al. (1999): Grabenräumprogramm in der Bremer Flußmarsch. Ergebnisse vegetationskundlicher und faunistischer Begleituntersuchungen. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 267-274.
- HARD, G. (1998): Vegetationsdynamik in einer kleinen Stadtbrache. Eine Interpretationsübung in der Ruderalvegetation. Natur und Landschaft **73**: 479-485.
- HÄRDLE, W. (1999): Potentielle natürliche Vegetation – zur Entwicklung eines vegetationskundlichen Konzeptes. NNA-Berichte 12: 48-52.
- HARTHUN, M. (1998): Woran der Nationalpark Kellerwald vorerst scheiterte. Natur und Landschaft **73**: 223-227.
- HARTHUN, M. (1999): Funktionalität und Wiederherstellung von Lebensräumen gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) am Beispiel von Auen in Hessen. FFH-Entwicklungsgebiete als Voraussetzung für ein nachhaltiges Schutzgebietssystem Natura 2000 der EU. Natur und Landschaft **74**: 317-322.
- HAUCK, M. (1998): Die Flechtenflora der Gemeinde Amt Neuhaus (Nordost-Niedersachsen). Tuexenia **18**: 451-461.
- HAUFFE, H. K. et al. (1998): Bewertung von Böden als „Standort für die natürliche Vegetation“. Vorschlag zur Ermittlung des Standort-Wasserhaushaltes. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 214-219.
- HEIBEL, E. (1999): Untersuchungen zur Biodiversität der Flechten von Nordrhein-Westfalen. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 61 (2).
- HEIBEL, E., C. PRINTZEN und G. B. FEIGE (1998): Zwei bemerkenswerte Flechtenstandorte in der Nord-Eifel (Nordrhein-Westfalen). Herzogia **13**: 171-179.
- HEINKEN, T. und E. ZIPPEL (1999): Die Sand-Kiefernwälder (*Dicrano-Pinion*) im norddeutschen Tiefland: Syntaxonomische, standörtliche und geographische Gliederung. Tuexenia **19**: 55-106.
- HEINRICH, J. (1998): Bemerkenswerte Hieracien-Vorkommen im Bereich des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg (Nordrhein-Westfalen). Floristische Rundbriefe **32**: 13-18.
- HEINRICH, J. und C. RENKER (1999): Kurzer Nachtrag zur Hieracienflora Niedersachsens: *Hieracium polymastix* bei Holzminden. Floristische Rundbriefe **33**: 23-25.
- HEINZ, S. und T. PFEIFFER (1998): Lebensstrategiegefüge in zwei xerothermen Pflanzengesellschaften in Mitteldeutschland (unteres Unstruttal): *Teucrio-Seslerietum* und *Geranio-Dictamnietum*. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 225-233.
- HEMP, A. (1999): Die Vegetation offener Kalkschutthalden der Nördlichen Frankenalb. Tuexenia **19**: 241-304.
- HENKE, H. (1998): Geprüfte/r Natur- und Landschaftspfleger/in. Ein neuer Naturschutzberuf. Natur und Landschaft **73**: 228-229.
- HENKER, H. (1999): Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus Mecklenburg-Vorpommern (neue, verschollene und übersehene Arten). Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 119-128.
- HENNICKE, M. (1998): Zum Vorkommen der Mehlsprimel längs der Eisenbahnstrecke zwischen Ferdinands-hof und Borkenfriede. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 119-120.
- HENSEN, I. und M. KENTRUP (1998): *Teucrio botryos-Melicetum ciliatae* (Traubengamander-Wimperperlgasflur) – Lebensstrategien in einer xerothermen Fels-Pioniergesellschaft. Tuexenia **18**: 217-236.
- HENZ, A. (1998): Das Karlsruher Modell. Ermittlung von Eingriff und Ausgleich in Bebauungsplanverfahren. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 345-350.
- HERBSTREIT, E. und M. STOLZENBURG (1999): Lagerstättenplanung im ökologisch sensiblen Raum. Ökologische und ökonomische Untersuchungen zum Kalksteinabbau im Teutoburger Wald. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 73-79.
- HERBSTREIT, E. und M. STOLZENBURG (1999): Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen von Eingriffen in Natur und Landschaft beim Festgesteinsabbau. Natur und Landschaft **74**: 110-118.
- HERDAM, H. (1998): Die Pflanzenwelt der Karstlandschaft Südharz. Farn- und Blütenpflanzen. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **35** (Sonderheft): 18-26.

- HERRMANN, A. (1999): Zustandserfassung ausgewählter Naturschutzgebiete Brandenburgs. *Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg* **8**: 93-101.
- HERRMANN, S. und A. SCHICK (1998): Erstellung und räumliche Zuordnung eines Grünlandnutzungskonzeptes mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 61-68.
- HERRMANN, S. und G. KAULE (1998): Ein Regionalmodell als Werkzeug für die Wirkungsanalyse von Konzepten zur nachhaltigen Agrarlandschaftsnutzung. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 25-34.
- HERTEL, D. und C. LEUSCHNER (1998): Die Rhizosphäre in einem Eichen-Buchenmischwald: Feinwurzelproduktion und die Bedeutung von Wurzelkonkurrenz. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 441-447.
- HETTWER, C. (1999): Schatthangwälder und Felsspalten-Gesellschaften auf Jura-Gestein im Alfelder Bergland (Süd-Niedersachsen). *Tuexenia* **19**: 153-171.
- HETZEL, G. und L. MEIEROTT (1998): Zur Anthropochorenflora fränkischer Deponiestandorte. *Tuexenia* **18**: 377-415.
- HEYDE, K. et al. (1999): Die Biotoptypen der Bergbaufolgelandchaften. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **36** (Sonderheft): 41-48.
- HIRSCH, G., M. MANN und O. MÜLLER (1998): Naturschutzgroßprojekt Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal, Thüringen. *Natur und Landschaft* **73**: 334-340.
- HOBOHM, C. (1998): Epiphytische Kryptogamen und pH-Wert – ein Beitrag zur ökologischen Charakterisierung von Borkenoberflächen. *Herzogia* **13**: 107-111.
- HÖCHTL, F. und W. KONOLD (1998): Dynamik im Weinberg-Ökosystem. Nutzungsbedingte raum-zeitliche Veränderungen im unteren Jagsttal. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 249-253.
- HOFMEISTER, H. und D. ZACHARIAS (1999): Die Weidelgras-Weiden des *Lolium-Cynosuretum* Br.-Bl. & De Leeuw 1936 nom. inv. auf dem Standortübungsplatz Hildesheim (Niedersachsen). *Tuexenia* **19**: 393-404.
- HÖLZEL, N. (1999): Geobotanische Dauerbeobachtung als Grundlage für die Effizienzkontrolle in Streuobstwiesen. Pilotstudie in den Streuobstbeständen der Stadt Maintal östlich von Frankfurt a. M. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 147-154.
- HORLITZ, T. (1998): Naturschutzszenarien und Leitbilder. Eine Grundlage für die Zielbestimmung im Naturschutz. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 327-330.
- HORLITZ, T. und K. Tampe (1998): Kosten zweier möglicher Entwicklungsszenarien des Naturschutzes in einem nordwestdeutschen Modellgebiet. *Natur und Landschaft* **73**: 435-442.
- HÖVELMANN, T. (1999): Kartierung mauertypischer Vegetation im Stadtgebiet von Münster. *Pulsatilla Heft 2*: 14-23.
- HOZAK, R. und C. MEYER (1998): Konzepte zur Wiederbelebung der Hüteschäferei auf Kalkmagerrasen und Heiden. *LÖBF-Mitteilungen* **4/98**: 22-28.
- HUBER, H. (1998): *Sphagnum* in der Schweiz und angrenzenden Gebieten: Bestimmungsschlüssel und Kommentare. *Herzogia* **13**: 1-36.
- HÜGIN, G. (1999): Was sind Wärmezeiger? Untersuchungen zum Wärmebedürfnis von Ruderal- und Segetalpflanzen in Mitteleuropa. *Tuexenia* **19**: 425-445.
- HUSICKA, A. (1999): Flora und Vegetation im NSG „Emsaltarm an der Hassel“. *Natur und Heimat* **59**: 25-28.
- HUSICKA, A. und A. VOGEL (1999): Zur Refugialfunktion von Weideparzellenrändern für Pflanzenarten und Vegetationstypen des Grünlandes. *Tuexenia* **19**: 405-424.
- HUSICKA, A. und G. SCHULTE (1999): Flußdeiche – Lebensräume zur Erhaltung und Reaktivierung der biologischen Vielfalt in den Auen? *LÖBF-Mitteilungen* **1/99**: 38-46.
- IHL, A. und H. J. HARDTKE (1998): Die Kartierungen der Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Botaniker für einen Florenatlas. *Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2*: 28-35.
- IRMLER, U. et al. (1998): Der Einfluß von Nutzung und Bodenparametern auf die Biozönosen des Feuchtgrünlandes. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 15-28.
- ISERMANN, M. (1998): Synchorologische Aspekte des *Elymo-Ammophiletum festucetosum* entlang der Küste Vorpommerns. *Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern* **34**: 106-112.
- JAGEL, A. (1999): Beiträge zur Flora Westfalens. *Floristische Rundbriefe* **33**: 27-54.
- JAKOB, S. und U. V. KÖCK (1999): Flora und Vegetation der Bergbaufolgelandchaften. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **36** (Sonderheft): 17-22.
- JANDT, U. (1998): Vegetation der Kalkmagerrasen des Südharzes und des Kyffhäusers. *NNA-Berichte* **11**: 120-124.
- JAX, K. (1998): Natürliche Störungen: ein wichtiges Konzept für Ökologie und Naturschutz? *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 241-253.
- JEDICKE, E. (1998): Raum-Zeit-Dynamik in Ökosystemen und Landschaften. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 229-236.
- JESSEL, B. (1998): Das Landschaftsbild erfassen und darstellen. Vorschläge für ein pragmatisches Vorgehen. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 356-361.
- JESSEL, B. (1998): Wie „zukunftsfähig“ ist die Eingriffsregelung? *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 219-222.
- JESSEL, B. (1999): Die FFH-Verträglichkeitsprüfung. Unterschiede gegenüber der UVP und zusätzliche Anforderungen. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 69-72.
- JESSEL, B. und K. Tobias (1998): Die Planungsrechtsnovelle – Symptom für den Zeitgeist? Zur Neufassung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung durch die Novellierung des Baugesetzbuches. *Natur und Landschaft* **73**: 155-158.

- JÖDICKE, M. und K. VAN DE WEYER (1998): Die Vegetation im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots Brügggen-Bracht (Kreis Viersen). *Decheniana* **151**: 71-87.
- JUEG, U. (1999): Die Gehölzflora im Schloßpark Ludwigslust. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 133-148.
- KAISER, T. (1998): Aufbau und Inhalt einer FFH-Verträglichkeitsstudie. Methodisches Vorgehen trotz fehlender Umsetzung des EU-Rechts. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 165-168.
- KAISER, T. (1999): Anwendung des Konzeptes der potentiellen natürlichen Vegetation in der praktischen Landschaftsplanung und im Naturschutz. *NNA-Berichte* **12**: 105-112.
- KAISER, T. (1999): Die potentielle natürliche Vegetation des Großraumes Celle auf der Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000 (BÜK 50). *NNA-Berichte* **12**: 66-77.
- KAISER, T. et al. (1998): Erfassungsdefizite bei Vegetationsaufnahmen mesophiler Laubwälder in Abhängigkeit vom Aufnahmezeitpunkt. *Tuexenia* **18**: 51-61.
- KAISER, T. und D. ZACHARIAS (1999): Eine anwendungsorientierte Definition der potentiellen natürlichen Vegetation. *NNA-Berichte* **12**: 46-47.
- KAISER, T. und I. BAECK (1999): Beurteilung von Gewichtungsmethoden zur Berechnung ökologischer Feuchtezahlen auf Niedermoorgrünland. *Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung* **40**: 29-33.
- KAMMER, P. M. (1998): Erfolgskontrolle im Naturschutz: Eine Methode für die repräsentative Überwachung von Pflanzenbeständen mit Dauerflächen. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 99-109.
- KARISCH, T. (1999): Mahonie, *Mahonia aquifolium* (Pursh.) Nutt., als Futterpflanze des Schlehens-Bürstenspinners, *Orgyia antiqua* L. *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft* **11**: 235-238.
- KARSTE, G. (1999): Der Brockengarten und seine Aufgaben im Nationalpark Hochharz. *Mitteilungen aus der NNA* **10**: 60-62.
- KASPEREK, G. (1999): Beiträge zur Flora des Rur-Tales (Großlandschaften Eifel, Niederrheinische Bucht und Niederrheinisches Tiefland) Folge 2. *Decheniana* **152**: 29-35.
- KASTEN, J. (1998): Die kleinsten Pflanzen im jüngsten Nationalpark Deutschlands – Phytoplankter des Unteren Odertals. *Biologie in unserer Zeit* **28**: 82-88.
- KÄSTNER, A. (1999): Schwarz-Pappeln in Sachsen-Anhalt, vom Aussterben bedroht? *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **36** (2): 3-12.
- KEHR, V. und G. KOST (1999): Mikrohabitat Pflanzengalle: Das Zusammenleben von Gallmücken und Pilzen. *Biologie in unserer Zeit* **29**: 18-25.
- KEIL, P. und T. KORDGES (1998): Wiederfund des Schwarzen Streifenfarne (*Asplenium adiantum-nigrum* L.) in der Westfälischen Bucht. *Natur und Heimat* **58**: 65-68.
- KELLER, M. und J. KOLLMANN (1998): Bedeutung der Herkunft von Saatgut. Untersuchungen an Buntbrachen und anderen ökologischen Ausgleichsflächen. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 101-106.
- KIECKBUSCH, J. J. (1998): Vegetationskundliche Untersuchungen am Südufer der Schlei. *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft* **55**: 1-136.
- KIFFE, K. (1998): Anmerkungen zu *Carex*-Hybriden in Mecklenburg-Vorpommern. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **32**: 127-134.
- KIFFE, K. (1998): Die ehemalige und aktuelle Verbreitung von *Carex buxbaumii* Wahlenberg und *Carex hartmanii* Cajander in Hamburg und Schleswig-Holstein. *Tuexenia* **18**: 273-284.
- KIFFE, K. (1998): Ein Erstnachweis von *Carex aquatilis* Wahlenberg in Nordrhein-Westfalen. *Natur und Heimat* **58**: 87-94.
- KIFFE, K. (1999): Anmerkungen zum Vorkommen von *Carex buxbaumii* s.l. in Nordrhein-Westfalen. *Natur und Heimat* **59**: 53-58.
- KIFFE, K. (1999): Ein Erstnachweis von *Carex binervis* Smith in Westfalen. *Natur und Heimat* **59**: 91-96.
- KIFFE, K. (1999): Eine in Deutschland bisher übersehene Sippe von *Carex* sect. *Phacocystis* (Cyperaceae): *Carex elata* subsp. *omsiana*. *Floristische Rundbriefe* **32**: 117-122.
- KIFFE, K. und K. VAN DE WEYER (1998): Ein Erstnachweis von *Carex x bakkerana* van der Ploeg & Rudolphy (= *C. acutiformis* Ehrh. x *C. rostrata* Stokes) in Deutschland. *Floristische Rundbriefe* **32**: 19-26.
- KINTZEL, W. (1998): Floristische Beiträge aus dem Landkreis Parchim (IV). *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **32**: 139-144.
- KINTZEL, W. (1998): Zur Ruderalvegetation in einigen Dörfen des Altkreises Lübz. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **32**: 49-68.
- KINTZEL, W. (1999): Floristische Beiträge aus dem Landkreis Parchim (V). *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 107-118.
- KIRCHNER-HESSLER, R. et al. (1999): Ökologische Konzeptionen für Agrarlandschaften. Modellprojekt Kulturlandschaft Hohenlohe – ein Forschungskonzept. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 275-282.
- KIRSCHBAUM, U. und K. HANEWALD (1998): Immissionsbezogene Flechtenkartierungen in hessischen Dauerbeobachtungsflächen. *Angewandte Botanik* **72**: 212-227.
- KLEINE-BÜNING, J., U. SANDER und M. KOCH-SIEPE (1998): Naturschutzgroßprojekt Hammeniederung, Niedersachsen. *Natur und Landschaft* **73**: 312-319.
- KLEMM, C. L. (1999): *Polystichum lonchitis* (L.) ROTH – ein seltener Farn bei uns im Norden. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 131-132.
- KLEMM, G. (1998): Flora des Altkreises Spremberg. Ergänzungen und Nachträge (2). *Gleditschia* **26**: 15-28.
- KLEYER, M. (1998): Individuenbasierte Modellierung von

- Sukzessionen pflanzlicher Wuchstypen bei unterschiedlichen Störungsintensitäten und Ressourcenangeboten. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 175-181.
- KLOTZ, E. (1999): Die Mehlprimel (*Primula farinosa* L.) im Kreis Heidenheim. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 231-234.
- KNEBEL, I. (1999): *Impatiens capensis* Meerb. In der Urdenbacher Kämpe – erster Nachweis dieses Springkrautes in NRW? Floristische Rundbriefe **32**: 123-125.
- KNOERZER, D. (1999): Zur Einbürgerungstendenz der Douglasie (*Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco) im Schwarzwald. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **8**: 31-39.
- KÖBERLE, T. und F. G. LINK (1999): Heiden und Schafe im Nordschwarzwald. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 39-62.
- KOKESCH, F. (1999): Nachweis autochthoner Eibenbestände im Bereich des NSG „Hütelmoor und heiliger See“. Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs **38**: 259-262.
- KOKESCH, F. (1999): Untersuchungsergebnisse zur Landschaftsgeschichte des NSG „Hütter Klosterteiche“ mit Hilfe der Dendrochronologie. Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs **38**: 263-264.
- KOLLMANN, J. (1998): Die *Rubus*-Flora der Nordfriesischen Insel Amrum. Tuexenia **18**: 95-102.
- KOLTZENBURG, M. (1999): Bestimmungsschlüssel für in Mitteleuropa heimische und kultivierte Pappelarten und -sorten (*Populus* spec.). Floristische Rundbriefe, Beiheft **6**: 1-54 sowie 28 Tafeln.
- KONOLD, W. (1998): Raum-zeitliche Dynamik von Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselementen. Was können wir für den Naturschutz lernen? Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 279-284.
- KOPERSKI, M. (1998): Der alte Militärflugplatz auf der ostfriesischen Insel Langeoog – ein bryologisch bedeutsamer Sekundärstandort. Herzogia **13**: 89-100.
- KOPERSKI, M. (1998): Verbreitung und Vergesellschaftung schwach acidiphiler bis schwach basiphiler epiphytischer Moose in Eichen-Buchenaltbeständen des niedersächsischen Tieflandes. Herzogia **13**: 63-80.
- KOPERSKI, M. (1999): Florenliste und Rote Liste der Moose in Niedersachsen und Bremen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 1-76.
- KÖPPEL, C. (1999): Rote Listen: Geschichte, Konzepte und Umsetzung sowie alternative Ansätze. NNA-Berichte **12**: 149-154.
- KORNECK, D. (1998): *Carex hallerina* im Nahegebiet (Zweiter Bericht). Decheniana **151**: 41-49.
- KÖRNER, C. (1999): Biologische Folgen der CO₂-Erhöhung. Biologie in unserer Zeit **29**: 353-363.
- KOSMALE, S. (1998): Grüngestaltung in Dörfern. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 1: 47-53.
- KOSMALE, S. (1998): Nutzungs- und Vegetationswandel im Westerzgebirge und in seinem Vorland. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 86-93.
- KOSMALE, S. (1999): Existenzbedingungen einer Art im Wandel der Zeiten – *Primula elatior*. Pulsatilla Heft 2: 42-44.
- KOWATSCH, A. et al. (1998): Salzgrünland an der Ostseeküste. Renaturierungsmöglichkeiten und -probleme am Beispiel der Zickernißniederung im Biosphärenreservat Südost-Rügen. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 143-146.
- KRATOCHWIL, A. und A. SCHWABE (1999): Interaktionen von Pflanzen- und Tierarten in Lebensgemeinschaften: ausgewählte Aspekte bioökologischer Forschung. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 201-221.
- KRAUSE, A. (1998): Das Pfefferkraut oder die breitblättrige Kresse (*Lepidium latifolium* L.) wieder in Nordrhein-Westfalen bestätigt. Decheniana **151**: 50.
- KRAUSE, A. (1998): Floras Alltagskleid oder Deutschlands 100 häufigste Pflanzenarten. Natur und Landschaft **73**: 486-491.
- KRAUSE, S. und W. SCHUMACHER (1998): Pflanzensoziologische Gliederung der Waldmeister-Buchenwälder (*Galio odorati-Fagetum* Sougez & Thill 1959) in der nordrhein-westfälischen Eifel. Tuexenia **18**: 3-19.
- KRAUSE, S., H. W. BENNERT und C. THIEX (1999): Verbreitung, Ökologie, Vergesellschaftung und Morphologie von *Cystopteris dickieana* Sim (*Woodsiaceae*, *Pteridophyta*) in Deutschland. Tuexenia **19**: 219-239.
- KRINGLER, H. und H. MATTERN (1998): Zieralgen vom Altbuch (Östliche Schwäbische Alb). Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **154**: 191-215.
- KRISCH, H. (1998): *Chenopodium botryodes* Sm. an der vorpommerschen Küste. Floristische Rundbriefe **32**: 27-31.
- KRUMBIEGEL, A., T. SCHMIDT und S. KLOTZ (1998): Artenverschiebung und Einwanderungsprozesse an einer Brache-Trockenrasen-Grenze im Mitteldeutschen Trockengebiet. Tuexenia **18**: 313-330.
- KÜHN, N. und J. PFADENHAUER (1998): Populationsbeobachtungen von ausgepflanzten *Centaurea jacea*. Ein Beitrag zur Renaturierung von Glatthaferwiesen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 319-326.
- KULBROCK, P. und I. SONNEBORN (1999): Wiederfunde des Nordischen Labkrautes (*Galium boreale* L.) in der Westfälischen Bucht. Natur und Heimat **59**: 117-120.
- KÜSTER, H. (1999): Die nacheiszeitliche Waldentwicklung in Norddeutschland und deren mögliche Beeinflussung durch die Fauna. NNA-Berichte **12**: 83-87.
- KWAK, R. et al. (1998): Erfolgreicher Naturschutz im Krosowicker Feld bei Vreden, Kreis Borken. LÖBF-Mitteilungen **1/98**: 35-44.
- LABASCH, M. und A. OTTE (1999): Handlungsebenen und Aufgaben der naturschutzfachlichen Effizienzkontrolle. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung **40**: 1-5, 59-64.
- LAMBERTZ, B. und W. SCHMIDT (1999): Auflichtungen in Buchen- und Buchenmischbeständen auf Muschelkalk und Buntsandstein – Untersuchungen

- zur Verjüngungs- und Vegetationsstruktur. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 81-88.
- LANGENAUER, R. und A. GIGON (1999): Blaue Listen: Anwendung in der nördlichen Schweiz. NNA-Berichte **12**: 121-132.
- LANGHEINRICH, U. et al. (1998): Probleme der Niedermoorregeneration im Naturpark Drömling. Natur und Landschaft **73**: 450-455.
- LANGROCK, D. (1998): Zu einigen Pflanzengesellschaften offener, nicht bewaldeter Standorte auf der Halbinsel Buhlitz (Rügen), einem ehemaligen Militärgelände. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 21-42.
- LEBENDER, A., S. TISCHEW und K. HEYDE (1999): Populations- und standortökologische Untersuchungen an Ophioglossaceen in der mitteldeutschen Tagelbaufolgelandschaft. Natur und Landschaft **74**: 523-529.
- LEDER, B. (1999): Zur Verwendung von Großpflanzen. Ist der Spanndraht eine alternative Schutzmaßnahme gegen Leittriebverbiß durch Rotwild? LÖBF-Mitteilungen 4/99: 47-50.
- LEDER, B. und J. KRUMNACKER (1998): Zur Vegetations- und Gehölzentwicklung auf Sukzessionsflächen nach Fichtenwindwurf. LÖBF-Mitteilungen 1/98: 64-72.
- LEHMANN, D. und R. LENZ (1999): Synthetische Kartierung der Vegetation im Vorfeld des Nationalparks Berchtesgaden – eine methodische Studie unter Einsatz geographischer Informationssysteme und neuronaler Netze. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 89-96.
- LEHNERT, S. et al. (1999): Auswirkungen extensiver Bewirtschaftungsvarianten auf eine Bergwiese im Harz. Entwicklung der Pflanzengesellschaften sowie der Bodennährstoffgehalte. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 181-186.
- LEICHT, H. (1998): Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Erfahrungen in Bayern und Verbesserungsvorschläge. Natur und Landschaft **73**: 213-217.
- LEINER, C. und C. MENKE (1998): Naturschutz und Landnutzung in Salzmarschen. Vorländer Ostfrieslands zwischen natürlicher Dynamik und kulturlandschaftlichen Prozessen. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 275-278.
- LEIPE, S. (1999): Flora und Vegetation im Naturschutzgebiet „Hütter Klosterteiche“. Archiv der Freunde der Naturgeschichte Mecklenburgs **38**: 249-258.
- LEUKERT, M. und M. VON DER LIPPE (1999): Konflikte zwischen Vegetationsdynamik und botanischem Artenschutz? Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 33-41.
- LEUSCHNER, C. (1999): Einige kritische Anmerkungen zur Konstruktion der Potentiellen Natürlichen Vegetation. NNA-Berichte **12**: 88-93.
- LEUSCHNER, C. (1999): Zur Abhängigkeit der Baum- und Krautschicht mitteleuropäischer Waldgesellschaften von der Nährstoffversorgung des Bodens. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 109-131.
- LEUSCHNER, C. et al. (1998): Feinwurzel-Bestandesmassen der Rotbuche an verschiedenen Standorten innerhalb ihrer ökologischen Amplitude in Nordwest- und Mitteldeutschland. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 429-434.
- LIENENBECKER, H. (1999): Die Natternzunge (*Ophioglossum vulgatum* L.) in ostwestfälischen Zierrasen. Natur und Heimat **59**: 29-32.
- LINK, M. und T. HARRACH (1998): Artenvielfalt von Gras- und Krautrainen. Ermittlung einer Mindestbreite aus floristischer Sicht. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 5-9.
- LINKE, C. et al. (1998): Neue und bemerkenswerte Moose aus Mecklenburg-Vorpommern (Teil 3). Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 161-166.
- LINKE, C. et al. (1998): Zur Kenntnis der Moosflora von Südwest-Mecklenburg. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 147-160.
- LINKE, C. und G. WALKOW (1999): Moose Mecklenburg-Vorpommerns VII. *Atrichum angustatum*. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 155-160.
- LITTERSKI, B. (1998): Bemerkenswerte Flechtenfunde in Mecklenburg-Vorpommern. Herzogia **13**: 165-169.
- LITTERSKI, B. (1998): Flechtenflora auf ausgewählten Monitoringflächen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern **34**: 78-97.
- LITTERSKI, B. (1999): Pflanzegeographische und ökologische Bewertung der Flechtenflora Mecklenburg-Vorpommerns. Dissertationes Botanicae **307**: 1-391.
- LITTERSKI, B. und F. BUNGARTZ (1999): Ergebnisse des 3. Flechtenkartierungstreffens in Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 161-166.
- LITTERSKI, B. und U. DE BRUYN (1998): Ausgewählte Flechtenfunde der Kartierungstreffen in Mecklenburg-Vorpommern 1997. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 167-172.
- LÖBNITZ, M. und G. LÖBNITZ (1999): Bemerkenswerte Arten bei der Kartierung des Gebietes südwestlich von Erfurt. Informationen zur floristischen Kartierung in Thüringen **17**: 14-17.
- LOOS, G. H. (1998): Die Brombeeren (*Rubus* L., subgenus *Rubus*) der Umgebung der Ruhr-Universität Bochum. Floristische Rundbriefe **32**: 32-43.
- LOOS, G. H. (1998): Vier neue Brombeerarten aus dem mittleren Westfalen. Floristische Rundbriefe **32**: 44-56.
- LOOS, G. H. (1999): Einige Bemerkungen zur Anwendung eines „pluralistischen“ Artkonzeptes im *Ranunculus auricomus*-Komplex (*Ranunculus* sectio *Ranunculus*). Floristische Rundbriefe **32**: 129-134.
- LOOS, H. E. (1998): Beobachtungen zur Migration und Standortwahl des Dreifinger-Steinbrechs (*Saxifraga tridactylites* L.). Natur und Heimat **58**: 33-38.
- LOSKE, K. H. (1999): Bestandsrückgang des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) in Mittelwestfalen. Folge der Ausbreitung der Brennessel (*Urtica dioica*) in Waldökosystemen? LÖBF-Mitteilungen 1/99: 23-31.

- LOTZ, A. (1998): Flora und Vegetation des Frankfurter Osthafens: Untersuchung mit Diskussion der verwendeten Analysekonzepte. *Tuexenia* **18**: 417-449.
- LÜDERITZ, V. und P. HENTSCHEL (1999): Umgestaltung des Landeskulturgrabens bei Dessau. Ein Beispiel für den Umgang mit anthropogenen Fließgewässern. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 18-23.
- LÜDERWALDT, D. (1999): Zum Rollenverständnis vom amtlichen und ehrenamtlichen bzw. verbandlichen Naturschutz von 1909 – 1999. *Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen* **19**: 188-190.
- LUTHARDT, V., W. G. VAHRSON und F. DREGER (1999): Konzeption und Aufbau der Ökosystemaren Umweltbeobachtung für die Biosphärenreservate Brandenburgs. *Natur und Landschaft* **74**: 135-143.
- MAASS, I., A. FRANKE und E. HUSSENDÖRFER (1999): Zur Wiederentdeckung von Schwarzpappeln (*Populus nigra* L.) am Neckar. *Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg* **155**: 97-105.
- MANN, G. (1999): Begrünte Dächer als Lebensraum. Ergebnisse ökologisch – faunistischer Untersuchungen. *Stadt und Grün* **48**: 194-199, 328-333.
- MANTHEY, M. (1998): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen auf Ackerbrachen im Stechlinsee-Gebiet. *Tuexenia* **18**: 331-356.
- MANTHEY, M. (1999): Beiträge zur bryologischen Erforschung Mecklenburg-Vorpommerns. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 149-154.
- MANTHEY, M. und S. SEIBERLING (1998): Verbreitung, Standort und Vergesellschaftung von *Eleocharis parvula*. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **32**: 69-76.
- MARSTALLER, R. (1998): Bryosoziologische Studien im Naturschutzgebiet Großer Inselsberg bei Brotterode im Thüringer Wald. 77. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. *Gleditschia* **26**: 75-104.
- MARSTALLER, R. (1998): Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes 10 Buchen bei Zillbach, Kreis Schmalkalden-Meiningen. 76. Beitrag zur Moosvegetation Thüringens. *Gleditschia* **26**: 59-74.
- MARTENSEN, H. O. (1998): 25 Jahre *Rubus*-Forschung in Norddeutschland. *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg* Heft 53: 1-60.
- MARX, J. und N. HÖLL (1999): Zur Landnutzung in den Naturschutzgebieten des Landes Baden-Württemberg. *Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg* **73**: 5-20.
- MATTERN, H. (1998): Die historische Kulturlandschaft in Naturschutz und Landschaftspflege an Beispielen aus dem nördlichen Württemberg. *Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg* **154**: 261-281.
- MATYSSEK, R. (1998): Ozon – ein Risikofaktor für Bäume und Wälder? *Biologie in unserer Zeit* **28**: 348-361.
- MATZKE-HAJEK, G. (1998): Die Identität von *Rubus angustifolius* Kalt. und *Rubus obscurus* Kalt. *Decheniana* **151**: 89-93.
- MATZKE-HAJEK, G. (1999): Erstnachweis von *Rubus murrayi* Sudre auf dem europäischen Kontinent und Ergänzungen zur Taxonomie und Verbreitung der Serie *Hystrix* (*Rubus* L., *Rosaceae*) in Mitteleuropa. *Decheniana* **152**: 37-46.
- MAUERSBERGER, R. (1998): Naturschutzgroßprojekt Uckermärkische Seen, Brandenburg. *Natur und Landschaft* **73**: 320-326.
- MAURER, U. (1998): Historisch-ökologischer Wandel städtischer Gehölze. Untersuchungen in Berliner Wohnsiedlungen der 20er und 30er Jahre. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 48-51.
- MEDUNA, E., J. J. SCHNELLER und R. HOLDEREGGER (1999): *Prunus laurocerasus* L., eine sich ausbreitende nichteinheimische Gehölzart: Untersuchungen zur Ausbreitung und Vorkommen in der Nordostschweiz. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **8**: 147-155.
- MENZEL, G. und K. MATHES (1999): Risikobewertung und Monitoring der Umwelteffekte gentechnisch veränderter Nutzpflanzen – Untersuchungen zum vertikalen Gentransfer bei *Brassica napus* L. (Raps). *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **8**: 157-162.
- MEY, H. et al. (1999): GIS-Daten zum Naturschutz in Niedersachsen. *Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen* **19**: 79-86.
- MEYER, H. und V. WOLTERS (1998): Ökologische Auswirkungen des Einsatzes von Totalherbiziden in herbizidresistenten transgenen Kulturen. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 337-344.
- MEYER, N. und H. SLUSCHNY (1999): Pflanzengeografische Besonderheiten des mecklenburgischen Elbetals. *Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern* **42** (2): 27-31.
- MEYER, T. (1999): Der Hainich – (k)lein ganz normaler Wald. Prozess-Schutz in Deutschlands erstem Laubwald-Nationalpark. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 24-25.
- MEYER-CORDS, C. und P. BOYE (1999): Schlüssel-, Ziel-, Charakterarten. Zur Klärung einiger Begriffe im Naturschutz. *Natur und Landschaft* **74**: 99-101.
- MICHELS, C. (1999): Stand der Maßnahmenumsetzung im Feuchtwiesenschutzprogramm und biologische Wirkungen am Beispiel des NSG „Dingener Heide“. *LÖBF-Mitteilungen* 3/99: 27-33.
- MIERWALD, U. (1999): Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufstellung von Blauen Listen in Hamburg. Blaue Listen als neues Instrument des Naturschutzes – eine Idee und ihre praktische Umsetzung. *NNA-Berichte* **12**: 133-135.
- MOHR, A. (1999): Die Laugenblume *Cotula coronopifolia* – Erstnachweis für Mecklenburg-Vorpommern. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **33**: 129-13.
- MÖLLER, C. (1998): Zum Vorkommen der Rispen-Flockenblume bei Parchim. *Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern* **32**: 121-122.
- MÖLLER, H. (1998): Der Klassencharakterarten-Verteilungsindex (V_{KC}), ein Zahlenwert zur integralen

- Erfassung der Beteiligung von Charakterarten verschiedener Klassen am Aufbau von Pflanzengesellschaften. *Tuexenia* **18**: 463-471.
- MROTZEK, R., M. HALDER und W. SCHMIDT (1999): Die Bedeutung von Wildschweinen für die Diasporenausbreitung von Phanerogamen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 437-443.
- MRZLIJAK, J. et al. (1999): Ein Verfahren der Erfolgskontrolle im Naturschutz: Biotrophybride. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 563-570.
- MÜCKSCHEL, C. (1999): Zum Vorkommen von *Erysimum cheiri* (L.) Crantz (*Cheirantus cheiri* L.) im mittleren Lahntal. *Decheniana* **152**: 5-8.
- MÜLLER, J. et al. (1998): Bodenvegetation und Wasserhaushalt von Kiefernforstökosystemen (*Pinus sylvestris* L.) Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 407-414.
- MÜLLER, K. und G. MÜLLER (1997/98): *Oxalis dillenii* Jacq., ein weiterer Neophyt für Schleswig-Holstein. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 167-168.
- MÜLLER, N. (1999): Einfluß biotischer und abiotischer Parameter auf die CH₄-C-Emissionen in einem degradierenden Hochmoor. *Decheniana* **152**: 47-64.
- MÜLLER-PFANNENSTIEL, K. et al. (1998): Kompensationsflächenpools zum Vollzug der Eingriffsregelung. Chancen und Anforderungen. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 182-189.
- MÜLLER-PFANNENSTIEL, K. und V. STUCHT (1998): Kartendarstellung im Landschaftspflegerischen Begleitplan. Anforderungen und Praxisbeispiel. *Natur und Landschaft* **73**: 272-276.
- NAGEL, J. und C. BEIERKUHNLEIN (1999): Beurteilung von Vegetationsentwicklungen mit Hilfe multivariater Methoden. Dauerflächen-Design und Auswertung mittels Hauptkomponentenanalyse. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 308-315.
- NATZKE, E. (1999): Erfassung, Identifizierung, Vermehrung und Wiederansiedlung der Schwarzpappel *Populus nigra* in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 45-55.
- NEYSTERS, T. und M. REMMERT (1998): Übererodung flachgründiger Kalkverwitterungsböden. Auswirkungen auf die Eigenschaften der Böden und die Entwicklung der Segetalflora und -vegetation – dargestellt am Beispiel des Raumes Soest-Erwitte. *LÖBF-Mitteilungen* 1/98: 73-80.
- NITSCH, L. (1999): Überlegungen zum Artenschutz durch Pflegenutzung im Grünland. *Pulsatilla* Heft 2: 24-33.
- NOBEL, W. et al. (1999): Flechtenkartierung nach VDI 3799: Methodische Modifikationen und Grundlage für eine ökologische Stadtplanung. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 571-577.
- OCHSE, M. und C. MICHELS (1999): Effizienzkontrolle im Feuchtgrünlandschutz. Ein Beispiel aus dem NSG „Dingener Heide“ (Nordrhein-Westfalen). *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 238-243.
- OPPERMANN, R. und R. LUICK (1999): Extensive Beweidung und Naturschutz. Charakterisierung einer dynamischen und naturverträglichen Landnutzung. *Natur und Landschaft* **74**: 411-419.
- PANEK, N. (1998): Prozessschutz in der Kulturlandschaft .. nicht um jeden Preis. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 381.
- PANEK, N. (1999): Nationalpark-Zukunft in Deutschland – einige kritische Anmerkungen und Thesen. *Natur und Landschaft* **74**: 266-272.
- PASSARGE, H. (1998): Gehölz-Gesellschaften auf Waldschlägen Nordostdeutschlands. *Tuexenia* **18**: 63-84.
- PATZELT, A. und J. PFADENHAUER (1998): Keimungsbiologie und Etablierung von Niedermoor-Arten bei Ansaat durch Mähgutübertragung. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 1-13.
- PESCHEL, T. (1998): Wiesen und Rasen Potsdamer Parks. Floristisch vegetationskundliche Bedeutung von 150 Jahre alten Landschaftsgärten des Weltkulturerbes. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 45-48.
- PETERS, J. (1998): Alleen und Pflasterstraßen als kulturgeschichtliche Landschaftselemente. Entwicklung und methodische Ansätze ihrer Sicherung in Brandenburg. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 69-75.
- PETERSEN, B., A. SSMYANK und U. HAUKE (1998): Natura 2000 – die nationale Gebietsbewertung gemäß der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie am Beispiel der alpinen biogeographischen Region in Deutschland. *Natur und Landschaft* **73**: 393-403.
- PFADENHAUER, J. (1999): Leitlinien für die Renaturierung süddeutscher Moore. *Natur und Landschaft* **74**: 18-29.
- PLIENINGER, W. (1998): Beiträge zur Kenntnis in Baden-Württemberg kultivierter Weiden-Arten. 1. *Salix eriocephala* Michaux, Amerikaner-Weide. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **154**: 217-229.
- POHL, D. (1998): Ziel, Bedeutung und Stand der Landschaftsschutzgebietsausweisung in Niedersachsen. Mitteilungen aus der NNA **9**: 33-38.
- POHL, D. (1999): Die ältesten Naturschutzgebiete in Niedersachsen – eine chronologische Zusammenstellung. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 163-169.
- POHL-ORF, M. et al. (1998): Untersuchungen zur Verbreitung von Fremdgenen in gentechnisch veränderten Pflanzen der Art *Beta vulgaris* L. – Monitoring in Agrar- und Küstenökosystemen. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 327-336.
- POTHMANN, G. und A. VOGEL (1999): Naturschutzfachliche Effizienzkontrolle des Pflege- und Entwicklungsplans NSG Emsdettener Venn. *LÖBF-Mitteilungen* 1/99: 56-62.
- POTT, R. (1999): 100 Jahre Reinhold Tüxen – Die Entwicklung der Pflanzengeographie und Pflanzensoziologie in Mitteleuropa. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* **11**: 7-17.
- POTT, R. et al. (1999): Aktuelle geobotanische Forschung

- auf den Nordseeinseln. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 39-108.
- POTTHAST, T. und U. ESER (1999): Systematisierungsvorschläge und vier Thesen zum Verhältnis von Naturschutzbegründungen, Ökologie und Ethik. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 579-585.
- PRETZEL, D. und A. REIF (1999): Erlenbruchwälder im Oberrheingraben und ihre Degradationsstadien. Tuexenia **19**: 179-191.
- PRILLIPP, K. M. (1998): Problematik von Naturschutzziele. Problemzusammenhang und Lösungsansatz – eine Diskussion. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 115-123.
- PROCK, S., G. MADER und A. CERNUSCA (1998): Die Diasporenbank subalpiner Weideflächen in den Alpen und ihre Bedeutung für die Sukzession. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 241-248.
- PUSCH, J. und W. WESTHUS (1998): Erhaltung und Schutz vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Thüringen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **35**: 38-48.
- PUSCH, J., J. WEIPERT und W. SAUERBIER (1998): Naturschutzgroßprojekt Kyffhäuser, Thüringen. Natur und Landschaft **73**: 327-333.
- PUST, J. und R. POTT (1998): Gewässerentwicklung und -eutrophierung. Raum-Zeit-Dynamik am Beispiel des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 258-263.
- RAAB, B. (1999): Beweggründe und Erfahrungen bei der Erstellung einer Blauen Liste für Vögel und Pflanzen auf LBV-Grundstücken. NNA-Berichte **12**: 143-148.
- RAABE, U. und K. VAN DE WEYER (1998): Effizienzkontrolle von Artenschutzgewässern in NRW. Floristische Aspekte. LÖBF-Mitteilungen **3/98**: 77-89.
- RADEMACHER, M. (1999): Wiederfund der Deutschen Tamariske (*Myricaria germanica*) an einem Baggersee in der südlichen Oberrheinebene (Baden-Württemberg). Floristische Rundbriefe **33**: 13-15.
- RADKOWITSCH, A. (1999): *Apocynum cannabinum* L. – ein neues nordamerikanisches Florenelement in Deutschland. Floristische Rundbriefe **32**: 111-116.
- RADLMAIR, S., H. PLACHTER und J. PFADENHAUER (1999): Geschichte der landwirtschaftlichen Moornutzung im süddeutschen Alpenvorland. Ein Beitrag zur naturschutzfachlichen Leitbilddiskussion. Natur und Landschaft **74**: 91-98.
- RAMISCH, H. (1999): Artidentifizierung reiner Ulmen-Arten und deren Hybriden anhand qualitativ zu beurteilender Merkmale. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft **84**: 109-122.
- RECKEL, S., M. LÖSCHNER und M. STOCK (1999): Flechten als Anzeiger der Luftqualität. Biologie in unserer Zeit **29**: 364-370.
- REFIOR, K. und G. WARTHEMANN (1999): Das geplante Naturschutzgebiet „Raumerwiese“ bei Dessau. Teil 1: Standort und Vegetation. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft **11**: 145-165.
- REHBEIN, R. und C. BERG (1998): Bemerkenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften aus dem Rostocker Raum. II. *Scorzonera humilis* L. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 77-86.
- REHBEIN, R. und C. BERG (1999): Bemerkenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften aus dem Rostocker Raum. III. *Euphorbia palustris* L. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 47-54.
- REICHHOFF, L. und P. HENTSCHEL (1998): Schutz und Nutzung biologischer Ressourcen – dargestellt am Beispiel des Biosphärenreservats Mittlere Elbe. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **35** (1): 17-24.
- REICHHOFF, L., G. WARTHEMANN und G. BRÄUER (1999): Bestand und Pflege des Auengrünlandes im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt **36** (1): 3-14.
- REICHHOLF, J. H. (1998): Stauseen – Tod oder Wiedergeburt der Flüsse? Biologie in unserer Zeit **28**: 149-156.
- REIF, A. (1999): Das naturschutzfachliche Kriterium der Naturnähe und seine Bedeutung für die Waldwirtschaft. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz **8**: 239-250.
- REISCH, C. (1999): Die Kalkmagerrasen des oberen Großen Lautertales. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **73**: 199-229.
- REISCH, C. und M. RÖHL (1999): *Meconopsis cambrica* (L.) Viguiet – eine neue Adventivart für Baden-Württemberg. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **155**: 193-197.
- RETTICH, H. (1999): Anfänge und Entwicklung des amtlichen Naturschutzes in Niedersachsen: Ereignisse – Daten – Fakten. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 130-160.
- REUTHER, R. (1999): Floristische Veränderungen an der mittleren Unstrut im Raum Bad Tennstedt in den vergangenen 150 Jahren. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 101-107.
- REUTHER, R. und H. DUBETZ (1999): Gegenwärtiges Vorkommen der zur Breitblättrigen Mehlbeere (*Sorbus latifolia* – Gruppe) gehörenden Sippen *S. subcordata* und *S. parumlobata* in der Umgebung von Arnstadt. Informationen zur floristischen Kartierung in Thüringen **17**: 11-14.
- RICH, T. und G. MATZKE-HAJEK (1999): Standardisierte Datenerhebung im Gelände als Grundlage für Verbreitungskarten. Floristische Rundbriefe **33**: 55-67.
- RIECKEN, U. (1998): Vorschlag zu „Bagatelluntergrenzen“ für die Flächengröße von besonders geschützten Biotopen nach § 20c BNatSchG. Natur und Landschaft **73**: 492-499.
- RIECKEN, U. et al. (1998): Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes für den Erhalt und die Entwicklung von Offenlandbiotopen. Natur und Landschaft **73**: 261-270.
- RIEDL, U. (1998): Was kann das Instrument § 26 NNatG „Landschaftsschutzgebiete“ für die Ziele des Naturschutzes leisten? Mitteilungen aus der NNA **9**: 39-45.

- RINGLER, A. (1998): Anmerkungen zum Verfahren und zu den bioökologischen Grundlagen für die FFH-Gebietsmeldungen (Natura 2000). *Natur und Landschaft* **73**: 533-537.
- RISTAU, K. D. und M. SCHMIDT (1998): Der Baumbestand des Lehrparks für Tier- und Pflanzenkunde Dessau. *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 10*: 59-85.
- RÖBBELEN, F. (1999): Einige Probleme, die bei der Erarbeitung Blauer Listen für Hamburg zu erwarten sind. *NNA-Berichte* **12**: 136-142.
- RÖBBELEN, G. (1999): Die historische Entwicklung der Pflanzenzüchtung in Deutschland: das Beispiel der Ölpflanze Raps. *Biologie in unserer Zeit* **29**: 132-141.
- RODE, M. W. (1998): Sukzessionen in Heidegebieten. Grenzen und Definitionen eines prozessorientierten Naturschutzes in einer Kulturlandschaft. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 285-290.
- ROMAHN, K. S. (1998): Die Vegetation der Krempen und Nordsee Heide. *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 54*: 1-148.
- ROTH, D. und M. SCHWABE (1999): Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen im Agrarraum. Ergebnisse und Erfahrungen in Thüringen. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 376-381.
- RUNGE, F. (1998): 40jährige Dauerquadrat-Untersuchungen in einer trockenen Zwergstrauchheide (*Gnisto-Callunetum*). *Decheniana* **151**: 7-9.
- RUNGE, F. (1998): Weitere Änderungen des Strauchbestandes einer neu angelegten Wallhecke. *Natur und Heimat* **58**: 19-20.
- RUNGE, F. (1999): Änderungen der Flora eines Hochwasser-Rückhaltebeckens im Laufe von 10 Jahren. *Floristische Rundbriefe* **32**: 140-143.
- RUNGE, F. (1999): Schwankungen der Vegetation in einem Tümpel des Münsterlandes II. *Natur und Heimat* **59**: 43-44.
- RUNGE, F. (1999): Zur Dynamik einiger Pflanzengesellschaften in den Allgäuer Alpen. *Tuexenia* **19**: 207-210.
- RUTHSATZ, B. (1998): Sukzessionsveränderungen im Seggenriedgürtel um ein vermoortes Maar der Vulkaneifel (NSG Mürmes) und ihre möglichen Ursachen. *Tuexenia* **18**: 237-259.
- SAMMLER, P. (1999): Zum Bewuchs von alten Eichen im Forstrevier Flottstelle zwischen Caputh und Ferch mit epiphytischen Flechten und Moosen sowie lignikolen Pilzarten. *Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg* **8**: 108-115.
- SÄNGER, H. und D. Vogel (1999): Salz- und Sumpfpflanzen im ehemaligen ostthüringischen Uranbergbaurevier. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **36**: 42-47.
- SAUER, M. (1998): *Ulotia macrospora*, eine verkannte Art? Ein Beitrag zur Taxonomie der Gattung *Ulotia* (*Orthotrichaceae*) in Mitteleuropa. *Herzogia* **13**: 37-51.
- SAUERWEIN, B. (1997/98): *Cicerbita macrophylla* subsp. *uralensis* (Rouy) Sell in Saumgesellschaften des *Lapsano-Geranion robertiani* Dierschke 74 in Angeln. *Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg* **25/26**: 70-79.
- SAYER, U. und A. REIF (1999): Bodenwasserversorgung und Einstrahlung in Flaumeichenbeständen im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb und des Klettgaus, Südwestdeutschland – was geschieht bei künftiger Erwärmung? Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 125-132.
- SCHÄFFER, N. (1999): Vegetationsstruktur – der Schlüssel zum Schutz des Wachtelkönigs. *NNA-Berichte* **12**: 50-61.
- SCHAKSMEIER, U. (1999): Die Greifswalder Erklärung – neue Wege zu Kooperation für den Naturschutz. *Mitteilungen aus der NNA* **10**: 37-40.
- SCHARF, D. und R. LÖSCH (1998): Die Sandtrockenrasen am Niederrhein. *Decheniana* **151**: 11-39.
- SCHERFOSE, V. et al. (1998): Naturschutzgroßprojekte des Bundes. *Natur und Landschaft* **73**: 295-301.
- SCHICK, B. und H. SUKOPP (1998): Blumen-Bestäuber-Systeme in urbanen Grünflächen: Über Blütenbesuche der Großen Wollbiene (*Anthidium manicatum* L.) im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 73-83.
- SCHIEFERSTEIN, B. (1999): Risikoforschung und Monitoring im Rahmen von Freisetzung und dem Inverkehrbringen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) – Aufgabenfelder für die ökologische Forschung. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **29**: 587-593.
- SCHLUMPRECHT, H. (1999): Pflege- und Entwicklungskonzept für die Grenzstreifen-Anteile von Naturschutzgebieten in Südhüringen. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **36**: 2-9.
- SCHMIDT, A. (1999): Historische Landschaftsanalyse. Ergebnisse aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **31**: 47-51.
- SCHMIDT, P. A. (1999): Ökologischer Waldumbau als Renaturierung? *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **29**: 595-600.
- SCHMIDT, T. (1998): Zur Vegetationsstruktur der Wasser- und Uferflora der Parthe, eines belasteten Fließgewässers in NW-Sachsen. *Tuexenia* **18**: 293-311.
- SCHMIDT, W. (1998): Dynamik mitteleuropäischer Buchenwälder. Kritische Anmerkungen zum Mosaik-Zyklus-Konzept. *Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 242-249.
- SCHMIDT, W. (1998): Langfristige Sukzession auf brachliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. *Naturschutz durch Nichtstun? Naturschutz und Landschaftsplanung* **30**: 254-258.
- SCHMIDT, W. (1999): Bioindikation und Monitoring von Pflanzengesellschaften – Konzepte, Ergebnisse, Anwendungen, dargestellt an Beispielen aus Wäldern. *Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft* **11**: 133-155.
- SCHMIDT, W. (1999): Die Bodenvegetation als Indikator für die biotische Mannigfaltigkeit von Wäldern – Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **29**: 133-143.
- SCHMITZ, G. (1998): *Impatiens parviflora* D.C. (*Balsaminaceae*) als Neophyt in mitteleuropäischen Wäldern

- und Forsten – eine biozöologische Analyse. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 7: 193-206.
- SCHMITZ, S. (1998): Flora des ehemaligen Grenzstreifens. Untersuchung von drei Beispielflächen im Berliner Stadtgebiet. Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 52-54.
- SCHMITZ, U. (1999): Naturverjüngung und Identifizierung der Schwarzpappel (*Populus nigra*) am Niederrhein. Decheniana 152: 97-103.
- SCHNABEL, R. und F. HOYER (1999): Floristische und avifaunistische Erfassungen auf dem alten Deponiekörper der Deponie Scherbelberg Dessau. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 11: 187-210.
- SCHNAPPAUFF, K. (1998): Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfs für den Landschafts- und Flächennutzungsplan. Modifikation des „Karlsruher Modells“ für die übergeordnete Planungsebene. Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 350-352.
- SCHNEIDER, C. und P. POSCHLOD (1999): Die Waldvegetation ausgewählter Flächen der Schwäbischen Alb in Abhängigkeit von der Nutzungsgeschichte. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 8: 135-146.
- SCHOLLE, D. und U. SCHLEUSS (1999): Methodische Ansätze zur Landschaftsanalyse: GIS -gestützte Zusammenführung von Vegetations- und Bodendaten. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 8: 163-171.
- SCHÖNBRODT, M. (1999): Ein individuenreicher Standort von *Ophrys apifera* Huds. in Halle (Saale). Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 4: 79-80.
- SCHRAUTZER, J. und K. JENSEN (1998): Quantitative und qualitative Auswirkungen von Sukzessionsprozessen auf die Flora der Niedermoorstandorte Schleswig-Holsteins. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 7: 219-240.
- SCHREIBER, M. und E. SPILLING (1999): Natura 2000: Vorschlaglisten nach Artikel 4 der FFH-Richtlinie für Niedersachsen. Diskrepanzen zwischen fachlichen Anforderungen und Umsetzung. Naturschutz und Landschaftsplanung 31: 170-175.
- SCHRÖDER, L. (1999): Die Erarbeitung von Karten der potentiellen natürlichen Vegetation (pnV) Deutschlands – Stand und Perspektiven. NNA-Berichte 12: 53-61.
- SCHRÖDER, R. (1998): Parkpflege und Naturschutz. Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz Heft 2: 100-105.
- SCHRÖDER, R. (1999): Erfahrungen der regionalen Botanischen Gärten beim Erhalt gefährdeter Pflanzen in Sachsen. Mitteilungen aus der NNA 10: 43-46.
- SCHUCHARDT, B. et al. (1999): Auswirkung der Verlegung einer Gasfernleitung auf die Bodenfunktionen. Analyse anhand von Vegetation, Regenwürmern und Laufkäfern in der Marsch. Naturschutz und Landschaftsplanung 31: 165-170.
- SCHULTE, W. und C. HETTWER (1999): Lehrpfade und Naturerlebnispfade zur Dorf- und Stadtökologie in Deutschland (Stand Januar 1999). Natur und Landschaft 74: 3-10.
- SCHULZE, M. (1999): Nachweis gentechnischer Veränderungen. Biologie in unserer Zeit 29: 158-166.
- SCHUPP, D. (1998): Baumschutz im Bereich von Baustellen. Mitteilungen aus der NNA 9: 10-14.
- SCHUPP, D. (1999): Amtlicher Naturschutz – „Männersache“? Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 19: 191-195.
- SCHUPP, D. (1999): Zur Situation der Bäume im Siedlungsbereich – Ergebnisse anhand von Baumkustastern. Mitteilungen aus der NNA 10: 72-74.
- SCHÜTZ, P. (1999): Kurzbeitrag zur Ausbreitungsstrategie des Dreifinger-Steinbrechs (*Saxifraga tridactylites* L.) und seiner künftigen Chancen im „Ruhrgebiet“. Natur und Heimat 59: 11-14.
- SCHWABE, M. (1999): Erfahrungen und Probleme bei der Neuanlage von Hecken in ausgeräumten Agrarlandschaften. Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 40: 117-121.
- SCHWARTZE, P. (1999): Auswirkungen der extensiven Grünlandbewirtschaftung und Wiedervernässung auf die Vegetation in Feuchtwiesenschutzgebieten. LÖBF-Mitteilungen 3/99: 49-55.
- SCHWENNINGER, H. R. und K. WOLF-SCHWENNINGER (1998): Naturschutzorientierte Umgestaltung von Straßenbegleitgrün. Neuer Lebensraum für Wildbienen und Tagfalter in der Großstadt? Natur und Landschaft 73: 386-392.
- SCHWEPPE-KRAFT, B. (1998): Naturschutzstrategien aus ökonomischer Sicht. Natur und Landschaft 73: 55-63.
- SCHWOCHOW, H. (1998): Die Pflanzengesellschaften im NSG Iteleich und deren Bedeutung für ein Biosphärenreservat Südharz. NNA-Berichte 11: 111-120.
- SEIFFERT, P. und W. KONOLD (1998): Landschaftswandel in Kißlegg (Allgäu). Ein Beispiel für Landschaftspotentiale und -entwicklung. Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 315-323.
- SEITZ, B. und H. JENTSCH (1999): Rückgang von Farn- und Blütenpflanzen im Biosphärenreservat Spreewald. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 8: 13-24.
- SESTERHEHN, G. (1998): Erstnachweis von *Fissidens monguillonii* in Deutschland. Herzogia 13: 53-62.
- SIEDENTOP, S. (1999): Kumulative Landschaftsbelastungen durch Verstädterung. Methodik und Ergebnisse einer vergleichenden Bestandsaufnahme in sechs deutschen Großstadttregionen. Natur und Landschaft 74: 146-155.
- SLUSCHNY, H. (1998): Die Krebschere (*Stratiotes aloides* L.) – Blume des Jahres 1998. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 32: 17-20.
- SLUSCHNY, H. (1999): Das große Büchsenkraut *Lindernia dubia* (L.) Pennell neu für Mecklenburg-Vorpommern. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern 33: 41-46.
- SLYCKEN, J. VAN (1998): Die Bewahrung forstgenetischer Ressourcen als wesentlicher Bestandteil der Biodiversitätsstrategie in Belgien. LÖBF-Mitteilungen 3/98: 40-48.
- SMETTAN, H. (1999): Ein Beitrag zur Flora des Mangfallgebirges. Floristische Rundbriefe 32: 144-171.
- SMETTAN, H. W. (1999): Florenwandel in Ostfildern (Kreis

- Esslingen) seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **155**: 199-226.
- SOLGA, A. (1998): Ergebnisse der Mooskartierung auf dem Stadtgebiet von Münster. Natur und Heimat **58**: 107-122.
- SOLGA, A. (1999): Moosflora und -vegetation auf Osningssandstein im nordwestlichen Teutoburger Wald. Limprichtia **13**: 1-110.
- SPEIER, M. (1998): Raum-Zeit-Dynamik in der Vegetations- und Landschaftsentwicklung Mitteleuropas. Ein Überblick zur nacheiszeitlichen Vegetations- und Landschaftsgeschichte. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 237-242.
- SPEIER, M. und R. POTT (1999): Der hannoversche Stadtwald „Eilenriede“ in geobotanischer und historischer Sicht. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 279-303.
- SPIESS, H. J., P. BOLBRINKER und D. LÄMMELE (1999): Monitoring nährstoffarmer Seen in Mecklenburg-Vorpommern durch Ermittlung und Beschreibung der submersen Makrophyten in ausgewählten FFH-Gebieten. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern **42** (1): 35-40.
- SPILLING, E. (1999): Natura 2000: Defizite bei der Aufstellung der FFH-Vorschlagsliste. Natur und Landschaft **74**: 323-328.
- SPILLING, E. (1999): Optionen beim Umgang mit Gänseproblemen. Entschädigen, Füttern oder Lenken – ein Beitrag zur Weideschadens-Problematik. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 244-246.
- STARKE, W. und V. WACHLIN (1999): Konzept für ein Monitoring zum LIFE-Projekt „Erhaltung und Wiederherstellung des Trebeltalmoores“. Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern **42** (1): 41-47.
- STEINBERG, C., A. FYSON und B. NIXDORF (1999): Extrem saure Seen in Deutschland. Biologie in unserer Zeit **29**: 98-109.
- STEINER, A. et al. (1998): Phytomasse- und Nährelementvorräte unterschiedlich stickstoffbeeinflusster Kiefernbestände (*Pinus sylvestris* L.) des nordostdeutschen Tieflandes. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 421-428.
- STEPHAN, B. und K. WITTIJEN (1999): Feuchtwiesenschutz und Florenzentwicklung in Feuchtwiesen-Naturschutzgebieten des Kreises Paderborn. LÖBF-Mitteilungen 3/99: 56-62.
- STICHMANN, W. (1999): Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Feuchtgebietsschutz und Flächenerwerb für den Naturschutz aus der Sicht der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. LÖBF-Mitteilungen 3/99: 12-13.
- STREMKE, A. et al. (1998): Dörfer im Wandel – Naturschutz in der Kommune. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **35**: 93-124 (Sonderheft).
- SUCK, R. (1999): Die natürlichen Waldgesellschaften des Schneifel-Hauptkammes (Westliche Hocheifel) und ihre Ersatzgesellschaften. Tuexenia **19**: 13-53.
- SUKOPP, H. (1998): 20 Jahre Naturschutz in Berlin. Ein Überblick der Jahre 1975 – 1995. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 37-40.
- SUNDERMEIER, A. (1999): Die Bestimmung der Vegetationsdichte in Grasland – ein Methodenvergleich. NNA-Berichte **12**: 61-73.
- TASSER, E. (1998): Kausalanalyse von Vegetationsveränderungen im Gebirge in Abhängigkeit von Landnutzung und Standortfaktoren. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 107-115.
- TÄUBER, T. (1998): Entwicklung von Flora und Vegetation des ehemaligen Panzerübungsgeländes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Eine erste kritische Bilanz nach 5 Jahren. Natur und Landschaft **73**: 523-530.
- TÄUBER, T. (1998): Neu- und Wiederfunde von Arten der Zwergbinsen-Gesellschaften in Niedersachsen. Teil 1: Landkreise Soltau-Fallingb. (SFA), Celle (CE) und Gifhorn (GF). Floristische Rundbriefe **32**: 74-80.
- TÄUSCHER, L. (1999): Wasser- und Sumpfpflanzen-Funde im Elb-Havel-Winkel (Biosphärenreservat „Flußlandschaft Elbe“, Sachsen-Anhalt, Landkreis Stendal). Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 70-74.
- TESCH, A. (1999): Grünland-Extensivierung im Moorgürtel der Hamburger Elbmarsch. Vegetationskundliche Begleituntersuchungen von 1988 bis 1998. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 342-350.
- THIERY, J. und H. KELKA (1998): Beweidung als geeignetes Mittel zur Bergwiesenpflege? Erfahrungen nach 25jähriger Beweidung einer Bergwiese im Harz. Natur und Landschaft **73**: 64-66.
- THOMAS, W. (1999): 50 Jahre kontinuierliche phänologische Beobachtungen in Münster. Über die aktuelle Bedeutung der Phänologie. Natur und Heimat **59**: 59-64.
- THOMAS, W. (1999): Einige bemerkenswerte (zumeist) neophytische Pflanzenvorkommen in Münster. Natur und Heimat **59**: 121-128.
- THUST, R. und A. THIELE (1999): Zu Problemen der Biotopepflege im Grünlandbereich. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 14-16.
- TIMMERMANN, T. (1999): *Sphagnum*-Moore in Nordostbrandenburg: Stratigraphisch-hydrodynamische Typisierung und Vegetationswandel seit 1923. Dissertationes Botanicae **305**: 1-175.
- TISCHEW, S. und E. G. MAHN (1998): Ursachen räumlicher und zeitlicher Differenzierungsprozesse von Silbergrasfluren und Sandtrockenrasen auf Flächen des mitteldeutschen Braunkohlentagebaus – Grundlagen für Renaturierungskonzepte. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 307-317.
- TÖPFER, O. et al. (1998): Das Fundortmonitoring – ein Dauerbeobachtungsprogramm für hochgradig gefährdete Orchideenarten in Thüringen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **35**: 89-90.
- TORNEDE, D. und T. HARRACH (1998): Effizienzkontrolle von Heidepflanzmaßnahmen. Erste Ergebnisse von Dauerbeobachtungsflächen auf dem Truppenübungsplatz Senne. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 205-210.
- TREIBER, R. (1999): Pflanzensoziologische, bodenkundliche

- che und Nutzungsgeschichtliche Untersuchungen zur Entwicklung von Trockenrasen-Gesellschaften der südsächsischen Harth (Frankreich, Haut Rhin). *Tuexenia* **19**: 305-342.
- TREIBER, R. (1999): Untersuchungen zur Aziditätstoleranz der Weißen Brunelle (*Prunella laciniata* L.). Floristische Rundbriefe **32**: 135-139.
- ULLRICH, B. (1999): Das Pilotprojekt „Pflege- und Entwicklungsplanung Büchelberg“ – ein Beispiel für umsetzungsorientierte Naturschutzplanung. *Natur und Landschaft* **74**: 306-316.
- VÖGE, M. (1998): Zur phänotypischen Plastizität beim Durchwachsenen Laichkraut *Potamogeton perfoliatus* L. Floristische Rundbriefe **32**: 81-85.
- VÖGE, M. (1999): Das See-Brachsenkraut *Isoetes lacustris* L. in einigen deutschen Seen: Blattanzahl und Sporenproduktion. *Tuexenia* **19**: 211-217.
- VOIGTLÄNDER, U. und C. BERG (1999): Naturschutzorientierte Umweltbeobachtung in Mecklenburg-Vorpommern – Vorschläge aus der Sicht der AG Geobotanik. *Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern* **42** (1): 12-16.
- VORMANN, M. und E. LEISEN (1999): Elf Jahre Untersuchungsprojekt „Erfolgskontrolle zum Feuchtwiesenschutzprogramm (FWP)“ LÖBF-Mitteilungen 3/99: 34-41.
- VORMANN, M. und W. KÜHBAUCH (1999): Auswirkungen einer langjährigen Extensivbeweidung nach Vorgaben des Feuchtwiesenschutzprogramms auf die Vegetationsentwicklung. *Angewandte Botanik* **73**: 110-117.
- WAGNER, H. G. (1999): Ein Neufund von *Potamogeton praelongus* von Wulfen 1805 in Baden-Württemberg. Floristische Rundbriefe **33**: 9-12.
- WALDHARDT, R. et al.: (1999): Typisierung, Lokalisierung und Regionalisierung von Vegetationspotentialen einer peripheren Kulturlandschaft. *Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung* **40**: 246-252.
- WALTER, E. (1998): Die Großblütige Katzenminze (*Nepeta grandiflora* Bieb.) in Oberfranken. Floristische Rundbriefe **32**: 86-90.
- WALTER, E. (1998): Die Schwertblättrige Binse (*Juncus ensifolius* Wikström – auch in Oberfranken. Floristische Rundbriefe **32**: 91-94.
- WALTER, R. et al. (1998): Regionalisierte Qualitätsziele, Standards und Indikatoren für die Belange des Arten- und Biotopschutzes in Baden-Württemberg. Das Zielartenkonzept – ein Beitrag zum Landschaftsrahmenprogramm des Landes Baden-Württemberg. *Natur und Landschaft* **73**: 9-25.
- WARTHEMANN, G. und L. REICHHOFF (1999): Flora und Vegetation der Taubeniederung. *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau* Heft 11: 74-97.
- WEBER, B. E. G., M. JÄGER und C. ECKELKAMP (1998): Ökologische Risiken gentechnisch veränderter virusresistenter Pflanzen. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 345-354.
- WEBER, H. E. (1998): *Franguletea*. Faulbaum-Gebüsche. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands, Heft 4: 1-86.
- WEBER, H. E. (1998): Weitere Nachträge zur Brombeerflora Westfalens. *Natur und Heimat* **58**: 43-54.
- WEBER, H. E. (1998): Wichtigste Nachträge zur Gattung *Rubus* in Deutschland als Ergänzung zur Flora von Hegi 1995. *Floristische Rundbriefe* **32**: 57-73.
- WEBER, H. E. (1999): *Rhamno-Prunetea*. Schlehen- und Traubenholunder-Gebüsche. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands, Heft 5: 1-108.
- WEBER, H. E. (1999): *Salicetea arenariae*. Dünenweiden-Gebüsche. Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands, Heft 6: 1-37.
- WEHRICH, D. (1999): Regelungen zu naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch. *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* **36** (1): 33-40.
- WEISGERBER, H. (1998): Das Konzept zur Erhaltung forstlicher Genressourcen in der Bundesrepublik Deutschland. *LÖBF-Mitteilungen* 3/98: 35-40.
- WEISSER, H., B. SCHALL und R. SCHANZ (1998): Naturschutzgroßprojekt Wurzachser Ried, Baden-Württemberg. *Natur und Landschaft* **73**: 350-357.
- WELK, E. und M. H. HOFFMANN (1998): Chorologische Datenbanken – grundlegende Voraussetzung zur objektiven Evaluierung der Schutzrelevanz von Gefäßpflanzen. *Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz* **7**: 155-168.
- WEND, K. H. (1999): Baumarten für den Siedlungsbereich. *Mitteilungen aus der NNA* **10**: 78-81.
- WERNER, J. (1998): Einige Bemerkungen zu den Zeigerwerten für Moose. *Herzogia* **13**: 101-106.
- WESSELS, W. (1998): Laubbäume am stärksten geschädigt. *Ergebnisse der Waldschadenserhebung 1998 in NRW*. LÖBF-Mitteilungen 3/98: 94-98.
- WESSELS, W. (1999): Wälder stärker geschädigt. LÖBF-Mitteilungen 4/99: 57-63.
- WESTHUS, W. und F. FRITZLAR (1999): Sind Rote Listen noch zeitgemäß? *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **36**: 90-92.
- WESTHUS, W. und L. FABER (1998): Biotopkartierungen in Thüringen im Überblick. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **35**: 8-13.
- WESTHUS, W., S. KLAUS und F. FRITZLAR (1999): Schutz und Pflege Thüringer Hochmoore durch gemeinsames Handeln von Forst- und Naturschutzverwaltung. *Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen* **36**: 98-100.
- WEYER, K. VAN DE (1998): Nachträge zur Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes Elmpter Schwalmbruch (Niederrhein, Nordrhein-Westfalen). *Decheniana* **151**: 57-70.
- WIEBE, C. (1998): Ökologische Charakterisierung von Erlenchwäldern und ihren Entwässerungsstadien: Vegetation und Standortverhältnisse. *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg* Heft 56: 1-164.
- WIESINGER, K., M. SEEBAUER und S. STADLER (1998): Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen in Landwirtschaftsbetrieben – Kennzahlen zur Prognose von Wirtschaftlichkeit und Umweltwirkungen. *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* **28**: 43-52.

- WILHALM, T. (1998): Neues zur Ausbreitung von *Sporobolus vaginiflorus* (Torrey) Wood. Floristische Rundbriefe **32**: 95-100.
- WILKENS, H. (1999): Die Aland-Niederung (Sachsen-Anhalt): Planungen im alten Stil statt Hochwasserschutz im Gesamtkonzept. Natur und Landschaft **74**: 52-57.
- WILMANN, O. (1999): Vegetationsfarben. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **11**: 367-384.
- WINDISCH, U. (1999): Zur Eignung ausgewählter Laubbaumarten für die immissionsbezogene Flechtenkartierung in Hessen und Bayern. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **29**: 601-605.
- WINTER, J. (1999): Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Pflanzenzucht – Saatgut, Sortenwesen und Biotechnologie. Biologie in unserer Zeit **29**: 167-176.
- WIRTH, V. (1999): Das Endivien-Habichtskraut (*Hieracium intybaceum*) indigen im Schwarzwald. Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg **155**: 237-240.
- WISSEMANN, V. (1997/98): Die wilden Rosen Helgolands – ein Beitrag zur Flora von Helgoland. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 33-38.
- WITTIG, B. (1998): Das *Parnassio-Caricetum pulcaris* auf der Stader Geest. Tuexenia **18**: 261-272.
- WITTIG, B. (1998): Erfolgreiche Entwicklung einer Sandacker-Beikrautgesellschaft mit *Lilium bulbiferum* subsp. *croceum* und *Arnoseris minima* (Nordwestdeutschland). Floristische Rundbriefe **32**: 101-104.
- WITTIG, R. (1999): Vegetation, Flora und Schutzwürdigkeit des geplanten Waldnaturschutzgebietes „Glindfeld“ im Hochsauerland. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde **61** (3).
- WITTIG, R. (1999): Verbreitung und Standorte von *Ane-mone nemorosa* und *Polygonatum multiflorum* in Buchenwäldern des Ruhrgebietes. Tuexenia **19**: 173-177.
- WITTIG, R., S. HUCK und M. WITTIG (1999): Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Bärlappe (*Lycopodiaceae*) im Zentrum des Rothaargebirges. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde **61** (3).
- WITTIG, R. und S. WALTER (1999): Die Vegetation des geplanten Waldnaturschutzgebietes Schanze (Rothaargebirge, Hochsauerland). Decheniana **152**: 9-27.
- WITTIG, R., K. H. LENKER und V. TOKHTAR (1999): Zur Soziologie von Arten der Gattung *Oenothera* L. im Rheintal von Arnheim (NL) bis Mulhouse (F). Tuexenia **19**: 447-467.
- WOLF, G. und P. SAUERBORN (1999): Ein didaktisches Konzept für einen stadt-ökologischen Lehrpfad durch die Innenstadt von Köln. Natur und Landschaft **74**: 511-515.
- WÖLFEL, U. (1998): August Zobel und der Apollensberg bei Griebö. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 10: 25-39.
- WÖLFEL, U. (1998): Zur Vegetation und Flora des Quet-zer Berges. Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau Heft 10: 40-58.
- WÖLFEL, U. (1999): Zur Flora von Bitterfeld und Umgebung (7. Beitrag). Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt **4**: 75-78.
- WOLFF-STRAUB, R. (1998): Die Herkulesstaude – eine Problempflanze. LÖBF-Mitteilungen **2/98**: 70-71.
- WOLFRAM, C. (1997/98): *Bryum salinum* Hagen ex Limpricht 1892 in Deutschland. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **25/26**: 123-127.
- WOLFRAM, C. et al. (1998): Die Vegetation des Beltringharder Kooges 1987-1998 (Nordfriesland). Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg Heft 58: 1-220.
- WÖLLECKE, J., B. MÜNZENBERGER und R. F. HÜTTL (1998): Kiefernmykorrhizen und ihre Diversität auf unterschiedlich stickstoffbelasteten Standorten im nordostdeutschen Tiefland. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **28**: 259-262.
- WOLLERT, H. (1998): Zur Zusammensetzung des *Urtico-Cruciatetum laevis* Dierschke 73 im mittleren Mecklenburg. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **32**: 43-47.
- WOLLERT, H., H. KARL und C. BERG (1999): Zur Methodik der Erfassung vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern als Grundlage für die Erarbeitung eines Schutzprogramms. Pulsatilla, Heft 2: 5-13.
- WOLLERT, H., H. SLUSCHNY und U. SCHLÜTER (1999): Zum Vorkommen einiger kontinental verbreiteter Pflanzenengesellschaften im mecklenburgischen Tal der Elbe sowie in den Niederungen ihrer Nebenflüsse Sude und Löcknitz. Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **33**: 23-40.
- WOLSCHKE-BULMANN, J. und G. GRÖNING (1999): Zur Situation des Naturschutzes im Nationalsozialismus. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **19**: 175-178.
- WULF, F. und K. HELLMANN (1999): Erfassung und Bewertung des Sukzessionszustandes von ehemaligen Ackerterrassen im mittleren Thüringer Wald. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **36**: 17-24.
- WULF, M. und M. LUTHARDT (1999): Floristische Kartierung der Laubholzflächen auf Mineralstandorten im Naturschutzgebiet Grumsiner Forst/Redernswalde (Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin). Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg **8**: 137-143.
- WÜST, A. und V. SCHERFOSE (1998): Richtlinien für Pflege- und Entwicklungspläne. Übersicht und Vergleich von Anleitungen der Länder und des Bundes. Naturschutz und Landschaftsplanung **30**: 81-88.
- ZACHARIAS, D. (1999): Erarbeitung von Grundlagen für aktuelle Karten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (pnV) in Niedersachsen auf Basis der bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000 (BÜK 50). NNA-Berichte **12**: 62-65.
- ZENKER, W. (1998): Langzeitbeobachtungen an Halbtrockenrasen im Naturschutzgebiet Koppelstein bei Lahnstein (Rheinland-Pfalz). Decheniana **151**: 51-56.

- ZERBE, S. (1999): Bedeutung des PNV-Konzeptes für die Bewertung von Nadelholzforsten. Probleme und Konsequenzen für die Praxis. NNA-Berichte 12: 94-101.
- ZIMMER, D. (1998): Flechtendauerbeobachtung im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft – Dauerquadrate zur epigäischen Flechtenflora des Darß. Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern **34**: 98-105.
- ZIMMERLING, B., G. ADOLF und S. SCHÄFER (1999): Renaturierung geschädigter Grünlandvegetation. Empfehlungen für die Dornburger Aue im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Naturschutz und Landschaftsplanung **31**: 85-88.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Pulsatilla - Zeitschrift für Botanik und Naturschutz](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Höster H. R.

Artikel/Article: [Bibliographie Botanik und Naturschutz 1998 und 1999 42-60](#)