

Die Exkursion vom 1.-2.7.89 in die Südeifel bei Neuerburg

Von Dieter Siede, Bonn

Die südliche Eifel um Prüm, Neuerburg und Bitburg bis an die luxemburgische Grenze gehört zu den wenig besammelten Gegenden des Rheinlandes. Bis auf eine Exkursion in den sechziger Jahren (Koch und Koch) und einige Urlaubstage, die ich 1970/71 mit meinen Eltern in der Gegend von Neuerburg verbracht hatte, und eine Geländebegehung am 15.8.81 in Falkenstein unter Führung von Dr. Gruschwitz, waren meines Wissens nach noch keine Koleopterologen dort. Daher beschloß unsere Arbeitsgemeinschaft diese Gegenden in den folgenden Jahren genauer zu untersuchen.

Auf einer Vorexkursion am 22.4.89 sah ich mich nach interessanten Biotopen um und suchte preiswerte Quartiermöglichkeiten aus.

An der Exkursion am 1. und 2.7.89 nahmen folgende Damen und Herren teil: M. und F. Müller, D. Eisinger, J. Scheuern, F. Nippel mit Sohn, H. Pascher, Ch. Högner, Schmitt, H. D. Matern, M. Schoop, D. Siede und Ch. Näthke. Einige Kollegen waren schon Freitag abend angereist, so daß es ein recht gemütlicher Abend im Gasthof Kiemen wurde, vor allem auch wegen der Kochkünste des Inhabers.

Am Samstag besuchten wir bei kühlem Wetter (nach langer Trockenzeit und mit Vegetation im Zustand von Mitte bis Ende Juli) das Gaybachtal bei Gaymühle. Hier wurde ein Wiesenbach, die krautige Vegetation und Lagerholz untersucht. Dabei war eine auffällige Armut an Phytophagen zu bemerken. Danach wurde die Umgebung von Falkenstein besucht, wobei der Bereich des Naturschutzgebietes ausgeklammert wurde, da auch an Straßenrändern usw. hinreichend interessante Biotope vorhanden waren. Am Nachmittag wurden noch Waldränder bei Jucken in der Nähe von Arzfeld untersucht.

Am Sonntag nahmen wir uns den Holzabfallhaufen der Firma Högner genauer vor. Die Tochter des Inhabers begleitete uns dabei und obwohl selbst Naturwissenschaftlerin, staunte sie über die Fülle interessanter Käfer, die wir ihr zeigen konnten.

Da nach Abschluß der Untersuchungen eine Veröffentlichung geplant ist, folgt hier keine detailliertere Auswertung, sondern nur tabellarisch die Liste der beobachteten Käferarten mit Fundort; Anreiz fürs Mitmachen 1990! Mitaufgenommen sind dort Funde der Vorexkursion in die Umgebung Falkenstein, einer Exkursion von H. Pascher nach Gaymühle am 21.7. und zahlreiche Funde von J. Scheuern, die er am 30.6. und 1.7. in der näheren Umgebung gemacht hat.

Tab.: Artnachweise Eifelexkursionen 1989.
Abkürzungen: Orte: G = Gaymühle, Gaybach-
tal; H = Gaymühle, Holzabfallhaufen; F =
Falkenstein; J = Jucken bei Arzfeld; U =
Umgebung, sonstige Nachweise von Joachim
Scheuern. Beobachter: Ei = Dietmar
Eisinger; Ma = Horst-Dieter Matern; Pa =
Hans Pascher; Sc = Joachim Scheuern; Si =
Dieter Siede; m = 10-20 Ex. oder mehrere
Beobachter, h > 20 Ex. Faunistisch
bemerkenswerte Arten sind mit "!"
versehen. Nomenklatur und Gattungssyste-
matik nach LUCHT 1987, LUCHT 1989 und
RÜCKER 1989.

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BOEB.
<i>Carabus nemoralis</i>	1	1	.	.	.	Ei, Sc
<i>C. problematicus</i>	1	.	.	1	.	Sc
<i>Nebria brevicollis</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Notiophilus biguttatus</i>	1	.	.	.	2	Ei, Sc
<i>Elaphrus riparius</i>	.	.	.	.	2	Sc
<i>Loricera pilicornis</i>	.	1	.	.	1	Sc
<i>Dyschirius aeneus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>D. globosus</i>	.	.	.	.	3	Sc
<i>Trechus quadristriatus</i>	2	.	.	2	m	Ei, Sc
<i>Tachys bisulcatus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Bembidion lampros</i>	2	2	.	.	.	m
<i>B. tetracolum</i>	.	1	.	.	7	Sc
<i>B. articulatum</i>	1	.	.	.	4	Sc
<i>B. quadrimaculatum</i>	1	4	.	.	.	Ei, Sc
<i>Perigona nigriceps</i>	3	2	.	.	.	Ei, Sc
<i>Trichotichnus nitens</i>	1	.	1	.	2	Ei, Sc
<i>Harpalus rubripes</i>	.	.	1	.	.	Ei
<i>Stenolophus teutonus</i>	.	.	.	.	3	Sc
<i>Pterostichus madidus</i>	2	.	.	.	.	Ei
<i>P. cristatus</i>	2	.	.	.	.	Sc
<i>P. strenuus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>P. melanarius</i>	1	.	.	.	1	Ei, Sc
<i>P. oblongopunctatus</i>	2	.	.	.	2	Ei, Sc
<i>P. nigrita</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>P. rhaeticus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Abax parallelus</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>A. ovalis</i>	.	.	.	1	.	Sc
<i>A. parallelepipedus</i>	2	.	.	.	.	Ei, Sc
<i>Calathus fuscipes</i>	1	1	.	.	1	Ei, Sc
<i>Agonum marginatum</i>	.	.	.	.	5	Sc
<i>A. viridicupreum !</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>A. sexpunctatum</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Platynus obscurus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Amara plebeja</i>	1	.	.	.	1	Ei, Sc
<i>Amara ovata</i>	.	.	2	.	.	Ei
<i>A. familiaris</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>A. aenea</i>	2	.	.	.	.	Ei, Sc
<i>A. lunicollis</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Dromius agilis</i>	.	.	1	.	.	Sc
<i>Oreodytes rivalis</i>	m	.	.	.	1	m
<i>Platambus maculatus</i>	5	.	.	.	.	Pa, Si

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BOEB.
<i>Agabus bipustulatus</i>	1	.	.	.	.	Pa
<i>Hydraena gracilis</i>	3	.	.	.	.	Sc
<i>Limnebius truncatellus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Helophorus nubilus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>H. avernicus</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>H. granularis</i>	m	.	.	.	.	Si
<i>H. aquaticus</i>	m	.	.	.	1	Si, Sc
<i>H. obscurus !</i>	2	.	.	.	.	Sc
<i>H. minutus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>H. griseus</i>	4	.	.	.	.	Si
<i>Sphaeridium lunatum</i>	2	.	.	.	.	Sc
<i>Coelostoma orbiculare</i>	3	.	.	.	.	Si
<i>Cercyon impressus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>C. analis</i>	.	m	.	.	.	Pa
<i>Megasternum boletoph.</i>	2	m	8	5	.	Pa, Sc
<i>Cryptopleurum minutum</i>	2	.	.	.	5	Sc
<i>Anacaena globulus</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Laccobius minutus</i>	.	.	.	.	4	Sc
<i>L. alutaceus</i>	3	.	.	.	.	Si
<i>Abraeus globosus</i>	1	.	.	.	.	Pa
<i>Platysoma compressum</i>	1	.	.	.	1	Sc
<i>Margarinotus ventralis</i>	2	.	.	.	.	Sc
<i>Phosphuga atrata</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Agathidium sphaerulum</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>A. badium</i>	5	.	.	2	.	m
<i>A. varians</i>	.	.	.	.	3	Sc
<i>A. atrum</i>	1	.	.	1	2	Sc
<i>A. laevigatum</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Calyptomerus dubius</i>	.	m	.	.	1	Sc
<i>Cephennium gallicum</i>	.	.	.	m	6	Sc
<i>Neuraphes elongatulus</i>	.	.	.	.	4	Sc
<i>Euconnus fimetarius</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>Scydmaenus tarsatus</i>	.	2	.	.	.	Pa
<i>Ptenidium gressneri !</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>P. pusillum</i>	.	m	.	.	.	Pa
<i>Pteryx suturalis</i>	.	.	.	m	1	Sc
<i>Acrotrichis intermedia</i>	9	.	.	8	1	Sc
<i>Scaphidium quadrimac.</i>	2	.	.	1	1	Sc
<i>Scaphisoma agaricinum</i>	1	4	.	.	3	Ei, Sc
<i>Phloeoch. subtilissima</i>	.	.	.	2	.	Sc
<i>Proteinus brachypterus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Eusphalerum longipenne</i>	4	.	.	.	.	m
<i>E. ophthalmicum</i>	3	.	.	1	.	Ma, Si
<i>E. rectangulum</i>	1	.	.	.	.	Ma
<i>E. abdominale</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Acrulia inflata</i>	.	.	.	3	.	Sc
<i>Phyllodrepa ioptera</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Ph. pygmaea !</i>	.	1	.	.	.	Ma
<i>Anthrophagus bicornis</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>A. angusticollis</i>	.	.	.	3	.	Ma, Sc
<i>Syntomium aeneum</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Oxytelus rugosus</i>	.	1	.	.	.	Si
<i>O. teracarinatus</i>	.	1	.	3	.	Pa, Si
<i>Platystethus cornutus</i>	1	.	.	.	1	Ei, Sc
<i>P. alutaceus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Stenus biguttatus</i>	.	.	.	.	4	Sc

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BEOB.
<i>S. clavicornis</i>	1	.	.	.	1	Sc
<i>S. boops</i>	.	1	.	.	7	Sc
<i>S. brunnipes</i>	.	.	.	.	2	Sc
<i>S. cicindeloides</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Paederus litoralis</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Rugilus angustatus</i> !	.	2	.	.	.	Sc
<i>Medon apicalis</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Litocharis nigriceps</i>	2	.	.	.	.	Pa
<i>Leptacinus linearis</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>L. intermedius</i>	.	1	.	.	.	Si
<i>Gauropterus fulgidus</i> !	.	m	.	.	.	m
<i>Gyrohypnus angustatus</i>	.	1	.	.	.	Sc
<i>Othius punctulatus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>O. myrmecophilus</i>	1	.	.	.	1	Sc
<i>Philonthus splendens</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Ph. atratus</i>	.	1	.	.	6	Si, Sc
<i>Ph. concinnus</i>	.	3	.	.	.	Si, Sc
<i>Ph. fuscipennis</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Gabronthus thermarum</i> !	.	2	.	.	.	Ei
<i>Gabrius splendidulus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Quedius picipes</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Qu. fumatus</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Qu. boops</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Habrocerus capilliaric.</i>	.	4	.	.	.	Pa
<i>Mycetoporus longulus</i>	.	.	.	1	.	Si
<i>Sepedophilus littoreus</i>	.	3	.	.	1	Sc
<i>S. immaculatus</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Tachyporus obtusus</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>T. solutus</i>	.	.	.	1	.	Si
<i>Gyrophaena strictula</i>	4	3	.	.	.	Pa, Si
<i>Leptusa pulchella</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>L. ruficollis</i>	.	.	.	.	2	Sc
<i>Bolitochara obliqua</i>	3	.	.	1	.	m
<i>B. lucida</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Falagria thoracica</i>	1	.	1	.	.	Ei
<i>Geostiba circellaris</i>	1	1	1	.	.	Pa, Sc
<i>Nehemitropia sordida</i>	1	3	.	.	.	Ei, Sc
<i>Dinaraea aequata</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Atheta palustris</i>	1	1	.	.	.	Ei, Sc
<i>A. coriaria</i>	1	6	1	.	.	m
<i>A. pygmaea</i>	.	3	.	.	.	Sc
<i>A. sodalis</i>	.	.	.	2	.	Sc
<i>A. trinotata</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Ocalea picata</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Oxypoda annularis</i>	.	.	.	3	.	Sc
<i>Aleochara albobvillosa</i> !	.	.	.	.	1	Sc
<i>A. stichai</i> !	.	.	.	.	1	Sc
<i>A. sparsa</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>A. bipustulata</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Bibloporus bicolor</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>Euplectus sanguineus</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>E. karsteni</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>Bryaxis curtisi</i>	3	.	.	.	.	Ei
<i>Cratosilis denticollis</i> !	1	.	.	.	.	Ma
<i>Rhagonycha fulva</i>	m	.	.	.	.	Ei
<i>Rh. gallica</i>	.	.	.	.	1	Sc

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BEOB.
<i>Rh. limbata</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Malthinus flaveolus</i>	.	.	.	1	.	Si
<i>Malachius bipustulatus</i>	.	.	.	1	.	Si
<i>Axinotarsus pulicarius</i>	.	.	.	1	.	Si
<i>Dasytes niger</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Ampedus pomorum</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>A. pomonae</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Agriotes pilosellus</i>	1	.	1	.	.	Ei
<i>A. pallidulus</i>	.	.	.	1	1	Si, Sc
<i>Adrastus limbatus</i>	.	.	.	1	2	Si, Sc
<i>Denticollis linearis</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Pseudathous niger</i>	3	.	.	.	.	Ei, Si
<i>Athous vittatus</i>	.	.	.	.	2	Sc
<i>A. subfuscus</i>	.	.	.	.	4	Sc
<i>Drapetes biguttatus</i> !	.	m	.	.	.	Si, Sc
<i>Throscus carinifrons</i>	.	.	.	.	1	Ma
<i>Elmis aenea</i>	7	.	.	.	m	Sc
<i>Anthrenus verbasci</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Brachypterus urticae</i>	m	.	.	.	.	Pa
<i>Meligethes aeneus</i>	m	.	2	.	.	m
<i>M. coracinus</i>	.	.	2	.	.	Si
<i>M. erythropus</i>	.	.	1	.	.	Si
<i>M. serripes</i> !	4	.	.	.	.	Si
<i>Epuraea florea</i>	1	.	.	.	.	Ma
<i>E. pusilla</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>E. adumbrata</i> !	.	.	.	1	.	Ma
<i>E. longula</i>	1	.	.	.	.	Sc
<i>Cychramus luteus</i>	m	.	.	.	.	Ei
<i>Pityophagus ferrugineus</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Rhizophagus cribratus</i> !	1	.	.	.	.	Ei
<i>Rh. dispar</i>	.	.	.	2	.	Sc
<i>Monotoma picipes</i>	1	.	.	.	2	Ei, Sc
<i>Silvanus unidentatus</i>	m	1	.	.	1	m
<i>Uleiota planata</i>	m	m	.	.	.	m
<i>Pediacus depressus</i>	1	.	.	.	.	Ei
<i>Cryptophagus scanicus</i>	.	.	.	2	1	Sc
<i>C. distinguendus</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>C. pseudodentatus</i>	.	1	.	.	.	Pa
<i>Lathridius nodifer</i>	.	6	.	.	.	Si, Sc
<i>L. constrictus</i>	.	1	.	.	.	Sc
<i>Enicmus pseudominutus</i> !	.	5	.	.	2	Sc
<i>Cartodere elongata</i>	1	1	.	.	.	Ei, Sc
<i>C. separanda</i> !	.	.	.	.	2	Sc
<i>Corticarina similata</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>C. gibbosa</i>	3	.	.	.	.	Ma, Si
<i>Melanophthalma curticoll.</i>	.	.	1	.	.	Si
<i>Mycetophagus atomarius</i>	.	.	.	.	1	Sc
<i>Litargus connexus</i>	.	.	1	.	.	Sc
<i>Ditoma crenata</i>	.	m	.	.	.	Pa
<i>Cerylon fagi</i>	.	.	.	1	2	Sc
<i>Orthoperus atomus</i>	.	h	.	.	.	Sc
<i>Sphaerosoma pilosum</i>	2	3	.	.	1	Pa, Sc
<i>S. piliferum</i>	.	.	.	1	1	Sc
<i>Mycetaea hirta</i>	.	h	.	.	.	Pa
<i>Coccidula rufa</i>	1	.	.	.	.	Si
<i>Scymnus rubromaculatus</i>	1	.	.	.	.	Sc

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BEOB.
Chilocorus renipustul.	1	.	.	.	.	Si
Coccinella distincta !	.	.	.	1	.	Si
C. quinquepunctata	1	.	.	1	.	Si, Sc
C. septempunctata	1	.	.	.	.	Si
Propylea quatuordecimp.	1	.	.	.	.	Si
Sulcacis affinis	3	.	.	.	.	Si
Cis festivus	1	.	.	.	.	Ma
Ennearthron cornutum	1	.	.	.	.	Ma
Tipnus unicolor	.	1	.	.	.	Pa
Chrysanthia viridissima	1	.	.	.	.	Sc
Anthicus tobias !	.	4	.	.	.	m
A. floralis	.	m	.	.	.	m
Anaspis humeralis	.	.	.	.	1	Sc
A. thoracica	.	.	.	.	1	Sc
A. varians	1	.	.	.	.	Si
A. cf. lurida	1	.	.	.	.	Si
Tetratoma ancora	.	1	.	.	.	Si
Orchesia minor	.	.	1	.	.	Sc
Melandrya caraboides	.	.	.	.	1	Sc
Lagria hirta	.	.	1	.	.	Si
Conopalpus testaceus	.	.	1	.	.	Sc
C. brevicollis !	3	.	.	.	.	Ma, Sc
Hypophloeus unicolor	1	.	.	.	.	Ei
Geotrupes stercorosus	.	.	.	1	.	Sc
Onthoph. verticicornis !	.	.	1	.	.	Si
Aphodius fossor	3	.	.	.	.	Sc
A. rufipes	2	.	.	.	.	Sc
A. depressus	1	.	.	.	.	Sc
Amphimallon solstitiale	.	.	1	.	.	Ei
Oryctes nasicorn. Larven	.	m	.	.	.	Si, Sc
Platycerus caraboides	1	.	.	.	.	Sc
Judolia cerambyciformis	2	1	.	.	.	m
Strangalia nigra	1	.	1	.	.	Ei, Sc
S. maculata	5	.	.	.	.	m
S. melanura	m	.	.	.	.	Ei
Stenopterus rufus	3	.	.	.	.	Si, Sc
Phymatodes testaceus	.	1	.	.	.	Sc
Agapanthia villosa virid.	1	.	.	.	.	Si
Lema lichenis	.	.	1	1	.	Si
Cryptocephalus labiatus	6	.	1	.	.	m
C. pusillus	.	.	.	1	.	Ma
Chrysomela varians	m	.	.	.	.	Si
Dlochysa fastuosa	m	.	.	.	.	m
Gastroidea viridula	m	.	.	.	.	Si
G. polygona	.	.	1	.	.	Si
Phaedon cochleariae	1	.	.	.	.	Pa
Plagioderma versicolore	1	1	.	.	.	Si, Sc
Phytodecta olivaceus	1	.	m	.	.	m
Phyllodecta vittellinae	1	.	.	.	.	Ma
Melasoma vigintipunctata	1	.	.	.	.	Ma
Galeruca tanaceti	1	.	.	.	.	Ei
Agelastica alni	.	.	.	.	1	Sc
Phyllotreta christinae !	1	.	.	.	.	Si
Longitarsus exoletus !	.	.	4	.	.	m
L. anchusae	.	.	1	.	.	Si
L. melanocephalus	.	.	1	.	.	Si

GATTUNG, ART	G	H	F	J	U	BEOB.
L. suturellus	m	.	m	.	.	Si
Haltica oleracea	.	.	.	.	4	Sc
Sphaeroderma testaceum	1	.	.	.	.	Pa
Chaetocnema concinna	1	.	1	1	.	Si
Ch. subcoerulea	2	.	.	.	.	Pa
Cassida viridis	1	.	.	.	.	Si
C. rubiginosa	.	.	1	.	.	Si
Bruchidius fasciatus	m	.	1	.	.	m
Hylastes opacus	.	.	.	.	1	Sc
Dryocoetes autographus	.	.	.	.	1	Sc
Apoderus coryli	.	.	1	.	.	Pa
Apion curtirostre	5	.	3	2	.	Si
A. hookeri	.	.	1	.	.	Si
A. loti	1	.	.	.	.	Si
A. striatum	.	.	.	.	2	Sc
A. onopordi	.	.	.	1	.	Ma
A. violaceum	2	.	2	.	.	Si
A. viciae	.	.	.	1	.	Si
A. spencei	.	.	.	2	.	Si
A. cerdo	.	.	.	2	.	Si
A. flavipes	2	.	.	.	.	Si
A. affine	1	.	.	.	.	Si
A. virens	.	.	1	.	.	Si
A. immune	.	.	1	.	.	Si
Otiorhynchus singularis	.	.	3	.	.	Ma, Sc
Phyllobius viridearis	.	.	.	.	1	Sc
Ph. parvulus	.	.	.	1	.	Si
Polydrusus impar	1	.	.	.	1	Si, Sc
P. marginatus	.	.	.	1	.	Ma
Strophos. melanogrammum	.	.	.	1	.	Sc
Barypeithes pellucidus	.	.	.	.	1	Sc
Larinus planus	1	.	.	.	.	Ma
L. sturnus	.	.	2	.	.	Si
Curculio nucum	.	.	.	1	.	Ma
Liparus germanus	.	.	.	.	1	Sc
Leiosoma deflexum	.	.	1	.	.	Si
Acalles ptinoides !	.	.	.	1	.	Sc
Rhinoncus perpendicul.	.	.	.	.	1	Sc
Rh. pericarpus	4	.	.	1	.	Si
Zacladus affinis	1	.	.	.	.	Si
Coeliodes dryados	1	.	.	2	1	m
C. ruber	.	.	.	3	.	Ma
Ceutorhynchus contractus	.	1	.	.	.	Pa
C. quadridens	.	.	1	.	.	Si
C. punctiger	.	.	1	.	.	Si
C. cochleariae	.	.	1	.	.	Si
Cidnorhinus quadrimacul.	.	2	.	.	.	Ma, Si
Miarus ajugae	.	.	.	2	.	Ma, Si
Cionus cf. longicollis	.	.	1	.	.	Sc
C. tuberculosus	.	.	1	.	.	Si
Rhynchaenus pilosus	.	.	.	m	.	Ma, Sc
Rh. avellanae !	.	.	.	m	.	Ma
Rh. quercus	.	.	.	5	.	Ma
Rh. fagi	1	.	.	m	5	Ma, Sc

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Rundschreiben der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [1990](#)

Autor(en)/Author(s): Siede Dieter

Artikel/Article: [Die Exkursion vom 1. -2. 7 .89 in die Südeifel bei Neuerburg 9-12](#)