

REICHENBACHIA

STAATLICHES MUSEUM FÜR TIERKUNDE IN DRESDEN

Bd. 5

Ausgegeben: 3. November 1965

Nr. 32

Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae)

S. von B R E U N I N G
Paris

Nanohammus sinicus PIC (nov. comb.)

Orsidis sinica PIC, 1926, Mél. exot. ent., XLV, p. 16.

Langgestreckt. Fühler fein, das erste Glied lang und dünn, das dritte merklich länger als das vierte. Die unteren Augenloben etwas höher als breit, mehr als um die Hälfte länger als die Wangen. Stirn höher als breit, ziemlich dicht und fein punktiert. Halsschild quer, mit kleinem, spitzigem Seitendorn, die beiden Querfurchen wenig deutlich. Decken lang, parallel, apikalwärts kaum verschmälert, am Ende verrundet, ziemlich fein punktiert.

Rotbraun. Jede Decke mit zwei breiten weißlichen Querbinden, eine praemediane und eine postmediane. Beine rötlich.

Länge: 12 mm; Breite: 3 $\frac{1}{2}$ mm.

Von PIC nach einem Stück von China beschrieben und irrtümlich der Gattung *Orsidis* PASC. unterstellt. Typ im Pariser Museum.

Dem *myrrhatus* PASC. zunächststehend, aber das Halsschild ohne Binden, die Fühler einfarbig usw.

Ichthyodes (s. s.) biguttula dinayatensis ssp. nov.

Wie die Stammform, aber die unteren Augenloben kaum länger als die Wangen, die Stirn grob punktiert, das Halsschild größer punktiert, die apikale Deckennahtcke angedeutet, die Decken etwas weniger fein punktiert.

Typ ein ♂ von den Philippinen: Insel Dinayat, ex coll. W. SCHULTZE, im Museum für Tierkunde, Dresden.

Zorilispe luzonica n. sp.

Der *fulvisparsa* PASC. nahestehend, aber die unteren Augenloben mehr als zweimal so lang wie die Wangen, der Kopf und das Halsschild merklich weniger fein punktiert, die Decken etwas weniger fein punktiert, vor dem Apikalende nicht eingezogen und die Tomentierung abweichend.

Rot, fein graugelb tomentiert. Halsschild mit seitlich weniger deutlich ausgebildeter, schmaler ockergelber Längsbinde. Die Tomentierung auf den Decken in Form schmaler Längsstriche angeordnet. Jede Decke überdies mit einer praepikalen, nahtwärts verbreiterten, gelben Querbinde. Fühler rotbraun tomentiert.

Länge: 9 mm; Breite: $1\frac{2}{3}$ mm.

Typ von der Insel Luzon: Montalban, ex coll. W. SCHULTZE, im Museum für Tierkunde, Dresden.

Exocentrus (Pseudocentrus) vidanii n. sp.

Dem *tippmanni* BREUN. nahestehend, aber kleiner, das dritte Fühlerglied etwas kürzer als das erste, der Halsschildseitendorn merklich kürzer, die Decken sehr dicht punktiert, die Punkte in der vorderen Hälfte längsgereiht, die Basalhälfte der Schenkel ebenso dunkelrot wie die übrigen Teile der Schenkel.

Länge: 5 mm; Breite: $1\frac{3}{4}$ mm.

Typ von Ghana: Acra, leg. VIDANI, ex coll. DEMELT in meiner Sammlung.

Paraglenea latefasciata m. obscuricollis PIC nov. comb.

Paraglenea obscuricollis PIC, 1952, Echange, LXVIII, no. 530, p. 13.

Wie die Stammform, aber auf jeder Decke eine kurze schmale weiße Binde, die auf der Scheibe schief nach vorn von der weißen Mittelquerbinde ausgeht.

Tonkin: Chapa (coll. PIC), Typ im Pariser Museum.

Obereopsis nigrolateraloides nom. nov.

Obereopsis nigrolateralis BREUN. 1964, Ent. Arb. Mus. Frey, XV, p. 729 (nec 1953, Ent. Arb. Mus. Frey, IV, p. 8) **nov. syn.**

Phytoecia (Blepisani) rufa m. latesuturevittata nov.

Wie die Stammform, aber jede Decke mit einer breiten schwärzlichen Nahtbinde, die die drei vorderen Viertel durchläuft.

Typ ein ♀ von Nordrhodesien: Abercorn in meiner Sammlung.

Sehr nahe *pseudolatesuturalis* BREUN., aber das Halsschild etwas weniger quer, die Decken etwas weniger dicht und merklich punktiert usw.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Breuning Stephan von

Artikel/Article: [Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Lamiinae \(Coleoptera, Cerambycidae\) 283-284](#)