

# REICHENBACHIA

STAATLICHES MUSEUM FÜR TIERKUNDE IN DRESDEN

---

Bd. 6

Ausgegeben: 10. August 1966

Nr. 18

---

## Apistephialtes Seyrig ein Synonym zu Liotryphon Ashmead (Hymenoptera, Ichneumonidae)

JOACHIM OEHLEKE  
Eberswalde

In den Entomologischen Nachrichten Bd. 16, p. 297, hat KRIECHBAUMER 1890 die Art *Liogaster longulus* aus der Collection WÜSTNEI in Sonderburg beschrieben. Wahrscheinlich glaubte er, daß die Gattung *Liogaster* bereits beschrieben sei, denn er gibt keine Gattungsbeschreibung. Damit ist *Liogaster* eine monobasische Gattung. ASHMEAD hat, da der Name *Liogaster* bereits von MEYER, 1844 (*Crust.*) verwendet wurde, im Jahre 1900 in Canad. Ent., 32, p. 268, den neuen Namen *Liotryphon* eingeführt.

1960 hat TOWNES im U. S. Nat. Mus. Bull., 216 (2) p. 10 die bisher fragliche Gattung und Art zu deuten versucht und sie mit einem Fragezeichen als neues Synonym zu *Exeristes arundinis* KRIECHBAUMER gestellt.

Durch die freundliche Unterstützung von Herrn Dr. B. PETERSEN, Kopenhagen, erhielt ich das von KRIECHBAUMER determinierte Material der Coll. WÜSTNEI zur Untersuchung.

1 ♀ „*Liogaster longulus* KRIECH.“ — „Sdbg. 17. 6. 82“ (= Sonderburg) — „Kriechb. determ“ Die Bezeichnung erfolgte wahrscheinlich von WÜSTNEI, aber es handelt sich eindeutig um den Holotypus der von KRIECHBAUMER beschriebenen Spezies. Es ist ein kleines ♀ von *Apistephialtes punctulatus* (RATZEBURG, 1848), nov. syn.

Neben diesem ♀ befinden sich noch zwei weitere von KRIECHBAUMER determinierte und zur Gattung *Liogaster* gestellte Exemplare in der Sammlung:

1 ♀ „*Liogaster glabratus* RTZ.“ = *Apistephialtes strobilellae* (L.)

1 ♂ „*Liogaster cylindricus* HTG.“ — (eine i. litt.-Spezies), welche ein ♂ von *Apistephialtes crassisetus* (THOMS.) ist.

Damit ist eindeutig gezeigt, was KRIECHBAUMER unter seiner Gattung *Liogaster* verstanden hat. Die von SEYRIG, 1927 als *Apistes* (nom. praeocc.) beschriebene und 1928 umbenannte Gattung *Apistephialtes* mit der typischen Art *Apistes perversus* SEYRIG wird somit ein Synonym von *Liotryphon* ASHMEAD, 1900. Die typische Art ist:

*Pimpla punctulata* RATZEBURG, 1848 (= *Liogaster longulus* KRIECHBAUMER, 1890).

Die Gattung ist zumindest holarktisch und enthält in der Westpalaearktis folgende beschriebene Arten (alles nov. comb.):

### Liotryphon

- arcticus* ROMAN, 1914;  
*ascaniae* RUDOW, 1883 (= *perversus* SEYRIG, 1927);  
*caudatus* RATZEBURG, 1848;  
*crassisetus* THOMSON, 1877 (= *pleuralis* THOMSON, 1877);  
*cydiae* PERKINS, 1942 (vielleicht ein Synonym zu *Pimpla cercopitheca* COSTA, 1885);  
*discedens* HENSCH, 1930;  
*punctulatus* RATZEBURG, 1848 (= *Eph. extensor* TASCHENBERG, 1863;  
    *Liogaster longulus* KRIECHBAUMER, 1890);  
*strobilellae* LINNAEUS, 1758 (= *Eph. glabratus* RATZEBURG, 1852);  
*subglabratus* PERKINS, 1943 (= *Eph. geniculatus* KRIECHBAUMER, 1896,  
nom. praeocc.).

### Literatur

ASHMEAD, W. H., 1900: Some changes in generic names in the *Hymenoptera*. — Canad. Ent., 32, 368. — KRIECHBAUMER, J., 1890: Neue Schlupfwespen aus Nord- und Mitteldeutschland. — Ent. Nachr., 16, 289—297. — TOWNES, H. K., 1960: Ichneumon-Flies of America North of Mexico 2. Subfamilies *Ephialtinae*, *Xoridinae*, *Acanthinae*. — U. S. Nat. Mus. Bull. 216 (2). VII & 676 pp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1965-1966

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Oehlke Joachim

Artikel/Article: [Apistephialtes Seyrig ein Synonym zu Liotryphon Ashmead  
\(Hymenoptera, Ichneumonidae\) 145-146](#)