

REICHENBACHIA

STAATLICHES MUSEUM FÜR TIERKUNDE IN DRESDEN

Bd. 9

Ausgegeben: 14. September 1967

Nr. 12

98. Cerambycidae III.

Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera)

LEO HEYROVSKÝ

Praha

Von der dritten zoologischen Expedition, die Herr Dr. Z. KASZAB, Direktor der Zoologischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest, in die Mongolei im Jahre 1965 unternommen hat, wurde mir das Cerambyciden-Material zur Verarbeitung gütigst zugesendet. Es beträgt 12 Arten in ca. 200 Stücken. Diese Ausbeute ist sehr interessant, da sie auch von solchen Gebieten stammt, wo bisher noch niemand gesammelt hat. Ich fand darunter eine neue Subspecies, 3 neue Morphen und eine neue Art beschreibe ich „in literis“. Außerdem führe ich auch einige Arten an, die die Herren Dr. EREGDENDAGHVA und ČONGSONŽAV gesammelt haben. Die neue Art *Eodorcadion albitarsale*, die Herr ČONGSONŽAV im Chovd-aimak gesammelt hat, wird von Dr. S. BREUNING mit der Ausbeute der mongolisch-deutschen Expedition 1964 in nächster Zeit beschrieben. Diese Stücke stammen aus Bulgan und Uenč.

Die Fundorte führte ich unter den Nummern, die für die ganze Insektenausbeute eingeführt sind, an.

1. *Gaurotes aemula* MANNH.

Central aimak Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500–1800 m, 22.–23. VII. 1965 (Nr. 298), 1 Ex.; id., 1500–1800 m, 22. VII. 1965 (Nr. 294), 1 Ex.

2. *Leptura sequensi* REITTER

Central aimak Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500–1800 m, 22. VII. 1965 (Nr. 294), 1 Ex.

ab. *rufopaca* REITTER: Central aimak: Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500–1800 m, 22. VII. 1965 (Nr. 294), 1 Ex.; id., 1500–1800 m, 22.–23. VII. 1965 (Nr. 298), 1 Ex.

3. *Tetropium castaneum* (L.) ab. *aulicum* F

Central aimak Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500–1800 m, 22. VII. 1965 (Nr. 294), 1 Ex.

4. *Polyzonus fasciatus* (F.)

Chentej aimak 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965 (Nr. 320), 3 Ex.

5. *Eodorcadion involvens* (FISCHER-WALDH.)

Chentej aimak Somon Žargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965 (Nr. 314), 6 Ex.; 30 km O von Somon Žargaltchaan, 1200 m, 28. VII. 1965, Bergsteppe (Nr. 315), 5 Ex.; 10 km W von Somon Delgerchaan, 1250 m, 23.–24. VIII. 1965 (Nr. 474), 1 Ex.; 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 22. VIII. 1965 (Nr. 462), 1 Ex.; Somon Mörön, ungef. 1200 m, 28. VII. 1965 (Nr. 318), 5 Ex. — Central aimak Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500–1800 m, 22. VII. 1965 (Nr. 294), 1 Ex.

m. *nigrum* PLAV Chentej aimak Somon Žargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965 (Nr. 314), 1 Ex.

m. *combinatum* HEYROVSKÝ: Chentej aimak 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965 (Nr. 320), 1 Ex.

m. *dorsolineatum* PLAV Chentej aimak 7 km NO von Somon Mörön, 1200 m, 28.–29. VII. 1965 (Nr. 320), 1 Ex.

m. *vestitum* JAK.: Chentej aimak Somon Žargaltchaan, 1300 m, 28. VII. 1965 (Nr. 314), 1 Ex.; Somon Mörön, ungef. 1200 m, 28. VII. 1965 (Nr. 318), 1 Ex.

6. *Eodorcadion humerale* (FISCHER-WALDH.)

m. *melan* SUV Suchebaraator aimak Chadatin-bulan, 60 km N von Somon Bajanterem, 950 m, 31. VII. 1965 (Nr. 339a), 1 Ex. — Čojbalsan aimak Chamar-davaa am Chalchingol, 2. VII. 1965, 1 Ex. legit. Dr. EREGDENDAGHVA).

ssp. *imluviatum* FALD.: Chentej aimak zwischen Somon Zenchermandal und Somon Žargaltchaan, 10 km O von Zenchermandal, 1400 m, 27. VII. 1965 (Nr. 310), 1 Ex.; id., 1400 m, 27.–28. VII. 1965 (Nr. 311), 1 Ex.; id., 1400 m, 27. VII. 1965 (Nr. 312), 1 Ex.

7. *Eodorcadion chinganicum* (SUV.) ssp. *rubrosuturale* BREUN.

Čojbalsan aimak Somon Chalchingol, 22. VI. 1965, leg. Dr. EREGDENDAGHVA, 1 Ex.

8. *Eodorcadion novitzkyi* (SUV.)

Čojbalsan aimak Somon Tamzagbulag, 600 m, 10.–11. VIII. 1965 (Nr. 387),

11 Ex.; 80 km WSW von SW-Ecke des Sees Bujr nur, Menengijn Tal, 600 m, 14. VIII. 1965 (Nr. 414), 1 Ex.

m. suprastriatum PLAV Čojbalsan aimak Somon Tamzagbulag, 600 m, 10.—11. VIII. 1965 (Nr. 387), 33 Ex.; 80 km WSW von SW-Ecke des Sees Bujr nur, Menengijn Tal, 600 m, 14. VIII. 1965 (Nr. 414), 3 Ex.

m. longestriatum n.: Čojbalsan aimak Somon Tamzagbulag, 600 m, 10.—11. VIII. 1965 (Nr. 387), 3 Ex.

9. *Eodorcadion argali* (JAK.) *rugipenne* n. ssp.

Suchebaator aimak Molzog Elis, 2 km von Somon Dariganga, 1150 m, 6. VIII. 1965 (Nr. 367), 5 Ex.; Ongon Elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.—5. VIII. 1965 (Nr. 355), 3 Ex.

m. brevestriatum n.: Suchebaator aimak Molzog Elis, 2 km S von Somon Dariganga, 1150 m, 6. VIII. 1965 (Nr. 367), 28 Ex.; Somon Dariganga, 1150 m, 5. VIII. 1965 (Nr. 364), 1 Ex.; Ongon Elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.—5. VIII. 1965 (Nr. 355), 16 Ex.

m. pseudoffensum n.: Suchebaator aimak Molzog Elis, 2 km S von Somon Dariganga, 1150 m, 6. VIII. 1965 (Nr. 367), 31 Ex.; Ongon Elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.—5. VIII. 1965 (Nr. 355), 20 Ex.; 5 km S von Somon Chongor, 900 m, 5. VIII. 1965 (Nr. 361), 2 Ex.

10. *Eodorcadion darigangense* n. (in lit.)

Suchebaator aimak Somon Dariganga, 1100 m, 5. VIII. 1965 (Nr. 364), 1 Ex.

11. *Eodorcadion albitarsale* BREUN. (in lit.)

Chovd aimak Somon Mengad, Altai Chochai, 28. VI. 1963, ČONGSONŽAV legit.

12. *Phytoecia cinctipennis* MANNH.

Central aimak Ulan-Baator, Nucht im Bogdo ul, 12 km SO vom Zentrum, 1500—1800 m, 22.—23. VII. 1965 (Nr. 298), 1 Ex.

Neubeschreibungen

Eodorcadion argali rugipenne n. ssp.

Wie die typische Form, aber die Flügeldecken an der ganzen Fläche mehr oder weniger stark lederartig punktiert und gerunzelt. Fühlerglieder 3—8 basal weiß geringelt. Die Tomentbinden der Flügeldecken, besonders bei den ♀ ♀, merklich breiter. Durchschnittlich größer, die ♀ ♀ bis 23 mm lang.

Holotypus und Allotypus sowie zahlreiche Paratypen aus Suchebaator aimak Molzog Elis, 2 km S von Somon Dariganga, 1150 m, 6. VIII. 1965 (Nr. 367) und Ongon Elis, 10 km S von Somon Chongor, 900 m, 3.—5. VIII. 1965 (Nr. 355) in den Samm-

lungen des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Nationalmuseums in Budapest und in meiner Sammlung. — 8 Exemplare.

brevestriatum morph. nov.: Wie m. *delimitatum* PLAV. der typischen Form, die Flügeldecken im Basalteil mit einer kurzen Praesuturalbinde, die manchmal in kleine Flecken aufgelöst ist.

Typen und Paratypen von denselben Orten wie die typische Form (Nr. 355 und 367) und auch von Nr. 364: Somon Dariganga, 1150 m, 5. VIII. 1965, 45 Exemplare, in denselben Sammlungen.

pseudoffensum morph. nov.: Wie *morpha offensum* PLAV. der typischen Form, die Praesuturalbinde fehlt gänzlich.

Typen und Paratypen von den Orten Nr. 355 und Nr. 367, außerdem noch von *Suchebaator aimak* 5 km S von Somon Chongor, 900 m, 5. VIII. 1965 (flache Sandsteppe) (Nr. 361), 53 Exemplare in denselben Sammlungen.

Eodorcadion novitzkyi (SUV.) *morpha longestriatum* n.

Wie m. *suprastriatum* PLAV., aber die schmale weiße Praesuturalbinde verlängert, fast bis zur Spitze der Flügeldecken reichend.

Typen und Paratypen: *Čojbalsan aimak* Somon Tamzagbulag, 600 m, 10.—11. VIII. 1965, in den genannten Sammlungen.

Eodorcadion darigangense n. sp. in lit.

Von dieser Art sind nur Überreste (Flügeldecken mit Schildchen und Mesonotum) vorhanden, und so kann ich sie vorläufig nur in literis bezeichnen. — Schwarz, glänzend, an der ganzen Fläche dicht, fein lederartig gerunzelt, je mit 6 weißen, länglichen Tomentbinden: Eine laterale, eine breitere humerale, drei dorsale und eine dicht vor der Suture liegende Suturalbinde. Suture selbst kahl. Suturalbinde rückwärts verkürzt, zweite und dritte Dorsalbinde apikal verschmolzen, erste Dorsalbinde verkürzt, weder die Basis noch die Spitze erreichend. Suturalbinde mit der dritten Dorsalbinde basal verschmolzen. Alle Zwischenräume der Binden mit in einigen Reihen stehenden spärlichen, weißlichen Haaren. — Schildchen quer, in der Mitte stark ausgehöhlt, glatt, die Seitenteile dicht weiß tomentiert. — Länge der Flügeldecken 9 mm.

Suchebaator aimak Somon Dariganga, 1150 m, 5. VIII. 1965, kurzrasige Steppe (Nr. 364), in den Sammlungen des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest.

Literatur

HEYROVSKÝ, L., 1965: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 18. *Cerambycidae (Coleoptera)*. — Rovartani Közlemények — Folia Entomologica Hungarica, Ser. Nov., 17, 1964, p. 375–380. — HEYROVSKÝ, L., 1965: 47. *Cerambycidae* II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (*Coleoptera*). — Reichenbachia, 7, Nr. 3, p. 39–46. — KASZAB, Z., 1964:

Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, 1. Reisebericht der I. Expedition. — *Annales Historico-Naturales Musei Nationali Hungarici*, Pars zoologica, Tom 56, p. 229—240. — KASZAB, Z., 1965: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 25. Liste der Fundorte der II. Expedition. — *Rovartani Közlemények — Folia Entomologica Hungarica*, Ser. Nov., 18, p. 5—38. — KASZAB, Z., 1965: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 26. Reisebericht der II. Expedition. — *Annales Historico Naturales Musei Nationali Hungarici*, Pars zoologica, Tom. 57, p. 203—215. — KASZAB, Z., 1965: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei, 66. Liste der Fundorte der III. Expedition. — *Rovartani Közlemények — Folia Entomologica Hungarica*, Ser. Nov., 18, p. 587—623.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Reichenbachia](#)

Jahr/Year: 1967-1968

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Heyrovsky Leo

Artikel/Article: [98. Cerambycidae III. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei \(Coleoptera\) 101-105](#)