

XIII. SECTION.

LURCHE UND KRIECHTHIERE

(AMPHIBIA & REPTILIA).

VON

Prof. LUDWIG v. MÉHELÝ

Die ausgedehnte Wassermasse des Balaton und die abwechslungsreichen Naturverhältnisse seiner Umgegend sind dem Fortkommen der *Amphibien* und *Reptilien* ungemein günstig. Es gibt kaum einige aus anderen Gegenden unseres Landes bekannte Arten, deren Repräsentanten hier nicht in mehr-minder grosser Anzahl gedeihen. Das bezeugt das folgende Verzeichniss.

I. CLASSE. LURCHE, AMPHIBIA.

I. ORDO. SCHWANZLURCHE, CAUDATA.

FAM. SALAMANDRIDAE.

GEN. *Salamandra* LAUR.

1. *Salamandra maculosa* LAUR.

(Fleckiger Salamander.)

Hält sich in feuchten Waldgegenden auf. Ist nicht häufig.

GEN. *Molge* MERR.

2. *Molge cristata* LAUR.

(Kammmolch.)

In den stehenden Wässern der ganzen Gegend gemein.

3. *Molge vulgaris* L.

(Streifenmolch.)

Lebt in Gesellschaft des vorigen. Ist häufig.

4. *Molge alpestris* LAUR.

(Bergmolch.)

Kommt in den periodischen Tümpeln der höheren Punkte des Bakonyer Waldgebirges vor.

II. ORDO. FROSCHLURCHE, ECAUDATA.

FAM. RANIDAE.

GEN. *Rana* L.

5. *Rana esculenta* L.

(Wasserfrosch.)

In der ganzen Ufergegend gemein. In den Ueberschwemmungstümpeln des Sió lebt die Seefrosch genannte Varietät (var. *ridibunda* PALL.).

6. *Rana fusca* RÖS. (*mula* LAUR.).

(Grasfrosch.)

Lebt entlang der nördlichen Ufergegend.

7. *Rana arvalis* NILS.

(Moorfrosch.)

Findet sich in den Ueberschwemmungswässern des Sió.

8. *Rana agilis* THOMAS.

(Springfrosch.)

Kommt in der ganzen Gegend vor.

FAM. PELOBATIDAE.

GEN. *Pelobates* WAGL.9. *Pelobates fuscus* LAUR.

(Knoblauchskröte.)

Kommt in Gesellschaft von *Rana esculenta* var. *ridibunda*, *Bombinator igneus* und *Rana arvalis* an denselben Fundorten vor.

FAM. DISCOGLOSSIDAE.

GEN. *Bombinator* MERR.10. *Bombinator igneus* LAUR.

(Rothbauchige Unke)

Ist in den nordöstlichen Sumpfgenden heimisch.

11. *Bombinator pachypus* BONAP.

(Gelbbauchige Unke.)

Kommt auf den nordwestlichen Höhen vor.

FAM. BUFONIDAE.

GEN. *Bufo* LAUR.12. *Bufo vulgaris* L.

(Erdkröte.)

Findet sich an waldigen, buschigen Stellen.

13. *Bufo viridis* LAUR.

(Wechselkröte.)

Gedeiht überall, in der Nähe der menschlichen Wohnungen.

FAM. HYLIDAE.

GEN. *Hyla* LAUR.14. *Hyla arborea* L.

(Laubfrosch.)

Kommt in der ganzen Umgebung vor.

II. CLASSE. KRIECHTHIERE, REPTILIA.

I. ORDO. SCHUPPENKRIECHTHIERE, SQUAMATA.

UNTERORDNUNG. S C H L A N G E N, O P H I D I A.

FAM. COLUBRIDAE.

GEN. *T r o p i d o n o t u s* KUHL.15. *Tropidonotus natrix* L.

(Ringelnatter.)

In der ganzen Umgebung gemein; auch die weissgestreifte Varietät derselben (v. *persa* PALL.) ist genug häufig.

16. *Tropidonotus tessellatus* LAUR.

(Würfelnatter.)

Ebenso verbreitet wie die vorige. Kommt in Röhrichten und zwischen den Steinen der Landungsplätze in sehr grosser Anzahl vor und lauert Fischen auf. Nicht selten erscheint sie auch in den Bädern (Füred, Almádi).

GEN. *Coluber* L.17. *Coluber longissimus* LAUR.

(Aeskulapschlange.)

In der ganzen Umgebung des Balaton genug häufig.

GEN. *Coronella* LAUR.18. *Coronella austriaca* LAUR.

(Glatte Natter.)

Findet sich an den nördlichen trockenen Lehnen.

GEN. *Zamenis* WAGL.19. *Zamenis gemonensis* LAUR.var. *caspius* IWAN.

(Springnatter.)

Kommt wahrscheinlich auf den Ausläufern des Bakonyer Waldgebirges vor.

FAM. VIPERIDAE.

GEN. *Vipera* LAUR.20. *Vipera berus* L.

(Kreuzotter.)

Kommt auf den höheren Ausläufern des Bakonyer Walgebirges vor.

21. *Vipera Ursinii* BONAP.

(Rákos-Viper.)

Da diese Art im Pester Comitatus auf dem Rákos und auch im Eisenburger Comitatus vorkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch hier auf den südlichen fruchtbaren Flächen heimisch sein wird.

UNTERORDNUNG. EIDECHSEN, LACERTILIA.

FAM. ANGUIDAE.

GEN. *Anguis* L.22. *Anguis fragilis* L.

(Blindschleiche.)

In waldigen, buschigen Gegenden häufig.

FAM. SCINCIDAE.

GEN. *Ablepharus* FITZ.23. *Ablepharus pannonicus* FITZ.

(Johanniseidechse.)

Diese niedliche Art ist von weil. Dr. E. TÖMÖSVÁRY im Monat Juli 1881 im Comitate Zala am Ufer des Balaton, an der Südlehne des oberhalb Tapolcza sich erhebenden St.-Georgsberges zweimal gesehen worden; es ist wahrscheinlich, dass sie auf der ganzen Linie der nördlichen Ufergegend des Balaton vorkommt.

FAM. LACERTIDAE.

GEN. *Lacerta* L.24. *Lacerta viridis* LAUR.

(Smaragdeidechse.)

In der Umgegend des Balaton überall häufig.

25. *Lacerta agilis* L.

(Zauneidechse.)

Ueberall gemein.

26. *Lacerta vivipara* JACQU.

(Bergeidechse.)

Kommt in der höheren Niveaugegend der abhängigen Ausläufer des Bakonyer Waldgebirges vor.

27. *Lacerta muralis* LAUR.

(Mauereidechse.)

Kommt in kahlen, sonnenbeschienenen Felsengegenden vor.

II. ORDO. SCHILDKRÖTEN, CHELONIA.

FAM. TESTUDINIDAE.

GEN. *Emys*.28. *Emys orbicularis* L.

(Teichschildkröte.)

In den Röhrichten häufig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [2_1](#)

Autor(en)/Author(s): von Mehely L.

Artikel/Article: [XIII. Section. Lurche und Kriechthiere \(Amphibia & Reptilia\) 233-238](#)