DIE PILZARTEN DER WESTERWALD - PILZTREFFS VON 1981 BIS 1984 UND ZWEIER PILZAUSSTELLUNGEN

- JÜRGEN HÄFFNER, WERNER MACZEY -

Die mykologische Ausbeute der vier Tagungen und Ausstellungen ist beeindruckend: Über 850 Arten wurden zusammengetragen und vorgestellt. Damit können die Westerwald-Pilztreffs in die wenigen mykologischen Veranstaltungen mit höchstem Niveau auf regionaler Ebene in der Bundesrepublik eingereiht werden.

Mehr als 850 Arten wurden bestimmt und besprochen, der weitaus überwiegende Anteil stammt aus der Umgebung des Kreises Altenkirchen und der Nachbarkreise, einige wenige wurden aus allen Teilen Deutschlands oder aus dem Ausland mitgebracht. Die Teilnehmerliste nennt neben guten Pilzkennern eine Reihe anerkannter Mykologen, welche in dieser Disziplin weltweit Bedeutung erlangt haben. Damit dürfte allein schon ein schwerwiegendes Argument für die Seriosität der Bestimmungen aufgezeigt sein. Wir haben darauf verzichtet, die Bestimmer im einzelnen anzugeben, zum einen Teil, weil es nicht festgehalten wurde, zum anderen, weil es häufig "Koproduktionen" waren. Ohne Zweifel gaben bei der Bestimmungsarbeit letztlich die Leiter der Fundbesprechungen den Ausschlag, womit ihnen der größte Anteil bezüglich der Leistung und der Verantwortung einer korrekten Bestimmung zuerkannt wird! Vielfach wurden Vermutungen mikroskopisch überprüft und gesichert oder revidiert. Wo die Zeit nicht reichte, um der Fülle Herr zu werden, wurde aussortiert. In einigen Fällen führte eine Nachuntersuchung am eigenen Arbeitsplatz nach der Tagung zum Erfolg. Trotzdem bleibt eine stattliche Zahl unbearbeiteter Funde. Somit ist in der Zahl 850 eine Minimalangabe zu sehen, die nach oben offen ist.

1981 leitete Dr. Haas die Fundbesprechungen, unterstützt durch die Arbeitsgemeinschaft des Vereins für Pilzkunde Wissen. Dr. Maas Geesteranus bereicherte die Tagung. 1982 übernahm G.J. Krieglsteiner die Fundbesprechungen, unterstützt von Frau A. Runge. Sie war auch 1983 beteiligt, wo wie auch im Jahre 1984 H. Schwöbel den Hauptanteil der Pilzdiagnosen leistete. Diesen Mykologen sei besonders gedankt! In den Dank einbezogen sind die Teilnehmer, die weitere Bestimmungsarbeit erbrachten.

Die Gesamtleitung lag bei mir, H. Müller und Neues-Leben gewährten beste Unterstützung und vorzügliche Bedingungen. Die Mitglieder des Vereins für Pilzkunde Wissen trugen in vielfältiger Weise zum Gelingen bei. Bei der Auswertung der umfangreichen Fundzettel hat sich besonders W. Maczey verdient gemacht. Der Westerwald-Pilztreff findet 1985 eine besondere Fortsetzung. Er mündet ein in die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie.

Die mykologische Pilzausbeute steht unter einem wesentlichen Aspekt: Über 4 Jahre hinweg wurde zur selben Jahreszeit (Mitte bis Ende September) im gleichen Gebiet, zum Teil sogar von den selben Standorten das Pilzvorkommen aufgenommen. Somit liegt ein Ergebnis vor, welches einen recht umfassenden Einblick bietet über die Fruktifikation höherer Pilzarten einer mitteldeutschen Region.

DIE EXKURSIONSGEBIETE

1981

VOREXKURSIONEN

- 1a 12.9.81/MTB 5212 Wissen, Alte Hütte
- 1b 13.9.81/MTB 5213 Halde Herdorf
- 1b2 15.9.81/MTB 5212 Schonstein, Schloßpark
- 1c 16.9.81/MTB 5212 Waldfriedhof Wissen

EXKURSIONEN WÄHREND DER TAGUNG

- 10 19.9.81/MTB 5211 Wald bei Wölmersen
- 11 18.9.81/MTB 5312 Wald bei Wahirod
- 12 19.9.81/MTB 5212 Halde Wissen (Sandberg)
- 13 20.9.81/MTB 5213 Grundwasser bei Elkenroth

NACHEXKURSIONEN, ERGÄNZUNGEN

- 1d 22.9.81/MTB 5213 Grundwasser
- 1e 24.9.81/MTB 5212 Waldfriedhof Wissen
- 1f 24.9.81/MTB 5212 Alte Hütte
- 1h 26.9.81/MTB 5112 Vereinsexk. Wipperbachtal
- 1i 27.9.81/MTB 5112 Oberhövels
- 1j 29.9.81/MTB 5212 Halde Wissen
- 1k 30.9.81/MTB 5113 Schloß Junkerenthal

1982

EXKURSIONEN WÄHREND DER TAGUNG

- 2A1 17.9.82/MTB 5211 Feuchtgebiet bei Leuscheid
- 2A2 17.9.82/MTB 5111 Siegsümpfe bei Schladern
- 2A3 17.9.82/MTB 5110 Auwaldreste, Schönenberg
- 2B1 18.9.82/MTB 5212 Halde Wissen
- 2B2 18.9.82/MTB 5312 Wahlroder Wald
- 2B3 18.9.82/MTB 5212 Hümerich bei Seelbach
- 2C1 19.9.82/MTB 5111 Feuchtgebiet Roßbachtal
- 2C2 19.9.82/MTB 5213 Grundwasser, Bienenstück
- 2C3 19.9.82/MTB 5311 Wälder Fluterschen, Helmsenzen

1983

EXKURSIONEN WÄHREND DER TAGUNG

- 3A1 16.9.83/MTB 5211 Feuchtgebiet bei Leuscheid
- 3A2 16.9.83/MTB 5312 Wahlroder Wald
- 3B1 17.9.83/MTB 5212 Halde Wissen
- 3B2 17.9.83/MTB 5213 Grundwasser, Bienenstück
- 3C1 18.9.83/MTB 5311 Wälder Fluterschen, Helmsenzen
- 3C2 18.9.83/MTB 5111 Siegsümpfe bei Schladern

1984

EXKURSIONEN WÄHREND DER TAGUNG

- 4A1L 14.9.84/MTB 5211 Waldgebiet im Leuscheid
- 4A1W 14.9.84/MTB 5111 Westertbach bei Rosbach
- 4A2F 14.9.84/MTB 5311 Waldfriedhof Altenkirchen
- 4A2J 14.9.84/MTB 5311 Altenkirchen, Johannisberg
- 4B1 15.9.84/MTB 5113 Halde Niederschelden
- 4B2 15.9.84/MTB 5212 Birken-Honigssessen
- 4B1H 15.9.84/MTB 5212 Birken-Honigssessen
- 4B3 15.9.84/MTB 5312 Gietzebeul, Hachenburg
- 4C1 16.9.84/MTB 5312 Wahlroder Wald
- 4C2 16.9.84/MTB 5312 Oberdreiser Wald, Tongruben

AUSSTELLUNGEN IM NEUES-LEBEN-ZENTRUM WÖLMERSEN

- 11 5.-6.9.1981
- 2C4 16.-17.10.1982

MTB	EXKURSIONEN							
5110	2A3							
5111	2A2	2C1	3C2	4A1W				
5112	1h	1i						
5113	1k	4B1						
5211	10	2A1	3A1	4A1L				
5212	1a	1b2	1c	12	1e	1f		
	1j	2B1	2B3	3B1	4B2	4B1H		
5213	1b	13	1d	2C2	3B2			
5311	3C1	4A2F	4A2J					
5312	11	2B2	3A2	4B3	4C1	4C2		
Ton	4C2							
Hochofenschlacke	1a	1b	12	1f	1j	2B1		
	3B1	4B1						
Parkartig	1b2	1c	1e	4A2F	4A2J			
Sümpfe	13	1d	1h	1k	2A1	2A2		
Feuchtgebiete	2A3	2C1	2C2	3A1	3B2	3C2		
Wälder	4A1W							
	10	11	13	1h	1i	1k		
	2A1	2A2	2A3	2B2	2B3	2C2		
	2C3	3A1	3A2	3B2	3C1	3C2		
	4A1L	4A1W	4B2	4B3	4C1	4C2		

HALDEN UND HALDENSANDE

Besondere Lebensräume stellen die Schlackenhalden dar, die vom Siegerland bis zum Land an der Sieg - das Oberbergische und den Hohen Westerwald streifend - vorkommen und aus der Zeit der Eisengewinnung im Gebiet übriggeblieben sind. Diese künstliche, anthropogen verursachte Biotope zeichnen sich durch eine Bodenbeschaffenheit aus, die sonst nicht in der näheren Umgebung angetroffen wird. Es handelt sich um kalkige Sande. Der Kalkanteil ist sehr hoch, übersteigt häufig einen Gehalt von 20%. Ursprünglich entstammt das Material dem Abraum aus den Hochöfen, welches man - gewöhnlich in Werksnähe - auf Halde türmte, bis Berge von stattlichen Höhen aufragten, im Volksmund meist "Sandberg" benannt. In der aktiven Zeit des Erzbergbaus waren dies öde, lebensfeindliche Dünen, nicht selten vergiftet durch Metallverbindungen (z.B. Zink, Mangan, Blei u.a.) oder Schwefeloxide, botanische Organismen konnten nur in Randbereichen Fuß fassen. Mit der Beendigung der Verhüttung erholten sich die künstlichen Berge. Ihr Mineralreichtum bot Lebensraum für vielerlei Pionierpflanzen mit zunehmender Verflüchtigung giftiger Konzentrationen.

Als Musterbeispiel kann die Wissener Halde, der "Wissener Sandberg", angesehen werden. Nachdem schon früher H. Michels die Besiedlung durch Gefäßpflanzen verfolgte (Michels, Pflanzengesellschaften des Wissener Sandbergs, Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen 1962), widmete sich J. Häffner seit 1973 dem Pilzvorkommen. Zahlreiche Pilzkennner führte er bisher ins Haldengebiet, eine große Zahl hochinteressanter Pilzarten konnte festgehalten werden. Bei Westerwald-Pilztreffs besuchten die Teilnehmer auf folgenden Exkursionen das Haldengebiet: 12, 2B1, 3B1, weitere Arten wurden durch Nachexkursionen (1j) oder aus dem Herbar Häffner vorgestellt. Zum Vergleich wurden andere Halde begangen: 1b, 4B1. Sie haben eine völlig übereinstimmende Bodenbeschaffenheit. An manchen wenig bekannten Kleinbiotopen wird - aus verschiedensten Gründen - ebenfalls Hochofenschlackensand vorgefunden, im Alten-Hütte-Gelände bei Wissen hat sich dies sehr günstig auf das Pilzvorkommen ausgewirkt (siehe Exkursionen 1a, 1f).

Über die Abbauterrassen der Firma Schneider gelangt man zum Haldenkammweg des Wissener Sandbergs. Birken- und Weidengestrüpp beginnt, setzt sich fort bis zum Haldenfuß, spärlich oder unterbrochen an den Steilkanten. Am Haldenfuß zur Stadt hin wachsen Zitterpappeln. Dort wo ehemalige Becken und Vorteiche im flachen Teil vorgelagert sind, haben sich Birken, Faulbaum, Hasel eingestellt. Zum Werk hinunter nehmen Eichen und Buchen anteilig zu, vereinzelt stehen Erlen. Im vorderen, ehemaligen Teich kümmert eine Kiefer zwischen den üblichen Birken, Weiden und Zitterpappeln. Über einen schwer erreichbaren Buchen-Eichenwald gehts hinunter zur Sieg durch Mischwälder aus Kiefern, Fichten, Eichen, Buchen. Nach oben folgen interessante Hasel/Weißdornhänge. Vom Haldenkamm blickt man östlich auf die oberen Ölteiche. Dahinter grenzt ein Eichen- Buchen- Mischwald mit Haubergscharakter an, vereinzelt sind andere Baumarten eingemischt, häufiger die Fichte. Über freie Sandplätze erreicht man im Norden über einen steilen, nahezu vegetationslosen Damm einen unteren, verlandenden Ölteich. An diese Senke schließt sich ein humöser Laubbaumwald am Hang an, geht in einen Haselweg über. Es folgt ein Fichtenhochwald und nordöstlich ein alter Eichen- Buchenbestand. Vorherrschend westliche Wetterlagen sorgen für die Einbringung der mineralhaltigen Haldensande in diese Waldsäume. Die Tektonik der Halde schafft zahlreiche Nischen mit abwechslungsreichen Lebensbedingungen für eine Vielzahl von Pflanzen und Tiere.

WÄLDER

Der Kreis Altenkirchen und seine Randgebiete gehören noch immer zu den walddreichen Gebieten, wenn auch - wie überall - die bebauten Flächen zunehmen. Man trifft auf ausgedehnte Wälder, die bisher nicht allzustark vom Waldsterben heimgesucht werden. Bedauerlicherweise hat die Fichte überhandgenommen, nur zögernd finden sich Ansätze, wieder verstärkt die ursprünglich ausgedehnten Eichen-Buchenwälder entstehen zu lassen. Der Einfluß des Rheinischen Schiefergebirges auf die Bestände ist unverkennbar. Wo Schiefer und Grauwacke vorherrschen, bleibt der Boden im allgemeinen flachgründig, nährstoffarm und schwach sauer. Gute Böden dienen längst der Landwirtschaft, wobei Wiesen und Weiden gegenüber Ackerbau gewöhnlich überwiegen. Allerdings sorgt die hügelreiche Landschaft in den Waldbeständen besonders bei Senken für reichere Böden. Schwere Lehm- oder Tonböden stehen vereinzelt an. An einigen Stellen stößt man auf Basalt, seltener auf Quarzit oder Kaolin.

Somit herrschen gute Voraussetzungen für ein artenreiches Pilzvorkommen. Eine möglicherweise bescheidenere Fruchtkörperdichte im Vergleich mit nährstoffreicheren Wäldern wird ausgeglichen durch die Ausdehnung hiesiger Wälder und auch durch das Desinteresse der Bevölkerung am Pilzvorkommen. Auf den Pilzwanderungen trifft man selten auf Pilzsammler, meist nichtmal auf andere Wanderer.

Der Wald bei Wölmersen, unmittelbar an die Tagungsstätte Neues-Leben-Zentrum angrenzend, erstreckt sich kilometerweit. Kiefernstücke, Fichten, Eichen und Buchen bilden den vorherrschenden Bestand. Vereinzelt gibt es noch die Stechpalme im Unterholz. Sehr ähnlich zusammengesetzt sind die Wälder bei Fluterschen und Helmenzen. Lärche und Ahorn kommen hinzu. Insgesamt handelt es sich um für die Gegend typische Mischwälder mit forstlicher Nutzung. Sie bringen in der Regel beachtliche Pilzmengen hervor, wobei die häufigeren Waldpilzarten überwiegen, Seltenheiten wie der Königsröhrling (*Boletus regius*) bei Birnbach (11/MTB 5211), während der Ausstellung gefunden, bleiben eher die unerwartete Ausnahme. So auch die schönen Erdzungen am Waldweg nahe des Zentrums, gefunden von Familie Franzen (*Geoglossum fallax*, det. Häffner).

Ähnliche Mischwälder trägt der Hümerich bei Seelbach, einige wenige versumpfte Stellen mit Torfmoosteppichen waren Exkursionsziel. Der seltene Graugrüne Birkenpilz (*Leccinum thalassinum*), gefunden bei der Exkursion am 25.9.79 (leg. L. Maczey/J. Häffner, det. Häffner) an einer solchen versumpften Stelle unter Birke, zwischen Gras und Heidelbeere, konnte nicht wiedergefunden werden bei der Begehung 2B3. (Überraschend tauchte die Art Ende Oktober 1984 wieder an anderer Stelle auf: mitten in der Stadt Altenkirchen, MTB 5311, in den parkartigen Anlagen mit Birke um die Landwirtschaftsschule).

Der Leuscheid südlich der Sieg in das Kreisgebiet eindringend und der Nutscheid, nördlich an die Siegufer grenzend, stellen zwei ausgedehnte nahezu gänzlich bewaldete Landrücken dar, auf denen Siedlungen fast fehlen. Die weitläufigen Wälder werden nicht vom Tourismus heimgesucht, viele Partien sind schwer zu erreichen, dem Auto wird durch Schranken und Verbotsschilder vielerorts die Durchfahrt verwehrt. Obwohl die Baumbestände wieder die üblichen, oben schon aufgezählten ausmachen - vorzugsweise Fichten, dann Eichen- und Buchenwälder, eingemischt Lärche, Ahorn, Birke, Hasel, Erle, Kiefer, selten weitere Arten -, imponiert die Größe und Weite der Gebiete. An einigen Stellen haben sich durch besondere Bodenbeschaffenheit oder geographische Brennpunkte (Schluchten, Felsen, Bäche, Hänge, Mulden usw.) interessante Pilzarten eingestellt. Insgesamt sind diese Landschaften pilzkundlich eher spärlich be-

arbeitet. Hier bleibt eine Aufgabe des Vereins für Pilzkunde Wissen für die kommenden Jahre. Wenige kleinflächige Bereiche wurden, weil besonders lohnend, regelmäßiger aufgesucht. Am wichtigsten ist ein staunenswertes Gebiet auf der Hochfläche bei dem Ort Leuscheid, wohin 2A1 und 3A1 führten; 4A1L streifte es und erweiterte die begangene Fläche in Richtung Siegtal. In den Nutscheid (im erweiterten Sinn) gelangten die Teilnehmer auf 2A2, 2C1, 3C2, 4A1W. Als ausgesprochen artenreich erwiesen sich die Siegsümpfe bei Schladern. Obwohl bewaldet, werden sie bei den Feuchtgebieten abgehandelt.

Das sogenannte Grundwasser, eine Namensgebung der Einheimischen, liegt zwischen den Orten Biesenstück, Dickendorf und Elkenroth. Die Wälder um den an dieser Stelle sumpfigen Bach Lindiansseifen stellen kostbare und schützenswerte Kleinode der Natur dar. Endlich scheinen langjährige Bemühungen zu fruchten und in letzter Sekunde Chancen für ein Naturschutzgebiet gegeben. Die Errichtung eines Kohlekraftwerks in unmittelbarer Nähe wurde - hoffentlich nicht nur vorläufig - gestoppt. Eine schmale Waldzeile unterhalb der ehemaligen Verladestelle für Basaltschotter aus der Kotzenrother Lay - heute in den wohlklingenderen, leider nichtsagenden Allerweltsnamen Rosenheimerlay geändert - wird seit Jahren vielfach begangen. Der Artenreichtum des kleinen Areals ist erstaunlich. Die Teilnehmer der Westerwald-Pilztreffs hatten mehrfach Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme: 13, 2C2, 3B2. Mit dem Besuch Helmut Schwöbels 1979 geriet eine Pilzart ins Visier, die nach einer jahrelangen Odyssee als *Hydropus albus Schwöbel & Höffner ined.* ihre wahre Natur zu erkennen gab. (Ihre abenteuerliche Geschichte wird an anderer Stelle dieser Schrift berichtet). Das Waldstück, unter Pilzkundlern kurz Grundwasser benannt, besteht im vorderen Teil (Auffahrt Rosenheimerlay) aus einem Buchen-/Eschen-Mischwald, der in einem versumpften Quellgebiet in einen fast reinen Eschenbestand übergeht. Im rückwärtigen Teil wird die Fichte angetroffen, Hasel, Weide, Erle, Ahorn und Weißdorn sind eingemischt. Lange Jahre verhinderte dichtes Unterholz ein leichtes Eindringen, pilzkundlich waren das die ergiebigsten Jahre. In 1983 wurde der Wald "geputzt", also ausgelichtet, wobei die privaten Besitzer besonders kräftig und in den Augen des Naturliebhabs besonders rigoros und zerstörerisch vorgingen. Viele Pilzarten blieben aus, die restlichen bringen wesentlich weniger Fruchtkörper hervor. Vor allem dürfte die radikale Änderung des Mikroklimas Ursache sein. Von der Bodenbeschaffenheit ist Besonderes zu melden. Basaltblocksteine liegen regellos ausgestreut im Waldstück.

Die größte Besonderheit des Grundwassers bietet ohne Zweifel die Waldböschung zur Verladestelle hin. Wahrscheinlich trifft man dort auf eine äußerst seltene Bodenbeschaffenheit. Offenbar häufte sich bei der Schotterverladung über Jahrzehnte tonnenweise feinsten Basaltstaub unter den Verladerampen. Der Basaltstaub wurde von Zeit zu Zeit über die Böschung in den Wald geschoben. Noch immer besteht die Böschung an zahlreichen Stellen zum Großteil aus Basaltstaub, eingemischt in die Walderde. Damit wurden unbeabsichtigt erstklassige Bedingungen für Ascomyceten geschaffen. Mit Seltenheiten aus anderen Pilzklassen darf ebenso gerechnet werden.

Wichtiges und beachtetes Exkursionsziel war der Wahlroder Wald. Alljährlich wurde er aufgesucht, stets erwies er sich als pilzreich: 11, 2B2, 3A2, 4C1. Auf lehmigen, reicheren Böden erhebt sich vielparzellig ein schöner, alter Hochwald aus Buchen und Eichen. Daneben liegen Stücke mit allen sonstigen Baumarten unterschiedlichen Alters. Vergessene Basaltgruben und Quarzitvorkommen, Sumpflöcher,

Weiber und Tongruben sorgen für große Abwechslung. Die ausgedehnten Waldwege zeichnen sich durch feuchte Wasserrinnen aus, Torfmoose und Binsen fehlen nicht, auf Lichtungen entdeckt man Waldbeeren und -blumen, Hecken und Gebüsche bieten neue Lebensräume. Hier im "Hauswald Dr. Waldners" wurden zahlreiche Pilzarten entdeckt, die anderswo kaum oder überhaupt nicht vorkommen. Als Beispiel sei der eindrucksvolle Gelbmilchende Helmling (*Mycena crocata*) erwähnt. Die äußerst schlechte Abbildung in Michael/Hennig/Kreisel (1977, Bd.III, Nr. 112) läßt nicht ahnen, wie hübsch orangefleckig der schlanke Helmling durch die Milch in fast allen Teilen wird, in der Stielbasis kommt die Milch sogar tief kirsch- bis blutrot. Dieser keineswegs häufige Pilz erscheint bisher Jahr für Jahr, stets begleitet vom Saitenstieligen oder Langstieligen Knoblauch-Schwindling (*Marasmius alliaceus*). Beim Artenreichtum des Wahlroder Walds fallen besonders viele Täublinge, Milchlinge und Röhrlinge auf.

Angrenzende Waldungen bei Gehlert steigen mit der Erhebung Gietzebeul auf fast 500müM. Die Baumbestände sind vergleichbar, hohe Buchen/Eichenwälder überwiegen, aber die Krautschicht wird deutlich spärlicher, lichte Eöden oder Adlerfarnteppiche bilden das unterste Stockwerk. Immerhin fand hier Dr. Waldner den Kornblumenröhrling (*Gyroporus cyanescens*). Die Stippvisite der Gruppe Kajan - 4B3- lohnte sich.

SÜMPFE UND FEUCHTGEBIETE.

Wärmeliebende Spätsommerpilze finden im Untersuchungsgebiet gerade im September wegen anhaltender Trockenheit schlechte Fruktifikationsbedingungen. In den sonnigen Tagen des Altweibersommers lohnen sich häufig schattig-feuchte Stellen. Von 1981 bis 1983 machte sich die Trockenheit bemerkbar, insbesondere in dem heißen Sommer 1983. (1984 machten dagegen starke und anhaltende Regenfälle zu schaffen). So wurden die Standorte bevorzugt, die sich durch Restfeuchtigkeit auszeichneten. Teiche, Wassergräben, Schlammlöcher wasserführende Böschungen sind in allen Waldgebieten anzutreffen.

Die Böschungen des Alte-Hütte-Geländes fallen ostexponiert zum Brölbach ab. Sie sind meist wasserführend, beschattet durch Laubmischwald und münden in die Uferzonen. Wo sich das Schwemmholz im Bach staut, trifft man auf Kleinpilze, vorzugsweise Ascomyceten. Die Erlenzonen bergen wieder andere Arten als der schwarze Waldboden der Hänge, in den sich als Besonderheit Haldenschlacke eingemischt hat. Nach oben wächst die Trockenheit der Substrate.

Der Schönsteiner Schloßpark grenzt an die Sieg, die ufernahe Zone ist Überschwemmungsgebiet. Schiefergestein steigt als mächtiger Block auf und trägt das Schloß, in den Felsböschungen beschattet von Roßkastanien trifft man mit einigem Glück auf besondere Arten (weniger zum Zeitraum der Tagung).

Der Wahlroder Wald zeichnet sich durch zahlreiche Kleinstfeuchtgebiete aus. Neben ausgedehnten Wassergräben und Schlammlöchern findet man Teiche in großer Zahl in Bodenlöchern, aufgelassenen Basalt- und Quarzitsteinbrüchen und vor allem zu den Tongruben hin. Zahlreiche ehemalige Tongruben sind heute Teiche oder Weiher. Der Übergang in den Oberdreiser Wald ist fließend, dazwischen liegt der Beroder Wald. Die noch intakten Tonzechen bieten mit ihren kaolinischen Sanden mykologisch hochinteressante Bedingungen. Derzeit hat sich der Autor dem Studium der "Klebsandbewohner" intensiv zugewendet. Die gleiche Bodenbeschaffenheit steht bei Elkenroth an, wo mit *Boudiera areolata* ein Erstnachweis für die BRD gelang.

Das Grundwasser bei Elkenroth besitzt in dem begangenen Teil einen mit Eschen bestandenen Quellsumpf, zwischen den Basaltblocksteinen staut sich das Wasser. Tiefer zum Lindiansseifen hin (nicht begangen) folgen ausgedehnte Sümpfe, erst jüngst zum Naturschutzgebiet erklärt.

Dem Wipperbach, der ein langgestrecktes Tal geschaffen hat, fließen aus den Höhen zahlreiche Rinnsale zu, da und dort kleine Schluchten bildend, die man hierzulande Seifen nennt. Sie sind pilzreich. Ähnliche Verhältnisse trifft man am Westertbach an.

Junkerthal, ein Waldschloß, liegt am Siegufer. Ein Kanalsystem schafft eigenartige Feuchtzonen und Sumpfflächen.

Das hochgelegene Feuchtgebiet im Leuscheid bei der Ortschaft Leuscheid weist an einer relativ kleinflächigen Stelle eine staunasse Hochfläche vor, wo sich neben schönen Beständen des Lungenenzians größere Sphagnumrasen eingestellt haben. Kleinere Sphagnumflächen halten auch am Hüerich bei Seelbach durch.

Ein kleines Feuchtgebiet im Roßbachtal besteht aus einem Teich in einem Steinbruch. An einer Stelle ergießt sich Wasser über die Steilkante und bildet eine Spritzwasserzone.

Aus mykologischer Sicht müssen die wärmebegünstigten Siegsümpfe bei Schladern besonders hervorgehoben werden. Sie boten in allen

Begehungen wichtige Funde. Stellvertretend für weitere Seltenheiten seien hier nur *Russula pumila*, *Lactarius aspideus*, *Nidularia lanata* genannt. Diese Sümpfe entstanden, als mäandrierende Siegschleifen begradigt wurden. Sie werden im hinteren, äußerst schwierig zu begehenden Teil zusätzlich von einem Klärwerk mit Wasser gespeist. Neben Erlen kommen vereinzelt zahlreiche weitere Laubbaumarten vor. Zum Ort hin schließt ein nasses Pappelstück an, wo *Marasmius capillipes* und *Resupinatus kavinii* entdeckt wurden.

Die Auwälder mußten nahezu überall im Gebiet der Landwirtschaft weichen. Allenfalls Reste blieben übrig, zum Beispiel im entfernten Schönenberg. Zudem ist die Wasserqualität der heimischen Sieg, belastet durch vielerlei Unrat, einem etwas größeren Pilzvorkommen nicht zutügllich.

PARKARTIGE STANDORTE

Gärten, Hecken- und Strauchanpflanzungen, Anlagen, Waldfriedhöfe, Parks bringen oft einen erstaunlichen Pilzreichtum hervor. Auf kurzgemähten Wiesen können sich offenbar etliche Pilzarten der Konkurrenz höherer Pflanzen gegenüber erfolgreich erwehren. Zudem bilden sich allerhand Nischen mit günstigem Mikroklima, nicht zu vergessen nährstoffreiche Pflanzenabfälle, Komposthaufen, gärtnerische Bodenverbesserungsmaßnahmen, Brandstellen, Einbringung verschiedenster Materialien, Bewässerung.

Diese offenen Landschaften, wie sie bei den Schlössern Schönstein und Junkerthal, im Waldfriedhof Wissen und Altenkirchen oder auf dem Altenkirchener Johannisberg mit dem Park der Suchtklinik besonders typisch und ergiebig anzutreffen sind, stellen ein Eldorado für Pilzforscher dar. In den waldreichen Mittelgebirgslandschaften von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bilden die Dörfer und vereinzelt auch Städte große Lichtungen, wo vorzugsweise durch die menschliche Tätigkeit immer wieder Bodenverletzungen entstehen, die anfliegenden Sporen günstige Bedingungen schaffen. Selbst in kleineren Gärten werden häufig zahlreiche Pilzarten angetroffen.

ALPHABETISCHE ARTENLISTE

- Abotiporus biennis*
 1L 2C3 2C4
Agaricus abruptibulbus
 11 1L 2C3 2C4 4B2 4B3
Agaricus urvensis
 1L 2C4
Agaricus bitonguis
 1c 1L
Agaricus campestris
 1L 2C3 2C4
Agaricus cupreo-brunneus
 3C1
Agaricus haemorrhoidarius
 1L 2C4
Agaricus lungei
 1L 2C4
Agaricus mucrosporus
 1L 2C4
Agaricus cf. niveolutescens
 1L
Agaricus purpurellus
 1L 2C4
Agaricus semotus
 1L 4B1
Agaricus silvaticus
 1L 2B1 2C3 2C4 3B1
Agaricus subfloccosus
 1L
Agrocybe arvalis
 3A1 3B1 9/84-MTB 4408
Agrocybe exebis
 1L 4A2J 4C1
Albatrellus ovinus
 1L
Albatrellus confluens
 2C4
Aleuria aurantia
 1L 1L 2B1 2B2 2B3 2C3 2C4
Amanita asperu
 1L
Amanita citrina
 11 12 13 1L 1h 1i 1j 1k 1L
 2C3 2C4 3B2 4C2 4C1
Amanita citrina var. alba
 11 13 2B3 2C1 2C3 2C4
Amanita crocea
 11 1L 2B3 3A1 4C1 4ATW
Amanita eliae
 12 1L 4ATW 4C1
Amanita fulva
 1L 2A1 2B3 2C3 2C4 3A1
 4C1 4B3 4ATW
Amanita gemmata
 1L
Amanita muscaria
 1L 2A1 2B3 2C3 2C4
Amanita pantherina
 11 1L
Amanita phalloides
 11 1h 1L
Amanita porphyria
 1L 2B2 2C4 3B2
Amanita rubescens
 1L 2A1 2B1 2B2 2C3 2C4
 3C1 4C1
Amanita spissa
 10 11 12 13 1L 2A1 2B2 2B3
 2C3 2C4 3A1 4B2 4C2 4A1L
 4C1
Amanita strangulata Fr. =
inaunata Secr.
 1L 2C4
Amanita submembranacea
 4C1 4ATW
Amanita vaginata
 11 1L 2C4 4C1 4A1L
Amanita vinosa
 1L
Anthrurus uschnei
 1L 11.9.82/MTB 5212
Antrodia serialis
 2B2
*Aplocybe (=Hypocybe)
 chrysosperma*
 2C3
Ancynia denudata (L.) Wettst.
 2B2 2C2
Ancynia incannata
 11
Ancynia nutans (Bull.) Grev.
 2B2
Ancynia pomiformis
 12
Amillaniella cf. bulbosa
 2A2 2C3 3B2
Amillaniella mellea
 1L 1h 1i 1j 1k 11 13 1L 2C3
 2C4 3A1 3C2
Amillaniella cf. obscura
 2B3 2C3 3B2 3C2
Amillaniella cf. polymyces
 12 13 2C2
Ascobolus fusuraceus
 3B2
Ascocoryne cylichnium
 2C4 13
Ascocoryne sarcoides
 2C2 2C3 11 13 1L 2C4
Ascolnemella fulginea
 13 1L 2C2 3C2 4C2
Asterophora Lycopendoides
 1L 18.9.81/MTB 5211
Astraeus hygrometricus
 1L
Auniculium vulgare
 1L
Aunicularia unricula-judae
 1L 2C4 1j
Durospora myosula
 1L 2C4
Bentia moriformis
 2C2 3C2
Bisporella citrina
 11 13 1L 2B3 2C2 2C4 3B2
 4B1 4C1
Bjerkandera adusta
 1L 2A1 2A2 2A3 2B2 2C1 2C2
 2C3 3A1 4ATW 10 11 13
*Bolbitius aleuriatus (=neti-
 culatus)*
 2C4
Bolbitius lacteus
 1L 2C4
Bolbitius vitellinus
 1L 2C3 2C4
Boletinus cavipes
 MTB 5217LA 2C4
Boletus aestivalis
 11 2C4
Boletus albidus
 1L(Konstanz)
Boletus calopus
 1L 2B1
Boletus edulis
 10 11 1L 2C3 2C4
Boletus erythropus
 11 12 13 1L 2C4
Boletus pinophilus (=pinicola)
 1L
Boletus pulverulentus
 12 1L 4C2 4C1
Boletus regius
 1L/MTB 5211
Boletus variegatus
 1L
Boudiera uncolata (=echinulata)
 2.9.84/MTB 5213
Bovista plumbea
 3A2 9/83/MTB 4408
Bovista nigrescens
 1L
Bovista cf. pusilla
 4A2J
Bulgaria inquinans
 11 12 13 1L 2C3 3C1 4C2
 4A1L 4C1
Calocena connea
 10 11 12 13 1L 2C1 2C2 2C3
 3A1 3B1 3B2 4A1L 4C1
Calocena viscosa
 11 12 1L 2B2 2C4 3B1 4A1L 3C1
 4C1 10 13 2B3 2C1 2C3 3A1 3A2
Calocybe cf. canna
 4A2S
Calvatia exipuliformis
 1L 2B1 2C1 2C4
Calvatia utriformis
 1L 9/83/MTB 5215LU
Campanophyllus niveus
 2C4
Cantharellula unkonata
 1L 2C4
Cantharellus cibarius
 1L 2B3 2C3 4A1L
*Cantharellus cibarius var.
 amethystina*
 11 1L 2B3 2C3 2C4 3A1 4C1
Cantharellus cinereus
 11 1L 2C4
Cantharellus friesii
 13 1L 4C2 4C1
Cantharellus lukaeformis
 1L 2C3 2C4
Ceratiomyxa fruticulosa
 11 2B3 2A2 3A1 3B1 3B2 4C1
Chaetoporus pipenatus
 1L 2A1 2C4 3A1 4B3
Chlonoclonia cf. aenuginascens
 1L 2C4 3C2
Chondrostereum purpureum
 2B3 3B2
Chroogomphus rutilus
 1L 2C4 9/84/MTB 5215LU
Ciathus striatus
 1L
Cladospodium elatum (Hanz) Wanz.
 2C2
Clathrus ruber
 1L
Clavariadelphus pistillaris
 11 1L
Claviceps microcephala
 2B1 2C1 2C2 3B1 3C1 3C2
Claviceps purpurea
 1L 3A1
Clavulina cinerea
 1L 4C1
Clavulina cristata
 11 12 13 1h 1i 1k 1L 2A1
 2C3 2C4 3A1 4C2 4A1L 4C1
Clavulina rugosa
 13 1L 2C4 3C2
Clitocybe rugosa
 13 1L 2C4 3C2
Clitocybe angustissima
 4C1
Clitocybe cf. cerussata
 2C2
Clitocybe clavipes
 11 13 2B1 2C1 2C3 2C4 3A2
 4C2 4B2H
Clitocybe costata
 4B1
Clitocybe dealbata
 1L 2C4
Clitocybe diatrata
 13 2C4
Clitocybe dicolor
 11
Clitocybe fritilliformis
 2C4
Clitocybe gibba
 11 12 13 1L 2B1 2C1 2C2 2C4
 3B1 3C1 4B1 4B2
Clitocybe gilva
 1L 2C4
Clitocybe inversa
 1L 2C4
Clitocybe obsoleta
 4A1H

Clitocybe odora
 11 12 13 1L 2B1 2C2 2C4 3C2
Clitocybe phyllophila?
 12
Clitocybe tonnata
 2C4
Clitocybe umbillicata
 11 13 1L 2C2 2C4 4C1
Clitopilus hobsonii
 9/83/MTB 4808
Clitocybe prunulus
 1L 2C4
Clonostachys spec.
 2A2
Collybia ucuvatu
 2C4
Collybia usama
 11 13 1L 2A1 2B1 2C4 3A1
 3B1
Collybia kutynucea
 11 13 1L 2B3 2C4
Collybia (Microcollybia) cinchata
 1L 2C2
Collybia confluens
 11 12 13 1L 2C2 4A1L
 4C1 3B1 3B2
Collybia (Microcollybia) cookei
 2B3 3B2 3C2
Collybia distorta
 2B1 2B3 3B1 3B2 4C2
Collybia dryophila
 11 12 13 1L 2B3 2C3 3A1
 4A1L 4C1
Collybia fuscopurpurea
 1L
Collybia fusipes
 11 12 13 9/83/MTB 5210
 4A1W 4C1
Collybia impudica
 2C3
Collybia maculata
 13 1L 2A1 2C3 2C4 3A1
 4A1W 4C1 -
Collybia manassoides
 9/84/MTB 5817
Collybia peronata
 10 11 12 13 1L 2C3 2C4
 3A1 4C2 4B1H 4A1L
Collybia (Microcollybia) tuberosa
 13 1L
Copromus quercinum?
 2B1 2C2
Colluricius perennis
 1L
Comulnicha nigra
 11
Conocybe pubescens
 3B1
Conocybe rickeniana
 9/83/MTB 5211
Conocybe sienophylla
 12
Conocybe tenera
 13 1L 3A1 9/83/MTB 5211
Coprinus atramentarius
 1L 2C4
Coprinus comatus
 12 13 1L 2B1 2B3 2C2 2C4
 4C1
Coprinus disseminatus
 13 1L 9/83/MTB 5212
 4C1
Coprinus ephemerus
 9/83/MTB 5212
Coprinus hiaseus
 4A2S
Coprinus lagopus
 2B3 3B2 3C1 4B1
Coprinus micaceus
 11 13 1L 2C4 4A2S
Coprinus narcoticus
 2C3 3C2
Coprinus plicatilis
 12 13 1L 4B2H
Coprinus xantholax
 12 13 3B1 3B2 4B1

Coprinus granulata
 2A3 4C2
Continarius albobolaceus
 1a 1L
Continarius anomulus
 11 12 1L 2C4 4C2
Continarius umillatus
 1L 2A1 3A1 9/83/MTB 5214
 4C1
Continarius bolunus
 1L
Continarius brunneus
 1L
Continarius decipiens
 13 1L 2C4
Continarius delikulus
 11 13 1L 2A1 2C3 2C4 3A1
 3C2 4C2
Continarius elution?
 1L
Continarius hemilichus
 11
Continarius hinnuleus
 1L
Continarius integerrimus
 11
Continarius mucifluus
 2C4
Continarius pileaceus
 1L 2A1 2C4 3A1 3C2
 MTB 5214
Continarius paleiferus
 9/83/MTB 5214
Continarius pholideus
 2C4
Continarius porphyropus?
 11
Continarius rigidus
 1L
Continarius scaurus
 4C2
Continarius subtortus
 4C2
Continarius torvus
 MTB 5817 (Dud Soden,
 Leg. Hatten)
Continarius trinitaria
 13 2C2 (cf.)
Continarius varius
 1L 9/84/MTB 5215
Cnathellus conuocopioides
 11 12 2C4 1L
Cneolophus cinchatus
 11 1L
Cneopus gelatinosus
 2C2 3C2
Cnepidotus luteolus
 3B2 4C2
Cnepidotus pubescens
 1L 3C2
Cnepidotus variabilis
 11 13 1L 2C4 3B2 4C2
Cnitharius microcarpa (Schnad.)
 Pers.
 2A2
Caucikulum lueve
 11 12 13 1L 2C1 2C4 4B1
Cudoniella acicularis
 13 1L 4B3 (Gietzekeul,
 MTB 5312)
Cyathicula coronata
 13 3B2
Cyathus striatus
 1L 2B2 2C2 3B1 3B2
Cylindrobasidium evolvens
 10 13 2C3 3B2 3C2
Cystoderma amiantinum
 11 13 1L 2C3 2C4
Cystoderma cancharias
 1L 2C4
Cystoderma jasonis (=longi-
 sponum
 13
Cystolepiota kucknallii
 1L

Cystolepiota sistrata
 11 12 13 1a 1L 1L
 3C2 4A2F
Dacrymyces stillatus
 1L 10 11 12 13 1a 1L 1L 1L
 2C3 3A1 3B2 3C1 4B2H 4C1
Daedalea quercina
 1L 2A1 3A2 9/83/MTB 5214
Daedaleopsis confragosa
 11 12 13 1L 1L 1L 2A1 2B1
 2B2 2C2 2C3 2C4 3A1 3A2 4A1W
Daldinia verrucosa
 1L
Dasyascyphus niveus
 2B3
Dasyascyphus virgineus
 3B2
Datronia mollis
 2B2 2C2 3B2 3C2
Delicatula integrifolia
 2A2 3A2
Democybe cinnamomea
 1L 4C2 4B3
Democybe cinnamomeokadia
 1L
Democybe cinnamomeolulea
 1L 2C4
Democybe sanguinea
 2C4 1L
Democybe sphagnetii
 9/83/MTB 5214
Democybe uliginosa
 Erkelenz, Grundstück W. Lucas
Demoloma josserandii?
 4A2J
Diatrype kullata
 9/83/MTB 5111 (Schladern)
Diatrype disciformis
 11 12 13 1L 2B3 2C2 3B1 3B2
 4B2H
Diatrype cf. stigma
 2C2 2C4
Dictydium plumbeum
 1L
Entoloma ananeosum
 13 1L
Entoloma celratum
 1L
Entoloma conferendum (=stauropo-
 rum)
 1L 4C1 3A1 4B3 4A2S
Entoloma furinolenis?
 1a 1g 1L
Entoloma lampnopus?
 1L
Entoloma nidulosum
 1L 2A2 3A2
Entoloma nitidum
 2C3 2C4
Entoloma cf. papillatum
 2A2 3A2
Entoloma porphyrophaeum
 1L
Entoloma cf. prunulus
 1L
Entoloma radiatum/subradiatum
 9/84/MTB 5817
Entoloma rhodopolium
 1L 2A1 2A2 3A1 3A2
Entoloma senicellum
 2A2 3A2
Entoloma seniceum
 1L 2C4 3A2 3B2 9/83/MTB 4408+5314
Entoloma tuxidum
 11 1L
Exsiphia polygoni
 3B2
Eutypa flavovirens
 3C2 2C2
Exidia albida
 3C2
Exidia glandulosa
 2B1 2B3 3B2 4A1L

Farkowiella carmichaeliana
(Beak.) Sacc. (=Montospora megalospora)
Acrogenospora-Stadium
2A2
Fistulina hepatica
2A3
Flammulaster carpophila
3B1 4A1L 4B2C
Flammulaster rhombospora
3B2
Fomitopsis pinicola
1L 12 13 3A1 4C2 4C1
MTB 5214: 9.83
Fuligo septica
2C2 2C3 2B2 3A1 3C2 4C1
Galerina hypnorum
1L 2B3 2C1 3A1 3C1
Galerina marginata
1L 2C4
Galerina paludosa
1L
Ganoderma applanatum
11 12 13 1L 2C4 3A1
3B1 3C1 4C1
Ganoderma atkinsonii
Schwarzwald 9/83
Ganoderma ludidum
1L
Ganoderma resinaceum
2C4
Geastrum quadrifidum
1L
Geastrum sessile
1L
Geastrum triplex
MTB 4804: 9.783
Geastrum vulgatum (=ru-
fescens) 1L
Geoglossum fallax
18.9.82/ MTB 5211
18.9.83/ MTB 5211
Geopyxis carbonaria
1L 2C2 3C2
Gloeophyllum abietinum
1L 2A3 3B2
Gloeophyllum odoratum
11 1L 2B2 2C4 4C2 4C1
Gloeophyllum sepiarium
11 12 13 1L 2A1 2B2
2C1 3A1 3B2 3C1 4C2
9.83/MTB 5214
Gloeosporus dichrous?
4C2
Gomphidius glutinosus
1L 2C3 2C4
Gomphidius maculatus
2C4
Gomphidius roseus
1L 2A1
Gaifola frondosa
1L 1L 2C4
9.83/MTB 5016
Gymnopilus penetans
11 12 13 1a 1L 1A
1L 1A 1L 2B3 2C1 2C3
3C1 4A1
Gymnopilus spectabilis
1L 2C4 4C2
Gymnopilus sapineus
2C4
Gyrodorpus cyanescens
1L aus MTB 5312,
Gietzekeul
Hapalopilus nidulans
12 13 1L 2B1 2B3 2C2
3B1 3B2 3C2 4C2 4B2E
4C1
Helveloma crustuliniforme
11 12 13 1L 2C4
Helveloma latifolium
4A2F
Helveloma mesophaeum
12 13 1c 1g 1A 1L 2B1
3B1
Helveloma radicosum
13 1L 2A1 2C3 2C4
Helveloma sacchariolens
1L (Bad Soden, Hatten)
Helveloma sinapians
1L (MTB 5212, Wissen)

Helveloma versipelle
13
*Helicodendron triglitz-
iensis* (Jaak)Lindner
2A2
Helvella atra
1L 2C4 1a 1c 1L
Helvella bulbosa (Hedw.:Fr.)
Kreisel (=macrospus)
2A2
Helvella cf. connivens
4A2F
Helvella crispa
12 13 1L 2B1 2C2 3B1 3C2
Helvella elastica
13 1d 1L 2C2 3C2
Helvella ephippium
13 2C4 4A2F
Helvella lacunosa
13 1L 2C2 3C2
Helvella villosa
1L (MTB 5212, Wissen,
Waldfriedhof)
Heterobasidium annosum
1L 2B1 2B2 2B3 2C3 2C4
3B1 3C2 4C2
Hohenbuehelia atrocoerulea
3B1 3C2
Hohenbuehelia spec.
2B2
Humaria hemisphaerica
1L 2A2 3A2
Hydnellum conrescens
1L
Hydnum repandum
11 1L 2A1 2C2 2C4 3A1
3C2 4A1L
Hydnum rufescens
11 12 13 1L 2A1 2A3 2C4
4A2 4B2
Hydnopus subalpinus
4C2
Hygrocybe chlorophana
1L 4A2S
Hygrocybe conica
2A1 3A1 4B3
Hygrocybe nigrescens
2C4
Hygrocybe psittacina
1L
Hygrophorus aurantiaca
1L 2A1 2B2 2B3 2C1 2C3
2C4 3A1
Hygrophorus agathosmus
2C4
Hygrophorus hyacinthicus?
1L
Hygrophorus lucorum
2C4
Hygrophorus nemozeus
1L 2B2 2B3
Hygrophorus olivaceo-alkus
13 1L 2A1 2C3 2C4 4C2
4B3 4A1L 4C1
Hygrophorus pustulatus
2C4
Hymenochaete rubiginosa
12 11 13 1L 2B1 2B2 2C2
3B1 3B2 3C2
Hymenochaete tabacina
12 13 1a 2B1 2C4 3B1
3B2 3C2
Hymenoscyphus fructigenus
13 1L 1L
Hymenoscyphus scutula
3C1
Hyphoderma radula
3B1
Hypholoma capnoides
11 1L 2A1 2C3 2C4 4B2
Hypholoma fasciculare
11 12 13 1L 2A1 2B2 2B3
2C1 2C3 2C4 2A2 4A1L
4C2 4B2H 4C1
Hypholoma marginatum
2a1 2C4 3A1
Hypholoma polytrichi
4A1W
Hypholoma radicosum
13 1L 4B3
Hypholoma sublatexitium
11 12 13 1L 2B3 2C1 2C3
3A1 4B3

Hypocnea citrina
3C1
Hypocnea lactea
2B3 2C3 4C1
Hypocnea pulvinata
2B3 2C2
Hypoxylon laegifoame
11 12 13 1L 2A2 2B3 2C3 3A2
3B1 3C1 4B2H
Hypoxylon fuscum
2B1 3A1
Hypoxylon multifoame
2B3 2C2 2C3 3A1
Inocybe asterospora
4A1
Inocybe cf. auricoma
11
Inocybe bollonii
11 1L
Inocybe cincinnata
2C4
Inocybe cookei
4B2
Inocybe dulcamara
12 13 1L 2B1 2B2 2C2 2C4
3B1 3B2 3C2 4A1W 4B1 4B2
Inocybe fastigiata
1L 2A1 2B3 4A1W 4A2F
Inocybe gausapala
4C1 4C2 4B2E
Inocybe geophylla (var. incl.)
11 12 13 1L 2A2 2B3 2C4
Inocybe cf. hintellu
13 1L
Inocybe kuehneri
13 4C1
Inocybe lacera
1L 2C4 3A1
Inocybe lanuginella (=varia-
killima)
2C4 4A2F
Inocybe maculata
1L 2A3 2B1 4C2
Inocybe mixtilis
11 13 4C1 4A2F
Inocybe napipes
1L 4C2
Inocybe ovalispora
1L 12
Inocybe pelargonium
4B1
Inocybe pusio
4A2F
Inocybe pyxidora
1L
Inocybe umbrina
11 1L 2C4
Inonotus cuticularia
2B3
Inonotus nodulosus
1L
Inonotus radiatus
13 1L 2A1 2A2 2B2 2C2 2C3 2C4
3C2
Junghuhnia nitida
2C2 3C2
Kuehneromyces mutabilis
11 12 13 1L 2A1 2A2 2B1 2C1
2C2 2C3 2C4 4C2 4C1
Laccaria amethystina
11 12 13 1L 2A2 2B1 2B2 2B3
2C1 2C3 2C4 4C2 4C1
Laccaria bicolor
1L 2C4
Laccaria laccata
11 12 13 1L 2A1 2A2 2B1 2B3
2C1 2C2 2C3 2C4 3A1 3C1
4A1L 4C1
Laccaria promixa
11 12 2B2 2B3 2C1 2C3 2C4
3C2 4C2 4A1L
Laccaria tetraspora
9.83/MTB 4506
Laccaria tortilis
2C2 3C2
Lactarius aspidius
2A2 3A2
Lactarius klenzianus
13 1L 2B2 3B2 4C2 4C1
Lactarius pubescens (Schnad.:
Fr.)Fr. ss. Jahn (=klumii
Bon)
12 13 1a 1L 1A

- Lactarius camphoratus*
 1E 2C4 4C2
Lactarius chrysoorheus
 2A1 3A1
Lactarius cincellatus
 11 13 1E 2A1 2A3 2B2
 9.84/MTB 5817
Lactarius cincellatus
 var. *roseozonatus*
 13
Lactarius controversus
 1E 2C4
Lactarius deliciosus
 2C3
Lactarius delennimus
 13 1E 2A1 2C3 2C4
Lactarius flexuosus
 1c 2C2
Lactarius fluens
 11 13 2C2 4C2
Lactarius fuliginosus
 11 1E 2A1 4C2
Lactarius glycosmus
 1E 2A1 2C1 2C2 13
Lactarius helvus
 1E 2C3 4C2 4B3
Lactarius hortensis
 (= *pyrogalus*)
 11 13 1E 2A3 2B3 2C1 4A2
 4A2J
Lactarius cf. hyginus
 2C3
Lactarius mitissimus
 1E 2C4
Lactarius necator
 1E 2A1 2B2 2B3 2C3 2C4
 2A1 2B2 4B3 4C1
Lactarius obscuratus
 1u 2C1 3C2 4ATW 4C1
Lactarius omphaliformis
 2C1
Lactarius pullidus
 11 1E
Lactarius picinus
 13 1E
Lactarius piperatus
 1E 4B3
Lactarius pterosporus
 1E
Lactarius pubescens
 (= *klumii* Don) - Ergänzung
 12 13 1a 1E 1h 1E 2B1
 3B1 4B2
Lactarius quietus
 1E 2A1 2A2 2B3 2C3 2C4
 3C2 4C1
Lactarius rufus
 1E 2C3 2C4 4C2 4B3 4C1
Lactarius semisanguifluus
 1E
Lactarius senifluus
 11 4A2F
Lactarius subdulcis
 11 13 1E 2C1 4A2F 4C2
Lactarius tabidus
 1E
Lactarius theiogalus
 2B2 2C1 2C3 4C2 4ATW
 9.83/MTB 5214
Lactarius tonninosus
 13 1E 2C2 2C3 2C4
Lactarius trivialis?
 2C3
Lactarius uvidus
 1E 2C4
Lactarius vellereus
 1E 2B1 2B2 2C4 3B1
 3B2 4C1
Lactarius vietus
 2C3
Lactarius volemus
 1E
Laetiporus sulphureus
 1h 1E 2A3 2C4
Lamprospora ovalispora
 4C1
Leccinum aurantiacum
 1E 2C4
Leccinum griseum
 1E
Leccinum quercinum
 1E
Leccinum scabrum
 13 1E 2A1 2B2 2B3 2C1
 2C3 2C4 3A1 3B2 3C1 4A2F
- Leccinum testaceum-scabrum*
 1E
Lentinellus cochleatus
 einschl. var. *inolens*
 11 1E 2C3 2C4 3C1 4B2 4C1
Lenzites betulina
 1E
Leotia lubrica
 11 1E 3C2 4C1 4C2
Lepiota aspera (= *acutesquamosa* var. *furcata*, = *friesii*)
 3B1 4B1
Lepiota brunneo-incarnata
 1a 1E 1E 2C4
Lepiota castanea
 1E 1j 1E
Lepiota clypeolunata
 13 1E 2C4
Lepiota cristata
 13 1E 1E 2C4
 9.83 + 9.84/MTB 4408
Lepiota echinata
 13 2C2 3C2 4B2E
Lepiota hysterix
 1E 2C4
Lepiota ignicolor
 13 1a
Lepiota ventriosospora
 13
Lepista gilva
 2B2 3B2
Lepista invensa
 2C4 4B1
Lepista nekulurix
 1E 2B2 2C1 2C2 2C3 2C4
Lepista nuda
 2C4
Lepista sordida
 1E 2C4
Leucocoprinus brelissonii
 9.83+9.84/MTB 4408
Leucocoprinus cretatus
 9.83/MTB 5014
Leucocontinarius kulliger
 1E
Leucopaxillus giganteus
 1E 9.84/MTB 5215
Leucoscypha leucotracha
 2A1 3A1
Likentella betulina Desm.
 2C2
Lycogala conicum (L.) Fries
 2B2
Lycogala epidendron
 12 1E 2B3 3A1 3B1
 9.83/MTB 5210 4C1
Lycopendon echinatum
 1E 2C4
Lycopendon ericaeum
 2A2 2B1 2B2
Lycopendon lividum
 2B1 3B2
Lycopendon molle
 12 1E
Lycopendon perlatum
 11 12 13 1E 2B1 2C3 2C4
Lycopendon pyriforme
 11 12 13 1E 2B1 2C2 2C4
 3B2 3C2 9.83/MTB 4408
Lycopendon umbrinum
 1E
Lyophyllum connatum
 11 1E 2C4 3A1 9.83/MTB
 5116
Lyophyllum decastes
 12 2B1 2C4 3B2
Lyophyllum immundum
 2A1
Lyophyllum konradiianum
 10
Lyophyllum lonicatum
 2B3
Macrocystidia cucumis
 var. *latifolia*
 4ATW
Macrolepiota exornata
 3C1
Macrolepiota mastoidea/gracilentata
 1E 1E
Macrolepiota procera
 12 13 1h 1E 2B1 2C4
 3B1
Macrolepiota rhacodes
 11 1h 1E 1E 2B1 2C4 3A2
- Marasmiellus rumealis*
 10, 11 12 13 1a 1E 1c 1h
 1i 1k 2A2 2C1 2C2 3B2 3C2
 4A1L 4C1 4B2E
Marasmius alliaceus
 11 13 1E 2C4 3A2 4C2 4B2
 4C1
Marasmius androsaceus
 3C1 4C1 4A1L
Marasmius capillipes
 3C2
Marasmius cohenensis
 13 1E 2C2
Marasmius lupuletorum
 13 1E
Marasmius oreades
 1E 2C4 3A1 4A1L
Marasmius perforans
 3A1
Marasmius recubans
 3B2
Marasmius rotula
 2C4 2C2 3B2 3C2
Marasmius scodonius
 1E 2C4 3B1 4C2
Marasmius sphaeroides
 9.83/MTB 4107
Marasmius cf. torquescens
 Quél. s. s. Oulton
 2C2? 3A2? 3B2?
Marasmius wynnii
 2C4
Melanoleuca unguata
 2B1 3B1
Melanoleuca cognata
 1E 2C4
Melanoleuca cf. graminicola
 1E
Melanoleuca grammopodia
 2C4
Melanoleuca humilis
 2A3
Melanoleuca metalouca
 4B2
Melanoleuca paadida
 9.83/MTB 5816
Melanoleuca verrucosipes
 4A2S
Melanophyllum echinatum
 1E 1j 9.84/MTB 4408
Melogramma spiniferum
 2B3
Meripilus giganteus
 1E 2C4 4C2 4C1
Merulius tremellosus
 11 13 1E 2A2 2B2 2B3 2C2 2C4
Microglossum vinide
 2B2 3B2
Micomphale perforans
 2C3 3A1
Mollisia cinerea
 1E
Monchella conica f. nuderalis
 1E
Mulinus caninus
 2C3 4B2H 4C1 4A2S
Mycena galopus var. *candida*
 J. E. Lunge (= *annae* Br. =
 "Hydnopus albus" s. Schwöbel
 Haffner ined.)
 13
Mycena acicula
 4B1 2A3
Mycena amicta
 3A1
Mycena cilinno-marginata
 4A2S
Mycena crocata
 2C2 2C4 4C2 4C1
Mycena epiplatygia
 13 1E 2C1 2C3 2C4 4C2
Mycena erubescens
 leg./det. Maus Geesteranus
 ?
Mycena floridula
 2C4
Mycena galericulata
 11 13 1E 2A1 2B1 2B3 2C1
 2C2 2C3 2C4 3A1 3A2 3B1
 4B3 4A1L 4B2E
Mycena galopus
 1E 2A2 2B3 2C1 2C3 3A1 3C1
 4C1
Mycena galopus var. *candida* 13
 siehe *M. annae*

- Mycena galopus* var. *nigra*
2A2 4B2H
Mycena haematopoda
2A2 2A3 1L
Mycena inclinata
11 12 13 1L 2B1 2B2 2B3
Mycena leptocephalo
2C2 3A1
Mycena maculata
1L 2C4
Mycena polygramma
11 12 13 1L 2B1 2C4
3B1 4B1
Mycena (*supraecox* Vel.) *ahnamsii* Munn.
3C2
Mycena pura
11 12 13 1L 2B1 2C2 2C4
3B1 4C1
Mycena rosida
3B1 4B3
Mycena rosella
1L 2B1 2C4 3B1
Mycena sanguinolenta
11 12 13 1L 2B3 2C4
3A1 3B1 3C2
4A1W 4B2E 4C1 4A2S
Mycena speinea
3B1
Mycena typhae
4C1
Mycena nucicola (Nachttag)
4B1
Mycena vitilis
11 12 13 1L
Mycena vulgaris
4B1
Nauconia escharoides
13 1a 1L 2A1 2A2 3A1
3A2
Nauconia cf. *langai*
1a
Nauconia luteolofibrillosa
2A2 3A2
Nauconia cf. *scotentina*
3C2
Nectria cinnabarina
11 12 13 1L 2C2 2C3 3B1
Neokulgaria pura
13 3B2 4C2 4B2 4C1
Nidularia farcta
2A2 3A2
Oligoporus (= *Tyromyces*)
plychogaster
1L 2C1 2C4
Omphalina hepatica
1L
Onygena equina
13 1L
Osmoporus odoratus
3A2
Otidea eufonia
1j 1L 2C4
Otidea cf. *concinna*
4A2S
Otidea onotica
11 1L 2C4
Oudemansiella (= *Megacollybia*) *platyphylla*
1a 1L 11 12 13 1h 1j 1i
1k 1L 2A1 2C1 2C2 2C3
2C4 4C1
Oudemansiella radicata
4C1
Oxiporus populinus
1L
Paezilomyces farinosus (Holm. & S.F. Gray) Brown & Smith
2A2
Panaeolus acuminatus
3A1
Panaeolus sphinctrinus
1L 3a1
Panaeolus subhalteatus
9.83/MTB 4408+5214
Panellus serotinus
2A2 3B2
Panellus stipticus
11 12 13 1L 2B1 2C3 3A1
4A1L 4B2E
Panus conchulus
1L
Paxillus atroamentosus
1i 1j 1k 1L 2C3 3A1 3B2
3C2 2C4 4A1L
Paxillus filamentosus
13 1a 2A1 2A2 3A1 3A2
Paxillus involutus
11 12 13 1L 2B3 2C1 2C3
2C4 3A1 3C1 4C2 4A1L
Paxillus panuoides
4C1
Pecicula acericola
4B2H
Pecicula carpinea
2B1 3B1
Peniophora incarnata
11 13 3B2
Peniophora laeta
2B1 3A2 3B1
Peniophora limitata
2C2 3B2
Peniophora quercina
2B1 3B1
Peziza avennensis
9.83/MTB
Peziza badia
2A1 1L 3A1 4C2
Peziza hadiofusca?
1L 3B1
Peziza echinospora
1L
Peziza emileia?
3B2

Peziza micropus
9.83/MTB 4408
Peziza michelii
2C2 4A2F
Peziza praetervis
1L 2C4
Peziza violacea
13
Phaeohelotium cf. *sub-canneum*
3B2
Phaeolepiota aenea
9.82/Bad Reichenhall
Phaeolus schweinitzii
11 1L 2C3 4C2
Phallus impudicus
1L 2C2 2C4 4C1 4A1L
Phellinus conchatus
1L 2C2 3C2
Phellinus ferruginosus
2A1 2B1 3A1 3B1
Phellinus igniarius
1L
Phellinus pumaceus
1L 3C2
Phellinus punctatus
1L 2B1
Phellinus robustus
1L
Phellinus trivialis?
1L
Phlebia radiata
2B1 2B3 2C4
Pholiota adiposa
2C4
Pholiota atricola
2A2
Pholiota astragalina
2B2 2B3 4C1
Pholiota destruens
1L
Pholiota flammans
1L 2B3 4C2
Pholiota lenta
11 1L 2C4
Pholiota mutabilis
1L
Pholiota squarrosa
1L 2C4
Pholiota tuberculosa
2B2
Phylloporus rhodoxanthus
1L 2C4
Physarum globuliferum
12

Physarum nulan
2B2 2C2
Piptoporus betulinus
11 12 1L 2B2 2B3 2C4
9.83/MTB 5210
Pleurotus dagnyus
2C4
Pleurotus ostreatus
1L 2C4
Pluteus atricapillus
11 12 13 1L 2B1 2B3 2C2 2C3
2C4 3A1 3B2 3C1 3C2 4C1 4C2
Pluteus cf. *cinereofuscus*
3C2
Pluteus hispidulus
4C1
Pluteus leoninus
1L
Pluteus minutissimus
1L
Pluteus nanus
11 1L 1L
Pluteus pellitus
2C4
Pluteus petasatus
1L
Pluteus phlebotomus
12 13 1L 2A3
Pluteus romellii
11 13 2B1
Pluteus sulcinus
1L 2A1 2C2 4C2
Pluteus semibulbosus
11
Polydesmia pruinosa
11 13 2B1 2C2 3B2
Polyporus badius
13 1L 3A1
Polyporus crumulus
1L 3C1
Polyporus cristatus
1L
Polyporus nummularius
3A1
Polyporus tuberosus
11 13 1L 2C4
(= *Polyporus*) *Dendropolyporus umbellatus*
1L/MTB 5212
Polyporus varius
11 13 1L 2C2 3B2
Porphyrallus porphyrosporus
1L
Porphyrallus pseudoscaber
2B1
Postia (= *Tyromyces*) *caesia*
11 13 1L 2A1 2B3 2C3 4C2 4C1
Postia lactea
1L 2C1 4A1
Postia leucomellela
1L 2B3
Postia stiptica
11 12 13 1L 2B3 2C3 4C1
Postia subcaesia
13 2A3 2B1 2C2
Postia tephroleuca
2A1 2B1 2C2 2C3 4C1 4C2
Psathyrella ripollis
11 13 1L
Psathyrella candelliana
2A2 2B1 2C3 4C1
Psathyrella caput-medusae
2B2
Psathyrella caudata
4A1W
Psathyrella chondroderma
4C1
Psathyrella gracilis
2C4
Psathyrella hirsquumilosa
Psathyrella hydrophila
11 12 13 1L 2A1 2B3 2C1 2C4
3A2
Psathyrella multipedata
16.9.81/MTB 3917
2B2
Psathyrella obtusata
3B1
Psathyrella prona f. *ulbidula*
3B2

Psathyrella pseudonacilia
 9.83/ MTB 5210
Psathyrella spudicea
 1L
Psathyrella subutata
 2C4 9.84/ MTB 4408
Psathyrella velutina
 1L 2B3 2B2 2C4 9.83/ MTB
 4408 und 5014
Pseudocaulerellus sinuosus
 13 1L
Pseudohydnum gelatinosum
 1L 2B3 2C4 4C1
Psilocybe inquilina
 9.83/ MTB 5212 4ATW 4A2S
Psilocybe semiluncea var.
coenulescens
 3B2 4B3
Psilocybe semilibera
 Leg. Lücke
Puccinia poarum
 auf *Tussilago* 3B1
Pulvinula convexella
 1L 13 1u 1L
Pulvinula constellatio
 1L 2C2 2C4 3d2
Pycnoporus cinnabarinus
 10 1L 2A1 2B2 2C1 2C2 2C3
 3A1 3B2 3C1 3C2 4C1
Oudemansiella mucida
 11 1L 2C4
Oudemansiella platyphylla
 1L 4C1
Oudemansiella (Xerula)
radiata
 1L 2A1 2C3 2C4
Romania abietina
 1L 2C4
Romania flavida
 1L
Romania formosa
 1L
Romania stricta
 1L 2C2 2C4 4A2J
Resupinatus applicatus
 3B2
Resupinatus kuvinii
 3B2
Rhizina inflata
 4C1
Rhizopogon undulatum
 1L
Rhodocybe caeluta
 1L
Rhizisma acerinum
 4C1 9.84/ MTB 5213
Rickenella fibula
 1L 2A1 2C1 2C3 3A1 3B1
 3B2 3C1
Rickenella selipes
 2B1 2C1 3B2
Rosselinia thelena
 3B2
Russula acrifolia
 2A1
Russula adusta
 1L 2B2 2B3
Russula aeruginosa
 11 13 1L 2C3
Russula amethystina
 2B2
Russula cf. umoenicolor
 2B2
Russula aquosa
 3A1 4C2
Russula atrorubra
 11 12 13 1L 2B2 2B3 3B1
 4B2 4ATW 4C1 4A2F
Russula atrorubens
 11 1L 4C2
Russula uzurea
 4B3
Russula borealis
 4B1
Russula chamaeleontina
 11 12 13 1L 4C2 4A2F
 4C1 MTB5817
Russula chloroides
 13
Russula coerulea
 1L 2A1 2C3 2C4

Russula cuprea
 4B2
Russula curtipes
 11
Russula cyanoxantha
 1L 2B2 2C1 2C4 4C2 4B2 4ATL
Russula delicata
 11 12 1L 2B2 2C2 4A2S
Russula densifolia
 11 13 1L 2A1 2A3 2B3
 2C3 3C2 4C2 4A2 4C1
Russula emetica var. *betulanum*
 11 12 1L 2A1 2B2 2B3 2C1 2C3
 3A1 3C1 MTB5014 4C2
Russula emetica f. *silvestris*
 4C2 4ATL 4ATW
Russula faginea
 2A2
Russula fallax
 1L 2B2 2C3 2C4 4C2 4ATL 4C1
Russula flava
 1L
Russula fragilis
 2A1 2A2 2C1 4A1 4A2F
Russula cf. fuscata
 2B2
Russula heterophylla
 2A1 2B2 2B3
Russula integra
 12 1L 1L 4ATW 4A2F
Russula ionochlora
 10 11 3C2
Russula cf. lueta
 11
Russula laurococcasi
 13
Russula lundellii
 13
Russula lutea
 1L 2C4
Russula muirei var.
lageticola
 11 12 13 1L 2A1 2B2 2C1
 4C2 4C1
Russula cf. medullata
 2C2
Russula mustelina
 1L 9.83/ MTB 5214
Russula nigricans
 11 12 13 1L 1L 2B2 2B3 2C1
 2C2 2C3 4ATL 4A2
Russula nitida
 1L 2A1 3A1
Russula ochroleuca
 10 11 12 13 1a 1L 1h 1i 1j
 1k 1L 2A1 2B2 2C1 2C3 3A1
 3B2 3C1 3C2 4ATL 4B2 4C1
 4ATW
Russula olivacea
 11 4C2 4C1
Russula paludosa
 1L 4C1
Russula parvirens
 1L 3C2 4C2 4A2S MTB4408 4C1
Russula pectinatoides
 11 12 13 1L 1h 1i 1L 2C4
 4A2F
Russula pseudointegra
 1L
Russula puellaris
 11 12 13 1L 2A1 2B2 2C3 3A1
 3B2 4C2 4B2 4C1 4B3
Russula pulchella
 12 1a 1k 1L 4B1
Russula pumilla
 2A2 2B2
Russula queletii
 1L 2C3 4C1
Russula romellii
 4B2
Russula rosacea
 11 1L 2B3 4C2
Russula rosea
 1L 4C2
Russula sanguinea
 1L
Russula sardonica
 2A1 2C3
Russula subfoetens
 1L

Russula tunci
 1L
Russula velenovskii
 1c 2C3 4C2
Russula versicolor
 2B2 4A2F
Russula vesca
 1L 2C3 4C2
Russula violipes
 11 12 1c 1L 2B3 2C1 2C3
 3A1 3C1 4C1 4B2 4ATW
Russula virescens
 1c 1L
Russula xenampelina
 1L 3C2
Rutstroemia linnaea
 2B3
Rutstroemia sydowiana
 3B1
Schizopora paradoxo
 10 11 12 13 2B3 2C2
Schizophyllum commune
 10 11 12 13 1L 3A1 4C1
Scleroderma areolatum
 2A1 2A2 2B1 2C2 3A2 3B1
Scleroderma bovista
 9.84/ MTB5213
Scleroderma citrina
 2B1 2B2 2C1 2C3 3A2 2C4 1L
Scleroderma verrucosum
 1L 2B1 2B2 2C2 2C4 4A2F
 4ATL 4C2
Scutellinia cepjii
 2A2 4C1
Scutellinia erinacea
 2A2
Scutellinia scutellata
 1L 12 13 2C2 4C1
Scytinostroma portentosum
 3B1
Sepultaria arenicola (Leu.)
 Masse ss. Svanček
 2B1 1a 2C4
Sepultaria tenuis
 13 1a 1L 1L 2B1 2C4
Sistotrema confluens
 2C2
Sparassis crispa
 11 1L 2B2 2C3 2C4 3C1
Sphaerokolus stellatus
 1L
Sphaerosponella brunnea
 9.83/ Coburg Leg. Schwöbel
Stemonitis axifera
 2B3 2B2 2C2
Stemonitis fusca
 2B2
Stereum gausapatum
 13
Stereum hinsutum
 11 12 13 1L 2a1 2B2 2C3
 2C4 3A1 3B1 4C2 4C1
Stereum nameale
 3B1
Stereum rugosum
 11 12 13 1L 2B1 2B3 2C1 2C3
 3A1 3B1 3C2 4ATL 4B2E
Stereum sanguinolentum
 10 11 12 13 1L 2C2 2C3 3A1
Stilbella lomentosa
 auf *Trichia kotlytis*
 13
Strobilomyces floccopus
 1L
Strobilurus esculentus
 4C2
Stropharia aeruginosa
 11 13 1L 2C4 4C1
Stropharia albo-cyanea
 4C2
Stropharia coronilla
 MTB 5212
Stropharia rugoso-annulata
 1L
Stropharia semiglobata
 2A1 2C3 3A1 3B1 3B2
Stropharia semiglobata var.
stancaniana 2B1
Stropharia squamosa
 3B1 4B3

Suillus aeruginascens
 2C4
Suillus bovinus
 1E 2A1 2C3 2C4
Suillus granulatus
 1E 2C4
Suillus grevillei
 1E 2C3 2C4 3C1 4B3 4A2F 4A2F
Suillus luteus
 1E 2C3 2C4
Suillus plonans
 1E
Suillus variegatus
 1E 2A1 2C3 2C4
Tanzetta catinus
 11 12 13 1a 1b 2B2
Tanzetta cupularis
 2C1 2C2
Tephrocycba inolens
 13
Thelephora canyophylla
 2C2
Thelephora cf. lacineata/anthocephala
 13
Thelephora penicellata
 4B2
Thelephora taraxacia
 1E 9.83/ M7B5210 4A1L
 4C1
Trametes cinnabarinus
 1E 2C4
Trametes gibbosa
 11 12 13 13 1E 2B2 2C4
 3A2 3B2 4A1L 4B2E
Trametes hirsuta
 11 12 13 1E 2B1 2B2 2C3
Trametes rubescens
 4C1
Trametes versicolor
 11 12 13 1E 2A2 2B3 2C1
 2C2 2C3 2C4 3A1 3C1 4C1
Tramella foliacea
 11 13 1E 3B1 3B2
Tramella mesenterica
 11 12 13 1E 2C1 2C2 2C4
 3A1 3B1 3C1 4A1W 4A1L 4B2E
Trichaptum abietinum
 11 1E 2A1 2C3 3A1 4C1
Trichia kolaylis
 13
Trichia scabra
 2B2
Tricholoma uceratum
 1E 2C4
Tricholoma album
 1E 13 1E 2A2 2B1 2C4 4B1
Tricholoma cf. unguineum
 11
Tricholoma cingulatum
 13 1j 1E 2C4
Tricholoma columbetta
 11 1E
Tricholoma imbricatum
 1E
Tricholoma flavobrunneum
 2A1 2C3
Tricholoma flavovirens
 2C4
Tricholoma lascivum
 PneuB, Berlin 1E
Tricholoma myomyces
 1a 1E
Tricholoma nudum
 1E
Tricholoma psammopus
 1E
Tricholoma resplendens
 1E
Tricholoma saponaceum
 var. squamosum 1E
Tricholoma scalplunatum
 11 1a 1E 1E 1E
Tricholoma sciodes
 11 1E 2B2 4C2
Tricholoma sejunctum
 11 1E
Tricholoma sulphuraceum
 1E 13 1E 2B1 2C4
Tricholoma terreum
 1E 2C4
Tricholoma ustale
 2C4
Tricholoma vaccinum
 M7B5215 1E 2C4
Tricholomopsis decora
 9.83/ M7B5015
Tricholomopsis nitilans
 10 1E 2B2 2B3 2C3 2C4 4C1
Trichilia ilicina
 2A1 2C1
Tukaria funfuracea
 3A1 3B2 3C1 4B1
Tuker aestivum
 1E (Vendun)
Tuker excavatum
 1E (Vendun)
Tulifera ferruginosa
 1E 2A2
Tyromyces chioneus
 1E 2A1 2C4
Ungulina fomentaria
 1E 2C4
Ustilina deusta
 1E 13 1E 2B3 2C2
Vascellum pratense
 1E 2C1
Volvariella bombycina
 1E
Volvariella murinella
 1E
Volvariella pusilla var.
 kilohi 2B1
Vuilleminia comedes
 11 12 13 1E 2C2
Xerocomus ludius
 1E 2A1 2B3 2C3 2C4 4B3
 4A1L 4C1
Xerocomus chrysenteron
 1E 2B3 2C4
Xerocomus parasiticus
 2B2
Xerocomus pulverulentus
 1E
Xerocomus rubellus
 1E 2A3 2C4
Xerocomus subtomentosus
 1E 2A1 2B3 2C4 4C2 4A1L 4C1
Xylaria carpophila
 2C2
Xylaria hypoxylon
 1E 2B3 2C2 2C3 2C4 4C1
Xylaria longipes
 1E 4A2S
Xylaria polymorpha
 1E 2C2 2C4 3A1 4C2 4C1

TEILNEHMER AN DEN WESTERWALD-PILZTREFFS VON 1981 BIS 1984

Behr, Herbert Goldbergstr. 21 3550 Marburg-Cappel	Kajan, Ewald Maxstr. 9 4100 Duisburg 11	Runge, Annemarie Diesterwegstr. 63 4400 Münster-Kinderhaus
Bender, Hans Webschulstr. 50 4050 Mönchengladbach 1	Kann, Anne Kann, Paul-Hubert Am kühlen Brünchen 75 6623 Altenkessel	Schmidt, Rainer Römerweg 20 5240 Betzdorf
Brenner, Stephan Sandergarten 14 5240 Betzdorf	Kasperek, Fredi Forststr. 24 4352 Herten	Schwöbel, Helmut Winterstr. 17 7507 Pfinztal 4
Chable, Lisa Wachtelstr. 26 6660 Zweibrücken	Klütsch, Günter Siegstr. 57 5249 Hämmerholz	Seethaler, Ludwig Goethe Str. 3 8080 Fürstenfeldbruck
Ebert, Heinz Kirweg 3 5569 Mückeln	Kriegelsteiner, German J. Beethoven Str. 1 7071 Durlangen	Siepe, Klaus Geeste 133 4282 Velen
Ewald, Dr. H.+ Ehefrau Oberstr. 16 6240 Königstein 3	Krombholz, Richard Reichbergstr. 15 7090 Ellwangen	Sonneborn, Irmgard Sonneborn, Willi Ernst Rein Str. 33 4800 Bielefeld 1
Franzen, Edith Franzen, Peter Bonifatiusstr. 70 4130 Moers 1	Kühner, Gerd Kühner, Gertrud Heuduckstr. 96 6600 Saarbrücken 1	Sowa, Alexander Schulstr. 1 5241 Gebhardshain
Freitag, Horst Freitag, Ute Birkenweg 6 5249 Heckenhof	Lücke, Heinrich Haigerweg 10 5909 Burbach	Stabenau, Reinhard Richtpfad 2 2980 Norden
Geißler, Frank Sophienstr. 9/11 4400 Münster	Lucas, Wolfgang Kölner Str. 24 5140 Erkelenz	Tourneau, Justus Freiherr v. Stein Str. 28 5240 Betzdorf
Gebner, Dr. Ekkehard Königsberger Str. 136 4400 Münster	Ludwig, Erhard John-Locke-Str. 29 1000 Berlin 40	Waldner, Dr. Helmut Ringstr. 8 5231 Kroppach
Gumbinger, Astrid Gumbinger, Manfred Rothweg 18 4156 Willich 4	Maas Geesteranus, Dr.R.A. Ryksherbarium Schelpenkarde 6 Postbus 9514 2300 R A Leiden Niederlande	Wieland, Andreas Kantstr. 2 5248 Wissen
Haas, Dr. Hans Elsaweg 23 7000 Stuttgart 70	Maczey, Lieselotte Maczey, Werner Im Gässchen 5 5231 Obererbach	Wittwer, Erna Stirner Str. 9 1000 Berlin 41
Häffner, Jürgen Rickenstr. 7 5243 Blickhauserhöhe	Meller, Gertrud Eichenbusch 23 5208 Eitorf-Köttingen	Zielinski, Hans-Gerd Freiliggrath Str. 11 4100 Duisburg 11
Hansen, Walter Hemmelzer Str. 5 5231 Birnbach	Müller, Günter, Müller, Ehefrau Harras 8 7209 Wehingen	Für alle 4 Veranstaltungen ergeben sich 114 Teil- nahmen. 9 Teilnehmer be- suchten alle WPTs: J. Häffner, W. Hütter, G. Klütsch, W. Lucas, H. Lücke, L. u. W. Maczey, H. Müller, Dr. H. Waldner
Heister, Josef Gripwaldstr. 13a 4150 Krefeld	Müller, Herbert Neues Leben e.V. 5231 Wölmersen	
Hiby, Paul Im Hölken 50 5600 Wuppertal 2	Payerl, Hans Neue Steige 16 7071 Eschbach	
Hohmeyer, Helmut Fregestr. 74 1000 Berlin 41	Preuß, Otto Stirner Str. 9 1000 Berlin 41	
Hütter, Wolfgang Westring 121 6231 Schwalbach-Limes	Quecke, Ludwig Helenen Str. 30 4220 Dinslaken	
Janzer, Hans-Joachim Wendelinusstr. 31 6451 Mainhausen	Runck, Marianne Hippmannstr. 1 8000 München 19	
John, Karl-Heinz St. Killian Str. 30 7160 Gaildorf		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Rheinland-Pfälzisches PilzJournal](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [Festschrift_1985](#)

Autor(en)/Author(s): Häffner Jürgen, Maczey Werner

Artikel/Article: [DIE PILZARTEN DER WESTERWALD - PILZTREFFS VON 1981 BIS 1984 UND ZWEIER PILZAUSSTELLUNGEN 2-17](#)