

Die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten

Wolfgang Rabitsch

Einleitung

Leider war es nicht möglich, für das Verzeichnis der Wanzen Kärntens (FRIEB et al. 1999) die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten vollständig zu berücksichtigen. Während der Arbeiten zur Erstellung einer kritischen Checkliste der österreichischen Wanzen (RABITSCH, in Vorb.) konnte dies nunmehr nachgeholt werden.

Die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten in Klagenfurt besteht aus acht 58 x 44 cm großen Insektenladen mit rund 2900 Wanzenexemplaren und ist systematisch geordnet. Der Großteil der Belege stammt von Major Emil Hölzel (1894–1973, vgl. DEMELT 1974, KREISSL 1978) aus der Klagenfurter Umgebung (Sattnitz, Viktring). Einzelne, meist besonders interessante Funde wurden von ihm auch veröffentlicht (vgl. FRIEB et al. 1999). Offenbar für Vergleichszwecke zur Verfügung gestellt (vgl. HÖLZEL 1954a), enthält die Sammlung auch Belege aus Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg, die von Johann Moosbrugger (1878–1953) gesammelt wurden. Der Großteil seiner Sammlung befindet sich am Wiener Naturhistorischen Museum und wurde kürzlich revidiert (RABITSCH 1999). Weiters befinden sich in der Sammlung Belege von C. v. Demelt, F. Feige, H. Priesner, K. Prohaska, R. Puschnig, J. Roubal, H. Sampl, L. Strupi, J. Thurner u. a., vorwiegend aus Kärnten sowie einzelne Belege aus Deutschland, der Tschechischen Republik, Mazedonien, Italien, Griechenland und Kroatien.

Die ersten zusammenfassenden Publikationen zur Wanzenfauna von Kärnten stammen von Karl Prohaska (1854–1937) und Roman Puschnig (1875–1962, vgl. MILDNER & LEUTE 1987). Während sich einige der von Puschnig gesammelten Belege, die von PROHASKA (1923, 1932) und PUSCHNIG (1925) auch publiziert wurden, in der Sammlung befinden, sind die meisten Belege von Prohaska und Puschnig vermutlich verloren gegangen. Von manchen Familien wurden keine Belege in der Sammlung gefunden (z. B. Cydnidae, Plataspidae, Acanthosomatidae). Einige Exemplare „aus der alten Kärntner Sammlung“ (HÖLZEL 1954a) stammen vermutlich aus der Zeit vor 1900 und betreffen das damalige Kärnten bzw. Österreich, das sich bis Triest erstreckte.

Im Folgenden werden die Belege mit der Zahl der Exemplare, Geschlecht, Fundort, Funddatum und Sammler für jede gefundene Art chronologisch aufgelistet. Die Reihenfolge der Gattungen und Arten sowie die Taxonomie folgen weitgehend FRIEB et al. (1999), in einzelnen Fällen werden neuere Erkenntnisse berücksichtigt. Bei einigen Arten enthalten Anmerkungen (Anm.) zusätzliche Informationen (z. B. faunistische Besonderheiten, Fehlbestimmungen). Gedruckte Etikettentexte werden in

Normalschrift, handschriftliche in Kursivschrift angeführt. Kommentare zu den Etiketten werden in spitze Klammern <...> gestellt. Irrtümliche Determinationen werden nur dann erwähnt, wenn diese Angaben auch publiziert wurden.

Abkürzungen

Car., Cr., Kr., K.	Kärnten
V., Vbg.	Vorarlberg
St., Styr.	Steiermark
[GE]	Deutschland
[CZ]	Tschechische Republik
[MC]	Mazedonien
[CR]	Kroatien
[IT]	Italien
[GR]	Griechenland
[NL]	Niederlande
[UK]	Ukraine
[HU]	Ungarn
[SK]	Slowakische Republik
[AG]	Algerien
[KI]	Kirgisien
oD	ohne Datum
oE	ohne Etikett
aS	alte Sammlung
(Hö)	leg. Emil Hölzel
(Mo)	leg. Johann Moosbrugger
(Pu)	leg. Roman Puschnig
EW	Eduard Wagner
det.	bestimmt von
sub.	bestimmt als
Brw.	Brachwiese
pal.	palustris (im Sumpf)
cort.	corticalis (auf der Rinde)
hort.	hortensis (im Garten)
mur.	muralis (auf der Mauer)
dom.	domesticus (in der Wohnung)

Artenliste

Fam. Ceratocombidae

Ceratocombus coleoptratus (ZETTERSTEDT, 1819)

Vbg., Feldkirch, 3.IX.1932, 1♂ (Mo); Carinthia, Maria Rain, 15.VIII.1951, 1♂* (Hö) det. EW;

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Fam. Dipsocoridae

Cryptostemma alienum HERRICH-SCHÄFFER, 1835

St. Stefan, Gail, 15.VI.1947, 1♀ (Strupi) det. EW;

Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Cryptostemma waltli (FIEBER, 1860)

Vbg., Feldkirch, 27.III.1941, 1♀ (Mo); Carinthia, Keutschach, Dob. <=Dobain>, 12.V.1953, 1♂* (Hö); Cr., Wimitz, Dabromoos, 18.IX.1959, *Carex*, 2♀ 1♂ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Fam. Nepidae*Nepa cinerea* LINNAEUS, 1758*M. Saaler Wald*, 9.V.1915, 1♂* (Pu); *Wiesentümpel vor Zollfeld*, 7.V.1916, 1♂ (Pu); *Ehrental*, 25.X.1925, 2♀* (Pu); *Annabichl, Mitte Sept. 1926*, 1 Larve (Pu);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)*Kreuzbergteich*, 8.VIII.1922, 1 Larve* (Pu); *Moosburg*, 25.III.1923, 1♂* (Pu); *Carinthia, Moosburg*, IV.1953, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Fam. Corixidae*Cymatia coleoptrata coleoptrata* (FABRICIUS, 1777)*Car.*, Umgb. *Villach, Napoleonswiese Teich*, 1.IV.1946, 4Ex. (Strupi); *Carinthia, Klagenfurt, Seekanal*, 22.VIII.1946, 2Ex. (Hö); *Carinthia, Klagenfurt Umg.*, 7.Hügel, VIII.1947, 1Ex. (Hö); *Carinthia, Moosburg, pal.*, 22.IV.1951, 3Ex., 26.IV.1953, 2Ex. (Hö); *Carinthia, Arndorf, Schottergrube*, 22.X.1970, 3Ex. (Sampl);*Glaenocoris propinqua propinqua* (FIEBER, 1860)

1♂, oE;

Arctocoris carinata carinata (C.R. SAHLBERG, 1819)*Karnische Alp., Maderko. <=Maderkopf>*, 2000m, oD, 1♂ det. EW, 2♀5♂ (Hö);

Anm.: Von den zwölf von HÖLZEL (1969) erwähnten Exemplaren in der Sammlung sind acht vorhanden. Auch die von PUSCHNIG (1925) erwähnten Larven befinden sich in der Sammlung (Turracherhöhe, Schwarzsee, 26.VIII.1916, det. Prohaska „wahrscheinlich limitata“ bzw. C. carinata? M.D. (cognata F.) larva), sind aber nicht sicher zuzuordnen.

Callicorixa praeusta praeusta (FIEBER, 1848)*Carinthia, Schwabeck*, 24.VII.1951, Licht, 1♀* (Hö) det. EW; *Carinthia, Großbuch*, XI.1968, 1♂ (Hö) <sub. S. distincta>;

Anm.: Von *HÖLZEL (1958a, 1969) publiziert.

Corixa dentipes THOMSON, 1869*Ehrental*, 25.X.1925, 2♀1♂* (Pu); *Carinthia, Sattnitz-West, Wintschach Straße*, 25.III.1950, 1♀ (Hö); *Carinthia, Klagenfurt Umg.*, IV.1950, 1♀ (Hö) <sub. punctata>; *Carinthia, Arndorf, Schottergrube*, 30.X.1970, 2♂ det. Hö, 1♀1♂ <sub. punctata> (Sampl);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Corixa punctata (ILLIGER, 1807)*Carinthia, Arndorf, Schottergrube*, 30.X.1970, 3♀ (Sampl);*Hesperocorixa linnaei* (FIEBER, 1848)*Sieb. hügel*, 22.VIII.1914, 1♂*, 28.III.1915, 2♀ (Pu); *Seeausfluß*, 23.V.1915, 1♀* (Pu) <sub. sahlbergi>; *Ehrental*, 25.X.1925, 7♀5♂* (Pu); *Carinthia, Klagenfurt Umg.*, 7.Hügel, VIII.1947, 1♂ (Hö) <sub. S. falleni>;

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Hesperocorixa moesta (FIEBER, 1848)*Siebenhügel*, III.1915, 1♂* (Pu); *Carinthia, Sattnitz-West, Wintschach*, 27.X.1945, 2♂ (Hö) det. Heiss;

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Hesperocorixa sahlbergi (FIEBER, 1848)7.Hügel, 22.VIII.1914, 1♂*, 15.IX.1914, 1♀1♂* (Pu); *Ehrental*, 1.VII.1923, 1♀ (Pu); *Kropfitschgarten*, 7.X.1923, 1♀* (Pu); *Gärtnerei, Kropfitsch*, 10.X.1925, 1♀ (Pu); *Carinthia, Viktring*, 23.X.1945, Talmühle, 1♂ (Hö); *Carinthia, Klagenfurt Umg.*, IV.1950, 1♀1♂ (Hö); *Carinthia, Schwabeck*, 4.VII.1951, Licht, 1♂ det. EW, 1♀ (Hö); *Carinthia, Viktring*, VIII.1957, Licht, 1♂ (Hö) det. EW; *Carinthia, Großbuch*, XI.1968, Teich, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Paracorixa concinna concinna (FIEBER, 1848)

[GE] Borkum, 1♀ (Schneider);

Sigara nigrolineata nigrolineata (FIEBER, 1848)*Carinthia, Klagenfurt Umg.*, 6.IX.1950, 1♀ (Hö) det. EW; *Carinthia, Viktring, Almtümpel*, 20.IV.1953, 1♀ (Hö) det. EW; *Carinthia, Karnburg*, 10.X.1968, Betonbecken, 1♂ (Sampl) det. Weber; *Carinthia, Arndorf, Schottergrube*, 18.IX.1970, 1♂, 22.X.1970, 1♀1♂ det. Heiss, 30.X.1970, 1♀, XI.1970, 7♀2♂ det. Hö (Sampl);*Sigara limitata limitata* (FIEBER, 1848)*Klagenfurt, Gartenbassin*, 10.X.1925, 1♀*, 16.X.1925, 1♀ (Pu);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Sigara semistriata (FIEBER, 1848)*oberer Kreuzbergteich*, 6.I.1915, 1♀ (Pu); *Carinthia, Klagenfurt Umg.*, 3.IX.1950, 1♀ (Hö) det. EW; *Carinthia, Keutschach, Pyr.kg.*, 30.IX.1953, 1♀ (Hö) det. EW;*Sigara striata* (LINNAEUS, 1758)*Weidn. <=Weidmannsdorfer> Kanal*, 27.X.1913, 2♀* (Pu); *Schleppeteich, Wassergraben*, 11.X.1914, 1♀* (Pu); *Moosburg*, 25.III.1923, 2♀* (Pu); *Ehrental*, 25.X.1925, 1♀ (Pu); *Carinthia, Viktring*, VIII, Licht, 1♂ <sub. S. falleni>; VII.1956, Licht, 1♂ det. EW, VII.1957, Licht, 1♀ det. Heiss, 1.VII.1957, Licht, 1♂ det. Heiss, VIII.1957, Licht, 1♀ <det. EW sub. dorsalis> det. cf. Heiss# (Hö); *Carinthia, Schwabeck*, VIII.1962, Licht, 1♂ (Hö) det. Weber; *Carinthia, Meierteich*, III.1968, 1♀ (Sampl);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert. Bei dem #Exemplar handelt es sich um ein von EW als S. dorsalis determiniertes und von HÖLZEL (1969) publiziertes Weibchen. S. dorsalis kommt vermutlich in Österreich nicht vor (vgl. FRIER et al. 1999).

Sigara distincta (FIEBER, 1848)

Schleppe-Teich, 2.IV.1916, 3♀* (Pu); Carinthia, Viktring, 1.VII.1957, *Licht*, 1♀ det. EW, 2♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Spi. Tei.*, XI.1959, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, *Tanzenberg, Meierteich*, 8.VIII.1970, 1♀ (Sampl);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Sigara falleni (FIEBER, 1848)

Carinthia, Viktring, *Talmühle*, 23.X.1945, 1♂ (Hö); Carinthia, *Schwabeck*, 24.VII.1954, *Licht*, 1♀ det. EW, VIII.1962, *Licht*, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VI, *Licht*, 1♀3♂, VII.1956, *Licht*, 3♀2♂, 1.VII.1957, 1♀1♂ det. EW, 2♀2♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 1.VII.1957, *Licht*, 1♂ det. EW (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Spi. Tei.*, XI.1959, 1♀ det. EW, 2♀ (Hö); Carinthia, *Meierteich*, III.1968, 1♂ det. Weber, 1♂ (Sampl); Carinthia, *Großbuch*, XI.1968, *Teich*, 2♀1♂ (Hö) <sub. *distincta*>;

Sigara fossarum (LEACH, 1817)

Schleppeteich, Graben, 13.X.1914, 1♀* (Pu); *Glanfurtwiesen*, 25.X.1914, 1♀* (Pu); *Tentschach-Waldteich*, 5.VII.1917, 1♂* (Pu); *ob. Kreuzbg.teich*, 22.VIII.1922, 1♀* (Pu); Carinthia, Viktring, *Talmühle*, 23.X.1945, 1♀ (Hö); *Neusiedl See*, 1.?.1954, 1♀ det. EW;

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Sigara lateralis (LEACH, 1817)

*Carinthia, Viktring, VIII.1956, 1♂ det. EW, 1♂, 1.VII.1957, *Licht*, 1♀ det. EW, 1♀1♂ (Hö);

*Anm.: Von HÖLZEL (1958a) publiziert.

Fam. Naucoridae

Ilyocoris cimicoides cimicoides (LINNAEUS, 1758)

Siebenbügel, 12.VI.1916, 1♂* (Pu); *Kreuzberg*, 8.VIII.1922, 1 Larve* (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, 27.X.1945, 1♀ (Hö); Car., Umgb. *Villach, Napoleonswiese Teich*, 1.IV.1946, 1♂ (Strupi);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Fam. Notonectidae

Notonecta glauca glauca LINNAEUS, 1758

Pappelmorogarten, 20.IV.1911, 1♂* (Pu); *Glanfurtw.* 14.IX.1913, 1♂* (Pu); *Jerolitsch. Teich*, 4.X.1914, 1♂* (Pu); *Kreuzberg*, 19.X.1914, 1♀* (Pu); *Turracher Höhe, Rinsennock*, 2100m, 25.VIII.1916, 1♀* (Pu); *Ehrental*, 25.X.1925, 2♀* (Pu); Carinthia, Klagenfurt Umgb., IV.1950, 2♀ (Hö); Carinthia, Viktring, *F.T.*, 1.VI.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Moosburg, IX.1953, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Pyr.kg.*, 30.IX.1953, 2♀# (Hö); Carinthia, *Großbuch*, XI.1968, *Teich*, 1♂ (Hö) <sub. *maculata* det. Hö>;

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert. Von #HÖLZEL (1954a) als *N. obliqua* veröffentlicht. Offenbar liegt für *N. obliqua* kein gesicherter Nachweis aus Kärnten vor (vgl. FRIEß et al. 1999), mit einem Vorkommen der Art ist aber zu rechnen.

© Landesmuseum für Kärnten; download <https://www.biodidac.at/>

Notonecta obliqua THUNBERG, 1787

[GE] Borkum, 1♀ (Schneider);

Notonecta reuteri reuteri HUNGERFORD, 1928

Styria, Mariazell, 20.VIII.1967, *Hechtensee*, 3♂ (Sampl) det. Heiss; Nordtirol, *Umgb. Seefeld, 1500m*, 30.IX.1970, 2♀1♂ (Heiss) det. Heiss;

Anm.: Eine paläarktisch verbreitete Art mit einem disjunkten, subborealen Vorkommen. In Österreich sind mehrere Funde aus Tirol und wenige Nachweise aus den Ostalpen und dem Waldviertel bekannt. Die tyrphobionte Art bevorzugt nährstoffarme, saure Gewässer in höheren Lagen. Erstmeldung für die Steiermark.

Notonecta viridis DELCOURT, 1909

Carinthia, *Arndorf, Schottergrube*, 30.X.1970, 1♂ (Sampl) <sub. *obliqua* det. Hö>;

Anm.: Eine weit verbreitete Art, die von Mittel- und dem südlichen Nordeuropa und Nordafrika über den Kaukasus bis Indien und Pakistan vorkommt. In Österreich liegen bisher erst wenige Nachweise aus Niederösterreich, Wien, Burgenland, Oberösterreich und Tirol vor. Erstmeldung für Kärnten.

Fam. Pleidae

Plea minutissima minutissima LEACH, 1817

Car., Umgb. *Villach, Napoleonswiese Teich*, 1.IV.1946, 1Ex. (Strupi); Carinthia, Launsdorf, 18.IV.1946, 1Ex. (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umgb., *Seekanal*, 22.VIII.1946, 7Ex. (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umgb., *7Hügel*, VIII.1947, 1Ex. (Hö); Carinthia, *Moosburg*, 22.IV.1951, 2Ex., 26.IV.1953, 1Ex. (Hö); Carinthia, Viktring, *Almtümpel*, 20.IV.1953, 1Ex. (Hö); Carinthia, *Arndorf, Schottergrube*, 18.X.1970, 1Ex., 30.X.1970, 1Ex. (Sampl);

Fam. Mesoveliidae

Mesovelia furcata MULSANT & REY, 1852

Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach Teich*, 17.X.1945, 2♀1♂* (Hö); *Rauschelesee, Cr.*, 2.IX.1968, 1♀ <makropter> (Sampl); *Turnersee, Cr.*, 2.IX.1968, 2♀3♂ (Sampl); Carinthia, *Wintschach-Teich*, 18.VIII.1969, 1♀ 1 Larve (Sampl);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) mit anderen Funddaten publiziert.

Fam. Hebridae

Hebrus pusillus pusillus (FALLÉN, 1807)

Luschnau Moos, 15.V.1922, 1♀* (Prohaska); *Graz, oD*, 2♀1♂ (Mo); Carinthia, *Klopein, pal.*, 20.IV.1954, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Hebrus ruficeps THOMSON, 1871

Umgb. *Heiligengeist*, Car., *Nasses Moos*, 4.X.1945, 1♂* (Strupi); Carinthia, Viktring, *Talmühle*, 23.X.1945, *Carex*, 6♀1♂* (Hö); Umgb. *Villach, Car.*, *Teich bei Magdalenensee*, 29.X.1945, 1♀* (Strupi); Carinthia, Viktring, *Fab.T.*, 26.III.1948, *Carex*, 1♀* (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umgb., *W. See* <= Wörthersee >, 2.X.1948, 1♂* (Hö); *Grafenstein, Cr., pal.*, 1.X.1950, 1♀* (Hö); Ca-

rinthia, Grafenstein, 20.IV.1953, 1Ex.* (Hö); Wimitz, Cr., Dabromoos, 18.IX.1959, *Sphag.* 2♀2♂ (Hö); Carinthia, Thoner Moos, 27.X.1961, *Carex*, 1♀ (Hö); Karawanken, Cr., Matzen-Wolfsberg, 3.VII.1962, 1♀ (Hö); Hechtensee, St., VIII.1968 1♀ <leg. Sampl> det. Hö; Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Fam. Hydrometridae

Hydrometra gracilentia HORVÁTH, 1899
Carinthia, Sattnitz-West, oD, 1♀; Carinthia, Moosburg, pal., 22.IV.1951, 3♀2♂*, 6.V.1956, 1♀ (Hö); Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) mit anderen Funddaten publiziert.

Hydrometra stagnorum (LINNAEUS, 1758)
Austria superior, Enns, oD, 2♀2♂;

Fam. Veliidae

Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)
Carinthia, Viktring, Talmühle, 23.X.1945, 3♀1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, Seeausfluß, 24.X.1945, *Carex*, 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., Seekanal, 22.VIII.1946, 1♀, IX.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Moosburg, 22.IV.1951, pal. 2♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, Pyr.kg., 30.IX.1953, 2♂ (Hö);

Velia caprai caprai TAMANINI, 1947
Maria Zell, St., X.1970, 7♂ (Sampl) det. Tamanini;

Velia currens (FABRICIUS, 1794)
Weitzelsd, Drau-au, oD, 1♂* (Puschnig); Cr., Karawanken, Waidisch, 14.IX.1964, riv., 1♀ (Hö) det. Tamanini, det. Heiss;

Anm.: Literaturangaben zu *V. currens* aus Österreich vor der Revision durch TAMANINI (1947) – und vermutlich auch spätere Angaben – beziehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf *V. caprai* oder *V. saulii*. *Velia currens* ist eine südeuropäische Art, die aus der Schweiz (Tessin), Italien, Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien vorliegt. FRIEß (2001) konnte nach Exemplaren aus der Trögerner Klamm (Bergbach im Manneschen-Hopfenbuchenwald, 880 m) die Art erstmals mit Sicherheit für Österreich anführen. Das hier vorliegende Männchen wurde schon von *PUSCHNIG (1925) erwähnt und genitaliter überprüft. Die Art scheint in den Karawanken weiter verbreitet zu sein.

Velia rivulorum (FABRICIUS, 1775)
[IT] Sardinien, Siniscola, 31.III.1956, 1♂ (E. Priesner);

Fam. Gerridae

Aquarius najas (DE GEER, 1773)
In der Raab b. Weiz, 6.X.1922, 1♂ (Pu); Vbg., Satteins, 30.V.1939, 1♀ (Mo); Carinthia, Viktring, 23.X.1945, Talmühle, 1♀2♂* (Hö); Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Aquarius paludum paludum (FABRICIUS, 1794)
Großer Hallegger Teich, 4.X.1914, 1♀* (Pu) <f. obscura>; unt. Kreuzbergteich, 14.VIII.1915, 1♀* (Pu); Viktring, 15.X.1916, 1♂ (Pu); Gurk, Hemmateich, 12.IX.1917, 2♂* (Pu) <f. obscura>; Goggaussee, 14.IX.1917, 1♀* (Pu)

<f. obscura>; St. Georgen a.L., 2.IX.1920, 3♀1♂* (Pu) <2♀ f. obscura>; Carinthia, Wintschach, 27.X.1945, 1♀ (Hö); Cr., Turnersee, VIII.1968, 1♂ (Sampl); Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert. PUSCHNIG (1925:90) beschreibt zwei farbliche Aberrationen. Die hier genannten Exemplare der forma obscura mit schwarzer Ventralseite sind Syntypen der Originalbeschreibung (vgl. ANDERSEN 1995:99).

Gerris argentatus SCHUMMEL, 1832
Blasendorf, 18.IV.1915, 2♀ (Pu); Ehrental, 25.X.1925, 1♀* (Pu); Carinthia, Maria Rain, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, Talmühle, 23.X.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenlacke, 27.X.1945, 1♂ (Hö); Carinthia, Wintschach, 27.X.1945, 2♀4♂ (Hö); Carinthia, Viktring, Fab. Teich, IV.1948 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 20.IX.1950, pal. 1♂ (Hö); Carinthia, Moosburg, 22.IV.1951, pal. 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, XI.1959, Spt. Tei =<Spintikteich>, 3♀1♂ (Hö); Carinthia, Turnersee, 2.IX.1968, lit., 2♀1♂ (Hö); Carinthia, Meier-Teich, 23.IX.1968, 1♀ (Sampl); Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Gerris costae costae (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)
M. Rain, 24.V.1915, 1♂* (Pu); Ulrichsberg, 21.V.1916, 2♀2♂* (Pu); Turracher H., 26.VIII.1916, 1♀* (Pu); Görlitzen, 29.VII.1917, 1♀* (Pu); Kötschach, 7.VI.1922, 1♂* (Pu); Reißkofelwald, 8.VI.1922, 1♀* (Pu); Diex, 21.VI.1923, 1♂* (Pu); Turracher Höhe, 17.VIII.1925, 1♀* (Pu) det. Zimmermann, 3♀; Plöcken, 23.VIII.1926, 1♀ (Pu); Gmundner Hütte, 18.VI.1927, 1♀2♂ (Pu); Pflughof, 19.VI.1927, 1♂ (Pu); Styr., Kalbl. Gatt., 1♂** (Mo); Karawanken, Ogris Alm, 8.IX.1945, 1♂# (Hö); Karnische Alp, Nassfeld, 20.VII.1967, 2♀ (Hö); Carinthia, Emberg-Alm, VIII.1967, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, 1700m, 25.VIII.1967, 2♂ (Hö); Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert. Syntypen der von ihm beschriebenen ab. derubra (PUSCHNIG 1925:92) wurden nicht gefunden. Die Angaben von #HÖLZEL (1954a) als *G. lateralis* Schummel und *G. lateralis* var. *costae* H.S. betreffen *G. costae* (vgl. FRIEß et al. 1999). **Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Gerris gibbifer SCHUMMEL, 1832
St. Georgen am Längsee, 2.IX.1920, 1♀* (Pu); Sattnitz, 3.IV.1921, 1♂* (Pu); Vbg., Feldkirch, 18.IV.1934, 1♀ (Mo); San Remo 1♀ (Schneider); Korallengebiet, St., Raum um Osterwitz, Erlengrab, 7.VI.1959, 1♀; Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert.

Gerris lacustris (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Seeausfluß, 7.V.1912, 1♀* (Pu); M. Saal, Waldteich, 20.IX.1914, 1♀* (Pu); Zollfeld, 3.VI.1915, 1♀* (Pu) <ab. delineata>; Weißteich bei Reifnitz, 4.VII.1915, 1♂* (Pu) <ab. caudifulva>; Sekirn, 16.VII.1915, 1♀* (Pu) <ab. delineata>; Annabück, 1.VIII.1915, 1♂* (Pu) <ab. caudifulva>; Tentschach, 2.VII.1917, 1♀* <ab. ventriflava>, 3.VII.1917, 1♀2♂*, 5.VII.1917, 1♀* (Pu); Jerolitsch, 23.V.1920, 1♂* (Pu); Kötschach, 7.VI.1922, 1♂ (Pu); Drasinger Teich,

2.IV.1923, 1♀ (Pu) <ab. infusca>; Annabr.,
15.VIII.1927, 1♂ (Pu); Carinthia, Viktring, Talmühle,
23.X.1945, 3♀3♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, Pyr.kg.,
30.IX.1953, 1♀3♂ (Hö); Car., Maria Rain, Badetümpel,
11.V.1957, 2♀1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West,
XI.1959, Spi. Tei., 2♀ (Hö); Carinthia, Zollfeld, 1♀, oD
(Sampl); Carinthia, Osssiacher Tauern, Langes Moos,
10.V.1968, 1♀ (Hö); St., Hechtensee, VIII.1968 3♀
(Sampl); Carinthia, Wintschach-Teich, 18.VIII.1969, 1♀
(Sampl); Cr., Karawanken, Waidischsee, 25.IX.1970,
2♀2♂ (Hö);

Anm.: Von *PUSCHNIG (1925) publiziert. Er berichtet von insgesamt
217 Exemplaren dieser Art, aber nur vierzehn befinden sich noch in
der Sammlung. PUSCHNIG (1925:93) beschreibt bei den Männchen
zwei und bei den Weibchen drei farbliche Aberrationen. Die hier ge-
nannten Exemplare der formae caudiflava (♂) bzw. infusca, ven-
triflava und delineata (♀) sind Syntypen der Originalbeschreibung
(vgl. ANDERSEN 1995:101).

Gerris odontogaster (ZETTERSTEDT, 1828)
1♂, oE;

Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832
[NL] Hilversum, 27.IV.1924, 1♀ (Reclaire) det. Zim-
mermann;

Limnoporus rufoscutellatus (LATREILLE, 1807)
1♀1♂, oE;

Fam. Saldidae

Chiloxanthus pilosus (FALLÉN, 1807)
[GE] Borkum, 2 Ex; ŠTUSAK, 1961

Chartoscirta cincta cincta (HERRICH-SCHÄFFER, 1841)
Vbg., Feldkirch, 22.X., 1♀1♂ (Mo); Carinthia, Vik-
tring, Wintschach Teich, 3.XI.1945, Carex, 2♀1♂ (Hö);

Chartoscirta cocksii (CURTIS, 1835)
Car., Umgb. Heiligengeist, Nasses Moos, 4.X.1945,
7♀2♂ (Strupi);

Macrosaldula scotica (CURTIS, 1835)
Carinthia, Rosental, 2.VI.1946, 1♀; Carinthia, Sattnitz-
Ost, Annabr., 9.VI.1948, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria
Rain, 2.VIII.1953, rip., 1♀ det. EW, VIII.1954, 1♀,
17.IX.1955, 2♂, 18.V.1957, 1♀ (Hö); Rattendorf, Gail-
tal, Cr., Doberbachgraben bei 648m, Juli 1959, 1♀ (E.
Kreissl);

Macrosaldula variabilis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Carinthia, Maria Rain, 20.X.1945, Drautümpel, 1♀*,
18.VII.1949, rip., 1♀, 1.VIII.1953, rip., 2♀1♂ det.
EW, 2.VIII.1953, rip., 2♀3♂, 26.IX.1953, Licht, 1♂,
27.IX.1953, 4♀1♂, 2.X.1955, 1♂ (Hö);
Anm.: Von *Hölzel (1954a) publiziert.

Saldula arenicola arenicola (SCHOLTZ, 1847)
[MC] Macedonia, Stari Dojran, 13.VI.1955, 1♂ (Thur-
ner) det. EW;

Saldula c-album (FIEBER, 1859)
Karawanken, Ogris Alm, 8.IX.1945, 1♂* (Hö); Ca-
rinthia, Loibltal, 12.V.1946, rip., 1♀* (Hö); Carinthia,
Maria Rain, 7.VIII.1949, 1♀*, 14.VIII.1949, 1♀1♂*,
19.III.1950, 1♀ <sub. melanoscela>, 1♀ <sub. pallipes>
(Hö); Koschuta, Cr., Hudajama, 8.IX.1949, 1♂* (Hö);
Carinthia, Sattnitz-Ost, 14.I.1950, 1♂ (Priesner); Kar-
nische Alpen, Doberbachgrb., 10.VII.1951, 1♂* <sub.
saltatoria> (Hö); Carinthia, Bärenthal, 4.VII.1954, 1♂
(Hö); St., nordw. Ausläufer des Walzkogels, Übelbachgr.,
21.V.1959, 1♀;

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Saldula melanoscela (FIEBER, 1859)
Carinthia, Maria Rain, 2.VI.1946, 1♀, 19.III.1950, 2♀,
10.IV.1950, 1♀, 17.III.1957, 1♀* det. EW, 24.III.1957,
1♂* (Hö); Cr., Karawanken, Dolich, 20.V.1949, 1♀
(Hö); Carinthia, Klagenfurt, 7.III.1950, 1♀ (Priesner)
det. EW; [CZ] Moravia, Hodonin, VIII.1958, 1♀1♂*,
30.VIII.1958, 1♀1♂ (Roubal);
Anm.: Von *HÖLZEL (1958b) publiziert.

Saldula nobilis (HORVÁTH, 1884)
Carinthia, Maria Rain, 18.VII.1949, rip., 1♂#,
2.VIII.1949, rip., 1♀#, 14.VIII.1949, rip., 1♀#,
29.VIII.1953, rip., 1♂* (Hö) det. EW;
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert. Die anderen #Belege waren
bei *S. orthochila* eingeordnet.

Saldula orthochila (FIEBER, 1859)
Cr., Singerberg, Karawanken, 10.VI.1946, 1♂* (Hö);
Carinthia, H. Obir, 31.VII.1954, 1♂ (Hö) det. EW;
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Saldula pallipes (FABRICIUS, 1794)
Carinthia, Maria Rain, 24.III.1957, 1♀1♂*,
28.III.1957, 1♀ (Hö); St., Korallpengegebiet, Raum um
Osterwitz, 7.VI.1959, 1♀;
Anm.: Von *HÖLZEL (1958b) publiziert.

Saldula palustris (DOUGLAS, 1874)
Neusiedl See, 10.X.1954, 2♀1♂, 1.XI.1954, 7♀2♂;

Saldula saltatoria (LINNAEUS, 1758)
Vbg., Feldkirch, 1♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Gur-
nitz, 7.IV.1948, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, Maria
Rain, 18.VII.1949, 1♀, 17.III.1953, 1♀, 21.III.1957,
1♀* det. EW, 24.III.1957, 1♀2♂* (Hö); Carinthia,
Klagenfurt Umg., 27.III.1955, 1♂ (Hö) det. EW;
Anm.: Von *HÖLZEL (1958b) publiziert.

Saldula xanthochila (FIEBER, 1859)
Carinthia, Maria Rain, 7.VIII.1949, rip., 1♀* det. EW,
1♀, 17.IX.1955, 1♂, 2.X.1955, 4♂, 17.III.1957, 2♀#,
21.III.1957, 1♀#, 24.III.1957, 1♂# det. EW, 1♀ (Hö);
Anm.: Von HÖLZEL *(1954a) und #(1958b) publiziert.

Salda littoralis (LINNAEUS, 1758)

Carinthia, oD, 1♀; Vbg., Arlberg, 2♂ (Mo); *St. Admont*, 23.VII.1950, 1♀ (Priesner) det. EW;

Fam. Tingidae

Campylosteira verna (FALLÉN, 1826)

Vbg., Göfis, oD, 2♂ (Mo); 2♂ oE;

Acalypta carinata (PANZER, 1806)

Carinthia, *Lavamünd*, *Ostrya*, 12.V.1954, 1♂ (Hö);

Anm.: Dieses Exemplar wurde von EW als *A. brunnea* (Germar) determiniert und etikettiert und von HÖLZEL (1959) publiziert. Die Überprüfung zeigte jedoch, dass es sich um ein sehr dunkles Exemplar von *A. carinata* handelt.

Acalypta finitima (PUTON, 1884)

Karnische Alpen, Rattendorferalm, 18.VI.1948, 1♂ (Hö) det. EW; Karnische Alpen, Doberbachgrb, 10.X.1950, 1♂ (Hö);

Anm.: Diese Art ist in Österreich nur aus Kärnten bekannt. Von Hölzel (1953, 1954a, 1967) unter dem Synonym *A. samara* PUTON, 1887 gemeldet.

Acalypta gracilis gracilis (FIEBER, 1844)

oE, aS, 2 Ex.;

Acalypta marginata (WOLFF, 1804)

Böhmen, 1♂, aS; Koschuta, Cr., Hudajama, 31.VIII.1945, 1♂, 1.IX.1945, 1♂ (Hö); *Carinthia*, Grafenstein, 26.IV.1953, 1♂ (Hö);

Acalypta musci (SCHRANK, 1781)

Vbg., Feldkirch, oD, 2♂ (Mo); *Wöllanernock Alp.*, Car., 19.VII.1945, 1♂ (Strupi); *Illitsch Alp.*, Car., 23.IX.1945, 1♂* (Strupi); Umgb. *Graschlitzen*, Car., 27.IX.1945, 1♀, 1 Larve (Strupi); Car., Umgb. *Pöckau, Kokragraben*, 17.X.1945, 1♂ (Strupi); Karnische Alp., *Zottachk.*, 18.VI.1949, 1♀* (Hö); *Carinthia*, Launsdorf, 2.X.1953, 1♂ (Hö); *Gössgraben*, Cr., *Ankogelgr.*, *Acer*, 14.VII.1961, 1♂, 15.VII.1961, 1♀, 16.VII.1961, 1♀, 17.VII.1961, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *Hölzel (1954a) publiziert.

Acalypta nigrina (FALLÉN, 1807)

Austria superior, Enns, oD, 1♀;

Acalypta parvula (FALLÉN, 1807)

[GE] Hamburg, Langenhorn, 14.VIII.1932, unter Heide, 1 Ex., det. EW; [NL] Beetsterzwaag, 6.VIII.1926, (Reclaire) det. Gulde;

Acalypta pulchra ŠTUSAK, 1961

Annahütte-Alp., Car., *Mittagskogelgebiet*, 7.VIII.1945, 1♀ 1♂ (Strupi); Karawanken, *Singerbg.*, 30.X.1940, 1♀, 7.XI.1945 (Hö);

Anm.: Durch ŠTUSAK (1961) von *A. musci* abgetrennt und in Österreich bisher nur aus Kärnten bekannt (Karawanken, Koralpe).

Kalama tricornis (SCHRANK, 1801)

Vbg., Feldkirch, oD, 2♂ (Mo);

Derephysia foliacea foliacea (FALLÉN, 1807)

Böhmen, aS, 1♀;

Lasiacantha capucina capucina (GERMAR, 1837)

Österr., aS, 1♀; Böhmen, aS, 1♂; *Liesing*, 31.V.1921, 2♂* (Prohaska);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Galeatus spinifrons (FALLÉN, 1807)

Ungarn, 1♀, aS;

Galeatus maculatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

Böhmen, aS, 1 Ex.;

Stephanitis pyri (FABRICIUS, 1775)

Böhmen, aS, 2♂;

Elasmotropis testacea testacea (HERRICH-SCHÄFFER, 1830)

[CZ] Boh. Dobruška, 4.VII.1957, 1♀ (Roubal);

Catoplatus fabricii (STÅL, 1868)

Stabentein, 30.VI.1921, 1♀ 1♂ (Prohaska); *Carinthia*, Klagenfurt Umg., oD, 1♀ (Hö); *Carinthia*, Viktring, 1.V.1957, 1♀ (Hö);

Catoplatus carthusianus (GOEZE, 1778)

Böhmen, aS, 1♀ 1♂;

Copium clavicorne clavicorne (LINNAEUS, 1758)

oE, 1♀ 1♂; Vbg., Feldkirch, oD, 1♂ (Mo);

Oncochila simplex (HERRICH-SCHÄFFER, 1830)

oE, 1♀; Vbg., Feldkirch, 6.VII.1935, 2♂ (Mo);

Physatocheila dumetorum (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

Car., Pischeldorf, 27.VII.1931, 1♀ (Mo);

Physatocheila costata (FABRICIUS, 1794)

Car., Möderndf., 16.IV.1922, 1♂* (Prohaska); *Grünburg*, 5.VIII.192?, 1♀ (Pu); *Carinthia*, Maria Rain, III.1942, *Talpa*, 1♀ 1♂, 24.III.1946, 1♂, 26.V.1947, 1♀, 12.IX.1954, 1♂, 28.III.195?, *Anem. nemor.*, 1♀ (Hö); Car., Umgb. *Vorderberg, Wildbachgr.*, *Gailtal*, 22.X.1945, 1♀ (Strupi); *Carinthia*, *Haimach*, 20.III.1946, 1♀ 1♂ (Hö); Car., Umgb. *Villach, Kanzianiberg*, 25.III.1946, 1♂ (Strupi); *Carinthia*, *Sattnitz-Ost, Annabr.*, 12.IV.1946, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)

Kärnten, aS, 1♀# <sub. geniculata>; *Arnoldstein*, 2.VIII.1921, 2♀* (Prohaska); Koschuta, Cr., Hudajama, 27.IV.1946, 1♀ 2♂, 9.V.1946, 2♂ (Hö); *Koschuta Alp.*, Car., *unterhalb der Hütte*, 7.V.1946, 1♂ (Strupi);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Das Belegexemplar aus „Kärnten“ in der aS wurde von #HÖLZEL (1954a) als *T. geniculata* gemeldet. *Tingis geniculata* ist noch nicht in Kärnten aufgefunden worden (vgl. FRIER et al. 1999).

Tingis grisea GERMAR, 1835
Böhmen, aS, 1♂;

Tingis pilosa HUMMEL, 1825
Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); *Pischeldorf, Cr.*, 1♀1♂;
Carinthia, Maria Rain, 24.III.1946, 1♂, 2.V.1954, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, *F. Teich*, 10.IV.1948, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Brw.*, 26.VIII.1953, 1♂, 5.XI.1953, 1♀ (Hö);

Tingis ciliaris (PUTON, 1879)
[GR] Peloponnes, Megaspileion, 12.–20.VI.1938, 2 Ex. (Thurner) det. EW;

Tingis reticulata HERRICH-SCHÄFFER, 1835
oE, aS, 1♀; Kärnten, aS, 1 Ex.; Carinthia, Maria Rain, *Anem. nemora.*, 7.III.1959, 1♀ (Hö);

Dictyla echii (SCHRANK, 1782)
Kärnten, aS, 1♀1♂#; Car., Möderndf., 30.V.1922, 2♀ (Prohaska); [MC] Mavrovi Han.T., 9.VI.1939, 1♂ (Novak);
Anm.: Die beiden Belegexemplare aus „Kärnten“ in der aS wurde von Hölzel # (1954a) als *D. rotundata* gemeldet. *Dictyla rotundata* ist noch nicht in Kärnten aufgefunden worden (vgl. FRIER et al. 1999).

Dictyla humuli (FABRICIUS, 1794)
Car., Möderndf., 21.V.1922, 2♂ (Prohaska);
Anm.: Von PROHASKA (1923) publiziert.

Dictyla lupuli (HERRICH-SCHÄFFER, 1837)
Griechenl., aS, 1 Ex.;
Anm.: Diese eurosibirische Netzwanze ist im Südosteuropäischen Raum offenbar nur zerstreut verbreitet. Leider liegt für das Belegexemplar kein genauer Fundort vor, jedenfalls wurde *D. lupuli* offenbar bisher nicht aus Griechenland gemeldet. Nach PERICART (1983) sind aber benachbarte Nachweise bekannt, z. B. aus Macedonien (Ohrid).

Agramma laetum (FALLÉN, 1807)
Styria, Spielfeld-Strass, oD, bei *F. exsecta*, 1♀; Car., Möderndf., 20.V.1922, 1♀* (Prohaska); *Möderndf.*, 28.VII.1921, 1 Ex.* (Prohaska);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Agramma ruficornis (GERMAR, 1835)
Vbg., Feldkirch, oD, 1♀1♂ (Mo); Carinthia, Keutschach, *pal.*, 24.VII.1955, 1♀3♂* (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Fam. Microphysidae

Loricula pselaphiformis CURTIS, 1833
Styr., Bärndorf, oD, 1♀1♂ (Mo);
Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Myrmedobia exilis (FALLÉN, 1807)
Styr., Bärndorf, oD, 1♂** (Mo); Car., Pischeldorf, oD, 1♀* (Mo);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) bzw. *HÖLZEL (1954a) unter dem Synonym *M. tenella* (ZETTERSTEDT) publiziert.

Fam. Miridae

Isometopus intrusus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Vbg., Feldkirch, 12.VII.1941, *Apfelb.*, 2♀ (Mo);

Bryocoris pteridis (FALLÉN, 1807)
Hermagor, 16.VIII.1922, 1♂* (Prohaska); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, 12.VIII.1945, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Grafenst. A.*, 9.VIII.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, *Koralpe, Koglereck*, 8.VIII.1956, 1♀ (Hö); Carinthia, *Wollanig*, 5.IX.1961, 5♀2♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Monalocoris filicis (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, VII.1945, *pal.*, 4♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Grafenb.*, 13.VIII.1945, 2♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Grafenst. A.*, 9.VIII.1950, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, Keutschach, 27.V.1952, 1♀, 26.VIII.1953, *Brw.*, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, VIII.1952, 1♂, 2.VIII.1953, 1♀1♂ (Hö); Cr., Wimitz, Dabromoos, 18.IX.1959, *Sphag.*, 3♀ (Hö); Carinthia, *Wollanig*, 30.VIII.1961, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Matzen-Wolfsberg, VIII.1961, 1♂ (Hö);

Dicyphus annulatus (WOLFF, 1804)
Vbg., Feldkirch, 25.VIII., 1♀1♂ (Mo); [CZ] Bohemia centr., IX.1958, 1♀1♂ (*Roubal*);

Dicyphus globulifer (FALLÉN, 1829)
Liesing, 6.VIII.1920, 1♂* (Prohaska); Car., Pischeldf., oD, 1♂ (Mo); Cr., *Pischeldf.*, 1♀1♂; Carinthia, *Grafenst.*, 6.VIII.1950, 1♂ (*Priesner*); Carinthia, Klagenfurt Umg., 3.IX.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 20.VIII., *Brw.*, 1♂, 26.VIII.1953, *Brw.*, 1♂, 1.IX.1953, *Brw.*, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Dicyphus errans (WOLFF, 1804)
Carinthia, Maria Rain, VI.1959, 1♂ det. EW, 2♂ (Hö);

Dicyphus hyalinipennis (BURMEISTER, 1835)
Cr., Koschuta, Hudajama, 12.VI.1948, 1♀1♂# (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, IX.1956, 1♀* det. EW (Hö); Carinthia, *Wollanig*, 5.IX.1961, 1♀2♂* (Hö);
Anm.: Von #HÖLZEL (1954a) als *D. pallicornis* publiziert. Gesicherte Nachweise von *D. pallicornis* für Kärnten stehen noch aus. Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Dicyphus pallidus (HERRICH-SCHÄFFER, 1836)
Styr., Bärndf. b. Rtt., 1♀1♂** (Mo); Cr., Koschuta, Hudajama, 1.IX.1945, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, 26.VIII.1953, *Brw.*, 1♂ (Hö);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Dicyphus stachydis stachydis J. SAHLBERG, 1878
[CZ] Blatno bohemia, 1. VI. 1955, 1♂ (Roubal);

Alloeotomus germanicus WAGNER, 1939

Carinthia, Viktring, 28. VII. 1945, dom. Lichtf., 1♂, VI. 1956, hort. Licht, 1♀*, det. EW, IX. 1956, Licht, 2♂ (Hö); Carinthia, Magdalensbg., 25. IX. 1958, Licht, 1♂ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Alloeotomus gothicus (FALLÉN, 1807)

Carinthia, Viktring, VI., hort., Licht, 1♂ (Hö);

Deraeocoris punctulatus (FALLÉN, 1807)

Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Klagenfurt Umg., 7. III. 1950, 1♂ (Hö);

Deraeocoris annulipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1842)

Vbg., Nüziders, 29. VII. 1940, Lärche, 2♀ (Mo); Kasparstein, 27. VIII. 1962, 1♀ (Hö) det. EW sub. *D. cordiger* var. *beieri*;

Anm.: Der von EW als *D. cordiger* var. *beieri* determinierte Beleg ist zu *Deraeocoris annulipes* (H.-S.) zu stellen (vid. Rieger). Die Angaben von *D. cordiger* bei PROHASKA (1923, 1932) und HÖLZEL (1958a) sind zweifelhaft und höchstwahrscheinlich kommt *D. cordiger* in Österreich nicht vor.

Deraeocoris cordiger (HAHN, 1834)

[GE] Fürth i. B., Hainberg, 20. VI. 1934, 1♀ (K. Schmidt);

Deraeocoris olivaceus (FABRICIUS, 1777)

Vbg., Feldkirch, 1♀ (Mo); [GE] Berlin Umgebung, Finkenkrug, Juni 1956, 1♂ (Demelt) det. EW;

Deraeocoris ruber (LINNAEUS, 1758)

Car., Pischeldorf, 25. VII. 1931, 1♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain, 10. VII. 1945, 2♀ 1♂, 2. VIII. 1945, 2♀, 20. VII. 1955, 1♀, 3. VII. 1957, 1♂, 13. VII. 1957, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Wintschach, 2. VIII. 1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12. VIII. 1945, 3♀ 2♂ (Hö); Carinthia, Rattendf. Alm, 18. VI. 1948, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 3. IX. 1951, Licht, 1♂ (Hö); Carinthia, Magdalensbg., 21. VII. 1958, Licht, (Hö); Cr., Karawanken, Sechter, 6. VII. 1960, 1♀ (Hö); Carinthia, Wollanig, 30. VIII. 1961, 1♀ (Hö);

Deraeocoris schach (FABRICIUS, 1781)

[GR] Peloponnes, 12.-20. VI. 1958, 1♀ (Thurner) det. EW;

Deraeocoris trifasciatus (LINNAEUS, 1767)

Carinthia, Rosental, Hollenburg, VI. 1947, 1♀ (Hö); [GE] Berlin Umgebung, Finkenkrug, Juni 1956, 1♂ (Demelt) det. EW;

Deraeocoris lutescens (SCHILLING, 1837)

Car., Pischeldorf, 1♀ (Mo); Pischeldorf, 1♀; Carinthia, Viktring, VII. 1945, dom. Lichtf., 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Hemmabg., 1♂ (Hö); Krt., Koralpengebiet, 1948, 1♂ (Demelt); Carinthia, Viktring, 10. X. 1949, Küchenfenster, 1♀ (Hö); Carinthia, Grafenstein, 1. V. 1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 24. XII. 1951, dom., 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, 25. VIII. 1959, 2♀ (Hö);

Pithanus maerkelii (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

[GE] Harz, Blankenheim, 11. VII. 1931, 1♀ (Feige); Car., B. Vellach, 3. VIII. 1931, 1♀ (Mo);

Acetropis carinata (HERRICH-SCHÄFFER, 1841)

[GE] Fürstenberg i. M., 1♀ (Konow);

Stenodema calcarata (FALLÉN, 1807)

Keutschachersee, 18. VIII. 1907, 1♀# (Pu) sub. *laevigata*; Seerausfluß, 23. VIII. 1914, 4♀ 1♂* (Pu); Loreto, 4. IX. 1914, 1♀ (Pu); Siebenhügel, 22. ? 191?, 1♀ (Pu); Carinthia, Sattnitz-Ost, 12. VIII. 1945, 2♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 7. III. 1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VII. 1950, dom., 1♀ 1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Von #PROHASKA (1923) als *S. laevigata* publiziert.

Stenodema laevigata (LINNAEUS, 1758)

Karnburg, 30. VII. 1910, 1♀# sub. *calcarata*, 1♀ (Pu); Keutschach, Wiese, 1. VII. 1917, 1♀* (Pu); Carinthia, Wollanig, 30. VIII. 1961, 1♀ (Hö) sub. *Megaloceroea recticornis*;

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Von #PROHASKA (1923) als *S. calcarata* publiziert.

Stenodema virens (LINNAEUS, 1767)

Ebental, 27. VII. 1908, 1♂, 19. VII. 1910, 2♀ (Pu); Karnburg, 30. VII. 1910, 1♀* (Pu); Siebenhügel, 9. V. 1920, 1♀ (Pu); Carinthia, Viktring, 28. VII. 1945, Lichtf., 1♀, VII. 1950, Licht, 1♀ (Hö); Carinthia, H. Obir, 31. VII. 1954, 1♂ (Hö) sub. *calcarata*;

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Stenodema holsata (FABRICIUS, 1787)

Bad Vellach, 29. VI. 1913, 2♂ (Pu); Unt. Ebriachertal, 8. IX. 1914, 2♂ (Pu); Bärentratten, 29. VI. 1922, 1♂ (Pu); Karawanken, Hl. Wand, 9. IX. 1945, 1♂ (Hö); Karawanken, Ogris Alm, 8. IX. 1945, 1♀ 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 31. VIII. 1945, 3♀, 1. IX. 1945, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Koschuta, 19. VI. 1948, 1♀ (Hö); Karnische Alpen, Zottachkopf, 5. VI. 1950, Dryas, 1♀ (Hö); Karnische Alpen, Hoher Trieb, 31. VI. 1950, Bischof-A., 1♀ (Hö); Carinthia, Koralpe, Koglereck, 16. X. 1956, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Matzen-Wolfsberg, VIII. 1961, 2♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 17. VI. 1953, 1♀ (Hö) det. EW;

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Notostira erratica (LINNAEUS, 1758) © Landesmuseum für Kärnten; download
Siebenbüchel, 8.IX.1910, 1♀*1♂# (Pu); Car., Pischeldorf, 1♀ (Mo); Cr., Illitsch, Karawanken, 22.IX.1946, *Abornrinde*, 1♀ (Strupi); Cr., Karawanken, *Dolich*, 20.V.1949, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Jovanbg.*, VII.1950, 1♂ (*Strupi*);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) als *Stenodema sericans* publiziert. Von #PROHASKA (1923) publiziert.

Notostira elongata (GEOFFROY, 1785)
Vbg., Feldkirch, 7.VII.1932, 1♀ (Mo) <sub. erratica>; Cr., *Hl. Blut*, *Treven leg.*, 30.X.1946, 1♂ <sub. erratica>; *Neusiedl. See*, 10.X.1954, 1♀ <sub. erratica>;
Anm.: vgl. FRIER et al. (1999).

Megaloceroea recticornis (GEOFFROY, 1785)
[GE] Frankenhausen, Kyffhäuser, 5.VII.1929, 1♂ (Feige); Vbg., Feldkirch, 1♂ (Mo); Carinthia, *Magdalensbg.*, 12.VII.1958, *Licht*, 1♀1♂ (Hö);

Leptopterna dolabrata (LINNAEUS, 1758)
Kirchbach i. G. <= im Gailtal>, Juli.1909, 1♀ (Pu); *Glanfurt*, 15.VI.1912, 1♀# (Pu); *Katschtal (leg. Bellschan)*, 14.VII.1913, 1♂* (Pu); *Hlg. Blut*, 7.IX.1913, 1♂# (Pu); Carinthia, *M.Saalerbg.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, *Wintschach*, VII.1945, *pal.*, 1♂ (Hö); Klagenfurt Umg., *NordKärnten*, 13.VI.1948, 1♀ (Machacek); Carinthia, *Plöcken*, VIII.1948, 1♀** (Hö) <sub. ferrugata>; *Kreuzbergl*, 17.VI.1950, 1♀ (Machacek) det. EW; Carinthia, Viktring, VI.1953, *hort.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 15.VII.1953, *Pyr.kg.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Loibltal, 26.VI.1954, *gram.*, 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 15.VI.1958, 1♂ (Machacek);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) als *Brachycoleus scriptus* (= *B. decolor*) determiniert und publiziert. Ein sicherer Nachweis von *B. decolor* für Kärnten steht somit noch aus. Von #PROHASKA (1923) publiziert. Von **HÖLZEL (1954a) als *Miris ferrugata* publiziert.

Trigonotylus caelestialium (KIRKALDY, 1902)
Klagenfurt, oD, 1♂; Carinthia, Viktring, 14.IX.1950, *Licht*, 1♂, VIII.1952, *Licht*, 1♂ det. EW, 2♂, 9.VIII.1952, *dom. Licht*, 1♂, 10.VIII.1952, *Licht*, 1♂, 29.VIII.1952, *Lichtf.*, 1♀, IX.1952, *Licht*, 1♀ (Hö);

Trigonotylus pulchellus (HAHN, 1834)
Carinthia, *Magdalensbg.*, VIII.1959, *Licht*, 1♂ (Hö);
Anm.: Gesicherte Nachweise dieser Art sind für Österreich bisher nur aus dem Burgenland bekannt. Die Meldungen aus anderen Bundesländern müssen erst überprüft werden. Erstmeldung für Kärnten.

Phytocoris tiliae tiliae (FABRICIUS, 1777)
Vbg., Feldkirch, oD, 2♀ (Mo); [GE] Eisleben, 25.VII.1933, *Corylus*, 1♂ (Feige);

Phytocoris longipennis FLOR, 1861
Vbg., Feldkirch, oD, 1♀ (Mo); Karawanken, *Ferlach*, 29.IX.1946, 1♀, det. Hö; Carinthia, Maria Rain, 17.IX.1955, 1♀ (Hö) det. EW; Carinthia, *Magdalensbg.*, 13.VIII.1958, 1♂ (Hö) <sub. pini>;

Phytocoris dimidiatus KIRSCHBAUM, 1856
Vbg., Feldkirch, oD, 1♀1♂ (Mo); Carinthia, Viktring, 9.IX.1951, *dom. Licht*, 1♂* (Hö) det. EW; Carinthia, Viktring, 23.VI.1956, *Lichtfang*, 1♀*# (Hö); Carinthia, *Magdalensbg.*, 13.VIII.1958, 1♀# (Hö);
Anm.: Von HÖLZEL * (1958a) bzw. # (1969) publiziert.

Phytocoris pini KIRSCHBAUM, 1856
Carinthia, *Magdalensbg.*, 21.VII.1958, *Licht* 2♀2♂, 25.VIII.1958, *Licht*, 2♂ (Hö);

Phytocoris ulmi (LINNAEUS, 1758)
Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1♀1♂** (Mo); Carinthia, Viktring, 5.VIII.1956, *Licht*, 1♂ (Hö) det. EW; Cr., Karawanken, *Dolich*, 15.VI.1958, 1♂ (Hö) det. EW;
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Phytocoris austriacus WAGNER, 1954
Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 2♀ (Mo); *Pischeldorf*, oD, 1♀; Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, VIII.1946, *Lichtf.*, 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 12.VI.1948, 1♀ (Hö); Car., Viktring, VIII.1952, *Licht*, 1♂ (Hö); Car., *Magdalensbg.*, 13.VIII.1958, 1♂ (Hö);
Anm.: Die Verbreitung der Art in Österreich ist noch nicht genau bekannt. Es liegen bisher Nachweise aus Niederösterreich, Wien, Burgenland und Osttirol vor, wahrscheinlich ist sie aber weiter verbreitet. Erstmeldung für Kärnten.

Pantilius tunicatus (FABRICIUS, 1781)
Tentschach, 3.X.1918, 2♀* (Pu); Carinthia, Klagenfurt Umg., *Heide*, 30.VIII.1945, 1♂ (Machacek); Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschachteich*, 17.X.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VIII.1947, 1♂ (Hö); Carinthia, *Magdalensbg.*, VIII.1959, *Licht*, 2♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Megacoelum beckeri (FIEBER, 1870)
Carinthia, Klagenfurt Umg., *M. Saalerbg.*, IX.1948, 1♀ (Hö);

Adelphocoris seticornis (FABRICIUS, 1775)
Kirchbach i. G. <= im Gailtal>, Juli.1909, 1♀ (Pu); *Ossiachersee*, 15.VIII.1913, 1♂ (Pu); *Presseggergraben*, 9.VI.1922, 1♂ (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, VII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 28.VII.1945, *Licht*, 2♂, VIII.1946, *hort.* 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 8.VIII.1945, 2♀1♂, 20.VIII.1945, 2♀2♂, 25.VIII.1951, *Lichtfg.*, 1♂, 29.VIII.1952, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, 12.VIII.1945, 1♀, 17.VIII.1946, *Lichtfg.*, 1♂ (Hö); Umgb. *Kolbnitz*, Car., *Brückenbachgraben*, 4.IX.1945, 1♂ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, 27.VI.1946, *Zimmer*, 1♂ (Hö); Carinthia, Ulrichsberg, 20.VII.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia, Keutschach, *Brw.*, 1.IX.1953, 1♀ (Hö);

Adelphocoris reichelii (FIEBER, 1836)

Tessendorf, Wiese an der Glan, 31.VIII.1919, 1♀* (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenbach, 13.VIII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 9.VIII.1952, dom. Licht, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, Keutschach, 26.VIII.1953, Brw., 2♂, 29.VII.1955, pal. 1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Adelphocoris vandalicus (ROSSI, 1790)

Karnburg, Waldwiese, 30.VII.1910, 1♀* (Pu); Annabrigge, 9.VIII.1914, 3♀2♂ (Pu); Annabrk., 15.VIII.1927, 1♀; Car., Pischeldorf, 2.VIII.1931, 2♂ (Mo); Pischeldorf, 1♂; Carinthia, Maria Rain, 8.VIII.1945, 2♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, VII.1946, Lichtf., 1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Adelphocoris lineolatus (GOEZE, 1778)

Siebenbüchel, 22.VII.1913, 1♀ (Pu); Kollnitzer Teich, 1.IX.1921, 1♂ (Pu); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1945, 2♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenbach, 13.VIII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., Heide, 30.VIII.1945 (Machacek), 1♀* (Hö) <sub. quadripunctatus>; Carinthia, Klagenfurt Umg., 30.VIII.1949, dom., 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, VI.1950, Licht, 1♂, 17.VI.1951, Licht, 1♂, VII.1953, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, VII.1953, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 8.IX.1951, Lichtf., 2♂, 26.IX.1953, Licht, 1♂, 9.VI.1958, Licht, 1♂ det. EW (Hö); Carinthia, Maria Rain, 26.IX.1953, Licht, 1♂, 19.IX.1953, Lichtf., 1♀, 16.VII.1955, 1♂ (Hö); Kärnten, Tanzenberg, 20.VII.1952, 1♀ (Machacek); Carinthia, Klagenfurt Umg., M. Saalerberg, 19.VIII.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 26.VIII.1953, Brw., 1♂ det. EW, 1.IX.1953, Brw., 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, 26.VIII.1953, Brw., 1♂ (Hö); Carinthia, Magdalensbg., 12.VII.1958, Licht, 2♂, 21.VII.1958, Licht, 2♂ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) als *A. quadripunctatus* publiziert. Trotzdem kommt *A. quadripunctatus* in Kärnten vor, wie ein Beleg aus Nötsch (leg. Mader) im Niederösterreichischen Landesmuseum zeigt.

Pachypterna fieberi FIEBER, 1858

Koschuta, Cr., Hudajama, 15.VI.1946, 1♂ (Hö);

Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Brachycoleus pilicornis pilicornis (PANZER, 1805)

Vbg., Satteins, 17.VI.1941, 1♀2♂ (Mo);

Horwathia lineolata (A. COSTA, 1862)

Karnische Alpen, Hoher Trieb, Bischof-A., 31.VI.1950, 1♀ (Hö) det. EW;

Mermilocerus schmidtii (FIEBER, 1836)

Vorarlberg, 18.VI.1941, 1♀1♂ (Mo); Karawanken, Cr., Koschuta, oD, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 2.VI.1946, 1♀ (Hö);

Rhabdomiris striatellus striatellus (FABRICIUS, 1794)

Fritzendorf, 20.V.1920, Eiche, 2♀ (Prohaska);

Anm.: Von PROHASKA (1923) publiziert.

Grypocoris sexguttatus (FABRICIUS, 1777)

Styr., Kaiserau, oD, 2♂** (Mo); Carinthia, Klagenfurt, 20.VI.1949, 1♀ (Priesner); Karawanken, Cr., Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀ (Hö); Karawanken, Cr., Jovanberg, VII.1950, 1♂ (Strupi); Carinthia, H. Obir, 18.VIII.1954, 3♀2♂ (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Closterotomus biclavatus biclavatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Carinthia, Launsdorf, 5.VI.1946, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀3♂ (Hö); Cr., Karawanken, Grafenst. A., 9.VIII.1950, 1♂ (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgrb., 10.VII.1951, 1♀ (Hö); Carinthia, H. Obir, Hoffmann A., 1.VIII.1954, 1♂ (Hö); Carinthia, H. Obir, H. A. <= Hoffmann Alpe>, 18.VIII.1954, 2♀3♂ (Hö); Cr., Karawanken, Dolich, 15.VI.1958, 1♀1♂ (Hö); Carinthia, Loibltal, 27.VII.1958, 1♂ (Hö);

Closterotomus fulvomaculatus (DE GEER, 1773)

M. Rain, Drauwauen, 10.VI.1917, 1♂* (Pu); Bärentreten, 29.VI.1922, 1♂* (Pu); Carinthia, Rosental, 2.VI.1946, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 6.VI.1949, 1♀ (Hö) det. EW; Cr., Karawanken, Dolich, 15.VI.1958, 1♀ (Hö) <sub. biclavatus>;

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Calocoris affinis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Drauwauen bei Weizelsdorf, <Datum unleserlich>, 1♂* (Pu); Bärental, 13.VII.1913, 1♂ (Pu); Ebriachtal, 8.IX.1914, 1♀# (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, Winterschach, VII.1945, 3♀, 11.VIII.1945, 3♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 10.VII.1945, 1♀, 14.VIII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenbach, 13.VIII.1945, 1♀ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 30.VIII.1945, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, 27.V.1952, Seeufer, 2♀, 30.VII.1953, Süd, 2♀ (Hö); Cr., Karawanken, Matzen-Wolfsberg, VIII.1961, 2♀1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Von #PROHASKA (1923) als *Lygocoris pabulinus* publiziert.

Calocoris alpestris (MEYER-DÜR, 1843)

Cr., Koschuta, Hudajama, Im Graben, 26.VI.1946, 1♂ (Hö) <sub. affinis>; Karnische Alpen, Hoher Trieb, Bischof-A., 31.VI.1950, 2♀ (Hö);

Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (DE GEER, 1773)

oE, aS, 1♀;

Closterotomus norwegicus (GMELIN, 1790) desmuseum für Kärnten; download
Carinthia, Klagenfurt, 10.VII.1949, 1♂ (Priesner) det. EW;

Closterotomus cinctipes (A. COSTA, 1853)
[CR] Istrien, aS, 1♀; oE, aS, 1♂;

Alloeonotus egregius FIEBER, 1864
Carinthia, Plöcken, VIII.1948, 1♂ (Hö);

Hadrodemus m-flavum (GOEZE, 1778)
Gaisberg bei Salzburg, 21.VII.1913, 1♀1♂ (Pu);

Miris striatus (LINNAEUS, 1758)
[GE] Blankenburg, Thüringen, 20.V.1920, 1♂ (Feige);
Liesing, 17.VII.1922, 1♀* (Prohaska); Vbg., Feldkirch,
oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Koschuta, oD, 1♀ (Hö); Ka-
rawanken, Cr., Jovanbg, VII.5?, 1♀ (*Strupit*) det. EW;
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Actinonotus pulcher (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Vbg., Feldkirch, oD, 1♂ (Mo); Karnische Alpen, Hoher
Trieb, Bischof-Alm, 31.VI.1950, 1♀* (Hö); Nordtirol,
Halltal, 1500m, Bergahorn, 12.VI.1971, 1♀,
20.VI.1971, 1♂ (Heiss);
Anm.: *Eine westpaläarktische Art, die in Österreich bisher nur selten
und zerstreut in höheren Lagen in Vorarlberg, Tirol, Steiermark und
Niederösterreich gefunden wurde. Erstmeldung für Kärnten.

Stenotus binotatus (FABRICIUS, 1794)
Siebenhügel, 18.VII.1907, 1♀ (Pu); Loretto, 28.VII.1911,
2♀* (Pu); Glanfurtwiesen, 12.VIII.1913, 4♀ (Pu); Ca-
rinthia, Sattnitz-West, Wintschach, VII.1945, 1♀ (Hö);
Carinthia, Keutschach, Pyr.kg., 15.VII.1953, 1♂ (Hö)
det. EW; Carinthia, Wollanig, 30.VIII.1961, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Dichroscytus rufipennis (FALLÉN, 1807)
[GE] Thüringen, 1♀, aS;

Dichroscytus intermedius REUTER, 1885
V., Bludenz, oD, 2♀1♂ (Mo); Carinthia, Schwabeck,
24.VII.1954, 1♀ (Hö) det. EW;

Lygocoris pabulinus (LINNAEUS, 1761)
Ebriachtal, 8.IX.1914, 1♀* (Pu); Sty., Kraubath, oD,
1♀ (Mo); Karawanken, Cr., Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀
<2♀5♂# sub. L. apicalis> (Hö); Carinthia, H.Obir,
Hoffmanns A., VIII.1954, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia,
Bärental, 25.VIII.1958, 1♀ <sub. Plesiocoris rugicol-
lis> (Hö); Karawanken, Cr., Matzen-Wolfsberg,
VIII.1961, 2♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Obwohl das Funddatum ab-
weicht, handelt es sich bei den Exemplaren vom Kleinen Obir ver-
mutlich um die von #HÖLZEL (1954a) als *Lygus apicalis* gemeldeten
und schon von FRIER et al. (1999) angezweifelte Tiere.

Lygocoris contaminatus (FALLÉN, 1807)
Möderndorf, 18.VIII.1921, 1♀ (Pu) <sub. lucorum>;
Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1♀2♂** (Mo);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Lygocoris viridis (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, oD, 2♀1♂ (Mo);

Lygocoris rugicollis (FALLÉN, 1807)
Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 2♀ (Mo);
Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Apolygus limbatus (FALLÉN, 1807)
Car., B. Vellach, 3.VIII.1931, 1♂ (Mo);

Apolygus lucorum (MEYER-DÜR, 1843)
Hermagor, 20.VIII.1919, 2♀ (Pu); Car., Pischeldorf,
25.VII.1931, 1♂ (Mo); Carinthia, Maria Rain,
VII.1952, gram., 1♀, det. EW, 3.VIII.1952, gram., 1♀
(Hö); Carinthia, Keutschach, Brw., 26.VIII.1953, 1♀
(Hö) <sub. spinolae>;

Apolygus rhamnicola (REUTER, 1885)
Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 1♀ (Mo);
Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Apolygus spinolae (MEYER-DÜR, 1841)
Vbg., Feldkirch, 30.VI.1932, 2♀1♂ (Mo); Carinthia,
Sattnitz-West, Wintschach, pal., 11.VIII.1945, 1♀1♂
(Hö); Carinthia, Maria Rain, 30.IX.1945, 1♀ (Hö); Ca-
rinthia, Rosental, 2.VI.1946, 1♀ (Hö); Carinthia, Vik-
tring, 29.VIII.1952, Licht, 1♀* (Hö) det. EW; Karnburg,
23.IX.1968, 1♀ (Sampl);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Pinalitus atomarius (MEYER-DÜR, 1843)
Vbg., Feldkirch, 3.IX.1941, 3♂ (Mo);

Pinalitus cervinus (HERRICH-SCHÄFFER, 1841)
Car., Pischeldorf, 3.VIII.1931, Linde, 2♀ (Mo); Cr., Pi-
scheldorf, 1♂;
Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Pinalitus rubricatus (FALLÉN, 1807)
St., Gesäuse, oD, 1♀2♂ (Mo); Carinthia, Sattnitz-West,
Wintschach, pal., VII.1945, 1♂ (Hö) det. EW; Cr., Ka-
rawanken, Grafenst. A., 9.VIII.1950, 1♀* (Hö); Ca-
rinthia, Magdalensbg., 21.VII.1958, 1♀1♂,
13.VIII.1958, Licht, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) als *Lygus cervinus* publiziert.

Orthops campestris (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Viktring, VIII.1956, Licht, 1♀ (Hö) det. EW;

Orthops basalis (A. COSTA, 1853)
Treffener Tal, 11.V.1913, 1♂* (Pu); K., Lavanttal, Kiefer,
22.III., 1♀ (Demelt); Carinthia, Sattnitz-West, Wint-

schach, VII.1945, *pal.*, 1♀, 11.VIII.1945, *pal.*, 3♀1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 29.V.1946, 1♀, VIII.1952, *gram.*, 1♀, 29.VIII.1952, 1♀, 19.IX.1953, 2♂, IX.1959, 1♂ (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgrb., 8.VI.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Loibltal, *Tunnel*, 26.VI.1954, 2♀1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 20.IX.1956, *pal.*, 1♀, 12.X.1956, *in der Küche*, 1♀ det. EW sub. *kalmii*, VII.1958, *Licht*, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) als „*Lygus pastinacae* FALL. (im Sinne Fiebers)“ publiziert.

Orthops kalmii (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, 11.VIII.1945, *pal.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VIII.1952, *Licht*, 1♂ (Hö); [MC] Ohrid Umgebung, Macedonis, 700m, 2♀1♂ (Thurner) det. EW;

Orthops montanus (SCHILLING, 1837)
Styriae alp, oD, 1♂ (Strobl); Vbg., Feldkirch, 19.V.1933, *Rumex*, 2♀ (Mo); Carinthia, *Gailt. A., Reisseck*, 30.VI.1949, 1♂ (Hö); Karnische Alpen, Hoher Trieb, *Bischof A.*, 31.VI.1950, 2♀ (Hö); Carinthia, H. Obir, *Hoffmann A.*, 1.VIII.1954, 2♀ (Hö);

Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)
[GE] Germania, Koeslin Pom., Gollenberg, 15.IV.1920, 1♂ (K. Labler);

Lygus punctatus (ZETTERSTEDT, 1838)
Karawanken, *Tscheppa*, oD, 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 1.IX.1945, 3♀5♂* (Hö); Cr., Karawanken, Koschuta, *Grasalm*, 15.VI.1946, 1♂ (Hö); Karnische Alp., *Doberbachgrb.*, 27.V.1949, ♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Kl. Obir*, 30.VIII.1949, 1♂ (Hö); Karnische Alpen, Rattendorferalm, 27.V.1953, 1♀ (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgrb., 8.VI.1950, 3♀, 10.VII.1951, 1♂* (Hö); Karnische Alpen, Hoher Trieb, *Bischof-A.*, 31.VI.1950, 2♀2♂* (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) mit anderen Funddaten publiziert.

Lygus rugulipennis POPPIUS, 1911
Carinthia, *Techelsbg.*, 14.VII.1945, *Licht, Kiefer*, 1♀4♂# (Hö); Carinthia, Viktring, 28.VII.1945, *dom. Lichtf.*, 1♂1♀*, 12.VIII.1945, *Lichtf.*, 1♀#, VII.1949, *dom. Licht*, 1♂# det. EW (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Grafenbach*, 13.VIII.1945, 1♂ (Hö); Car., Umgb. *Kolbnitz, Brückenbachgraben*, 4.IX.1945, 1♀# (Strupi); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Brunnstube*, 5.XI.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 30.IX.1945, 1♀1♂#, 19.IX.1953, *Lichtf.*, 1♂, 26.IX.1953, *Licht*, 2♀* (Hö); Car., Umgb. *Villach, Kanzianibg.*, 25.III.1946, 1♀ (Strupi); Carinthia, Klagenfurt, 5.VII.1949, 2♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 8.II.1950, *Priesner*, 1♀# (Hö) det. EW; Carinthia, Keutschach, 1.IX.1953, *Brw.*, 1♂* (Hö); Carinthia, *Schwabeck*, 24.VII.1954, 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., X.1956, 1♀2♂ (Hö); *Karnburg*, 23.IX.1968, 1♀ (*Sampl.*);

Anm.: Von #HÖLZEL (1954a) unter dem Synonym *L. pubescens* publiziert, größtenteils mit abweichenden Funddaten. Von *HÖLZEL (1954a) als *L. gemellatus* publiziert, z. T. mit anderen Funddaten.

Agnocoris reclairei (WAGNER, 1949)
Car., Pischeldorf, 30.VII.1931, *Salix*, 1♂ (Mo); Cr., *Pischeldorf*, 1♀1♂; Carinthia, Grafenstein, 20.IV.1962, 1♂* det. EW (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Agnocoris rubicundus (FALLÉN, 1807)
Car., Möderndf, 17.IV.1922, *Salix*, 1♀* (Prohaska); *Hermagor*, 19.IV.1922, *Salix*, 1♀* (Prohaska);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Camptozygum aequale (VILLERS, 1789)
Pischeldorf, 1♂;

Polymerus cognatus (FIEBER, 1858)
[KI] *Kirghisia*, aS, oD, 1♀; [CZ] Bohemia, Neratovice, 29.VIII.1955, 1♂ (Roubal);

Polymerus microphthalmus (WAGNER, 1951)
Carinthia, Maria Rain, 2.VI.1946, 1♂ <sub. *Adelphocoris seticornis*>, 29.VIII.1952, 1♀* det. EW (Hö); Cr., Karawanken, *Kl. Obir*, 30.VIII.1949, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Hemmabg.*, 10.IX.1959, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1953, 1954a) publiziert.

Polymerus unifasciatus (FABRICIUS, 1794)
Carinthia, Ma. Saaler Bg., 14.VI.1944, 2♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 28.VII.1945, 2♀, 2.VI.1946, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, VI.1952, *Licht*, 1♂, *Pyr.kg.*, 15.VII.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, *Nachts im Zimmer*, 20.VIII.1952, 1♂ (Hö); Carinthia, *Magdalensbg.*, 21.VII.1958, 1♂ (Hö);

Polymerus carpathicus (HORVÁTH, 1882)
Vbg., Feldkirch, 1.VII.1941, 1♀1♂ (Mo);

Polymerus holosericeus HAHN, 1831
Drauwau bei Weizelsdorf, 11.VII.1909, 1♂ (Pu);
Anm.: Von PROHASKA (1923) publiziert.

Polymerus nigrita (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, 25.VII.1941, 2♀1♂ (Mo);

Charagochilus gyllenhalii (FALLÉN, 1807)
Car., Pischeldf., 1♀ (Mo); *Pischeldorf*, 1♀1♂; Carinthia, Viktring, VI., *hort.*, *Licht*, 1♂ (Hö); Karawanken, *Dolich*, 5.IX.1955, 1♀1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., *Seegründe*, 21.IX.1957, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Heumoo*, 10.IX.1959, 1♀ (Hö); [MC] Ohrid Umgebung, Macedonis, 700m, 1♀ (Thurner) det. EW;

- Charagochilus weberi* WAGNER, 1953 © Landesmuseum für Kärnten; download von <https://www.zoosystemica.de/>
Carinthia, Keutschach, *Pyr.kg.*, 15.VII.1953, 1♀ (Hö);
Carinthia, Keutschach, 29.VII.1955, *pal.*, 1♀ (Hö);
[MC] Drenowo-Maz., V.1956, Thurner 1♂ (Hö);
- Liocoris tripustulatus* (FABRICIUS, 1781)
Viktg., 11.V.1946, *hort.*, 1♀; Carinthia, Launsdorf,
5.VI.1946, 2♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, 1♀ (Hö);
Carinthia, Loibltal, 1.V.1949, 1♀ (Priesner); Carinthia,
Klagenfurt Umg., 5.III.1950, 1♀, 6.IX.1950 1♂ (Hö);
Carinthia, Viktring, 21.III.1954, *dom.*, 1♂ (Hö) det.
EW;
- Capsus ater* (LINNAEUS, 1758)
Vbg., Feldkirch, 1♀ 1♂ (Mo);
- Capsodes gothicus gothicus* (LINNAEUS, 1758)
Vbg., Feldkirch, 20.VI., 1♀ 2♂ (Mo);
- Capsodes mat* (ROSSI, 1790)
[IT] *Lago d. Cavallo*, V.1955, 1♀ det. EW;
- Halticus apterus apterus* (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, 13.VIII.1945, 1♂
(Hö); Carinthia, Loibltal, *Tscheppa*, 15.VIII.1945, 1♂*
<sub. pusillus>(Hö); Carinthia, Viktring, 5.VIII., 1♂,
VIII.1947, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 27.V.1952,
Seeufer, 2♀ 2♂, 26.VIII.1953, *Brw.*, 1♀ 2♂ (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) als *H. pusillus* publiziert. Die weiteren
Exemplare z. T. ebenfalls unter *H. pusillus* eingeordnet. Ein gesicher-
ter Nachweis von *H. pusillus* für Kärnten steht offenbar noch aus (vgl.
FRIER et al. 1999).
- Halticus luteicollis* (PANZER, 1804)
Carinthia, Maria Rain, VII.1952, *gram.*, 1♂ (Hö);
- Strongylocoris leucocephalus* (LINNAEUS, 1758)
1♀, aS, oE; *Bodental*, *Wiesen*, 9.VII.1922, 1♀* (Pu); Cr.,
Karawanken, Bärenthal, 4.VII.1954, *gram.*, 1♂ (Hö) det.
EW; *Saualpe*, *Grafenbach*, 20.VI.1958, 1♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.
- Strongylocoris luridus* (FALLÉN, 1807)
2♂, aS, oE;
- Orthocephalus coriaceus* (FABRICIUS, 1777)
Vbg., Feldkirch, 18.VI., 1♂, oD, 3♀ (Mo);
- Orthocephalus saltator* (HAHN, 1835)
Carinthia, Sattnitz-West, VIII.1945, *pal.*, 1♀ (Hö);
- Orthocephalus vittipennis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Millstättersee, *N-Ufer*, *Wiesen*, 29.VI.1910, 1♀* (Pu) sub.
mutabilis; Styr., Bärndf. b. Rtt., 1♀** (Mo) <sub. salta-
tor>; Carinthia, Maria Rain, 29.VI.1955, *Lichtf.*, 1♂
(Hö) det. EW;
- Anm.: Von *PROHASKA (1923) als *O. mutabilis* (= *O. coriaceus*) publi-
ziert, für den keine aktuellen Nachweise aus Kärnten vorliegen (vgl.
FRIER et al. 1999). **Von MOOSBRUGGER (1946) als *O. saltator* publi-
ziert.
- Dimorphocoris schmidtii* (FIEBER, 1858)
Styria, Kalbl. Gatt., 1♀ 1♂ 1Larve** (Mo); Styr., Kai-
serau, 2♀ (Mo); Carinthia, *Sau-Alpe*, 30.VI.1946, 1♂*
(Hö);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) bzw. *HÖLZEL (1954a) publiziert.
- Pachytomella parallela* (MEYER-DÜR, 1843)
[CZ] *Böhm.*, aS, 1♂; [CZ] Bohemia, *Nejdek*,
10.VIII.1955?, 1♂ (Roubal);
- Blepharidopterus angulatus* (FALLÉN, 1807)
Carinthia, Viktring, VIII.1956, *Licht*, 1♂ (Hö) det. EW;
Carinthia, Maria Rain, VI.1959, 1♂* (Hö) det. EW sub.
Orthotylus virens;
Anm.: Das *Exemplar aus Maria Rain wurde von EW als *O. virens* eti-
kettiert und von HÖLZEL (1969: „11.VI.1959, mehrfach“) publiziert.
Eine längere Belegserie fehlt allerdings und auch in der coll. Wagner
in Hamburg fehlen die Tiere. Ob es sich daher bei allen Exemplaren
– so wie bei vorliegendem – um Verwechslungen handelt, kann nicht
sicher gesagt werden.
- Cyllecoris histrionius* (LINNAEUS, 1767)
Car., Mödernd., 30.V.1922, 2♂* (Prohaska); Carinthia,
Klagenfurt Umg., 2.VI.1953, *Gradnitz*, 2♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.
- Dryophilocoris flavoquadrinaculatus* (DE GEER, 1773)
Car., Möderndf., 27.V.1922, 1♀ 1♂ (Prohaska); Styr.,
Bärndf. b. Rtt., 1♀ 2♂*** (Mo); Cr., Karawanken, Sin-
gerberg, 10.VI.1946, 1♀, 19.VI.1946, 1 Ex.; Carinthia,
Klagenfurt, 5.V.1949, 1 Ex. (Priesner);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.
- Globiceps sphaegiformis* (ROSSI, 1790)
[GR] Griech., aS, 1♂; Cr., Karawanken, *Dolich*,
15.VI.1958, 1♀ 1♂ (Hö);
- Globiceps flavomaculatus* (FABRICIUS, 1794)
Ursulaberg, 24.VIII.1913, 1♂* (Pu); Carinthia, Sattnitz-
West, *Wintschach*, VII.1945, *pal.*, 1♀ (Hö); Carinthia,
Klagenfurt, 20.VI.1949, 1♀# (Priesner); Carinthia,
Keutschach, *Pyr.kg.*, 15.VII.1953, 1♀, 30.VII.1953, *pal.*
1♀, 29.VII.1955, *pal.*, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. Von #HÖLZEL (1954a) als
G. cruciatus (= *G. fulvicollis*), 20.VI.1946, publiziert.
- Heterocordylus erythrophthalmus erythrophthalmus* (HAHN,
1833)
[CZ] Boh. Valec v C, VII.1954, 1♀ (Roubal);
- Heterocordylus genistae* (SCOPOLI, 1763)
Siebenhügel, 28.VI.1910, 1♀* (Pu); Styr., Bärndf. b. Rtt.,
3.VIII.1943, *Gen. tinct.*, 2♀ 1♂*** (Mo); Carinthia, Satt-
nitz-Ost, *Petelinz*, 22.VI.1945, *Genista tinct.*, 1♀ (Hö);

Carinthia, Ma. Saaler Bg., 14.VI.1949, 1♀1♂ (Priesner); Carinthia, Keutschach, *Pyr.kg.*, 15.VII.1953, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Dolich*, VII.1954, 3♀1♂, 7.IX.1954, 1♀ (Hö) <sub. *Heterocapillus tigris*>; Anm.: Von *PROHASKA (1923) bzw. von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Heterocordylus tibialis (HAHN, 1833)
[IT] Ligure, S. Margherita, 27.IV.1933, 1♂ (Feige);

Heterocordylus tumidicornis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Vbg., Feldkirch, 2♀ (Mo);

Heterotoma merioptera (SCOPOLI, 1763)
Carinthia, Sattnitz-Ost, 1♂ (Hö);

Mecomma ambulans ambulans (FALLÉN, 1807)
Vbg., Göfis, 13.VIII.1932, 1♀3♂ (Mo); Cr., Wimitz, Dabromoos, 18.IX.1959, *Sphag.*, 2♀ (Hö);

Mecomma dispar (BOHEMAN, 1852)
Styr., Bärndf. b. Rtt., 1♀1♂ (Mo);
Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Orthotylus ericetorum ericetorum (FALLÉN, 1807)
Carinthia, Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♂, X.1956, 4♀1♂ (Hö);

Orthotylus flavosparsus (C. R. SAHLBERG, 1841)
Carinthia, Viktring, 14.IX.1950, *Licht*, 1♂, VIII.1952, *Licht*, 1♂, 6.VIII.1952, *Licht*, 1♂, IX.1952, *Licht*, 2♂ (Hö); Carinthia, *Magdalensbg.*, 13.VIII.1958, 1♂ (Hö);

Orthotylus marginalis REUTER, 1883
Vbg., Feldkirch 25.VI., *Salix*, 2♀ (Mo); Carinthia, Viktring, 17.VI.1951, 1♂, *Licht* (Hö); Cr., Karawanken, *Dolich*, 15.VI.1958, 1♂ (Hö) det. EW;

Orthotylus prasinus (FALLÉN, 1826)
Vbg., Feldkirch, 1♂ (Mo);

Orthotylus viridinervis (KIRSCHBAUM, 1856)
Vbg., Feldkirch, 1♂ (Mo);

Pilophorus confusus (KIRSCHBAUM, 1856)
Kärnten, aS, 1♀; Vbg., Feldkirch, 1♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain, IX.1959, 1♂ (Hö) det. EW;

Pilophorus perplexus DOUGLAS & SCOTT, 1875
Carinthia, Viktring, 7.IX.1961, *dom.*, 1♀ (Hö) det. EW;

Cremnocephalus albolineatus REUTER, 1875
Carinthia, *Techelsberg*, 14.VII.1945, *Lichtfang*, 1♂ (Hö);

Cremnocephalus alpestris WAGNER, 1941
Vbg., Feldkirch, 23.VI.1942, 1♂ (Mo); Cr., Karawanken, *Grafenst. A.*, 9.VIII.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, H. Obir, *H.A.*, 18.VIII.1954, 1♀ (Hö);

Hallodapus rufescens (BURMEISTER, 1835)
Lesachtal, oD, 1♀*; Vbg., Feldkirch, 16.VII.1932, 1♀ (Mo);
Anm.: Möglicherweise ein von *PROHASKA (1923) publiziertes Exemplar.

Atractotomus mali (MEYER-DÜR, 1843)
Vbg., Feldkirch, 20.VI., 1♀1♂, oD, 1♀1♂ (Mo);

Atractotomus parvulus REUTER, 1878
Carinthia, Viktring, 20.X.1957, *Zillhöhe*, 1♀* (Hö) det. EW; Carinthia, *Magdalensbg.*, 13.VIII.1958, 1♀* (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Atractotomus rhodani FIEBER, 1861
Vbg., Röhth, 12.VII.1941, *Sanddorn*, 3♀, 23.VII.1941, *Sanddorn*, 2♀ (Mo);

Campylomma verbasci (MEYER-DÜR, 1843)
Carinthia, Viktring, IX.1952, *Licht*, 1♂ (Hö) det. EW;

Chlamydatus saltitans (FALLÉN, 1807)
[CZ] Böhmen, aS, 1♀; 1♂, oE;

Chlamydatus pulicarius (FALLÉN, 1807)
Hlg.blut., 6.IX.1913, 1♀ (Pu); Carinthia, Maria Rain, 20.VIII.1945, 1♂ (Hö); Car., *Verditz Alp.*, 29.V.1946, 1♀ (Strupi); Cr., Karawanken, Koschuta, 15.VI.1946, 1♀ (Hö); Carinthia, *Plöcken*, 26.VII.1948, 3♀1♂ (Hö); Cr., Karawanken, *Kl. Obir*, 30.VIII.1949, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Matzen-Wolfsberg, VIII.1961, 1♂ (Hö) <sub. pullus>; Cr., Karawanken, *Sechter*, 25.VIII.1961, 1♀ (Hö); Carinthia, *Wollanig*, 5.IX.1961, 1♂ (Hö); Cr., *Karnburg*, 23.IX.1968, 1♂ (*Sampl.*);

Criocoris crassicornis (HAHN, 1834)
[GE] Eisleben, Oberrissdorf, 20.VI.1932, *Gal. verum*, 1♂ (Feige);

Europiella alpina (REUTER, 1875)
Cr., Karawanken, Singerberg, IX.1956, 1♀ det. EW; Carinthia, *Wollanig*, 30.VIII.1961, 1♀* (Hö) det. EW;
Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Eurycolpus flaveolus (STÄL, 1858)
[GE] Sachsenbg., 8.VII.1920, 1♀ (Feige); [CZ] Bohe-mia, Praha, 18.VI.1958, 1Ex. (Roubal);

Harpocera thoracica (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, 3.VI.1941, 2♀ (Mo);

Heterocapillus tigris (MULSANT & REY, 1852)
Carn., *Tschau* <?>, 10.VII.1959, 1♀ det. EW;

Hoplomachus thunbergii (FALLÉN, 1807)
[CZ] Böhmen, aS, 1♂; oE, 1♀;

Lopus decolor decolor (FALLÉN, 1807)
Vbg., Göfis, 13. VIII. 1932, 3 ♀ (Mo);

Macrotylus quadrilineatus (SCHRANK, 1785)
Carinthia, Loiblthal, 15. VIII. 1945, *Tscheppa*, 1 ♀ (Hö);
Cr., Koschuta, Hudajama, 1. IX. 1945, 1 ♀ (Hö); Carinthia,
Maria Rain, 14. IX. 1952, *gram.*, 1 ♀ (Hö); Carinthia,
Keutschach, 26. VIII. 1953, *Brw.*, 2 ♂ (Hö); Cr., Karawanken,
Sechter, 6. IX. 1961, 1 ♀ (Hö);

Megalocoleus molliculus (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, 1 ♂ (Mo); Carinthia, Viktring,
VI. 1952, *dom. Licht*, 1 ♂ (Hö) det. EW; Carinthia, *Magdalensbg.*,
21. VII. 1958, 2 ♂, 13. VIII. 1958, *Licht*, 1 ♂
det. EW, 1 ♂, VIII. 1959, *Licht*, 1 ♂ (Hö);

Megalocoleus tanacetii (FALLÉN, 1807)
Car., Pischeldorf, 24. VII. 1931, 1 ♀ (Mo); Cr., *Pischeldorf*,
2 ♀; Carinthia, Klagenfurt Umg., *M. Saalerberg*,
18. VIII. 1953, 1 ♀ (Hö);

Monosynamma maritimum (WAGNER, 1947)
[GE] *Borkum*, 2 ♀;

Oncotylus punctipes REUTER, 1875
[CZ] *Böhmen*, aS, 1 ♀;

Oncotylus viridiflavus viridiflavus (GOEZE, 1778)
Vbg., Koblach, 14. VII. 1941, 1 ♀ 2 ♂ (Mo);

Orthonotus rufifrons (FALLÉN, 1807)
Styr., Bärndf. b. Rtt., 2 ♀** (Mo); Carinthia, Sattnitz-
West, *Wintschach*, VII. 1945, *pal.*, 1 ♂ (Hö);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Phylus coryli (LINNAEUS, 1758)
[GE] Frankenhausen, Kyffhäuser, 29. VI. 1931, 1 ♀
(Feige); Carinthia, Ma. Saaler Bg., 14. VI. 1949, 1 ♂
(Priesner); Carinthia, Klagenfurt, 20. VI. 1949, 2 ♀ 1 ♂
(Priesner); Carinthia, Viktring, 24. VI. 1957, *dom.*, 1 ♂
(Hö); Cr., Karawanken, *Dolich*, 15. VI. 1958, 1 Ex. (Hö);

Phylus melanocephalus (LINNAEUS, 1767)
Vbg., Feldkirch, 11. VI. 1934, 2 ♀ (Mo);

Phylus plagiatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)
Karawanken, *Dolich*, 15. VI. 1958, 1 ♂ (Hö) det. EW;
Carinthia, Maria Rain, 10. VI. 1964, 1 ♀ (Hö);

Plagiognathus arbustorum arbustorum (FABRICIUS, 1794)
Cr., Koschuta, Hudajama, 1. IX. 1945, 1 ♀ 1 ♂* <sub.
Psallus betuleti> (Hö); Carinthia, Keutschach,
26. VIII. 1953, *Brw.*, 1 ♀ det. EW, 1 ♀ 1 ♂ (Hö); Carinthia,
H. Obir, *H.A.*, 18. VIII. 1954, 1 ♂ (Hö) det. EW;
Cr., Karawanken, Matzen-Wolfsberg, VIII. 1961, 1 ♀

det. EW, 2 ♀ 1 ♂ (Hö); Carinthia, *Wollanig*,
30. VIII. 1961, 2 ♀ (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) als *Psallus betuleti* publiziert.

Plagiognathus bipunctatus REUTER, 1883
[CZ] Brno, 25. VIII. 1958, Kamenný, 1 ♀ 1 ♂ (Roubal),

Plagiognathus chrysanthemi (WOLFF, 1804)
Carinthia, Loiblthal, 26. VI. 1951, 1 ♂ (Hö) det. EW;

Plagiognathus fulvipennis (KIRSCHBAUM, 1856)
Vbg., Feldkirch, 10. VII. 1935, 2 ♀ (Mo);

Plagiognathus vitellinus (SCHOLTZ, 1847)
Vbg., Feldkirch, 26. VI. 1940, *Lärchen*, 2 ♀ 1 ♂ (Mo);

Psallus betuleti (FALLÉN, 1826)
Carinthia, Loiblthal, 3. VII. 1961, *Licht*, 2 ♂ (Hö) det.
EW;
Anm.: Bei den von HÖLZEL (1954a) gemeldeten Exemplaren von der
Koschuta-Hudajama handelt es sich um eine Verwechslung mit *Pla-*
giognathus arbustorum (siehe dort).

Psallus ambiguus (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, 2 ♀ (Mo); Carinthia, Loiblthal,
26. VI. 1954, *Licht*, 1 ♂ (Hö); Carinthia, H. Obir, *H.A.*,
18. VIII. 1954, 1 ♀ (Hö) det. EW, 1 ♀;

Psallus quercus (KIRSCHBAUM, 1856)
Vbg., Feldkirch, 4 ♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain,
VI. 1959, 1 ♂ (Hö) det. EW;

Psallus falleni REUTER, 1883
Carinthia, *Magdalensbg.*, 12. VII. 1958, 1 ♀ (Hö) <sub.
Orthops cervinus>;

Psallus haematodes (GMELIN, 1790)
Styr., Bärndf. b. Rtt., 3 ♀ 1 ♂** (Mo); Carinthia, *Magda-*
lensbg., 13. VIII. 1958, *Licht*, 1 ♂* det. EW sub. scholtzi
(Hö);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) unter dem Synonym *P. roseus*
publiziert. Von *HÖLZEL (1969) als *P. scholtzi* (= *P. salicis* KIRSCHBAUM)
publiziert.

Psallus luridus REUTER, 1878
Carinthia, Loiblthal, *Tunnel*, 26. VI. 1954, *Licht*, 1 ♂*#
(Hö) det. EW; Carinthia, *Magdalensbg.*, 21. VII. 1958,
Licht, 1 ♂# det. EW (Hö);
Anm.: Von HÖLZEL * (1958a) bzw. # (1969), z. T. mit anderen Fund-
daten, publiziert.

Psallus vittatus (FIEBER, 1861)
Carinthia, *Magdalensbg.*, 21. VII. 1958, 1 ♀ 6 ♂,
13. VIII. 1958, 4 ♂ (Hö);

Salicarus roseri (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)
Carinthia, Klagenfurt, 20. VI. 1949, 1 ♀ 1 ♂ (Priesner)
det. EW; Carinthia, Sattnitz-West, VI. 1959, 1 ♀ (Hö);

Sthenarus rotermundi (SCHOLTZ, 1847)
Vbg., Feldkirch, 11.VIII.1939, 2♀ (Mo);

Tinicephalus hortulanus (MEYER-DÜR, 1843)
Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 1♀ (Mo); [CZ] Boh.,
Karl. Týn, 16.VI.5?, 1♀2♂ (Roubal);

Tuponia hippophaes (FIEBER, 1861)
Vbg., Nüziders, 17.VII.1942, *Myricaria*, 2♀ (Mo);

Fam. Nabidae

Alloeorhynchus flavipes (FIEBER, 1836)
Cr., Grafenstein, 19.IV.1947, 1♀ (Hö);
Anm.: Von HÖLZEL (1952, 1954a) publiziert.

Prostemma guttula guttula (FABRICIUS, 1787)
[CZ] Böhmen, aS, 1♂; [GE] Maintal, G., VIII.1955, 1
Larve;

Prostemma aeneicolle STEIN, 1857
Carinthia, Viktring, oD, 1♀* (Hö); Ma. Saalbg.,
13.III.1949, *trunc.*, 1♂* (Priesner); Cr., Grafenstein,
20.IV.1950, *rip.*, 1♂* (Hö); Carinthia, Schütt,
26.IV.1953, 1♂ (coll. Herrmann);
Anm.: Von *HÖLZEL (1952, 1954a) publiziert.

Himacerus apterus (FABRICIUS, 1798)
Carinthia, Ma. Saalerberg, oD, 1♀ (Hö); Carinthia, Ma-
ria Rain, 28.VII.1945, 1♂, VII.1952, *gram.*, 1 Larve det.
EW, 14.IX.1952, *gram.*, 1♀, VI.1959, 1♀ (Hö); Ca-
rinthia, Viktring, VIII.1945, *hort.*, 1♀, 10.X.1961, *hort.*
1 Ex. (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., *Kreuzbergl.*
VIII.1946, 1♀ (Hö); Karawanken, *Dolich.*, 7.IX.1954,
1♀ (Hö); Carinthia, Rosental, 15.VIII.1956, 1♀ <ma-
kropter> (Hö);

Himacerus mirmicoides (O. COSTA, 1834)
Carinthia, M. Saalerbg., oD, 1♂ (Hö); Carinthia, Kla-
genfurt Umg., 30.VIII.1945, *Heide*, 1♀ (Hö); Koschuta,
Cr., Hudajama, 12.VI.1948, 1♂ (Hö); Carinthia, Satt-
nitz-Ost, *Haimach*, 24.IV.1949, 1♀ (Hö); Carinthia, M.
Saaler Bg., 5.III.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, *Grafen-
stein*, 6.VIII.1950 1♀ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt
Umg., 5.III.195?, 1♂ (Hö); [IT] *Lago d. Cavazzo*, I.,
VI.1952, *Herbert*, 1♀; Carinthia, Viktring, 16.IX.1952,
Calluna, 1♀ (Hö); Carinthia, *Lavamünd.*, 12.V.1954, 1♀
(Hö); Carinthia, *Schwabeck*, 19.IX.1957, 2♂ (Hö); Ca-
rinthia, Sattnitz-West, *Grafenbach*, 3.VII.1961, 1♀
(Hö);

Nabis flavomarginatus SCHOLTZ, 1847
Hlg. blut <=Heiligenblut>, 6.IX.1913, 1♀* (Pu); Vbg.,
Feldkirch, oD, 2♀ (Mo);
Anm.: Das Exemplar aus Heiligenblut (leg. Puschnig) steckte unter
„*N. limbatus*“ und wurde von *PROHASKA (1923) auch unter diesem
Namen publiziert.

Nabis brevis brevis SCHOLTZ, 1847
Car., *Illitsch-Alp.*, 23.IX.1945, 1♂ (Strupi); Carinthia,
Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♂ (Hö);

Nabis ferus (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, *Viktring*, 22.III.1946, *hort.*, 1♂ (Hö); Car.,
Umgb. Kolbnitz, *Brückenbachgraben*, 4.IX.1949, 1♀1♂
(Strupi);

Nabis punctatus punctatus A. COSTA, 1847
Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, 11.VIII.1945,
3♀2♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Pyr.kg.*,
15.II.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, *Dobra m.*, 1.VI.1949,
pal., 1♂ (Hö); Klagenfurt, *Stadtwohnung*, 15.XI.1956,
1♀, 19.XI.1956, 1♂ (Demelt); Klagenfurt, *Stadtg.*,
9.XII.1956, 1♀ (Demelt);

Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)
Carinthia, Sattnitz-Ost, *Petelinz*, 20.VI.1945, *Genista
tinctoria*, 1♀ (Hö); Carinthia, Rosental, *Haimach*,
12.VIII.1945, 1♂ (Hö); Car., Umgb. *Villach*, *Kanzia-
nibg.*, 25.III.1946, 1♀2♂ (Strupi); Cr., Koschuta, Hu-
dajama, 7.V.1946, 1♀ (Hö); Car., Umgb. *Thörl*, *Gailitz*,
14.V.1946, 1♀ (Strupi); Cr., Illitsch, *Karawanken*,
22.IX.1946, 1♀ (Strupi); Karn. Alpen, *Rattendf. A.*,
28.V.1949, 1♀ (Hö); Carinthia, Ma. Saaler Bg.,
14.VI.1949, 1♀, 17.IV.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia,
Klagenfurt, 10.VII.1949, 1♂, 20.IX.1949, 1♀ (Pries-
ner); Carinthia, Maria Rain, 15.VIII.1952, 1♂ (Hö);
Carinthia, Keutschach, *FT.*, 17.IX.1952, *carex. aln.*, 1♂
(Hö); Carinthia, *Sauvalpe*, 8.VI.1953, 1♀ (Hö) det. EW;
Carinthia, Keutschach, *Süd*, 30.VII.1953, 1♀, *Brw.*,
26.VIII.1953, 1♀, 1.IX.1953, 1♂ (Hö); Ossiach. Tau-
ern, Köstenberg, 4.IV.1961, *Carex*, 1♀ (Hö) det. EW;

Fam. Anthocoridae

Acompocoris pygmaeus (FALLÉN, 1807)
Styr., Kaiserau, 2♀ (Mo);
Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Anthocoris confusus REUTER, 1884
Carinthia, Viktring, *Weidenkätzch*, IV.1947, 1♂ (Hö);
Anm.: Das Exemplar wurde von HÖLZEL (1954a) als *Acompocoris py-
gmaeus* publiziert und diese Angabe bereits von FRIEß et al. (1999) an-
gezweifelt.

Anthocoris gallarumulmi (DE GEER, 1773)
Styr., Pürgg, 2♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost,
6.V.1953, *Gurnitz*, 1♂ (Hö) det. EW;

Anthocoris limbatus FIEBER, 1836
V., Dornbirn, 2.V.1934, 1♀ (Mo);

Anthocoris nemoralis (FABRICIUS, 1794)

Carinthia, Maria Rain, 1 Ex.* ohne Abdomen, 28.III.1948, sal. flor. (Hö); Cr., Karaw., Turm-Alpe, 20.VII.1948, 1 ♀ (Hö);

Anm.: Vermutlich der von *HÖLZEL (1954) als *A. gallarum-ulmi* publizierte Beleg.

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)

Carinthia, Sattnitz-West, 1 ♀, oD, (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Wintschach, VIII.1945, 1 ♀ (Hö); Car., Umgb. Vorderberg, Wildbachgr. Gailtal, 22.X.1945, 1 ♀ (Strupi); Cr., Koschuta, Hudajama, 28.IV.1946, 2 ♀ (Hö); Karawanken, Waidisch, 17.VI.1946, 1 ♀ 1 ♂ (Hö); Carinthia, Sau-Alpe, VII.46, 1900m, 1 ♀ (Hö); Karawanken, Boddental, 25.IX.1946, 1 ♂ (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgr., 27.V.1949, gram., 1 ♀, 19.VI.1949, aln., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Barental, Stoubhütte, 4.VII.1954, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 14.VI.1958, 1 ♀ (Machacek);

Anthocoris pilosus (JAKOVLEV, 1876)

Vbg., Feldkirch, 2.VIII.1937, Artemisia, 3 ♀, oD, 1 ♀ 1 ♂ (Mo); Carinthia, Viktring, 6.IX.1955, dom., 1 ♀ (Hö);

Elatophilus nigricornis (ZETTERSTEDT, 1838)

Vbg., Göfis, oD, 1 ♀ (Mo); Vbg., Nüziders, oD, 1 ♀ (Mo);

Anm.: Eine selten gefundene Art, die an *Pinus* in höheren Lagen vorkommt. Erstmeldung für Vorarlberg.

Temnostethus pusillus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

V., Bludenz, oD, 1 ♀ (Mo);

Tetraphleps bicuspis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

2 ♀, oE; Styr., Bärndf. b. Rtt., 1 ♀** (Mo); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenlacke, 3.VII.1961, 1 ♀ (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Orius sp.

[GE] Borkum, 1 ♀, aS; Möderndorf, Verbasc., 24.VII.1921, 1 ♀; Carinthia, Sattnitz-West, oD, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 28.III.1948, sal. flor., 5 ♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 11.VIII.1945, 1 ♀, III.1948, sal. flor., 4 ♀, V.1955, 1 ♀, 2.X.1955, Zimmer, 1 ♀ (Hö); Car., Umgb. Villach, Kanzianiberg, 25.III.1946, 1 ♀ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-Ost, Annabrck, 12.IV.1946, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 7 Hügel, VIII.1947, sal., 2 ♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 5.XI.1953, cort. fag., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Buchscheid, 23.X.1953, pal., 1 ♀ (Hö);

Anm.: Vermutlich *O. minutus* und/oder *O. majusculus*; es liegen aber nur Weibchen vor, die nicht zweifelsfrei zuzuordnen sind.

Orius minutus (LINNAEUS, 1758)

Carinthia, Viktring, 24.X.1945, hort., 1 ♂ (Hö);

Orius niger (WOLFF, 1811)

Carinthia, Klagenfurt Umg., Seegründe, 21.IX.1957, 1 ♀ 1 ♂ (Hö);

Dufouriellus ater (DUFOUR, 1833)

unter Buchenrinde, 1 ♀; [GE] Hamburg, Hummelsbüttel, 4.XI.1932, 1 ♀;

Lyctocoris campestris (FABRICIUS, 1794)

Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 1 ♀ (Mo); Carinthia, Rabenstein, 23.IV.1952, Linde, 2 ♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VIII.1956, Licht, 1 ♂* (Hö) det. EW; Carinthia, Keutschach, 21.XII.1961, hort., 1 ♀ (Hö); Cr., Karnburg, 5.IX.1968, 1 ♀# (Sampl);

Anm.: Von EW als *L. dorni* Wagner determiniert und etikettiert, von *HÖLZEL (1958a, 1969) publiziert. Das Taxon wurde später mit *L. campestris* synonymisiert. Möglicherweise das von #HÖLZEL (1969) als *Anthocoris confusus* gemeldete Exemplar.

Xylocoris galactinus (FIEBER, 1836)

Car., Pischeldorf, oD, 1 ♀* (Mo); Vbg., Feldkirch, oD, 2 ♀ 1 ♂ (Mo);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Xylocoris cursitans (FALLÉN, 1807)

Car., Pischeldorf, oD, 1 ♀ 2 ♂ (Mo) det. Singer; Krt., Korallengebiet, Eichenrinde, 1948, 1 ♀ (C.v.Demelt); Carinthia, Viktring, 15.III.1948, cort. frax., 2 ♀ 1 ♂ (Hö); Cr., Karawanken, Ogrisalm, 15.V.1948, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 6.IV.1952, cort. fag., 1 ♀ (Hö); Cr., Karawanken, Eiskeller-Matz., 5.VI.1952, musc., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 5.XI.1953, 1 ♀ (Hö); Cr., Karawanken, Loibltal, XI.1959, cort. pin., 1 ♂ (Hö);

Fam. Cimicidae

Cimex lectularius LINNAEUS, 1758

Carinthia, Mallnitz, VIII.1964, 1 ♀ (Hö);

Fam. Reduviidae

Empicoris culiciformis culiciformis (DE GEER, 1773)

Vbg., Feldkirch, Thuja 17.VII.1933 1 ♀, oD 1 ♀ (Mo); Klagenfurt, Am Museumsfenster 30.VIII.1968, 1 ♀* (Sampl);

Anm.: Von *HÖLZEL (1969) mit anderen Funddaten publiziert.

Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)

[CZ] Böhm., aS, 1 ♀; oE, aS, 1 ♀; <beide Ex. zur var. pilosus>

Peirates hybridus (SCOPOLI, 1763)

Carinthia, Rosental, Unterbergen, 24.V.1947, 1 Ex.*# <ohne Abdomen> (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Pyr.kg., 14.IV.1951, 1 ♀# (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Mökriach => Mokriach, 22.IV.1954, 1 ♂ (Hö);

Anm.: Von HÖLZEL *(1952) bzw. # (1954a) publiziert.

Phymata crassipes (FABRICIUS, 1775)
Vbg., Feldkirch, 27.VI.1934, 2♂ (Mo); [IT] *Chiusa-forte* <=Friaul>, 14.IV.1951, 1♂ (Herbert <=leg. H. Hölzel>); Cr., Karawanken, *Dolich*, VI.1954, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Skarbin, 16.VI.1963, 2♂, 16.V.1964, 1♂ (Hö);

Phymata monstrosa (FABRICIUS, 1794)

2 Ex., aS, oE;

Anm.: Ob es sich hier um die beiden von PROHASKA (1923) gemeldeten Exemplare aus Warmbad Villach handelt, kann ohne Etikettierung nicht gesagt werden. Jedenfalls ist *P. monstrosa* eine westeuropäische Art, die bei uns nicht vorkommt.

Reduvius personatus (LINNAEUS, 1758)

[CR] *Spalato* <=Split>, oD, 1♀; *Pappelmorogart, Juni 1910*, 1♀*; Vbg., Feldkirch, 27.VIII.1935, 1♀, oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Viktring, 10.VIII.1954, dom. 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., VII.1955, mur., 1♀ (Hö); [CR] Adriaküste b. Novi, Jugosl., 15.VI.1965, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, *Zimmer*, 3.VIII.1967, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Pygolampis bidentata (GOEZE, 1778)

Europ, oD, aS, 1♂; *Seeausfluß*, 23.VIII.1914, 1 Larve* (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, *Alm*, 10.V.1945, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 2.IX.1949, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, *Dolich*, 14.V.1950, 1♂ (Hö); Klgf., St.Ruprecht, 1952, 1♀ (Demelt); Carinthia, Viktring, 18.V.1969, dom. mur., 1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Oncoccephalus squalidus (ROSSI, 1790)

[MC] Petrina plan., Macedonis, 1600m, 3♀2♂ (Thurner);

Anm.: Vermutlich die von WAGNER (1960) publizierten Exemplare.

Coranus kerzhneri P. V. PUTSHKOV, 1982

[IT] *Monfalcone (Istrien)*, 9.IX.1907, 1♀ (Pu); [CR] *Orsera (Istrien)* <=Vrsar>, 18.IX.1910, 1♀ (Pu);

Coranus woodroffei P. V. PUTSHKOV, 1982

Vbg., Feldkirch, 6.VII., 1♀, 25.VII.1940, 2♂ (Mo);

Anm.: Die Verbreitung dieser Art in Österreich ist noch wenig bekannt. Erstmeldung für Vorarlberg.

Rhynocoris annulatus (LINNAEUS, 1758)

Dobratchschütt, 21.V.1910, 1♀* (Pu); *Turracherhöhe*, VIII.1919, leg. Treven, 1♀* (Pu); Karawanken, *Bodental*, 8.VI.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Ma. Saaler Bg., 14.VI.1949, 1♀ (Priesner);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Rhynocoris iracundus (PODA, 1761)

Lußnitz, (Fellaauen), 29.VI.1908, 1♀* (Pu); *Sattnitz*, 25.VI.1922, 1♀* (Pu); Kärnten, Ulrichsberg, 30.V.194?, 1♀ (Machacek); *Dobrowa*, 6.VII.1942, 1♀; Carinthia,

Ma. Saaler Bg., 14.VI.1949, 3♂ (Priesner); Klagenfurt, Umgebung, 17.VIII.195?, 1♂ (Machacek);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. PROHASKA (1923) schreibt: „Die Mehrzahl unserer Stücke zur var. *rubricus* Gmel. gehörig“. *Rhynocoris rubricus* wurde später zur Art erhoben, die sehr variable, dunkle Zeichnung der Hintertibien ist aber kein sicheres Unterscheidungsmerkmal zu *R. iracundus*. Nach der Form der Genitalkapsel, der Parameren und der Chitinstäbe der Phalothek sind die hier vorliegenden Männchen eindeutig zu *R. iracundus* zu stellen. Ob *R. rubricus* wirklich in Kärnten vorkommt, bedarf noch der Bestätigung.

Fam. Aradidae

Aneurus avenius avenius DUFOUR, 1833

Car., Pischeldorf, 26.VII.1931, 1♂*# (Mo); Saualpe, *Grafenbach*, 20.VI.1958, aln., 1♀# (Hö);

Anm.: Von HÖLZEL *(1954a) und #(1969) publiziert.

Aneurus laevis laevis (FABRICIUS, 1775)

Böhmen, 1♀1♂, aS; Berge südl. St.Paul, *Corylus avelana hinter Rinde*, 1.IV.1959, 1♀1♂* (Demelt);

Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Aradus betulae (LINNAEUS, 1758)

Karawanken, *Koschuta*, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 24.IV.1954, *fag.* 1♀ (Hö) det. EW; Carinthia, Maria Rain, 3.VII.1954, *cort. fag.* 1♂ (Hö); Carinthia, Karawanken, *Bärental*, VIII/VIII.1956, 2♂ (Demelt);

Aradus betulinus FALLÉN, 1829

Karawanken, *Koschuta*, oD, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, 25.IV.1946, 1♀* (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgrb., 2.VI.1952, *fr. fag.*, 1♂* (Hö); Carinthia, Keutschach, *Dobein cort.*, 21.IX.1952, 1♂* (Hö); Carinthia, *Saualpe*, 8.VI.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, *Grebenze*, 12.VII.1954, 1♀ (Hö) det. EW sub *corticalis*; Carinthia, *Saualpe*, 9.X.1957, *Weissenbachgr.*, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Waidisch*, 2.IV.1959, *cort. pin.*, 2♀1♂ (Hö); Cr., Koralpe, Koglereck, *Tiefengrabenweg*, 16.VI.1962, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Aradus cinnamomeus PANZER, 1806

[?] Naturk. Heim. Mus. Leipzig, *Dol.* 4.V.1913, 1♀ (R.Buch); Vbg., Frastanz, 3♀ (Mo);

Aradus conspicuus HERRICH-SCHÄFFER, 1835

Cr., Karawanken, Illitsch, 13.VI.1947, 3 Ex. (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, 25.X.1952, *cort. fag.*, 1♀1♂ 3 Larven (Hö);

Aradus corticalis LINNAEUS, 1758

Styr., Kaiserau, 1♀1♂ (Mo); Carinthia, H. Obir, 1.VIII.1954, *Picea*, 1♀1♂ (Hö);

Aradus crenaticollis R. F. SAHLBERG, 1848

Cr., Koschuta, Hudajama, 9.V.1946, 1♀ (Hö) det. Heiss; Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Aradus depressus depressus (FABRICIUS, 1794)

Styr., Bärndf. b. Rtt. 1♂^{**} (Mo); Car., Umgb. Pöckau, Kokragraben, 1.X.1946, 1♂^{*} (Strupi); Cr., Koschuta, Hudajama, 12.VI.1948, 1♀ (Hö); Carinthia, Saualm, 23.V.1958, 1♀, St. Walpurga am Rucksack (Hö); Anm.: Von ^{**}MOOSBRUGGER (1946) bzw. von ^{*}HÖLZEL (1954a) publiziert.

Aradus ribauti WAGNER, 1956

Carinthia, Maria Rain, 14.I.1950, 1♀ (Priesner) det. Heiss;

Anm.: Diese Rindenwanze lebt an Pappeln. In Österreich ist sie bisher aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bekannt. Erstmeldung für Kärnten.

Aradus versicolor HERRICH-SCHÄFFER, 1835

Carinthia, Klagenfurt, 10.VII.1949, 1 Larve (Priesner);

Fam. Piesmatidae

Piesma capitata (WOLFF, 1804)

Cr., Pischeldf., oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Loibltal, Tscheppe, <Datum unleserlich>, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Rauschelesee, 15.X.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Launsdorf, 18.IX.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 1.IV.1947, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, Taubenkot, 27.IV.1951, 1♂, 15.IV.1952, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 28.IV.1952, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, 5.XI.1953, 1♂ (Hö), det. EW;

Piesma maculatum (LAPORTE, 1833)

Hermagor, Ackerunkraut, 20.VIII.1922, 1♀ 1♂^{*} (Prohaska); Carinthia, Sattnitz-Ost, Brunnstube, 4.XI.1945, 2♀ (Hö); Carinthia, Haimach, 20.III.1946, 1♀ (Hö); Umgb. Villach, Car., Kanzianiberg, 25.III.1946, 1♀ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-Ost, Annabrck, 12.IV.1946, 2♀ (Hö); Ebental, Cr., 22.V.1947, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Kalbreinskg, IV.1949, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, oD, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, Dobein, cort., 21.IX.1952, 1♀ (Hö); Carinthia, Buchscheid, 23.X.1953, pal., 2♀ 1♂^{*} (Hö);

Anm.: Vermutlich von ^{*}PROHASKA (1923) publizierte Exemplare.

Fam. Berytidae

Berytinus clavipes (FABRICIUS, 1775)

Vbg., Feldkirch, 25.IV.1932, 2♂, oD, 1♂ (Mo); Radmannsdorf, Carn., oD, 1♀; Windische Höhe, Gailtaler Alpen, 16.VI.1948, 1♂ (Strupi); Karawanken, Cr., Jovanbg., VII.1952, 1♀ det. EW, 2♂ (Strupi);

Berytinus hirticornis hirticornis (BRULLÉ, 1836)

Car., Pischeldorf, oD, 1♂^{*} (Mo); Dübener Heide, Schmiedeberg, 10.VIII.1936, 2♀ 2♂ (Feige);

Anm.: Von ^{*}HÖLZEL (1954a) publiziert.

Berytinus minor minor (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Dobratch Alp., Cr., 20.IV.1946, 1♂ (Strupi); Koschuta, Cr., Hudajama, Turm, 5.VI.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 28.III.1948, 1♂ (Hö); Karawanken, Cr.,

Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀ (Hö); Karawanken, Bodental, Cr., 6.X.1957, cort., 1♀ (Hö); Carinthia, Saualpe, Weißenbachg., 9.X.1957, 1♂ (Hö);

Berytinus crassipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Carinthia, Maria Rain, 28.IV.1952, 1♀^{*} (Hö); Carinthia, Keutschach, 21.IX.1952, Dobein, cort., 1♀^{*} (Hö);

Anm.: Von ^{*}HÖLZEL (1954a) publiziert.

Berytinus signoreti (FIEBER, 1859)

Bärndf. b. Rttm., oD, 1♂ (Mo); Karawanken, Cr., Rosica, Almgras, 16.IX.1951, 1♂ (Hö);

Neides tipularius (LINNAEUS, 1758)

Car., Pischeldorf, 24.VII.1931, 1♂ (Mo); [GE] Dessau, 29.IX.1933, 1♂ (Feige);

Gampsocoris culicinus culicinus SEIDENSTÜCKER, 1948

Styr., Bärndf. b. Rtt., 1♂ (Mo);

Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) als *G. punctipes* publiziert, vgl. auch RABITSCH (1999).

Gampsocoris punctipes punctipes (GERMAR, 1822)

[GE] Blankenburg, Thüringen, 21.V.1920, 1♂ (Feige);

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Styr., Bärndorf, 15.VIII.1931, *Circaea alpina*, 1♂^{**} (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Annabrück, 12.IV.1946, fr., 1♂^{*} (Hö);

Anm.: Von ^{**}MOOSBRUGGER (1946) publiziert. Von ^{*}HÖLZEL (1954a) mit anderen Funddaten publiziert.

Fam. Lygaeidae

Arocatus roeselii (SCHILLING, 1829)

Car., Pischeldorf, 26.VII.1931, 1♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain, 10.VII.1945, 1♀ (Hö); Ulrichsberg, Krnt., 1952, 1♂ (Demelt); Klagenfurt Stadt, Lendkanal, VI.195?, 1♀ (Demelt); Carinthia, Viktring, III.1965, mur., 1♀, 20.-28.VI.1966, mur., 1♀ (Hö);

Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)

Styr., Mautern, oD, 1♀ (Mo); Koralpengebiet, Krt., 1948, 4♀ 2♂ (Demelt); St. Martin bei Teschling a WS, 27.VI.1946, 1♂ (Hoschek);

Melanocoryphus alboacuminatus (GOEZE, 1778)

Koralpengebiet, Krt., 1948, 3♀ (Demelt); Carinthia, Sattnitz-West, cort.pin., 30.XI.1952, 4♀ 1♂^{*} (Hö); Ma. Rain, 21.VIII.1955, 1♂ (Dem.);

Anm.: Von ^{*}HÖLZEL (1953) publiziert.

Horvathiolus superbus (POLLICH, 1781)

Schweiz, 1♀, aS;

Spilostethus pandurus (SCOPOLI, 1763) © Landesmuseum für Kärnten; download unter: www.biologiezentrum.at
1♀ 1♂, oE, aS; *Dalmatien*, 1♂; [CR] Istrien, *Rovinj*, IV.1959, 1♀ (Demelt);

Spilostethus saxatilis (SCOPOLI, 1763)

Carinthia, Rosental, 2.IX.1945, 1♀ (Hö); Umgb. *Vil-lach*, Car., *Kanzianiberg*, 25.III.1946, 4♀ 3♂ (Strupi); Karaw., Turm - Alpe, Cr., 24.IX.1950, 2♀ 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Waidisch*, IX.1961, 1♂ (Hö);

Tropidothorax leucopterus (GOEZE, 1778)

Styr., Pürgg, 24.VIII.1931, 1♀, oD, 1♂ (Mo);

Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Nithecus jacobaeae (SCHILLING, 1829)

Oberhof (Metnitz. T.), VIII.1908, 1♀* (Pu); *Ursulaberg*, 24.VIII.1913, 1♂* (Pu); *Turracherhöhe*, VIII.1919, leg. *Treven*, 1♀*, 1♀ 1♂ in Kopula (Pu); Koschuta, Cr., Hudajama, 1.IX.1945, 3♀ 2♂ (Hö); Carinthia, *Plöcken*, 26.VII.1948, 2♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Grafenstein*. A., 9.VIII.1950, 1♀ 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., <Fundort unleserlich>, 14.VIII.1954, 1♀ 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Loiblal Tunnel*, 6.VIII.1959, 1♀ 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Matzen-Wolfsberg*, VIII.1961, 1♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Nysius senecionis senecionis (SCHILLING, 1829)

Cr., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo); Krt., Korallengebiet, 1948, 1♀ (Demelt); Carinthia, Klagenfurt Umg., oD, 1♀ (Hö) det. EW sub. thymi; Carinthia, Klagenfurt Umg., III.1948, 1♀ 1♂ 3.IX.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, I.1949, 1♂ (Hö); Carinthia, Ma. Saaler Bg., 17.IV.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 8.II.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, Keutschach, *Brw.*, 26.VIII.1953, 1♀ (Hö) det. EW, 1♀ (Hö) det. EW sub thymi; [MC] *Petrina plan.*, *Macedonis*, 1600m, 1♂ (Thurner) det. EW;

Nysius ericae ericae (SCHILLING, 1829)

[CZ] Böhmen, aS, oD, 2♀; Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 2♀ (Mo);

Nysius thymi thymi (WOLFF, 1804)

Kärnten, aS, 1♂; Carinthia, aS, 1♀;

Nysius helveticus (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)

Carinthia, Klagenfurt Umg., 3.IX.1950, 1♂ det. EW. 1♀ <sub. Ortholomus> (Hö);

Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHÄFFER, 1838)

Vbg., Feldkirch, 3.VIII.1933, 2♂ (Mo); Vbg., *Feldkirch*, oD, 1♀;

Kleidocerys resedae (PANZER, 1797)

Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Cr., *Pischeldorf*, 1♀ 1♂; Carinthia, Klagenfurt, *Küchenfenster*, 20.X.1945, 1♂

(Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 4.XI.1945, 1♂, 18.X.1952 1♂ (Hö); Koschuta, Cr., Hudajama, 8.V.1946, *Grasalm*, *Rhodod.* <=Rhododendron>, 3♀ 1♂ (Hö); Illitsch, Cr., Karawanken, *Abornrinde*, 22.IX.1946, 1♂ (Strupi); Carinthia, Klagenfurt, 17.IV.1949, 1♀ (Priesner); Carinthia, Maria Saalerberg, 14.VI.1949, 1♀ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., *M. Saalerberg*, 18.VIII.1953, 1♀ (Hö); *Klagenfurt*, 25.VIII.1987, 1♀ (leg. ?);

Cymus aurescens DISTANT, 1883

Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo);

Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Cymus glandicolor HAHN, 1832

Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, VII.1945, pal., 1♀ 2♂ (Hö); *Verditz Alp.*, Car., 29.V.1946, 2♀ 2♂ (Strupi); Carinthia, Maria Rain, 2.VIII.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, Grafenstein, 21.X.1953, pal., 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Dobein*, 12.V.1959, 1♀ (Hö); Wimitz, Cr., *Dabromoos*, 16.IX.1959, 2♀ (Hö);

Cymus melanocephalus FIEBER, 1861

Grafenstein, Cr., 1.X.1950, *Pirk.*, pal., 3♀ 2♂ (Hö); Carinthia, Grafenstein, 21.X.1953, pal., 1♀ (Hö); Karnische Alpen, *Doberbachgrb.*, 10.X.1950, *cort.*, 1♀ (Hö); Carinthia, *Thoner Moos*, 27.X.1961, *Scirp.*, 2♀ (Hö);

Ischnodemus sabuleti (FALLÉN, 1826)

[GE] Fürstenberg i.M., oD, 2♂ (Konow); [GE] *Zöbiger b. Leipzig*, 11.IX.1932, 1♀ (Michalk);

Henestaris halophilus (BURMEISTER, 1835)

[GE] Wormsleben, 20.III.1920, 1♀ (Feige)

Geocoris grylloides (LINNAEUS, 1761)

1 Ex., oE, aS;

Geocoris ater (FABRICIUS, 1787)

Neusiedlersee, oD, 2♀ 1♂ (Priesner);

Chilacis typhae (PERRIS, 1857)

[GE] Hamburg, Freschenhausen, 20.VIII.1933, 1♂ (leg. ?); Carinthia, *Rauschelesee*, 4.VIII.1968, pal., 1♀ 2♂* (Sampl);

Anm.: Von *HÖLZEL (1969) mit anderen Funddaten publiziert.

Heterogaster artemisiae (SCHILLING, 1829)

[CZ] Böhmen, 2♂, aS; Pischeldorf, oD, 1♀* (Mo);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Heterogaster cathariae (GEOFFROY, 1785)

1♀, oE; [GR] *Peloponnes*, 12.-20.VI.1958, 2♀ 1♂ (Thurner) det. EW;

Heterogaster urticae (FABRICIUS, 1775)

[CZ] Böhmen, 1♀, aS;

Platyplax salviae (SCHILLING, 1829)

Car., Pischeldf, oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Maria Rain, *cort. fag.*, 20.III.1954, 1♂ det. EW, 20.III.1954, 1♀, V.1959, 1♀, VI.1959, 1♀, 5.VI.1960, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Klopeiner See*, 28.IV.1954, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Skarbin*, 13.VI.1963, 2♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Gleinach*, 3.VIII.1969, 1♀ (Hö);

Tropidophlebia costalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1850)

1 Ex., oE, aS;

Oxycarenus modestus (FALLÉN, 1829)

Car., Pischeldorf, 26.VII.1931, 1♀ (Mo); Cr., *Pischeldorf*, oD, 1♀; Carinthia, Maria Rain, 14.IX.1952, *gram.*, 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., *Dolich*, 15.VI.1958, 1♂ (Hö);

Macroplax preysleri (FIEBER, 1837)

Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo); Cr., *Pischeldorf*, oD, 2♀; Dobratsch Alp., 20.IV.1946, 2♀ (Strupi);

Macroplax fasciata fasciata (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

[MC] Macedonia, Stari Dojran, 9.VI.1955, 1♀ (Thurner) det. EW;

Plinthis pusillus (SCHOLTZ, 1847)

Karawanken, Bodental, Cr., 6.VI.1951, 1♀ (Hö) det. EW;

Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Plinthis brevipennis (LATREILLE, 1807)

[GE] Eisleben, 20.IX.1935, 2♀ <makropter> (Feige); Frankenhs. <=Frankenhausen>, 29.VI.1923, 1♀ <brachypter> (Feige);

Tropistethus holosericus (SCHOLTZ, 1846)

Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo);

Drymus latus latus DOUGLAS & SCOTT, 1871

Carinthia, Viktring, 11.IX.1950, *dom.mur.*, 1♀ (Hö) <sub. M. chiragra>;

Drymus pilicornis (MULSANT & REY, 1852)

Vbg., Göfis, 26.IX.1932, 1♀1♂ (Mo);

Drymus brunneus brunneus (R. F. SAHLBERG, 1848)

Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1♀** (Mo); Carinthia, Sattnitz-West, oD, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 22.X.1945, *Brw. pal.*, 1♂, 2.VIII.1949, *rip.*, 1♀1♂, 14.VIII.1949, *rip.*, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 7.XI.1945, 1♂ (Hö); Cr., Umgb. Villach, *Teich b. Magdalenensee*, 7.X.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, 20.IX.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia, Keutschach, *F.T.*, 17.IX.1952, 2♀* (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert. *Als *D. picinus* (= *D. ryeii* Dgl. & Sc.) eingeordnet und vermutlich z. T. von HÖLZEL (1953, 1954a) publiziert.

Drymus ryeii DOUGLAS & SCOTT, 1865

Carinthia, Sattnitz-West, *Grafenlacke*, 27.X.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 4.XI.1945, *Carex*, 1♀, *Kappa Teich*, 1♀ (Hö); Carinthia, *Brückl*, 13.IX.1945, 1♀1♂ (Hö); Car., Umgb. Villach, *Kanzianiberg*, 25.III.1946, 1♀1♂ (Strupi); Cr., Koschuta, Hudajama, 28.IV.1946, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Bärenthal, 4.V.1946, 1♀ (Hö); Cr., Grafenstein, 19.IV.1947, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, IV.1948, *hort.*, 1♂ det. EW <sub. sylvaticus>, V.1955, 1♀ (Hö); Karnische Alpen, Hoher Trieb, *Bischof-A.*, 31.VI.1950, 1♀* (Hö); Carinthia, Keutschach, *F.T.*, 17.IX.1952, 1♀*, 12.IV.1955, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, Sattnitz-Ost, *Gurnitz*, 5.V.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, *Lavamünd*, 12.V.1954, *Ostrya*, 1♀ (Hö); Carinthia, *Thoner Moos*, 27.X.1961, *Scirp.*, 1♀1♂# (Hö) det. EW;

Anm.: Von HÖLZEL * (1953, 1954a, unter dem Synonym *D. picinus*) bzw. # (1969) publiziert.

Drymus sylvaticus (FABRICIUS, 1775)

Carinthia, Sattnitz-West, 12.IV., *trunc.*, *Opfl.*, 1♀ (Hö);

Lamproplax picea (FLOR, 1860)

Vbg., Feldkirch, oD, 1♀1♂ (Mo);

Gastrodes abietum BERGROTH, 1914

Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1♀** (Mo); *Illitsch-Alp.*, Car., 23.IX.1945, 1♂ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, 23.III.1949, *pin.*, 1♀ (Hö); Karnische Alpen, Rattendorferalm, 7.X.1950, 1♀ (Hö); Karawanken, Bodental, Cr., 27.III.1953, *Schnee*, 1♀ (Hö); Carinthia, *Magdalenensbg.*, VIII.1959, *Licht*, 1♀ (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Gastrodes grossipes grossipes (DE GEER, 1773)

Styr., Bärndf. b. Rtt., 31.VIII.1931, 1♀** (Mo); [GE] Frankenhausen, Kyffhäuser, 20.V.1935, *Kiefer*, 1♂ (Feige); Koschuta, Cr., Hudajama, 19.V.1946, *Pin. montan.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 15.II.1947, 1♂, III.1948, 1♂ (Hö); K., Lavanttal, *Wolfsberg*, 25.III.1948, 1♂ (Demelt); Krt., Korlpengeb., 1948, 1♀ (Demelt); Carinthia, Sattnitz-West, II.1953, 1♂ (Hö); Karawanken, Bodental, Cr., 27.III.1953, *Schnee*, 1♂ (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Ischnocoris hemipterus (SCHILLING, 1829)

Car., Pischeldorf, 26.VII.1931, 1♀ (Mo); Cr., *Pischeldorf*, oD, 1♂; Carinthia, Sattnitz-West, 28.III.1952, 1♀1♂ (Hö);

Eremocoris abietis (LINNAEUS, 1758)

Koschuta, Cr., Hudajama, 7.V.1946, *Latsche*, 1♀2♂*, 17.VI.1953, 1♀ (Hö); Karawanken, Bärenthal, Cr., 18.VII.1954, 2♀1♂ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Eremocoris plebejus (FALLÉN, 1807)

Ulrichsberg Gipfel, 21.V.1916, 1♀* (Pu); Vbg., Feldkirch, oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Sattnitz-West, oD, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, VI.1945, hort., 1♀ (Hö); Karawanken, Cr., Singerberg, 30.X.1945, 1♀, 20.III.1948, 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, 15.I.1950, 1♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, F.T., 17.IX.1952, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, Dobein, 21.IX.1952, 1♂ (Hö); Ossiach, Tauern, Köstenberg, 4.IX.1961, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Eremocoris podagricus (FABRICIUS, 1775)

Car., Umgb. Villach, Kanzianibg., 25.III.1946, 1♂ (Strupi) <sub. plebejus>; Carinthia, Rabenstein, 24.IV.1952, fr. rip., 1♂* (Hö); Carinthia, Loiblthal, 7.IX.1957, cort., 1♀ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Scolopostethus affinis (SCHILLING, 1829)

Vbg., Feldkirch, 27.IX.1933, 2♀ 1♂ (Mo); Carinthia, Viktring, III.1949, dom., 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, I.1949, 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, 20.VI.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 3.IX.1950, 1♂ (Hö) det. EW;

Scolopostethus decoratus (HAHN, 1833)

Vbg., Feldkirch, oD, 1♀ 1♂ (Mo);

Scolopostethus grandis HORVÁTH, 1880

Carinthia, Maria Rain, 6.V.1952, Taubenkot, 1♂ (Hö) det. EW;

Anm.: Von HÖLZEL (1953, 1954a) publiziert.

Scolopostethus pictus (SCHILLING, 1829)

[GE?] Rosslau, 28.III.1920, 1♂ (E. Heidenreich.);

Scolopostethus pilosus pilosus REUTER, 1875

Carinthia, Sattnitz-West, Grafenbach, 27.X.1945, 1♀, 2♀ 2♂ <sub. thomsoni> (Hö); Grafenstein, Cr., I.X.1950, pal., 5♀ 1♂*, 21.X.1953, pal., 3♂* (Hö); Carinthia, Keutschach, F.T., 17.IX.1952, car. aln., 1♂# (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 28.IX.1952, Schilf, 1♀# (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1953, 1954a) als *S. lethierryi* publiziert, jedoch später berichtigt (HÖLZEL 1958c). Von #HÖLZEL (1954a) publiziert.

Scolopostethus puberulus HORVÁTH, 1887

1♀ 1♂, oE; Vbg., Feldkirch, 16.V.1934, 1♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain, 29.VIII.1952, 1♂* (Hö) det. EW; Anm.: Vermutlich handelt es sich um den von *HÖLZEL (1954a) als „*S. pubescens*“ publizierten Beleg.

Scolopostethus thomsoni REUTER, 1875

Möderndf., 24. August, 1♀*, 26.VIII.1921, 1♀ <sub. affinis> (Prohaska); Carinthia, Sattnitz-West, 11.VIII.1945, pal., 1♀ 1♂ (Hö); Carinthia, Haimach, 20.III.1946, fr.,

1♀ (Hö); Koschuta, Cr., Hudajama, 8.V.1946, 1♂ <sub. affinis> (Hö); Car., Umgb. Thörl, Gailitz, 14.V.1946, 1♂ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, trunc., X.1947, 1♂ <sub. affinis> (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 14.I.1950, M.R., 1♀ (Priesner); Carinthia, Maria Rain, 29.VIII.1952, 1♀ (Hö) det. EW;

Anm.: Möglicherweise von *PROHASKA (1923) als *S. decoratus* publiziert.

Taphropeltus contractus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Styria, Selztal, oD, 1♀ (Mo);

Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Taphropeltus hamulatus (THOMSON, 1870)

Carinthia, Keutschach, 21.XII.1961, 1♂* det. EW (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1969) publiziert.

Acompus rufipes (WOLFF, 1804)

Vbg., Feldkirch, oD, 1♀ <makropter> (Mo); Koschuta, Cr., Hudajama, 28.IV.1946, 1♀ 1♂, 7.V.1946, 1♀ 4♂ (Hö); Karawanken, Bodental, 8.VI.1946, 1♀ (Hö); Karawanken, Cr., Koschuta, 15.VI.1946, 1♀ 3♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 26.V.1955, 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., Rosica, 1.VII.1955, 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., Sechter, 25.V.1960, 1♂ (Hö);

Lasiosomus enervis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Styr., Lannach, oD, 1♂ (Mo); Koschuta, Cr., Hudajama, 27.IV.1946, 1♀* (Hö); Wimitz, Cr., Dabromoos, 16.IX.1959, Sphagnum, 2♀ 1♂ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Stygnocoris rusticus (FALLÉN, 1807)

Car., Pischeldf., oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Grafenstein, 6.VIII.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♀, 1♂ <sub. fuliginus> (Hö); Carinthia, Maria Rain, VIII.1952, gram., 2♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, 26.VIII.1953, Bru., 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VII.1961, 2♀ (Hö); Carinthia, Wollanig, 5.IX.1961, 1♀, 1♂ <sub. fuliginus> (Hö);

Stygnocoris fuliginus (GEOFFROY, 1785)

[CZ] Böhmen, 1♀, aS; Carinthia, Klagenfurt Umg., oD, 2♀ 1♂, I.1949, 1♀ (Hö);

Stygnocoris cimbricus (GREDLER, 1870)

Hermagor, 17.IX.1920, 1♀; Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Cr., Pischeldf., 1♂; Carinthia, Maria Rain, VIII.1952, gram., 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, 16.IX.1952, Calluna, 1♀ det. EW <sub. pygmaeus>, 2♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, Bru., 26.VIII.1953, 1♀, Pyr.kg., 30.IX.1953, 2♀ 1♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., Zillhöhe, X.1956, 1♀ (Hö);

Anm.: Erst seit HEISS (1997) von *S. pygmaeus* getrennt und vermutlich in Mitteleuropa weit verbreitet. Erstmeldung für Kärnten.

Stygnocoris sabulosus (SCHILLING, 1829)

Car., B. Vellach, oD, 1 ♀ (Mo); Koschuta, Cr., Hudajama, 1.IX.1945, 1 ♀* (Hö) det. EW; Carinthia, Maria Rain, 1.VIII.1953, rip., 1 ♂ (Hö);

Anm.: Das *Exemplar wurde von EW als *S. faustus* determiniert und etikettiert und von HÖZEL (1953, 1954a) publiziert. Die Meldung wurde von FRIER et al. (1999) angezweifelt und die Überprüfung ergab, dass es sich um *S. sabulosus* handelte. *S. faustus* kommt in Österreich vermutlich nicht vor.

Pachybrachius fracticollis (SCHILLING, 1829)

Vbg., Feldkirch, oD, 1 ♂ (Mo); Carinthia, Klagenfurt Umg., Wörther S. Schilf, 5.III., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, Seerausfluß, 24.X.1945, Carex, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Grafenbach, 27.X.1945, 1 ♀ 1 ♂ (Hö); Carinthia, Viktring, Wintschach, 3.XI.1945, 1 ♂ (Hö); Umgb. Villach, Car., Teich bei Magdalenensee, Wurzeln, 29.X.1945, 5 ♀ 2 ♂ (Strupi); Carinthia, Viktring, Teich, 20.IV.1948, 1 ♀ 1 ♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 20.IX.1950, pal., 1 ♂ <sub. luridus> (Hö); Carinthia, Keutschach, N.Ufer, 10.V.1953, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 2.XI.1952, cort.pin., 1 ♀ <sub. luridus>, 30.X.1954, Carex, 1 ♀ (Hö);

Pachybrachius luridus HAHN, 1826

Vbg., Feldkirch, 6.X.1932, 1 ♂, oD, 1 ♂ (Mo); Carinthia, Sattnitz-West, VII.1945, pal., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, Wintsch., VII.1945, pal., 1 ♂ (Hö); Grafenstein, Cr., 1.X.1950, pal., 2 ♀ 1 ♂ (Hö); Wimitz, Cr., Dabromos, 16.IX.1959, Sphagn., 1 ♀ 1 ♂, 1 ♂ <sub. fracticollis> (Hö);

Ligyrocoris sylvestris (LINNAEUS, 1758)

1 ♂, oE; Vbg., Feldkirch, oD, 1 ♀ 1 ♂ (Mo); Carinthia, Plöcken, VIII.1948, 1 ♀ (Hö);

Aellopus atratus (GOEZE, 1778)

Car., Pischeldorf, 1.VIII.1931, 1 ♀ (Mo); Pischeldorf, oD, 1 ♀;

Beosus maritimus (SCOPOLI, 1763)

[UK] Kiew, oD, 1 ♀;

Peritrechus angusticollis (R. F. SAHLBERG, 1848)

Vbg., Übersaxen, oD, 1 ♂ (Mo);

Peritrechus geniculatus (HAHN, 1832)

Vbg., Feldkirch, 8.XI.1935, 1 ♀ 1 ♂ (Mo);

Peritrechus lundii (GMELIN, 1790)

Car., Pischeldorf, 2.VIII.1931, 1 ♀ (Mo); Pischeldorf, oD, 1 ♀;

Anm.: Von HÖZEL (1954a) publiziert.

Panaorus adpersus (MULSANT & REY, 1852)

Vbg., Göfis, 25.IX.1933, 2 ♀ (Mo);

Graptopeltus lynceus (FABRICIUS, 1775)

Car., Pischeldorf, 30.VII.1931, 1 ♂ (Mo); Pischeldorf 1 ♂;

Raglius alboacuminatus (GOEZE, 1778)

Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1 ♀** (Mo); Carinthia, Klagenfurt Umg., oD, 1 ♂ (Hö); Car., Umgb. Graschlitzten, 27.IX.1945, 2 ♂ (Strupi); Carinthia, Klagenfurt Umg., III.1948, 1 ♂ (Hö); Krt., Korallpengegebiet, 1948, 1 ♀ (Demelt); Carinthia, Klagenfurt, 20.IX.1949, 1 ♂ (Priesner); Carinthia, Sattnitz-West, Pyr.kg. Süd, cort. querc., 11.XI.1952, 2 ♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, Dobein, 12.V.1953, 1 ♀ (Hö);

Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Rhyparochromus vulgaris (SCHILLING, 1829)

1 ♀, aS, oE; Klagenfurt, Wohnung am Fenster, 16.IX.1910, 1 ♀* (Pu); Carinthia, Klagenfurt Umg., Maria Saalerbg., IX.1948, 1 ♂ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, I.1949, 1 ♀ 2 ♂ (Hö); Neusiedl. See, 10.X.1954, 1 ♀ det. EW;

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Rhyparochromus pini (LINNAEUS, 1758)

Annabichl, 3.V.1908, 1 ♀ (Pu); Tessendorf, 13.X.1912, 1 ♂ (Pu); Vbg., Feldkirch, 25.III.1934, 1 ♀, oD, 1 ♀ (Mo); Carinthia, Rattendfalm, oD, 1 ♂ (Hö) det. EW; Cr., Karawanken, Singerberg, 12.III.194?, 1 ♂; Car., Haimach, 20.III., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1945, 1 ♀ 1 ♂ <sub. phoeniceus> (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 1.IX.1945, 1 ♀ <sub. phoeniceus>, 9.V.1946, 1 ♂ <sub. phoeniceus>, 15.VI.1946, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 14.IV.1946, 1 ♂ (Hö); Cr., Karawanken, Setica, 25.VI.1947, 1 ♂ (Hö); Cr., Karawanken, Ogrisalm, Kosiak, 15.V.1948, 1 ♀ <sub. phoeniceus> (Hö); Carinthia, Viktring, dom., 16.IX.1948, 1 ♀ <sub. lynceus> (Hö); Karnische Alpen, Hoher Trieb, Bischof-Alm, 31.VI.1950, 1 ♀ (Hö); Cr., Karaw., Turm-Alpe, 24.IX.1950, 1 ♂; Cr., Karawanken, Rosica, 8.VII.1951, 1 ♀ (Hö);

Rhyparochromus phoeniceus (ROSSI, 1794)

Carinthia, Loiblital, Tischeppa, 15.VIII.1945, 1 ♀ (Hö); Karawanken, Dolich, 17.VI.1954, 1 ♀ (Hö) det. EW;

Rhyparochromus sanguineus (DOUGLAS & SCOTT, 1868)

[GR] Peloponnes, 12.-20.VI.1958, 1 ♂ (Thurner);

Lamprodema maura (FABRICIUS, 1803)

Ung., 1 ♂, aS; 1 ♀, oE, aS;

Megalonotus antennatus (SCHILLING, 1829)

Styr., Lannach, oD, 1 ♀ (Mo); Illitsch-Alp., Car., Moos, 3.XI.1945, 1 ♂ (Strupi); Korallpengegebiet, Krt., 1948, 1 ♀ (Demelt) det. Roubal; Carinthia, Koschuta, oD, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Gurnitz, 6.V.1953, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Saualpe, 8.VI.1953, 1 ♀ (Hö);

Megalonotus hirsutus FIEBER, 1861

Car., Pischeldorf, 3.VIII.1931, 1♂* (Mo); Cr., Pischeldorf, oD, 1♀; Carinthia, Loiblthal, 24.V.1947, 1♂* (Hö); Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Megalonotus praetextatus (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

[CZ] Böhmen, 1♀, aS; 1♂, oE, det. Roubal;

Megalonotus chiragra (FABRICIUS, 1794)

Umg. Kolbnitz, Car., Brückenbachgraben, 4.IX.1945, 2♀ (Strupi); Carinthia, Viktring, VII.1946, hort., 1♂ (Hö) det. EW, det. Roubal; Carinthia, Sattnitz-West, Wö.see, 30.VI.1959, 1♂ Thur <=leg. Thurner> (Hö);

Pterotmetus staphyliniformis (SCHILLING, 1829)

Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Cr., Pischeldorf, oD, 2♀; Carinthia, M. Saalerberg, 3.IX.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, Keutschach, 20.V.1953, 1 Larve, 1.IX.1953, Bru., 1♀ 1♂ (Hö);

Aphanus rolandri (LINNAEUS, 1758)

[GE] Sachsenburg, Thüringen, IV.1930, 1♂ (Feige); [GE] Freybg. a. U., Rödel, 18.V.1930, 1♀ (Michalk); [GE] Maintal, G., VIII.1955, 1♀;

Emblethis verbasci (FABRICIUS, 1803)

Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo);

Anm.: Von HÖLZEL (1954a) publiziert.

Emblethis denticollis HORVÁTH, 1878

[GE] Aken Elbe, 2♂ (E. Heidenreich);

Macrodera microptera (CURTIS, 1836)

Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 2♂ (Mo);

Anm.: Von MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Pionosomus varius (WOLFF, 1804)

[GE] Borkum, aS, 1 Ex. <ohne Abdomen>;

Trapezonotus anorus (FLOR, 1860)

Carinthia, Haimach, 20.III.1946, fr., 1♀ (Hö); Karawanken, Bärental, Cr., 4.VII.?, gram., 1♀ (Hö);

Trapezonotus arenarius arenarius (LINNAEUS, 1758)

[UK] Kiew, 1♀, aS <sub. Sphragisticus>;

Trapezonotus desertus SEIDENSTÜCKER, 1951

Karawanken, Kosiak, 9.VI.1945, 2♀ (Hö); Cr., Dobratsch Alp., 20.IV.1946, 1♂ (Strupi); Karawanken, Klgft. Hütte, 9.VI.1946, 1♀ (Hö); Karawanken, Cr., Gollica, 25.VI.1947, 1♀ (Hö); Karn. Alpen, Rattendf. A., 28.V.1949, 1♀#, Lärchenboden, 29.V.1953, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Hudajama, 8.IX.1949, Dolin., 1♀*# (Hö); Cr., Karawanken, Rosica, 8.VII.1951, 2♀ 2♂# (Hö) det. EW; Karnische Alpen, Zottachkopf, 1.VI.1952, 1♀*, 29.V.1953, 1♂, Dryas (Hö); Carinthia,

Greibenze, 12.VII.1954, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Kosiak, 8.VI.1958, 3♀ (Hö);

Anm.: Von HÖLZEL *(1953) bzw. #(1954a) publiziert.

Trapezonotus dispar STÄL, 1872

Car., B. Vellach, oD, 1♀ (Mo); Karawanken, Kosiak, 9.VI.1945, 1♂ (Hö); Karawanken, Singerberg, 7.XI.1945, 1♂ (Hö); Koschuta, Cr., Hudajama, 9.V.1946, 1♀ 1♂ (Hö) det. EW; Korallpengeb., Krt., 1948, 2♀ (Demelt); Carinthia, Viktring, IV.1948, hort., 1♂ (Hö); Karawanken, Cr., Koschuta, 11.VI.1948, Pischinca, 1♀* (Hö); Karnische Alp., Doberbach Gr., 19.VI.1949, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 1.V.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, FT., 17.IX.1952, 2♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, Dobein, 21.IX.1952, 1♀ 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 24.IV.1954, 1♀, 2.V.1954, 1♀, 16.VII.1955, 1♀ (Hö); Carinthia, Lavamünd, 12.V.1954, Ostrya, 1♀ (Hö); Carinthia, Grebenzen, 12.VII.1954, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *HÖLZEL (1953) unter *T. desertus* publiziert.

Trapezonotus ullrichi (FIEBER, 1837)

Ungarn, 2♀; „Kärnt“, 1♀, aS;

Anm.: Diese Art ist aus Kärnten bisher nicht bekannt, der vorliegende Fund stammt vermutlich aus den ehemaligen Küstenländern.

Fam. Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)

Goritschitzen, 13.IV.1908, 3♂* (Pu); Carinthia, Viktring, oD, 4♂ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Pyrrhocoris marginatus (KOLENATI, 1845)

Bisamberg, A.i., 15.XII.1954, 1♀ (Priesner) det. EW;

Scantius aegyptius (LINNAEUS, 1758)

[AG] Oran Alg. <=Ouahrin in Algerien>, 18.XI.1933, 1♂ (Novak);

Fam. Coreidae

Gonocerus acutaeangulatus (GOEZE, 1778)

Vbg., Feldkirch, oD, 1♂ (Mo); [GE] Dübener Heide, Schmiedeberg, 29.V.1934, 1♂ (Feige);

Gonocerus insidiator (FABRICIUS, 1787)

[CR] Brioni <=Brijuni>, 12.IX.1923, 1♂;

Gonocerus juniperi HERRICH-SCHÄFFER, 1839

Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 1♂ (Mo); Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo);

Syromastes rhombeus (LINNAEUS, 1767)

[CR] Dalmatia, Ragusa, 1.V.1938, 1♂ (Feige); Carinthia, Keutschach, Brachwiese, 1.IX.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Saal, IX.1971, mur., 1♀ (Sampl);

Enoplops scapha (FABRICIUS, 1794)

Carinthia, *Lavamünd*, 1.IX.1930<?, 1♀; [GE] Eisleben, 23.V.1932, 1♀ (Feige); Vbg. Feldkirch, 25.III.1934, 1♂ (Mo); Carinthia, *Kasparstein*, 24.IV.1952, *silv.*, 1♀1♂ (Hö);

Coreus marginatus marginatus (LINNAEUS, 1758)

Willersdorf, 25.VI.1916, 1♀; Prössinggraben bei Wolfsberg, oD, 1♂ (Demelt); Krt., Korallengebiet, 1948, 1♂ (Demelt); Carinthia, Viktring, oD, 1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, *flor.*, 18.VI.1945, 1♀, 11.VIII.1945, 2♀1♂ (Hö); Carinthia, *Ossiach-S.*, *Badehaus*, 19.VIII.1969, 1♂ (Hö);

Spathocera laticornis (SCHILLING, 1829)

[CZ] Böhmen, aS, 1♂; Millstädter See, oD, 1♀ (Handlirsch) <ohne Kopf>; Carinthia, Viktring, *dom. mur.*, 5.IX.1964, 1♀ (Hö);

Bathysolen nubilus (FALLÉN, 1807)

2♀, oE;

Arenocoris fallenii (SCHILLING, 1829)

1♀, oE; [GE?] *Laacher See*, 11.IV.1903, 1♂; [MC] *Macedonia*, *Ohrid*, V.1956, 1♀;

Centrocoris spiniger (FABRICIUS, 1781)

[GR] *Peloponnes*, 12.-20.VI.1958, 1♀ (Thurner), det. EW;

Ulmicola spinipes (FALLÉN, 1807)

Car., Möderndorf, 29.V.1923, 1♂ (Pu); Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Cr., Koschuta, Hudajama, 28.IV.1946, 1♂ (Hö); Krt., Korallengebiet, 1948, 1♂ (Demelt); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Gurnitz*, 8.IV.1950, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 27.IV.1951, *Taubenkot*, 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, IX.1963, *dom. mur.*, 1♀, V.1965, *dom. mur.*, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, *Rosica*, 8.VII.1951, 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 27.III.1955, 1♂ (Hö); Klagenfurt Umg., 9.V.1958, 1♂ (Machacek);

Ceraleptus gracilicornis (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

1♂, oE;

Bothrostethus annulipes (HERRICH-SCHÄFFER, 1835)

Maria Saal, oD, 1♂ (Thurner) det. EW;

Anm.: Von HÖLZEL (1954b) publiziert: Maria Saalerberge, nördlich von Klagenfurt, VII.1953, leg. Thurner. Es handelt sich dabei um den einzigen Nachweis dieser nordmediterranen Art für Österreich.

Phyllomorpha laciniata (VILLERS, 1789)

[MC] *Petrina plan.*, *Macedonis*, 1600m, 2♂* (Thurner) det. EW; [MC] *Ohrid Umg.*, *Macedonis*, 700m, 3♀ (Thurner);

Anm.: Von *WAGNER (1960) publiziert.

Coriomeris denticulatus (SCOPOLI, 1763)

Car., Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Carinthia, *Wimitz*, 11.VI.1947, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, *Ogrisalm*, 16.V.1948, 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 12.VI.1948, 1♂ (Hö); Cr., Grafenstein, 20.IV.1950, *rip.*, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 16.V.1953, 2♂ (Hö); Cr., Karawanken, *Waidisch*, 2.IV.1959, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, VIII.1964, *mur.*, 1♂, 5.IX.1964, *dom. mur.*, 1♀ (Hö);

Coriomeris hirticornis (FABRICIUS, 1794)

[GR] *Peloponnes*, 12.-20.VI.1958, 1♂ (Thurner) det. EW;

Fam. Alydidae

Alydus calcaratus (LINNAEUS, 1758)

Sattnitz, 6.IX.1914, 1♀* (Pu); Falkenberg, 30.VIII.1914, 1♀* (Pu); Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, 20.VI.1945, *Genista tinct.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Hoch-Obir, *Jovanberg*, VIII.1948, 1♀; Carinthia, Maria Saalerberg, 21.VIII.1949, 1♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt, 5.V.1949, 1 Larve (Priesner); Carinthia, *Lavamünd*, 1.IX.1950, 1♂ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umgebung, 6.IX.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, *Annabürcke*, 10.IX.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, *Keutschach*, *Brachwiese*, 26.VIII.1953, 1♀, 1.IX.1953, 1♀1♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 15.IX.1957, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, 1.IX.1962, 2♀, 8.VIII.1972, 1♀ (Hö);

Anm.: Vermutlich die von *PROHASKA (1923) genannten Exemplare („bei Klagenfurt“).

Megalotomus junceus (SCOPOLI, 1763)

Siebenbügel, 8.IX.1910, 1♂* (Pu); *Gösselsdorfersee*, 21.VII.1921, 1♂* (Pu); Carinthia, Maria Rain, 10.VII.1945, 1♀ und eine Larve, VII.1952, *gram.*, 1♂ (Hö); Carinthia, Maria Saalerberg, 6.VIII.1949, *Calluna v.*, 1♂, 21.VIII.1949, 1♀ (Priesner); Carinthia, Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, 1.IX.1962, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, <Fundort unleserlich>, 15.VIII.1969, 1♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Camptopus lateralis (GERMAR, 1817)

Österreich, 1♀*, aS; [GR] *Peloponnes*, 12.-20.VI.1958, 1♀ (Thurner) det. EW;

Anm.: *Höchstwahrscheinlich außerhalb heutiger Landesgrenzen gefunden.

Fam. Rhopalidae

Corizus hyoscyami hyoscyami (LINNAEUS, 1758)

<Fundort unleserlich> VII.1909, 1♀, 15.VI.1912 1♀ (Pu); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, 13.VIII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 20.VIII.1945, 2♂ (Hö); Car., *Illitsch-Alp.*, 23.IX.1945, 1♀ (Strupi); Carinthia, Viktring, VIII.1946, *hort.*, 1♂, IV.1947, *hort.*, 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 19.VI.1948, 1♂

(Hö); Carinthia, *Valentinbach*, 3.VIII.1948, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, *Grafenst. A.*, 9.VIII.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, *Lavamünd*, 12.V.1954, 1♂ (Hö); Carinthia, *Wollanig*, 5.IX.1961, 1♂ (Hö);

Brachycarenum tigrinus (SCHILLING, 1829)
1♀ 1♂, oE, aS;

Rhopalus maculatus (FIEBER, 1837)
Vbg., Übersaxen, oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-West, *Wintschach*, VII.1945, pal., 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt, 5.V.1949, 1♀ (Priesner);

Rhopalus conspersus (FIEBER, 1837)
Cr., Koschuta, Hudajama, 1.IX.1945 1♀ (Hö) <sub. R. distinctus>; Car., Klagenfurt, 5.V.1949, 1♂ (Priesner) <sub. R. distinctus>;

Rhopalus parumpunctatus SCHILLING, 1829
Cr., Pischeldf., oD, 1♀ 1♂ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, *Haimach*, 13.VIII.1945, 1♀ 2♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 20.VIII.1945, 1♀ 1♂ (Hö) <das ♂ sub. subrufus>; Car., *Illitsch-Alp.*, 23.IX.1945, 1♀ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, 1.IV.1947, 1♀ (Hö); Krt., Kor-alpengebiet, 9.II.1948, 1♂ (Demelt) <sub. R. distinctus>; Carinthia, Klagenfurt Umg., 6.IX.1950, 1♀ (Hö); Carinthia, Viktring, *Calluna*, 16.IX.1952, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Brw.*, 1.IX.1953, 3♀ 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Pyr.kg.*, 30.IX.1953, pal., 1♂ (Hö);

Rhopalus subrufus (GMELIN, 1790)
Maria Rain, *Weizelsdorf*, 25.V.1913, 1♀* (Pu); Carinthia, Maria Rain, 2.VIII.1945, 1♀, 16.V.1953, 1♀ (Hö); Car., Sattnitz-Ost, *Haimach*, 13.VIII.1945, 1♂ (Hö); Car., Umgb. *Thörl*, *Gailitz*, 14.V.1946, 1♂ (Strupi); Karnische Alp., *Doberbachgr.*, 27.V.1949, *gram.*, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Stictopleurus abutilon abutilon (ROSSI, 1790)
Worstsee Wald, 8.VIII.1909, 1♂* (Pu) <sub. R. subrufus>; *Sattnitzwald*, 28.IX.1911, 1♀ (Pu); Car., Pischeldorf, oD, 2♂ (Mo); Car., Maria Saalerberg, 14.VI.1949, 1♂ (Priesner); Car., Viktring, 16.V.1953, *gram.*, 1♀ (Hö); Carinthia, Keutschach, *Brw.*, 26.VIII.1953, 1♀ (Hö) <sub. crassicornis>;
Anm.: Von *PROHASKA (1923) als *Rhopalus subrufus* publiziert.

Stictopleurus crassicornis (LINNAEUS, 1758)
Maria Saaler Wald, 20.IX.1914, 1♀ 2♂* (Pu); *Annabücke*, 15.VIII.1927, 1♂ (Pu); Styr. Bärndf. b. Rtt., oD, 2♀** (Mo) <sub. punctatonervosus>; Cr., Koschuta, Hudajama, 1.IX.1945, 1♂ (Hö); Umg. *Kolbnitz*, Car., *Brückenbachgraben*, 4.IX.1945, 1 Ex. (Strupi); Car., Maria Rain, 30.IX.1945, 1♂ (Hö); *Wind. Höhe*, *Gailtaler Alp.*, 16.VI.1948, 1♀ (Strupi); Carinthia, Klagenfurt, 30.V.1949, 1♀, 20.IX.1949, 1♀ (Priesner); Carinthia,

Ulrichsberg, 20.VII.1949, 1♀ (Priesner); Karawanken, Cr., Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♀ (Hö) <sub. abutilon>; Car., Keutschach, *Brachwiese*, 1.IX.1953, 1♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) bzw. von **MOOSBRUGGER (1946, als *S. crassicornis* oder *punctatonervosus*) publiziert.

Stictopleurus punctatonervosus (GOEZE, 1778)
Annabücke, *Drauauen*, 15.VIII.1911, 1♀# (Pu) <sub. crassicornis>; Carinthia., Skarbin, 23.VIII.1949, 1♀ (Priesner) det. EW; Carinthia., *Grafenstein*, 6.VIII.1950, 1♀ (Priesner) <sub. crassicornis>; Carinthia, Maria Rain, 28.IV.1951, 1♂*, 26.IX.1953, *Licht*, 1♂ (Hö) det. EW; Carinthia, Klagenfurt Umg., 17.V.1959, 1♀ (Hö) det. EW; Carinthia, *Wollanig*, 5.IX.1961, 1♀ 1♂ (Hö); [MC] Petrina plan., Macedonis, 1600m, oD, 1♀ (Thurner) det. EW;
Anm.: Von #PROHASKA (1923) als *S. crassicornis* publiziert. Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Myrmus miriformis miriformis (FALLÉN, 1807)
Vbg., Feldkirch, oD, 1♀ (Mo); Styria, Selztal, 17.VII.1931, 1♀** (Mo); Styr., Kaiserau, 31.VIII.1931, 1♂ (Mo); *Neusiedl. See*, 10.X.1954, 3♂ det. EW;
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Chorosoma schillingii (SCHUMMEL, 1829)
[GE] Harz, Blankenheim, 4.IX.1931, 1♀ (Feige);

Fam. Stenocephalidae

Dicranocephalus agilis agilis (SCOPOLI, 1763)
Annabücke, *Drauauen*, 15.VIII.1911, 1♂* (Pu); *Sattnitz*, 6.IX.1914, 1♂* (Pu); Carinthia, Maria Rain, 29.VI.1946, 1♂ (Hö); Carinthia, Loibltal, 23.IV.1947, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Koschuta, 4.VI.1947, 1♂ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, *K.Bach*, 12.VI.1948, 1♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 24.IV.1949, 1♀ 1♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Dicranocephalus albipes (FABRICIUS, 1781)
1♂, oE, aS;

Dicranocephalus medius (MULSANT & REY, 1870)
[GE] Fürstenberg i.M., oD, 1♂ (Konow); Carinthia, Pischeldorf, oD, 1♂ (Mo); Cr., Koschuta, Hudajama, 9.V.1946, *Dolina*, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Singerberg, 10.VI.1948, 1♀;

Fam. Scutelleridae

Odontoscelis fuliginosa (LINNAEUS, 1761)
[GE] Rödel, 6.VII.1930, 1♂ (Michalk); [GE] Fürstenberg i.M., oD, 1♀ (Konow); Cr., *Hl. Blut*. <=Heiligenblut>, VII.1946, 1♀;

Odontoscelis lineola RAMBUR, 1839
[GE] Oberfranken, oD, 1♂;

Eurygaster austriaca austriaca (SCHRANK, 1776)
1♀ 2♂, oE, aS; Kärnten, aS, 1♂*, [GE] Dübener Heide, Schmiedeberg, 10.VIII.1931, 1♂ (Feige); [SK] Bratislava, VI.1959, 1♀ (Dostal);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)
Kötschach, 28.VI.1908, 1♀ (Pu); Karnburg, 30.VII.1910, 1♀# (Pu); Waidisch, 6.VIII.1916, 1♀ (Pu); Keutschach, 3.VII.1917, 1♂ (Pu); Bad Vellach, 12.IX.1921, 1♀* (Pu); Car., Pischeldorf, oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Maria Rain, VII.1945, 2♂ (Hö); Carinthia, Viktring, VIII.1964, 1♂# (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert. #Wurde vielfach mit folgender Art verwechselt.

Eurygaster testudinaria testudinaria (GEOFFROY, 1785)
Seeausfluß, 26.V.1910, 1♀ (Pu); Siebenhügel, 1.IX.1914, 1♀# (Pu); Moosburg, 25.VIII.1907, 1♂# (Pu); V, Bludenz, oD, 1♂ (Mo); Carinthia, Viktring, VII.1945, 1♀#, 1♂*, 11.VIII.1945, 1♂#, 20.XI.1964, dom. mur., 1♀# (Hö); Carinthia, Maria Rain, VII.1952, gram., 1♀*, 2.VIII.1953, 1♀#, 12.IX.1959, 1♂ (Hö); Car., Keutschach, 10.V.1953, N.Ufer, 1♂ (Hö); Cr., Karawanken, Sechter, 25.V.1961, 1♀ (Hö); Karawanken, Vellachtal, VIII.1964, 1♀ (Hö); Karawanken, <Fundort unleserlich>, 6.VII.1965, 1♂# (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert. #Wurde vielfach mit voriger Art verwechselt.

Fam. Pentatomidae

Ventocoris trigonus (KRYNICKI, 1871)
[HU] Ungarn, oD, aS, 1♀;

Ancyrosoma leucogrammes (GMELIN, 1790)
[IT] Bozen, oD, 2♀ (Mo);

Graphosoma semipunctatum FABRICIUS, 1775
Kärnten, oD, aS, 1♀; oE, 1♂;
Anm.: *Graphosoma semipunctatum* wird von HÖLZEL (1954a, „Ein Stück aus der alten Kärntner Sammlung trägt die allgemeine Patria-bezeichnung Kärnten“) angeführt und von STICHEL (1957-62) wohl für Österreich übernommen. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um einen Fund außerhalb aktueller Landesgrenzen (vgl. FRIER et al. 1999). Rezente Meldungen dieser Art aus Mitteleuropa liegen nicht vor.

Graphosoma lineatum (LINNAEUS, 1758)
Kreuzberg, (in cop.), 24.VII.1910, 1♀ 1♂* (Pu); Ossiachersee, Annenheim, 15.VIII.1913, 2♀*; Carinthia, Maria Rain, 20.VIII.1945, 1♂, VI.1968, rip., 1♀ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Podops inuncta (FABRICIUS, 1775)
Car., Pischeldorf, 1.VIII.1931, 1♂* (Mo); Cr., Pischeldorf, oD, 1♀; Vbg., Feldkirch, oD, 1♀ (Mo); Carinthia, Viktring, V.1960, 1♀ (Hö);
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Sciocoris cursitans cursitans (FABRICIUS, 1794)
Car., Pischeldorf, 25.VII.1931, 1♀ (Mo); Pischeldorf, Cr., 2♀; Carinthia, Keutschach Nordufer, 10.V.1953, 1♂* (Hö) det. EW sub. *S. galiberti*;
Anm.: Dieses *Exemplar wurde von EW als *S. galiberti* determiniert und etikettiert und von HÖLZEL (1954a) unter diesem Namen publiziert. Die Meldung wurde von FRIER et al. (1999) angezweifelt und die Überprüfung ergab, dass es sich um *S. cursitans* handelte.

Sciocoris distinctus FIEBER, 1851
[HU] Ungarn, oD, aS, 1 Ex.;

Sciocoris microphthalmus FLOR, 1860
Bodenbauer. Wiesen, 9.VII.1922, 1♀ 1♂* (Pu) <sub. *cursitans*>; Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1946, 1♂ (Hö) <sub. *cursitans*>; Carinthia, Bärental, 4.VII.1954, 1♀ (Hö) <sub. *cursitans*>; Tschau <?>, Carn., 10.VII.1959, 5♀ 1♂;
Anm.: Vermutlich die von *PROHASKA (1923) als *S. cursitans* aus dem Bodental gemeldeten Exemplare (vgl. auch PROHASKA 1932).

Sciocoris umbrinus (WOLFF, 1804)
1 Ex. <ohne Abdomen>, oE, aS; Vbg., Feldkirch, oD, 2♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Annabr., 1.V.1950, 1♂* (Hö); Kärnten, <Fundort unleserlich>, 22.IV.1951, 1♀ (Machacek) <sub. *microphthalmus*>;
Anm.: Von *HÖLZEL (1954a) publiziert.

Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)
Möderndorf, 2.V.1920, 1♀ (Pu); Car., Möderndf., 21.V.1922, 1♂ (Pu); Carinthia, Klagenfurt, 20.IX.1949, 1♀ 1♂ (Priesner); Carinthia, Maria Rain, VII.1952, gram., 2♂, VIII.1952, gram., 1♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 26.V.1955, gr., 1♂ (Hö);

Aelia rostrata BOHEMAN, 1852
[MC] Prilep, 26.V.1956, 1♀, 27.VIII.1956 1♀ (Turner);

Neottiglossa pusilla (GMELIN, 1789)
Styr., Bärndf. b. Rtt., 2.IX.1931, 1400m, 1♀ 1♂*** (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1945, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, VIII.1952, gram., 1♀, 15.VIII.1952, 1♂, VI.1960, 1♀ (Hö);
Anm.: Von **MOOSBRUGGER (1946) publiziert.

Eysarcoris aeneus (SCOPOLI, 1763)
Möderndorf, 1.IX.1907, 1♂ (Prohaska); Seeausfluß, 23.VIII.1914, 1♀* (Pu); Siebenhügel, 1.IX.1914, 1♀* (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, Wintschach, 1.VIII.1945, 1♀, oD, 1♀ 2♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 18.VIII.1945, hort., 1♀, 7.IV.1951, Talpa, 1♀ (Hö); Carinthia, Grafenstein, 6.VIII.1950, 1♀ (Priesner); Carinthia, Maria Rain, III.1954, fag., 1♂, 12.IX.1959, 1♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., 2.IX.1957, Seegelande, 1♂ (Hö); Cr., Wimitz, Dabromoos, 16.IX.1959, 1♀, Sphagnum (Hö); Ossiach. Tauern, Köstenberg, 16.V.1960, 1♀, 4.IV.1961, 1♂ (Hö);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) als *Stagonomus pusillus* publiziert.

Eysarcoris venustissimus (SCHRANK, 1776)

Carinthia, Haimach, 20.III.1946, 3 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, V.1946, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, VI.1960, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Wollanig, 30.VIII.1961, 1 ♀, 5.IX.1961, 1 ♀ (Hö);

Stagonomus bipunctatus (LINNAEUS, 1758)

Car., Pischeldorf, oD, 1 ♂ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1946, 1 ♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-West, 25.X.1952, 1 ♂ (Hö); [MC] Macedonia, Drenovo-Kavadar, 1.-15.VII.1958, 1 ♀ (Thurner) det. EW;

Stagonomus amoenus (BRULLÉ, 1832)

1 ♀, oE;

Staria lunata lunata (HAHN, 1835)

2 ♂, oE; [GR] Peloponnes, 12.-20.VI.1958, 1 ♂ (Thurner) det. EW;

Rubiconia intermedia (WOLFF, 1811)

Bärental, 8.IX.1909, 1 ♀* (Pu); Carinthia, Sattnitz-West, 12.VI.1945, Pyr.kg., 1 ♀, 13.VIII.1945, 1 ♂, 25.X.1952, cort. fag., 1 ♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, 12.VIII.1945, 3 ♂ (Hö); Carinthia, Viktring, III.1946, Pyr.kg., 1 ♀ (Hö); St. Martin bei Teschling a/WS => Töschling am Wörthersee, 27.VI.1946, 1 ♀ (Hoschek);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Holcostethus sphacelatus (FABRICIUS, 1794)

1 ♀, oE; Süd-Alp., 1 ♀, aS; Kärnten, 1 ♂, aS;

Holcostethus vernalis (WOLFF, 1804)

Car., Pischeldorf, oD, 1 ♀ (Mo); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 13.VIII.1945, 1 ♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 20.VIII.1945, 1 ♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Skarbin, 13.VI.1963, 1 ♀ (Hö);

Palomena prasina (LINNAEUS, 1761)

Loretto, auf Birken, 25.VI.1916, 1 ♀ (Pu) <sub. viridissima>; Carinthia, Sattnitz-West, oD, 2 ♂, 11.VIII.1945, 1 ♂, 15.II.1946, Pyr.kg., 1 ♀, 25.X.1952, cort. fag., 1 ♂ (Hö); Carinthia, Viktring, 15.II.1946, Pyr.kg., 1 ♀ 1 ♂, IV.1964, dom.mur., 1 ♀, VII.1964, mur., 1 ♀ (Hö); Krumpendorf a/WS, 12.VI.1946, 1 ♂ (Hoschek); Krt., Korallengebiet, 1948, 1 ♀ (Demelt); Carinthia., Maria Rain, IV.1954, 1 ♂ (Hö); Car., Sattnitz-West, Grafenbach, 4.IV.1959, 1 ♀ (Hö);

Palomena viridissima (PODA, 1761)

Pappelmorogart., VII.1912, 1 ♀ (Pu); *Loretto, 26.V.1916, 1 ♂, 4.IX.1919 1 ♀ (Pu); Glantal, Willersdorf, 25.VI.1916, 1 ♀ (Pu); St. Peter im Holz, 29.IX.1919, 1 ♀ (Pu); Krt., Korallengebiet, 1948, 1 ♀ (Demelt);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)

Oberhof, VIII.1908, 1 ♀* (Löhner); Keutschachersee,

16.VI.1909, 1 ♂ (Pu); Maria Saal, 15.V.1910, 1 ♀ (Pu); Carinthia, Sattnitz-Ost, Petelinz, 20.VI.1945, Gen. tinct. 1 ♂ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, 12.VIII.1945, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Viktring, oD, 1 ♂, 13.VIII.1945, 1 ♀, 12.X.1945, hort. 1 ♀, 15.X.1945, hort. 1 ♀ (Hö); Carinthia, Loiblital, Tscheppe, 15.VIII.1945, 1 ♀ (Hö); Carinthia, Klagenfurt Umg., Heide, 30.VIII.1945, 1 ♂ (Hö); Car., Umgb. Kolbnitz, Brückenbachgraben, 4.IX.1945, 1 ♀ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, Pyr.kg., 15.II.1946, 1 ♀ (Hö); Karawanken, Klgt. Hütte, 9.VI.1946, 1 ♀ (Hö); Krt., Korallengebiet, 1948, 1 ♀ (Demelt); Karnische Alpen, Doberbachgr., oD, 1 ♀ (Hö); Karnische Alpen, Doberbachgr., 27.V.1949, gram., 2 ♂, 9.VI.1950, 1 ♂ (Hö); Kärnten, Klagenfurt Umg., 18.VII.1952, 1 ♂ (Machacek); Carinthia, Maria Rain, 31.V.1959, 1 ♀ 1 ♂, VI.1960, 1 ♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, Wurdach, 18.III.1961, 1 ♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Chlorochroa juniperina juniperina (LINNAEUS, 1758)

Klagenfurt, 1909, in fruct. junip. 1 ♀ 4 ♂*; Car., Pischeldorf, 29.VII.1931, Juniperus, 1 ♂ (Mo); Karawanken, Klgt. Hütte, 9.VI.1946, 1 ♀ (Hö);

Anm.: Vermutlich die von *PROHASKA (1923) in der Fußnote publizierten Tiere.

Chlorochroa pinicola (MULSANT & REY, 1852)

Worstsee Wald, 9.VII.1906, 1 ♀* (Pu); Carinthia, Viktring, VII.1948, dom. 1 ♀ (Hö);

Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN, 1849)

Magdalensberg, 15.VIII.1907, 2 ♂ (Pu) det. Tamanini; Cr., Karawanken, Grafenst.A., 9.VIII.1950, 1 ♀ 1 ♂ (Hö);

Carpocoris melanocerus MULSANT, 1852

Styr., Bärndf. b. Rtt., oD, 1 ♂ (Mo); Cr., Rattendf., oD, 1 ♂; Cr., Karawanken, Koschuta, 8.V.1946, 1 ♀, 12.VI.1948, 1 ♀ (Hö); Karawanken, Klgt. Hütte, 9.VI.1946, 1 ♂ (Hö) <sub. pudicus>;

Carpocoris mediterraneus TAMANINI, 1958

[MC] Macedonia, Prilep, 26.V.1956 1 ♂, 26.VI.1956 1 ♀ (Thurner);

Carpocoris pudicus (PODA, 1761)

Worstsee Wald, 8.VIII.1909, 1 ♀ (Pu) det. Tamanini; Töschling a/WS, 7.VI.1946, 1 ♀, (Hoschek) det. Tamanini; Worst See, 1.VIII.1946, 1 ♀ (Hoschek) det. Tamanini; Carinthia, Klagenfurt, 20.IX.1949, 1 ♀ (Priesner) det. Tamanini;

Carpocoris purpureipennis (DE GEER, 1773)

Thoner Moos, 26.V.1907, 1 ♂ (Pu); Längsee, 21.VIII.1909, 1 ♀ (Pu); Siebenhügel, 1.IX.1914, 1 ♀

(Pu); *St. Georgen am Sandhof*, 23.VI.1916, 1♀ det. T. manini, 1♀1♂, (Pu); Carinthia, Viktring, VII.1945, 1♀3♂, VIII.1945, 2♀ (Hö); Carinthia, Sattnitz-Ost, Haimach, VIII.1945, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Kl. Obir, 30.VIII.1949, 1♂ (Hö); Carinthia, Keutschach, 10.V.1953, 1♀ (Hö); Carinthia, Maria Rain, 18.VIII.1964, 1♂ (Hö); [MC] Macedonia, Drenovo-Kavadar, 1.-10.VII.1953, 1♀ (Thurner) det. EW <sub mediterraneus>;

Eurydema dominulus dominulus (SCOPOLI, 1763)
Gurnitz, 28.IV.1912, 1♂* (Pu); Bad Vellach, 12.IX.1921, 1♀ (Pu); Carinthia, Viktring, 11.VIII.1945, 1♀ (Hö); Cr., Koschuta, Hudajama, 7.V.1946, 1♀ (Hö); Cr., Karawanken, Koschuta, 7.V.1946, 1♂ (Hö); Prösinggraben b. Wolfsberg, oD, 2♀1♂ (Demelt);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Eurydema oleracea (LINNAEUS, 1758)
Krt., Heimbürg, oD, 1♀; Oberhof (Metnit. T.), III.1908, 2♂* (Pu); Ebental, 27.VII.1909, 1♂ (Pu); Worstsee Wald, 8.VIII.1909, 1♀ (Pu); Carinthia, Viktring, oD, 1♀1♂ (Hö); Carinthia, Passering, oD, 1♀2♂ (Hö); Carinthia, Maria Rain, oD, 1♀ (Hö); Annab. <=Anna-brücke>, 15.VIII., 1♂; Carinthia, Sattnitz-Ost, 20.VI.1945, Petelinz, Genist. tinct., 1♀ (Hö); Carinthia, Wintschach, VII.1945, 1♀2♂ (Hö); Umgb. Pöckau, Korkgraben, 19.X.1945, 1♀ (Strupi); Cr., Koschuta, Hudajama, 7.V.1946, 1♂ (Hö); Umgb. Thörl, Gailitz, 14.V.1946, 1♀2♂ (Strupi); Carinthia, Sattnitz-West, 16.IV.1948, 1♂ (Hö); Prösinggraben bei Wolfsberg, oD, 1♀ (Demelt); Krt., Korallpengeb., 1948, 1♂ (Demelt); Carinthia, Wollanig, 5.IX.1961, 1♀ (Hö); Carinthia, Pressegger See, 20.VII.1972, 1♂ (Sampl);
Anm.: Von *PROHASKA (1923) publiziert.

Eurydema ornata (LINNAEUS, 1758)
[IT] (Südtalien), VII.1910 (Prenn); [CR] Orsera (Ist.) <= Vrsar, Istrien>, 18.IX.1910, 1♂ (Pu); [MC] Macedonia, Prilep, 26.V.1956, 1♂ (Thurner);

Eurydema ventralis KOLENATI, 1846
Wohnung, Kleft., 9.VIII.1918, 1♀ (Pu); Carinthia, Viktring, oD, 3♀1♂, VII.1945, 1♀, hort., 11.VIII.1945, 1♂, hort. (Hö); Carinthia, Viktring, 10.V.1946, 2♀6♂, hort. (Hö); [GR] Peloponnes, 12.-20.VI.1958, 1♀ (Thurner) det. EW;

Eurydema rotundicollis (DOHRN, 1860)
Cr., Bärental, Karawanken, oD, 1♂; Karawanken, Kosiak, 9.VI.1945, 1♂ (Hö); Cr., Dobratsch Alp., 20.IV.1946, 1♂ (Strupi); Cr., Karawanken, Ogrisalm, Kosiak, 15.V.1948, 2♂ (Hö); Karnische Alpen, Rattendorferalm, 5.VI.1950, 1♂ (Hö); Karawanken, <Fundort unleserlich>, VIII.1964, 1♀ (Hö);

Arma custos (FABRICIUS, 1794)
Carinthia, Maria Rain, 2.IX.1961, 1♂ (Hö);

Danksagung

Ich danke Herrn Dr. P. Mildner für die Möglichkeit das Sammlungsmaterial zu bearbeiten und die große Geduld während der Fertigstellung des Manuskripts sowie den Herren Dr. E. Heiss (Innsbruck) und Dr. C. Rieger (Nürtingen) für die Überprüfung kritischer Belege und Dr. T. Frieß (Graz) für Anmerkungen zum Manuskript.

Zusammenfassung

Die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten (ca. 2.900 Exemplare) wurde durchgesehen und großteils revidiert. Die meisten Belege wurden von E. Hölzel in der Umgebung von Klagenfurt gesammelt. Im Material befinden sich auch Syntypen der von PUSCHNIG (1925) beschriebenen Farbvariationen von verschiedenen Wasserläufer-Arten (*Gerris spp.*), die jedoch taxonomisch ohne Bedeutung sind. Erstmals für das jeweilige Bundesland genannt werden: *Notonecta viridis*, *Phytocoris austriacus*, *Trigonotylus pulchellus*, *Actinonotus pulcher*, *Aradus ribauti* und *Stygnocoris cimbricus* für Kärnten, *Notonecta reuteri* für die Steiermark, *Coranus woodroffe* und *Elatophilus nigricornis* für Vorarlberg. Die bereits früher angezeigten Literaturangaben von *Sigara dorsalis*, *Deraeocoris cordiger*, *Taylorilygus apicalis*, *Stygnocoris faustus* und *Sciocoris galiberti* betreffen andere Arten. Die Literaturangaben von *Notonecta obliqua*, *Dicyphus pallicornis*, *Brachycoleus decolor*, *Halticus pusillus*, *Orthocephalus coriaceus* und *Orthotylus virens* für Kärnten sind wegen Verwechslungen vorläufig unbestätigt.

Literaturverzeichnis

ANDERSEN NM (1995) Infraorder Gerromorpha Popov, 1971 - semiaquatic bugs. In: AUKEMA B & RIEGER C (eds) Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 1, Netherlands Entomological Society, Amsterdam, 77-114.
DEMELT von C (1974) Major a.D. Prof. Emil Hölzel. Carinthia II 164./84., 345-439.
FRIER T (2001) Wanzen (Heteroptera) aus dem Naturschutzgebiet „Trögerner Klamm“ in Südkärnten. Linzer biol. Beitr. 33/1, 275-293.
FRIER T, HEISS E & RABITSCH W (1999) Verzeichnis der Wanzen Kärntens (Insecta: Heteroptera). In: ROTTENBURG T, WIESER C, MILDNER P, HOLZINGER WE (Red.) Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens. Naturschutz in Kärnten 15, 451-472.
HEISS E (1997) Das Typenmaterial der von V.M. Gredler beschriebenen Miridae und Lygaeidae (Heteroptera). Veröff. Tir. Landesmus. Ferd. 77, 287-292.
HÖLZEL E (1952) Faunistische Mitteilungen. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 9, 161-162.
HÖLZEL E (1953) Faunistische Mitteilungen. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 10, 196-198.
HÖLZEL E (1954a) Neues über Heteroptera (Ungleichflügler oder Wanzen) aus Kärnten. Carinthia II 144./64., 70-83.

- © Landesmuseum für Kärnten; download unter www.biologiezentrum.at
- HÖLZEL E (1954b) Faunistische Mitteilungen. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 11, 221.
- HÖLZEL E (1958a) Neue Heteropteren für Kärnten an künstlichem Licht gefangen. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 12, 220-221.
- HÖLZEL E (1958b) Neues über *Saldula xanthochila* Fieb. an der Drau südl. Klagenfurt. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 12, 222-223.
- HÖLZEL E (1958c) *Scolopostethus lethierryi* <sic> Jak. - Berichtigung. Nachr.bl. Fachgr. Entomol. Nat. Wiss. Ver. Kärnten 12, 223.
- HÖLZEL E (1967) Aus der Tierwelt Kärntens. Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten 24. Klagenfurt, 116 pp.
- HÖLZEL E (1969) Neues über Heteroptera (Ungleichflügler oder Wanzen) aus Kärnten. Carinthia II 159./79., 132-138.
- KREISSL E (1978) Professor Emil Hölzel zum Gedenken. Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 7(1), 1-16.
- MILDNER P & LEUTE GH (1987) Roman Puschnig (1875-1962) Leben und Werk. Carinthia II, 46. Sonderheft, 5-65.
- MOOSBRUGGER J (1946) Die Wanzen des steirischen Ennsgebietes. Zentralbl. f. Gesamtgeb. Ent. 1(1), 1-12.
- PÉRICART J (1983) Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens. Faune de France 69, 620 pp., Paris.
- PROHASKA K (1923) Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren Kärntens. Carinthia II 113./33., 32-101.
- PROHASKA K (1932) Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren Kärntens. Carinthia II 122./42., 21-41.
- PUSCHNIG R (1925) Beitrag zur Kenntnis der Wasserwanzen Kärntens. Carinthia II 115./35., 85-109.
- RABITSCH W (1999) Die Wanzensammlung (Insecta: Heteroptera) von Johann Moosbrugger (1878-1953) am Naturhistorischen Museum Wien. Ann. Naturhist. Mus. Wien 101B, 163-199.
- STICHEL W (1957-62) Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Stichel, Berlin-Hermsdorf.
- ŠTUSAK JM (1961) *Acalypta pulchra* sp. n., eine neue Tingidenart aus Bulgarien (Heteroptera, Tingidae). Čas. Českoslov. Spol. Entomol. 58, 261-265.
- TAMANINI L (1947) Contributio ad una revisione del genere *Velia* Latr. e descrizione di alcune specie nuove (Hemiptera Heteroptera: Veliidae). Mem. Soc. Entomol. Italiana 26, 17-74.
- WAGNER E (1960) Beitrag zur Heteropterenfauna Macedoniens (Hem. Het.). Fragmenta Balcanica, Musei Macedonici Scientiarum Naturalium 13(3), 107-112.

Adresse des Autors: Dr. Wolfgang Rabitsch, Institut für Zoologie der Universität Wien, Althanstraße 14, A-1090 Wien, e-mail: wolfgang.rabitsch@univie.ac.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Rudolfinum- Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [2002](#)

Autor(en)/Author(s): Rabitsch Wolfgang

Artikel/Article: [Die Wanzensammlung am Landesmuseum Kärnten. 451-480](#)