

Darstellung von Dibromacetaldehydacetal durch direkte Bromierung von Paraldehyd

Von
Rudolf Dworzak

Aus dem Analytischen Laboratorium der Universität in Wien

(Vorgelegt in der Sitzung am 12. Juni 1925)

Gelegentlich synthetischer Arbeiten mit einem nach den Angaben von Freundler und Ledru¹ hergestellten Monobromacetal, über die an anderer Stelle berichtet werden wird, zeigte sich aus den erhaltenen Produkten, daß das Ausgangsmaterial offenbar mit Dibromacetal verunreinigt gewesen sein mußte. Da Freundler² ausdrücklich angibt, daß es bei Bromierung des Paraldehyds bei Temperaturen unter 0° nicht gelingt, ein zweites Bromatom einzuführen, wenn aber die Temperatur über 0° ansteigt, bei Gegenwart eines Überschusses von Brom Krotionisation und die schließliche Bildung von Tetrabrombutyraldehyd eintritt, schien es von Interesse, diese Unstimmigkeit aufzuklären, zumal das Dibromacetal bisher in der Literatur nicht beschrieben ist.

Wenn man von den verschiedenen Darstellungsweisen des Bromals aus Äthylalkohol und Brom³ und der Bildung von Monobromacetal aus Dibromäther und Natriumäthylat⁴, welche letztere zur Darstellung nicht in Betracht kommen dürfte, absieht, so bestanden bisher im wesentlichen folgende Wege zur Herstellung der Bromderivate des Acetaldehyds, beziehungsweise ihrer Acetale:

Während die beiden obenerwähnten Reaktionen in der Hauptsache wie bei den analogen Chlorderivaten zu verlaufen scheinen, fand Pinner⁵, daß die von Hagemann⁶ versuchte direkte Einwirkung von flüssigem oder gasförmigem Brom auf Acetaldehyd viel zu heftig verläuft, um zur Darstellung der Bromprodukte zu dienen; er führte daher die Einwirkung bei Gegenwart von Verdünnungsmitteln durch und empfahl schließlich die Bromierung von Paraldehyd in der doppelten Menge Essigester. Monobromaldehyd ließ sich nicht isolieren, dagegen Di- und Tribromaldehyd, beziehungsweise deren Hydrate; über die Ausbeuten

¹ Bull. (4) 1, 73 (1907); vgl. auch Freundler und Ledru C 140, 795.
C 140, 1693.

Löwig, A. 3, 288; Schäffer, B. 4, 366 u.

⁴ Wislicenus, A. 192, 112.

A. 179, 67

B. 3, 758.

fehlen nähere Angaben. In neuerer Zeit griff Mylo¹ auf die Pinnische Darstellungsweise des Dibromacetaldehyds zurück, ersetzte aber den Essigester — um die nebenher aus ihm entstehenden Bromprodukte zu vermeiden — durch Chloroform. Der Aldehyd ziemlich leicht rein zu erhalten, die Ausbeute jedoch nach Angabe des Verfassers auch nicht gut (maximal 33 g Dibromaldehyd = 22 g Paraldehyd = zirka 30% der Theorie).

Emil Fischer² schlug als neuen Weg den der Bromierung des Acetals bei Gegenwart von Calciumcarbonat vor und stellt auf diesem Wege das Monobromdiäthylacetal dar, aus welchem dann durch Destillation mit entwässerter Oxalsäure auch den freien Monobromacetaldehyd erhalten konnte.

Im Jahre 1900 fand A. Franke³, daß man bei der direkten Bromierung von trimerem Isobutyraldehyd in Schwefelkohlenstofflösung bei -15 bis -5° glatt Parabromisobutyraldehyd erhält, das sich leicht analysenrein gewinnen ließ; weniger glatt, aber ebenfalls noch gut, ließ sich auf analogem Wege⁴ der Parabrompropionaldehyd darstellen. Auch aus Paraacetaldehyd konnte ein krystallisiertes Bromprodukt erhalten werden, doch sind die experimentellen Schwierigkeiten bei dessen Reinigung schon beträchtlich; seine Reindarstellung gelang erst H. Hibert und H. S. Hill⁵ (Ausbeute bestenfalls 32%); durch sehr vorsichtige Destillation des ganz reinen Produktes gelang es den erwähnten Autoren auch, daraus den monomeren Bromacetaldehyd zu erhalten, vielleicht allerdings nicht ganz frei von trimerem.⁶

Wie aus vorstehenden Angaben ersichtlich, bildet die Hauptschwierigkeit die Isolierung des Parabromacetaldehyds, während die Bromierung bei tiefer Temperatur glatt verläuft. Für Fälle in denen man an Stelle des freien Aldehyds das Acetal anwenden kann, bedeutete es daher eine glückliche Lösung, als Freundle und Ledru⁷ zu dem durch Bromieren von Paraldehyd bei -10 bis -5° ohne Verdünnungsmittel erhaltenen Produkt einen Überschuss an absolutem Alkohol zufügten; das Gemisch erwärmt sich dadurch, es tritt offenbar Depolymerisation und gleichzeitig — infolge des Überschusses an absolutem Alkohol und des im Reaktionsgemisch vorhandenen Bromwasserstoffs — Acetalisierung ein. Da Monobromacetal läßt sich nach dieser oder der durch E. Späth vereinfachten Methode leicht und in relativ guter Ausbeute

¹ B. 45, 1, 647.

² B. 25, 2551; Verbesserung der Ausbeute: Braun B. 35, 3388. Anmerkung 1.

³ M. 21, 206 und 210.

⁴ A. Franke, A. 351, 421 ff.

Journ. Am. Ch. Soc. 45, 734 ff.

Während der Drucklegung der vorliegenden Arbeit wurden die Untersuchungen von A. Stepanow, N. Preobraschensky und M. Sechtschukin, denen die Darstellung von ganz reinem Monobromacetaldehyd mit befriedigender Ausbeute gelang, veröffentlicht, auf die hiermit ebenfalls verwiesen sei; vgl. B 58, p. 171¹

⁷ C. r. 140, 795 und Bull. (4) 1, 73.

M. 36, 4.

Freundler und Ledru erhielten 50% der Theorie an reinem Monobromacetal) darstellen.

Bezüglich des Dibromacetals findet sich lediglich im Protokoll Sitzung der Chem. Ges. von Paris vom 23. Juni 1905¹ der kurze Satz: »M. Freundler communique ses recherches sur le dibromacétal.« Da nicht die geringste Andeutung mehr über die Ergebnisse dieser Untersuchungen veröffentlicht ist², ist es mehr wahrscheinlich, daß dieselben bezüglich der Darstellung des Dibromacetals negativ waren und die erwähnte Mitteilung sich offenbar auf jene Versuche bezog, die von demselben Autor drei Tage später der Akademie der Wissenschaften in Paris vorgelegt wurden und hiedurch zu der früher erwähnten Veröffentlichung³, nach welcher Dibromacetal nicht erhalten wurde, führten.

Durch die eingangs erwähnten Ergebnisse aufmerksam gemacht, untersuchte ich nun neuerlich die Einwirkung von Brom auf Paraldehyd, wobei die von Freundler angegebene Versuchsanordnung und seine Art der Aufarbeitung im wesentlichen beibehalten wurden. Bei der Einwirkung von 1 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd entstand nebst der auch von Freundler angegebenen circa 50%igen Ausbeute an Monobromacetal und etwas Tetrabrombutyraldehyd wiederholt so viel Dibromacetal, daß die Isolierung von einigen Gramm desselben möglich war, obwohl gleich hier erwähnt sei, daß alle in Betracht kommenden Körper, auch wenn ihre Siedepunkte relativ weit auseinander liegen, aus ihren Gemischen nur durch wiederholte, sorgfältige Destillation ganz rein erhalten werden können.

Nunmehr wurde auch die Einwirkung von 2 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd versucht:

Einwirkung von 2 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd.

Die Apparatur entsprach der von Freundler und Ledru⁴ angegebenen. Zu 45 g Paraldehyd (getrocknet und destilliert) werden zunächst 51 cm³ Brom wie zur Darstellung des Monobromacetals zugefügt (langsames Eintropfen unter Rührung, Temperatur —10 bis +5°), dann noch weitere 51 cm³ (jetzt rascher, da sichtliche Erwärmung nicht mehr eintrat) und mit dem Rühren noch ungefähr drei Stunden fortgefahren, dann über Nacht im Eiskasten aufbewahrt, abermals einen Tag in Kältemischung gerührt und wieder über Nacht im Eiskasten belassen, so daß die Temperatur nie wesentlich über 0° stieg. Hierauf wurden unter Rühren und

¹ Bull. (3) 33, 868 (1905).

Das Dibromacetal fehlt auch in Beilstein's Handb. d. Chem., vierte Auflage.

C 140, 1693.

⁴ Bull. (4) 1, 73.

Kühlen durch Kältemischung 200 cm^3 absoluter Alkohol zugesetzt und 24 Stunden stehengelassen. Die Flüssigkeit war durchsichtig, tiefrot gefärbt, bildete aber keine zwei Schichten; sie wurde zirka drei Liter Wasser eingegossen; ein rotes Öl setzte sich auf dem Boden. Das Wasser wurde durch Dekantieren entfernt, das Öl mit Äther aufgenommen und mit eiskalter Sodalösung bis zur völligen bleibenden Farblosigkeit der Ätherlösung gewaschen, dann noch mehrmals mit Wasser, und schließlich über Chlorcalcium getrocknet. Nach Abdestillieren des Äthers wurde im Vakuum fraktioniert. Bei der Vakuumdestillation stieg das Thermometer nach wenigen Tropfen Vorlauf gleich auf 75° ($10 \cdot 5 \text{ mm}$)¹, dann ziemlich rasch noch bis 85° ; die Fraktion von 75 — 105° wurde als farblose Flüssigkeit aufgefangen; nach weiterem zweimaligen Fraktionieren wurden 110 g Dibromacetal vom Siedepunkt 94 — 99° (10 mm) erhalten; der Siedepunkt des ganz reinen Dibromacetals liegt bei 96 — $96 \cdot 5^\circ$ (10 mm). Es ist eine vollkommen farblose Flüssigkeit, die sich auch bei mehrwöchigem Stehen nicht färbte und im Geruch nicht merklich vom Monobromacetal unterschied.

Brombestimmung nach Liebig in der Fraktion $Kp_{10} = 94$ — 99°

0·3430 g Substanz ergaben 0·4684 g AgBr = 58·12₀% Br

Brombestimmung nach Liebig aus dem Produkt ($Kp_{10} = 96$ — $96 \cdot 5^\circ$):

0·4367 g Substanz ergaben 0·5920 g AgBr = 57·78₀% Br

Berechnet für $C_6H_{12}O_2Br_2$ 57·92₀% Br

Nach der ersten Vakuumdestillation war im Kolben noch ein goldgelb gefärbtes dickliches Öl hinterblieben; dasselbe erstarrt nach dem Umgießen in einen kleineren Kolben zu einer weißer Krystallmasse. Bei deren Destillation gingen nach einem Vorlauf von 7·5 g zirka 50 g zwischen 135 und 142° (8 mm) über², die auf Zufügen eines Impfkristalls sofort zu einer schön weiß krystallisierten Masse von Tetrabrombutyraldehyd erstarrten; derselbe wurde durch Halogenbestimmung und Schmelzpunkt identifiziert.

Aus vorstehendem Versuche ersieht man, daß man bei Einwirkung von 2 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd bei Temperaturen unter 0° durch entsprechend verlängerte Einwirkungsdauer entgegen der Angabe von Freundler und Ledru Dibromacetal in relativ guter Ausbeute (zirka 40% der Theorie) erhalten kann. Daneben entstehen höchstens ganz geringe Mengen von Monobromacetal, dagegen Tetrabrombutyraldehyd in nennenswerter Menge.

¹ Monobromacetal: $Kp_{10} = 60$ — 62°

² Kp_8 des reinen Tetrabrombutyraldehyds wurde gefunden bei 140°

Es lag nunmehr nahe, auch die Einwirkung von 3 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd zu versuchen, um eventuell auf diesem Wege das Tribromacetal darzustellen, wengleich schon von vornherein außer mit den Schwierigkeiten einer so weitgehenden Bromierung auch mit der schweren Acetalisierbarkeit des Tribromaldehyds¹ gerechnet werden mußte.

Einwirkung von 3 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd.

In den früheren Versuchen analoger Weise wurden in 45 g Paraldehyd zunächst vorsichtig 51 cm^3 Brom, dann rascher noch weitere 102 cm^3 eingetragen und die Einwirkungsdauer auf dreimal 24 Stunden ausgedehnt, davon ungefähr die halbe Zeit unter kräftiger Rührung; auch bei diesem Versuch wurde beachtet, daß die Temperatur nie wesentlich über 0° stieg. Gegen Ende der Einwirkungsdauer entwich aus dem Reaktionsgemisch Bromwasserstoff. An den Wänden des Reaktionsgefäßes hatten sich einige tafelförmige Krystalle angesetzt, die jedoch nicht untersucht wurden.² Nach Zusatz von 200 cm^3 absoluten Alkohols wurde in genau derselben Art weitergearbeitet, wie beim Dibromacetal angegeben. Bei der Destillation unter 10 mm Druck gingen 48 g zwischen 92·5 und 100° über, die ihrem Siedepunkt nach ziemlich reines Dibromacetal darstellen. Weitere 52 g gingen zwischen 100 und 125° über. Aus der Siedekurve zeigte sich also deutlich, daß mehr höhersiedende Bestandteile entstanden waren, als bei der Einwirkung von 2 Mol Brom; wie bereits erwähnt, zeichnen sich die hier in Betracht kommenden Körper dadurch aus, daß sie im Gemisch miteinander oft weit unter ihrem eigentlichen Siedepunkt schon flüchtig sind.³ Daher gelang es durch wiederholte Fraktionierung nur, die Ausbeute an Dibromacetal noch etwas zu erhöhen; anderseits wurden einige Gramm einer konstant bei 120·5 bis 122·5° (10 mm) übergehenden Fraktion erhalten; der Siedepunkt läßt mit Rücksicht auf den des Dibromacetals und in Analogie mit der Siedepunktsdifferenz der entsprechenden Chlorderivate auf Tribromacetal schließen. Tatsächlich ergaben die Analysenresultate folgende Werte.

0·2370 g Substanz ergaben 0·3862 g AgBr.	<u>69·35% Br.</u>
0·2587 g Substanz ergaben 0·1873 g CO ₂	<u>19·75% C</u>

¹ Vgl. Jacobsen und Neumeister, B. 15, 602, und besonders Pinner, 31, 1930, Anm. 1.

Möglicherweise $CBr_3 \cdot CHO + HBr?$

³ So erhielt ich einmal aus den letzten Tropfen einer bis 125° (10 mm) übergegangenen Fraktion Krystalle, die sich durch ihren Schmelzpunkt als Tetrabrombutyaldehyd erwiesen, dessen Kp_{10} bei 142° liegt!

0·2587 Substanz ergaben 0·0739 g H₂O

Berechnet für C₆H₁₁O₂Br₃

3·20⁰₀
 .67·56⁰₀ l.
 20·29⁰₀ l.
 3·10⁰₀

Mit Rücksicht darauf, daß es fast unmöglich sein dürfte, die Fraktion 120·5 bis 122·5° (10 mm) — außer bei Destillation großer Mengen — frei von Tetrabrombutyraldehyd zu erhalten (vgl. Anm. 3 auf vorhergehender Seite), woraus sich der zu hohe Bromwert und auch die Differenz an Kohlenstoff erklären ließe, könnte man aus obigen Analysenzahlen schließen, daß ein nicht ganz reines Tribromacetal vorliegt. Dieser Schluß erweist sich jedoch als unsicher, wenn man bedenkt, daß ein Gemisch von 60·7⁰/₀ Dibromacetal und 39·3⁰/₀ Tetrabrombutyraldehyd bei der Elementaranalyse folgende Werte liefern müßte:

67·58⁰/₀ Br

20·72⁰/₀ C

3·05⁰/₀ H,

die denen für Tribromacetal so ähnlich sind, daß durch Analyse sicher keine Entscheidung zwischen ihnen getroffen werden könnte, auch das Molekulargewicht von Tribromacetal und das scheinbare des oben erwähnten Gemisches differieren zu wenig, um dadurch eine sichere Entscheidung finden zu können, zumal das Vorliegen eines ähnlichen Gemisches leicht möglich wäre. Um mir Gewißheit zu verschaffen, ob Tribromacetal überhaupt entsteht, schlug ich folgenden Weg ein: Die fragliche Substanz (Fraktion 120·5 bis 122·5° 10 mm) wurde zirka eine Stunde am Rückflußkühler mit konzentrierter Bromwasserstoffsäure gekocht, hierauf starke Kalilauge im Überschuß zugesetzt. In kürzester Zeit ließ sich ein intensiver Bromoformgeruch bemerken und es gelang leicht, eine kleine Menge Bromoform aus dem Gemisch zu isolieren, womit wohl mit Sicherheit erwiesen scheint, daß die erwähnte Fraktion im wesentlichen aus Tribromacetal besteht; dasselbe ist ein schon etwas dickliches, farbloses Öl vom $Kp_{10} = 120·5$ bis $122·5°$

Abschließend läßt sich nun über die hier berichteten Versuche sagen, daß entgegen der Angabe von Freundler und Ledru bei der Einwirkung von 1 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd immer auch geringe Mengen von Dibromacetal entstehen dürften, manchmal soviel, daß ihre Isolierung gelingt. Bei der Einwirkung von 2 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd entsteht Dibromacetal in relativ guter Ausbeute (zirka 40⁰/₀ der Theorie), daneben erhebliche Mengen von Tetrabrombutyraldehyd. Bei der Einwirkung von 3 Mol Brom auf 1 Mol Paraldehyd wurden ebenfalls in erster

Linie Dibromacetal und Tetrabrombutyraldehyd gefunden. Die Entstehung von Tribromacetal wurde durch seine Verseifung mit konzentrierter Bromwasserstoffsäure und Überführung des Bromals durch Kalilauge in Bromoform mit Sicherheit nachgewiesen, doch entsteht es bei den angegebenen Versuchsbedingungen nicht annähernd in solcher Menge, daß es auf diesem Wege dargestellt werden könnte. Während das zweite Bromatom noch ziemlich leicht eintritt, gelang es so, nur ganz unbedeutende Mengen von tribromiertem Produkt zu erhalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [134_2b](#)

Autor(en)/Author(s): Dworzak Rudolf

Artikel/Article: [Darstellung von Dibromacetaldehydacetal durch direkte Bromierung von Paraldehyd. 253-259](#)