

# Die Bryozoen der Retzer Sande

Von O t h m a r K ü h n

(Paläontologisches Institut der Universität, Wien)

Mit 2 Tafeln.

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. März 1955)

## I. Ein neuer Bryozoenfundort.

Die Retzer Sande sind seit fast hundert Jahren, aber nur wenig bekannt. E. S u e s s<sup>1</sup> hat sie auf Grund einiger weniger Muscheln und unbestimmter Echiniden mit den höheren Horizonten der Eggenburger Schichten verglichen. Genauer beschrieben hat sie H. V e t t e r s<sup>2</sup>, der auch nur einige Mollusken und unbestimmte Balanen aus Ober-Nalb anführte. Erst 1954 begann Dr. A. B e r n h a u s e r eine eingehende Untersuchung dieser Vorkommen, eines bei Unter-Nalb, SW von Retz, eines bei Ober-Nalb, zwischen Retz und Markersdorf, und eines dritten bei Pillersdorf, WSW Retz, knapp vor Schrottenthal. Außer Mollusken, Balaniden, Echinidenresten und Foraminiferen fand Dr. B e r n h a u s e r aber auch Bryozoen, wenn auch größtenteils nur in unbestimmbaren Bruchstücken, vielfach zu feinem Grus zerrieben. Nur ein kleiner Teil war bestimmungsfähig.

Bryozoen sind aus dem österreichischen Burdigal überhaupt wenig bekannt. In seiner ersten Bearbeitung der österreichisch-ungarischen Bryozoenfaunen kannte R e u s s 1847 überhaupt keine Bryozoen des Burdigals. E. S u e s s führte<sup>3</sup> von Burgschleinitz *Lepralia monoceros* und *Cupularia haidingeri*, von Ober-Dürnbach<sup>4</sup> *Cellepora globularis*, *Vaginopora polystigma*, *Eschara polystomella*, *Idmonea cancellata* und *distincta*, von Maißau<sup>5</sup> *Membranipora fenestrata*, *Cricopora pulchella*, *Hornera hippolithus*, *Eschara poly-*

<sup>1</sup> 1866, S. 21.

<sup>2</sup> 1918, S. 463.

<sup>3</sup> 1866, S. 16, nach Bestimmungen F. Stoliczka's; Namen in damaliger Schreibweise, weil z. T. bis heute nicht revidiert.

<sup>4</sup> 1866, S. 21.

<sup>5</sup> 1866, S. 23.

*stomella*, von Meisselsdorf<sup>6</sup> *Lepralia scripta* und *Eschara papillosa* an. Alle diese Angaben erfolgten ohne Beschreibung oder Abbildung, die Belege sind nicht mehr zu finden, sie wurden auch von Reuss und Manzoni nicht berücksichtigt. Denn später erwähnt Reuss<sup>7</sup> nur von Maibau seine *Lepralia rarepunctata*, Manzoni von Zogelsdorf<sup>8</sup> *Myriozoum punctatum*, von Ober-Dürnbach<sup>9</sup> *Idmonea carinata* und von Maibau<sup>10</sup> *Idmonea foraminosa* und<sup>11</sup> *Fungella multifida*. Eine spätere Revision<sup>12</sup> erbrachte aus den Eggenburger Schichten bloß 22 Arten, nämlich *Membranipora* cf. *laxa* (Rss.) C. B., *Conopeum lacroixi* (Busk) C. B., *Biflustra savartii* *texturata* (Rss.) C. B., *Onychocella angulosa* (Rss.) Neviani, *Steraechmella hippocrepsis* (Rss.)<sup>13</sup>, *Cribrilina radiata scripta* (Rss.) C. B., *Lepralina auriculata* (Rss.) Kühn, *Schizoporella geminipora* (Rss.) Pergens, *Aimulosia glabra* Kühn, *Sertella gigantea* Kühn, *Trigonopora monilifera* (M. Edw.)<sup>14</sup>, *Holoporella albirostris* (Smitt) Osburn, *H. polythele* (Rss.) C. B., *Schismopora coronopus* (Wood), *S. krahuletzki* Kühn, *Myriapora truncata* Pallas, *Ceripora chaetoides* Kühn, *Oncousoecia varians* (Rss.) C., *Lichenopora prolifera* (Rss.) Neviani, *Tretocycloecia dichotoma* (Rss.) C., *T. lithothamnoides* Kühn, *Multicavea crassa* Kühn<sup>15</sup>.

Diese Liste umfaßt sicher nicht den ganzen Bryozoenbestand der Eggenburger Schichten. Bei der Bearbeitung zeigte sich, daß in den großen Sammlungen cyclostome Bryozoen überhaupt fehlten und cheilostome vielfach von den Muscheln, auf denen sie saßen, abgekratzt waren; sie interessierten die damaligen Sammler nicht. Die Arbeit mußte aber auf Grund des vorhandenen Materials in kurzer Zeit für das Schlußheft der Eggenburger Monographie von F. X. Schaffer fertiggestellt werden. Die Bearbeitung eigener Aufsammlungen und einer umfangreichen Fauna der schwäbischen oberen Meeresmolasse wird erst eine Beurteilung der euro-

<sup>6</sup> 1866, S. 24.

<sup>7</sup> 1874, S. 175.

<sup>8</sup> 1877, II, S. 71.

<sup>9</sup> 1877, III, S. 5.

<sup>10</sup> 1877, III, S. 7.

<sup>11</sup> 1877, III, S. 17.

<sup>12</sup> Kühn 1925.

<sup>13</sup> Ob diese Art zu *Steraechmella buski* nov. gen. nov. spec. Lagaij 1952, S. 39, oder zu *Gargantua hippocrepsis* Dartevelle 1952, S. 184, gehört, kann nur durch Autopsie der Typen entschieden werden; die Abbildungen sind zu schlecht. Nach Canu & Bassler 1920, S. 230, und Voigt 1930, S. 380, kommt *Aechmella* (= *Gargantua*) *bidens* nur in der Kreide vor.

<sup>14</sup> Statt *Metrarabdotos* Canu 1914 tritt *Trigonopora* Maplestone 1902.

<sup>15</sup> Statt *Ascosoecia* Canu 1919 tritt *Multicavea* D'Orbigny 1853.

päischen burdigalen Bryozoenfauna ermöglichen. Erst dann wird sich zeigen, ob es eine kennzeichnende Bryozoenfauna des Burdigals überhaupt gibt oder ob diese im Miozän und Pliozän fast einheitlich bleibt, wie man nach den früheren Arbeiten annehmen müßte. Reuss führt ja in der miozänen Bryozoenfauna viele kretazische und rezente Arten an, aber auch Canu & Bassler behalten noch eine ansehnliche Anzahl bei. Canu & Lecoindre<sup>16</sup> betrachten die Bryozoenfauna der Faluns als jene eines wenig südlicheren Mittelmeeres, etwa zwischen den Küsten von Marokko, der Kanaren und von Madeira. Das steht im Widerspruche zu den Ergebnissen an Mollusken und Korallen. Voigt hat auch darauf hingewiesen, daß die hochspezialisierten Bryozoengruppen, trotz ihrer Faziesabhängigkeit, eine sehr rasche Entwicklung zeigen, so daß sie innerhalb der Oberkreide zu stratigraphischen Zwecken brauchbar sind<sup>17</sup>. Da die kleinen Bryozoenkolonien und Segmente, wie sich zeigte, in Bohrkernen vorzüglich erhalten sind, können sie auch für erdölgeologische Fragen von Bedeutung werden.

## II. Die Bryozoenfauna.

### *Cyclostomata.*

#### ***Diaperoecia rugulosa*** (Manzoni) Canu & Bassler.

- 1877 (*Pustulopora r.*) Manzoni, III, S. 11, Taf. 10, Fig. 38 (a, c, non b, d?).  
1924 Canu & Bassler, S. 686, Taf. 25, Fig. 12 (non 13?).  
1928 (*Entalophora r.*) Bobies, S. 25.

Canu & Bassler haben 1924 behauptet, daß Manzoni unter dem Namen *Pustulopora rugulosa* zwei gute Arten beschrieben habe, ohne aber daraus nomenklatorische Folgerungen zu ziehen.

Im Naturhistorischen Museum in Wien wurden keine von Manzoni als *Pustulopora rugulosa* bezeichneten Stücke gefunden. 11 Stücke trugen die Bezeichnung „*Pustulopora*“ und stammen aus Steinabrunn, während Manzoni eine große Zahl von Fundorten angibt. Unter diesen Stücken finden sich beide Formen, bei den dickeren sind tatsächlich auch die Röhren bloß auf kürzere Erstreckung angewachsen und nicht so regelmäßig verteilt wie bei den dünneren, sie tragen auch eine stärkere Querrunzelung. Trotzdem scheinen beide Formen nach den vorkommenden Zwischenformen nur die Endglieder einer Modifikationsreihe mit

<sup>16</sup> Canu & Lecoindre 1925, S. 6.

<sup>17</sup> Voigt 1930, S. 379.

korrelierenden Merkmalen zu sein. Doch möchte ich die Frage nach den wenigen Stücken nicht zu entscheiden versuchen.

Die zwei Stücke von Unter-Nalb würden der dünneren Form Canu & Basslers angehören. Die Stämmchen haben Durchmesser von 0,80 bis 1 mm (bei Canu & Bassler 0,80—1,75 mm); die sonstigen Maße, Durchmesser der Röhren 0,20 mm, Länge der Röhren 1—1,2 mm, Peristomdurchmesser 0,16 mm stimmen aber gut überein. Die Röhrchen liegen im größten Teil ihrer Länge dem Stock an, stets zwischen zwei benachbarten Röhrchen und sind nur schwach querverunzelt. Beide Stämmchen sind gerade und oben nur wenig verdickt, während Canu & Bassler angeben, daß sie gelegentlich blattartig verbreiterte Zoarien bilden und oben dichotom geteilt sind.

Manzoni hat als Fundorte Nußdorf, Niederleis, Garschent, Steinabrunn, Großbach, Wildon, St. Nicolai, Kostel, Lapugy angegeben. Canu & Bassler fügen Eisenstadt hinzu.

Fundort: Unter-Nalb.

### *Hornera striata* Milne-Edwards.

1952 Lagaaij, S. 170, Taf. 21, Fig. 4 a, b. Ibid. Lit. Ferner:

1924 Canu & Bassler, S. 688.

1946 Roger & Buge, 226.

1948 Buge, 74, 79.

Ein gut erhaltenes Bruchstück zeigt deutlich die Zugehörigkeit zu dieser Art und nicht zu *H. frondiculata* Lamouroux, mit der sie oft verwechselt wird. Die Unterschiede sind bei Lagaaij auseinander gesetzt.

Die Art ist aus dem Helvet von Frankreich, aus dem Torton des Wiener Beckens (Eisenstadt und Porzteich), aus dem Pliozän von England, Frankreich und Holland bekannt.

Fundort: Unter-Nalb.

### *Reteporidae reussi* nov. spec.

(Taf. 1, Fig. 3, Taf. 2, Fig. 4).

1847 (*Idmonea cancellata*) Reuss, S. 46, Taf. 5, Fig. 25—27; Taf. 6, Fig. 33 a—c.

1877 (*Idmonea cancellata*) Manzoni III, S. 7, Taf. 5, Fig. 18.

1913 (*Idmonea cancellata*) Canu & Bassler, S. 126.

1922 (*Polyascosoeia c.*) Canu & Bassler, S. 126, 128, Fig. 37 E—F.

1924 (*Polyascosoeia c.*) Canu & Bassler, S. 689, Taf. 25, Fig. 2—7.

1928 (*Polyascosoeia c.*) Bobies, S. 26.

Arttypus (hier bestimmt): das Taf. 1, Fig. 3, abgebildete Stück der Coll. Reuss, Naturhistor. Museum, geol.-pal. Abtlg. Inv.-Nr. 1859-I-720 a.

Art diagnose: bei Canu & Bassler 1924, S. 689.

Locus typicus: Eisenstadt (Torton).

Die Gattung *Polyascoecia* Canu & Bassler 1920 ist identisch mit *Reteporidae* D'Orbigny 1849, teste Bassler 1935, S. 173. Der Artname Reuss' ist ausdrücklich auf *Retepora cancellata* Goldfuß<sup>18</sup>, „Archetypus fossile, e monte St. Petri“ bezogen. Canu & Bassler zählen diese Art des Campan, Maestricht und Dan ausdrücklich<sup>19</sup> zu *Polyascoecia*, nachdem sie vorher S. 126 die Unterschiede zwischen ihr und der Miozänart hervorgehoben hatten. Die miozäne Form muß daher, obwohl die Beschreibungen von Canu & Bassler mit den Originalen Reuss' gut übereinstimmen, einen neuen Namen erhalten.

Meine Exemplare sind, ebenso wie der aus Reuss' Material ausgewählte Typus, im Querschnitt rund; doch finden sich unter den Exemplaren Reuss' auch solche mit eckigem Querschnitt, wie sie etwa Reuss auf Taf. 5, Fig. 25—27, oder Canu & Bassler 1924 auf Taf. 25, Fig. 3, abbilden. Die Faszikel bestehen aus 4 bis 5 Röhren, weiter unten 3, schließlich manchmal nur 2, die Entfernung der Faszikel voneinander beträgt 0,25—0,5 mm, der Durchmesser des Peristoms etwa 0.04 mm. Zwischen den Faszikeln befinden sich 3—4 Reihen von Mesoporen. Das Ovizell ist bei Canu & Bassler 1924, Taf. 25, Fig. 3, gut abgebildet.

*Reteporidae reussi* gehört zu den häufigsten Bryozoen des österreichischen Tertiärs. Manzoni erwähnt sie von Nußdorf, Niederleis, Grubbach, Kostel, Porztech, Podjarkow, Eisenstadt, Mörbisch, Rust, Kroisbach, Ehrenhausen, Wildon; Canu & Bassler fügen 1913 Baden, Bobies den Rauchstallbrunngraben bei Baden hinzu. Aus dem Burdigal wurde sie jetzt zum ersten Male gefunden.

Fundort: Unter-Nalb.

### Die Gattung *Tretocycloecia* C. & B.

Schon der Gattungsname hatte ein merkwürdiges Schicksal, indem er 1919, S. 346, als *Tretocycloecia* aufgestellt, jedoch 1920, S. 826, als „in errore“ rektifiziert wurde. Als Gattungstypus war *Heteropora dichotoma* Reuss 1847 angegeben. Reuss bezog seine Art aber ausdrücklich auf *Ceripora dichotoma* Goldfuß<sup>20</sup>, die später von Canu & Bassler als Typus der Gattung *Gramma-*

<sup>18</sup> Petrefacta Germaniae I., S. 103, Taf. 36, Fig. 17 a, b.

<sup>19</sup> 1922, S. 128.

<sup>20</sup> 1827, S. 34, Taf. 10, Fig. 9 a—e, non f.

*scosoecia* aufgestellt wurde<sup>21</sup>. Als Typus von *Tretocyloecia* verbleibt demnach nur die Form Reuss' aus dem Miozän des Wiener Beckens. Canu & Bassler sagen aber 1920, S. 108, ausdrücklich, daß ihnen keine österreichischen Formen vorlagen, daß sie nur Exemplare aus dem französischen Helvet beschreiben. Ich mußte daher zunächst die Identität des Arttypus mit der Form von Canu & Bassler untersuchen.

a) *Tretocyloecia dichotoma* (Reuss) Canu & Bassler  
(Taf. 1, Fig. 1).

1847 (*Heteropora dichotoma* non Goldfuß) Reuss, S. 35, Taf. 5, Fig. 20 a—b.  
1877 (*Heteropora dichotoma* non Goldfuss) Manzoni III, S. 19, Taf. 12, Fig. 46.

Arttypus (Lectotypus, hier bestimmt): das abgebildete Stück, wahrscheinlich Original zu Reuss 1847, Taf. 5, Fig. 20 (1 Ast abgebrochen). Naturhistor. Museum Wien, geol.-pal. Abtlg., Inv.-Nr. 1859-L-686 a.

Locustypicus: Eisenstadt, Torton.

Durchmesser der Stämmchen: 2 mm,

Durchmesser der Aperturen: 0,1 mm,

Durchmesser der Mesoporen: 0,025 mm,

Zahl der Aperturen auf 1 mm<sup>2</sup>: 20,

Zahl der Mesoporen zwischen 4 Aperturen: 4—6.

Die Zoarien sind durchwegs einfach gegabelt. Die Aperturen sind im Gegensatz zu der Beschreibung von Canu & Bassler nie in konzentrischen Kreisen angeordnet, sondern in der Regel in Reihen, die schräg um die Stämmchen laufen.

Die Art wurde von Reuss und Manzoni von Niederleis, Eisenstadt und Forchtenau beschrieben.

b) *Tretocyloecia helvetica* nov. spec.

1919 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Canu & Bassler, S. 346.

1920 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Canu & Bassler, S. 108, Abb. 31 A, B.

<sup>21</sup> 1922, S. 119, Abs. 35 A—D.

Erklärung zu nebenstehender Tafel 1

Fig. 1. *Tretocyloecia dichotoma* Reuss. Arttypus. Eisenstadt, Torton. 20 × vergr. Fig. 2. *Tretocyloecia distincta* nov. spec. Arttypus. Unter-Nalb, Burdigal. 20 × vergr. Fig. 3. *Reteporidaea reussi* Kuehn. Arttypus. Eisenstadt, Torton. 20 × vergr.

Phot. Fig. 1, 2, 3: H. Schwertner, Firma Bors & Müller, Wien.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



- 1920 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Canu & Bassler, S. 826, Abb. 197 B, 275 A—I.  
 1929 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Cipolla, S. 388, Taf. 41, Fig. 8, 11, 12.  
 1934 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Canu & Lecointre, S. 197, Taf. 38, Fig. 1—14.  
 1946 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Roger & Buge, 1946, 226.  
 1948 (*T. dichotoma* non Goldfuss, non Reuss) Buge, 74, 80.

Arttypus (Lectotypus, hier bestimmt): das von Canu & Lecointre, Taf. 38, Fig. 2, abgebildete Stück.

Locus typicus: Mirebeau, Helvetium.

Durchmesser der Stämmchen: 16—20 mm,

Durchmesser der Aperturen: 0,09 mm,

Durchmesser der Mesoporen: 0,03 mm,

Zahl der Aperturen auf 1 mm<sup>2</sup>: 17,

Zahl der Mesoporen zwischen 4 Aperturen: 7—9.

Die Zoarienform der französischen Art ist nach Canu & Bassler 1920, S. 109, recht variabel, massiv, retikuliert, verzweigt oder zylindrisch, während die österreichische Form stets einfach gegabelt ist. Die Aperturen sind nach denselben Autoren oft radial um ein hypothetisches Zentrum angeordnet, was bei der österreichischen Form niemals vorkommt. Aperturen und Mesoporen sind bei beiden Formen annähernd gleich groß, doch sind die Mesoporen bei der französischen im Verhältnis zu den Aperturen etwas größer, sie sind auch dichter gedrängt, während die Aperturen lockerer stehen. Das Ooecium wurde von Canu & Bassler 1920 (Proc.), S. 109, beschrieben; es ist bei allen 3 Formen gleich. So zeichnet sich eine neue Form ab, die sich vielleicht später als Unterart einer der benachbarten Arten herausstellen mag. Vorläufig kann sie noch nicht an eine derselben angeschlossen werden, da die ägyptische noch zu wenig bekannt ist.

Die Art wurde aus dem Helvet der Touraine und aus dem Rédonien beschrieben; vielleicht gehört ihr auch die Form des ägyptischen Miozäns an.

c) *Tretocycloecia distincta* nov. spec.

(Taf. 1, Fig. 2, Taf. 2, Fig. 5).

- 1925 (*T. dichotoma* non Reuss) Kühn, S. 33.

Arttypus (Holotypus): Das Original zu Taf. 1, Fig. 2. Paläontolog. Institut der Universität Wien, Inv.-Nr. 1546.

Locus typicus: Pillersdorf. Burdigalium.

Diagnose: Aufrechte, dicke, einfach gegabelte Zoarien, Aperturen ungleich verteilt, größer als bei *T. dichotoma* und *helvetica*, Mesoporen ebenfalls ungleich, aber stets spärlich verteilt.

Die neue Art zeichnet sich schon durch ihre sehr gleichmäßige Kolonieform, dicke, stets einfach gegabelte, im Querschnitt kreisrunde Stämmchen, aus. Aperturen und Mesoporen sind ungleich verteilt, manchmal anstoßend, gleich daneben in Entfernungen bis 0,5 mm. Die ersteren sind größer als bei jeder anderen Art der Gattung, die letzteren spärlicher. Immerhin steht sie den mittelmiozänen Arten näher als der *T. chaetetioides* Kühn aus dem Burdigal von Klein-Meiseldorf. Sie scheint ein engbegrenztes Lebensgebiet zu bevorzugen: in einem Raum von etwa 6 cm<sup>3</sup> fanden sich 4 Kolonien (Taf. 2, Fig. 5), sonst keine.

Fundort: Unter-Nalb.

### *Ceripora chaetetioides* Kühn.

(Taf. 2, Fig. 7).

1925 S. 31, Taf. 2, Fig. 7, Abb. 8—9.

2 Kolonien, von denen eine abgerundete Ansätze einer Verzweigung zeigt. Ihre Durchmesser betragen ungefähr 48 bzw. 29 mm. Sie sind leider auch nicht besser erhalten als der Typus von Grübern, stark mit Sand verkittet und daher zur Gewinnung weiterer Ergebnisse nicht geeignet.

Fundort: Pillersdorf.

### *Cheilostomata.*

### *Cellaria fistulosa* Linné 1758.

(Taf. 2, Fig. 6).

1847 (*C. marginata*) Reuss, S. 59, Taf. 7, Fig. 28—29.

1874 (*Salicornaria farciminoidea*) Reuss, S. 143, Taf. 12, Fig. 3—13.

1924 Canu & Bassler, S. 976.

1925 Canu & Bassler, S. 19, Taf. 7, Fig. 1, Ibid. Lit.

1928 (*Salicornaria farciminoidea*) Bobies, S. 25.

1946 Roger & Buge, 227.

1947 Buge, 347.

### Erklärung zu nebenstehender Tafel 2

Fig. 4. *Reteporidaea reussi* Kuehn. Unter-Nalb, Burdigal. 20× vergr. Fig. 5. *Tretocycloecia distincta* nov. spec. Pillersdorf, Burdigal. Nat. Gr. Fig. 6. *Cellaria fistulosa* L. Unter-Nalb, Burdigal. 20× vergr. Fig. 7. *Ceripora chaetetioides* Kuehn. Pillersdorf, Burdigal. Nat. Gr. Fig. 8. *Myriapora truncata* Pallas. Ober-Nalb, Burdigal. Nat. Gr. Fig. 9. *Holoporella polythele* Reuss. Groß-Reisperbach, Burdigal. Nat. Gr. Fig. 10. *Cillia cilliae* nov. spec. Arttypus mit Ovicell. Ober-Nalb, Burdigal. 20× vergr.

Phot. Fig. 4, 6, 10: H. Schwertner, Firma Bors & Müller, Wien; Phot. Fig. 5, 7, 8, 9: H. Petrak, Naturhistor. Museum, geol.-pal. Abtlg., Wien.



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10



*Glaucanome marginata* Münster<sup>22</sup> aus dem Oligozän von Astrupp und Doberg, auf die Reuss seine Form ursprünglich bezogen hatte, ist eine ganz andere Form<sup>23</sup>. Später hat Stoliczka unter diesem Namen auch eine Form aus dem Untermiozän von Neuseeland beschrieben<sup>24</sup>, die nach D. A. Brown<sup>25</sup> aber identisch mit *Salicornia immersa* Tennyson Woods<sup>26</sup> ist. Auch sie hat nichts mit der vorliegenden, vom Oligozän bis zur Gegenwart reichenden Art zu tun.

Auf die stark wechselnde Form infolge des verschiedenen Alters der Glieder und der Fossilisation hat bereits Reuss<sup>27</sup> hingewiesen. Die Art geht niemals tiefer als 200 m, ist kosmopolitisch und zerfällt, wie alle articulierten Formen, nach dem Tode in ihre Segmente, die dann oft weit über ihren ursprünglichen Standort weggeschwemmt werden<sup>28</sup>.

Auch aus den Retzer Sanden liegen nur abgerollte Segmente vor, die zudem mit Quarzkörnchen stark verkittet sind. Sie zeigen, ebenso wie die Exemplare Reuss' von Nußdorf, etwas kleinere Zoecien, etwa 0,25—0,33 mm, gegenüber 0,36—0,40 mm bei Canu & Bassler 1925, stimmen aber sonst mit diesen gut überein. Diese zeitlich wie räumlich weitverbreitete Art wird aus dem altösterreichischen Miozän von Reuss außer von Nußdorf noch von Enzersdorf, Steinabrunn, Niederleis, Rausnitz, Wieliczka, Podjarkow, Miechowitz, Zukowce, Lapugy, Eisenstadt, Mörbisch, Rust, Winden, Freibichl, Ehrenhausen angeführt; Canu & Bassler fügen noch Porzteich, Bobies den Rauchstallbrunngraben bei Baden hinzu. Zwei Stücke aus Unter-Nalb sind die ersten des Burdigals.

### *Cillia* nov. gen.

Gattungstypus: *Cillia cilliae* nov. spec.

Diagnose: Rippen breit, kräftig, durch feine strichförmige Intercostalfurchen getrennt, jenseits deren sie zu einem breiten Rücken emporgewölbt sind. Innerhalb des Rückens ein ovaler Ring von punkt- bis kurzstrichförmigen Intercostalporen; der zentrale Teil der Frontalwand flach. Ooecien hyperstomial, groß. Kenozoecien selten. Avicularien unregelmäßig zerstreut, groß, schräg-distal orientiert.

<sup>22</sup> In Goldfuss 1827, S. 100, Taf. 36, Fig. 5.

<sup>23</sup> Vgl. Dartevelle 1952, S. 189.

<sup>24</sup> 1865, S. 150, Taf. 20, Fig. 11—13.

<sup>25</sup> 1952, S. 158.

<sup>26</sup> 1880, S. 27, Abb. 27.

<sup>27</sup> 1874, S. 144.

<sup>28</sup> Canu & Bassler 1925, S. 19.

Die neue cribrimorphe Gattung vereinigt in merkwürdiger Weise primitive und spezialisierte Merkmale und erinnert zunächst mehr an pelmatoporide, als an cribrilinide Formen. Das hyperstomiale Oecium schließt aber die Pelmatoporiden im Sinne Langs aus; auch Pelmata fehlen, anscheinend auch Aperturdornen. Offenbar wurde hier derselbe Bautypus von einer anderen Entwicklungsreihe auf andere Weise erreicht. Beziehungen bestehen nur zu *Membraniporella*; *M. compressa* C. & B. gehört wahrscheinlich, trotz ihrer anderen Zoarienform, unserer Gattung an. Sonst ist *Membraniporella* Smitt 1873 von unserer Gattung durch kräftige Wölbung auch der zentralen Frontalwand und tieferes Hineinreichen der intercostalen Furchen- und Porenreihen unterschieden. Die Verfestigung der Frontalwand ist also bei *Cillia* bereits weiter gediehen, durch Verstärkung und Abflachung des zentralen Teiles und durch Rückzug der Poren- und Furchenzone auf den gewölbten, peripheren Teil. Dies scheint ein Entwicklungsunterschied von generischem Wert zu sein.

***Cillia cilliae* nov. spec.**

(Taf. 2, Fig. 10).

**Arttypus:** das abgebildete Stück; Paläontolog. Institut der Universität Wien, Inv.-Nr. 1544.

**Diagnose:** Zoarium inkrustierend, 0,75 mm lang und 0,4 mm breit; 12 gleich breite Rippen von dünnen, strichförmigen Lacunen, auf deren Grund einige wenige, große Poren sitzen und jenseits eines erhöhten Verbindungsrückens durch punkt- bis strichförmige Poren getrennt; der zentrale Teil flach, fein gekörnt.

Das Zoarium inkrustiert auf der Innenseite einer Schale von *Pecten hornensis* D. & R.

Die Zooecien sind elliptisch, 0,75 mm lang und 0,4 mm breit. Die extraterminale Frontalwand ist schmal, zum Teil durch Avicularien verdeckt, die intraterminale Frontalwand ist nur am Rande gewölbt, der zentrale Teil ist eben, fein gekörnt. Sie ist gebildet aus 12 gleich breiten Rippen, getrennt durch schmale, strichförmig aussehende Lacunen, auf deren Grund man stellenweise die wenigen (meist 2) punktförmigen Poren erkennen kann. Jenseits der Lacunen sind die Rippen zu einem Rücken emporgewölbt; innerhalb desselben liegt in Verlängerung der äußeren Lacunen ein Kranz von feineren, punkt- bis kurzstrichförmigen Poren. Der zwischen dem Porenkranz liegende, zentrale Teil der Frontalwand ist flach und läßt, allerdings nur bei besonders günstiger Beleuchtung, eine feine Körnelung erkennen. Die Apertur ist semi-circulär,

0,15 mm breit und 0,075 mm hoch, scheinbar ganz glatt; doch zeigen einige Zooecien kleine, abgerundete Körnchen, die vielleicht Reste von Aperturaldornen sein könnten. Die Aperturalbarre ist breiter als die Rippen, deutlich abgesetzt; sie läßt keine Merkmale ihres ursprünglichen Aufbaues erkennen und trägt keinerlei Vorsprünge nach innen oder außen. Die Ooecien sind hyperstomial, breit gewölbt und glatt, 0,25 mm hoch und 0,35 mm breit, erstrecken sich daher fast über die Hälfte des distalen Zooeciums. Kaenozooecien treten nur selten auf (im Bilde distal-links vom Ooecium), Avicularien sind unregelmäßig verstreut, groß, oval, bis  $0,2 \times 0,15$  mm im Durchmesser, und sind schrägdistal gerichtet.

Die Art zeigt keinerlei Beziehungen zu bekannten, außer zu *Membraniporella compressa* C. & B., die aber durch aufrechte Zoarien und kleinere Zooecien, vielleicht auch durch die gewölbte Zentralzone unterschieden ist.

Sie gleicht ferner, wie mir Herr Hofrat B o b i e s zeigte, dem Typus, aber nicht der Abbildung von *Lepralia haueri* Reuss; diese unterscheidet sich aber durch stärkere Skulptur der Frontalwand, deutliche Aperturdornen und je ein Aviculoecium an jeder Seite der Apertur.

L o c u s t y p i c u s: Ober-Nalb.

S t r a t u m t y p i c u m: Burdigalium.

### ***Holoporella globularis* (Bronn) C. & B.**

1928 (*Celleporaria g.*) B o b i e s, S. 25.

1936 K ü h n, 263. Ibid. Lit.

*Cellepora globularis* Bronn<sup>29</sup> bezieht sich auf M ü n s t e r<sup>30</sup>, und beide Abbildungen zeigen, zumindest äußerlich, große Ähnlichkeit mit der Form des Wiener Beckens. Leider ist die Untersuchung der Celleporiden, wie schon C a n u & B a s s l e r wiederholt betont haben, sehr schwierig, weil infolge der dünnen Wände nur selten eine wohlerhaltene Oberfläche sichtbar ist und Tangentialschliffe kein einwandfreies Bild ergeben. Doch genügen die Originale R e u s s' und M a n z o n i s, die mir vorliegen, zur Identifizierung. Die Zugehörigkeit von Formen, wie sie R e u s s 1847, Taf. 9, Fig. 15, abbildet, bezweifle ich allerdings. Die vorliegenden Kolonien zeigen im Bau der Zooecien beträchtliche Unterschiede, sind aber für eine Abbildung zu schlecht erhalten.

<sup>29</sup> Lethaea geognostica, 2. Aufl., 2, S. 877, Taf. 35, Fig. 15 a, b.

<sup>30</sup> *Scyphia cellulosa* in Goldfuss, Petrefacta Germaniae, 1, S. 92, Taf. 33, Fig. 12 a—c, aus dem Tertiär von Astrupp und Kemmedingen.

Reuss beschreibt die Art von Nußdorf, Grinzing, Baden, Eisenstadt, Mörbisch, Kroisbach, Wieliczka, Manzoni fügt noch Gaudenzdorf, Himmelreich, Mailberg, Kalladorf, Steinabrunn, Garschental, Niederleis, Porzteich, Rudelsdorf, Kostel, Lapugy, Dios-Jenö, Bujtur, Miechowitz und Podjarkow hinzu. 1925 lag sie nicht vor, doch wurde sie inzwischen von mir bei Grübern in Menge gefunden.

Auch in dem vorliegenden Material ist *Holoporella globularis* die weitaus häufigste Form. Flach-polsterförmige und kugelige Kolonien, wie sie bei Grübern vorherrschen, fehlen hier fast. Die Kolonien sind vorwiegend länglich, um Algenfäden angelegt, deren Spuren als Hohlräume von bis 3,5 mm Durchmesser verfolgbar und häufig verzweigt sind; namentlich die größeren Kolonien bis 45 mm Höhe und 28 mm Durchmesser zeigen stets diese Verzweigung.

Fundorte: Ober-Nalb, Unter-Nalb und Pillersdorf; häufig, aber durchwegs schlecht erhalten.

### ***Holoporella polythele* (Reuss).**

1925 Kühn, 29. Ibid. Lit.

Arttypus (hier bestimmt): Reuss' Original 1847, Taf. 9, Fig. 18. Naturhist. Museum, Wien, geol.-pal. Abtlg. Inv.-Nr. 1859-XLV-68 a.

Locustypicus: Bischofswart in Mähren.

Diese Art wurde von Reuss für eine eigenartige Kolonief orm, Knollen mit kleinen, warzenförmigen Erhebungen, ähnlich einer Himbeere, aufgestellt. Wenn die Bedeutung der Zoarialform für die Systematik der Bryozoen heute auch allgemein abgelehnt wird, zeigen doch die Abbildungen Manzoni's<sup>31</sup>, daß es sich auch im Bau der Zooecien um eine von *Holoporella globularis* deutlich verschiedene Art handelt.

Die Kolonief orm, vor allem die Ausbildung der warzenförmigen Erhebungen, sind als Standorterscheinungen kaum verständlich, wohl aber, wenn sie vom Gesichtspunkt rascheren Wachstums aus betrachtet werden. Jede einzelne der Erhebungen kann nach allen Seiten ihre Zooecien bilden, so wie die schnellwüchsigen Korallengattungen, etwa *Acropora*, *Montipora*, *Pocillopora* oder *Porites* von jeder Verzweigung aus neue Polypare bilden. Sind schon die Holoporellen die schnellstwüchsigen Formen der neogenen und quartären Meere, so ist diese Art sozusagen ein Über-

Holoporella<sup>32</sup>. Die vorliegenden Kolonien sind mit Durchmesser bis 30 mm durchwegs etwas kleiner als jene von Gauderndorf. Eine Kolonie von 30 mm Durchmesser ist seitlich von einem Kanal durchbohrt, der von der Basis zur Oberseite verläuft; Spuren einer eigenen Wanderung wurden nicht gefunden. Offensichtlich stammt er nicht von der Umwachsung einer Alge durch die Kolonie (wie dies bei *H. globularis* so häufig ist), sondern von einer Bohralge, die das Bryozoon noch zu Lebzeiten befiel, da oben die anschließenden Zooecien eine etwas dichtere Wand haben und radial gegen den Kanal gerichtet sind. Der Durchmesser des Kanals ist mit nur 1 mm viel feiner, als jene, welche *H. globularis* als Basis dienen. An der Basis derselben Kolonie zeigen sich Spuren eines breiten und gedrehten Wurms, auf dem die Kolonie offenbar festgeheftet war; doch ist der untere Teil abgebrochen. Eine andere Kolonie hat einen *Balanus* überwachsen.

Die Art wurde von Reuss aus Bischofswart in Mähren beschrieben, durch Manzoni von Kroisbach, Diosjenö (und San Marino?), ich habe sie von Gauderndorf erwähnt; nun liegt sie von Pillersdorf vor.

Ferner verdanke ich Herrn Steinbruchbesitzer Hans Hattay eine schöne Kolonie von 25 mm Durchmesser und besonders schön ausgeprägten Warzen aus dem Steinbruch vor Groß-Reipersdorf im Pulkautale. Sie ist bemerkenswert, weil sie in einem Abstände von 0,2—1,5 mm von einer anderen Celleporide umwachsen ist (Taf. 2, Fig. 9), deren Kruste von mehreren Bohralgen durchlöchert ist. Diese Kruste ist ganz in organischen Kalk (größtenteils Bruchstücke von Balaniden und Bryozoenstöcken) eingebakken, blieb daher unbestimmbar.

Eine genauere Beschreibung der beiden, bisher als „*Holoporella*“ benannten Formen kann erst gelegentlich der bevorstehenden Revision der tortonen Bryozoenfauna des Wiener Beckens durch C. A. Bobies erfolgen, da sie nur in diesen Schichten halbwegs bestimmbar erhalten sind.

### *Myriapora truncata* Pallas 1766.

(Taf. 2, Fig. 8).

1930 (*Myriozoum truncatum*) Canu & Bassler, S. 83, Taf. 12, Fig. 1—8.

Ibid. Lit. Ferner:

1925 Kühn, S. 31.

1933 Canu & Bassler, S. 44.

1952 Lagaaij, S. 150, Taf. 16, Fig. 7.

<sup>32</sup> Eine ganz ähnliche Form ist *Ceripora tumulifera* Canu & Lecointre, vgl. Bugé 1949, Taf. 1, Fig. 3.

Diese innerhalb der alten Welt zeitlich wie räumlich weit verbreitete Art zeigt doch deutliche Standortmodifikationen. Lagaa ij betont, daß seine Stücke aus dem holländischen Pliozän ebenso wie jene von Astrupp nicht zylindrisch, sondern bilamellär und abgeflacht sind. Das trifft nach meiner Untersuchung auch für Reuss' Originale (als *Eschara punctata* bestimmt) von Eisenstadt zu. Dagegen sind die Stücke aus den Retzer Sanden, ebenso wie jene aus den Eggenburger Schichten deutlich zylindrisch.

Rezent geht die Art im Mittelmeer nur bis 100 m Tiefe, im Atlantik noch weniger tief. Eine Larve kann dort eine Kolonie bis 80 mm Höhe und Breite erzeugen. Nach dem Tode zerbricht sie aber trotz scheinbarer Stärke in zahlreiche Fragmente, wie sie im Miozän und Pliozän von Frankreich, Italien und Algerien massenhaft auftreten<sup>33</sup>. Auch in den Eggenburger Schichten waren nur Fragmente, vorwiegend die dicken Endstücke und millimetergroße Bruchstücke vorhanden. Um so auffallender ist bei Ober-Nalb das Auftreten ganzer Kolonien (Taf. 2, Fig. 8), die zwar niedrig und dünn, aber wohl erhalten sind.

Fundort: Ober-Nalb.

### III. Stratigraphische Folgerungen.

Die bisherigen Angaben über das Burdigalalter der Retzer Sande waren, wie die Angaben (vgl. S. 231) zeigen, paläontologisch nicht genügend begründet. Von den 10 Bryozoenarten sind zwei neu (*Tretocycloecia distincta* und *Cillia cilliae*), eine ist bisher nur aus dem Burdigal bekannt (*Ceriopora chaetetiodes*), zwei sind aus dem Burdigal bis Torton bekannt (*Holoporella globularis* und *polythele*), eine aus Burdigal bis rezent (*Myriapora truncata*), eine aus dem Oligozän bis rezent (*Cellaria fistulosa*), zwei nur aus dem Torton (*Diaperoecia rugulosa* und *Reteporidaea reussi*), eine aus dem Torton und Pliozän (*Hornera striata*). So würde sich also die alte Ansicht bestätigen, daß sich unter Bryozoen Burdigal-, Helvet- und Tortonfaunen nicht unterscheiden lassen. Doch fällt auf, daß die helvetischen Faunen, soweit sie bisher bekannt sind, also vorwiegend jene aus Frankreich, doch deutliche Unterschiede zeigen. Daher mag es vielleicht an der ungenügenden Kenntnis der österreichischen Bryozoenfaunen liegen, wenn eine Trennung und stratigraphische Auswertung bisher nicht möglich war. Der Neuuntersuchung der tortonen durch Hofrat C. A. B o b i e s, wie neuen Aufsammlungen in den burdigalen Schichten muß daher die Entscheidung überlassen bleiben. Groß und generell werden die Unter-

<sup>33</sup> Canu & Bassler 1925, S. 62; 1933, S. 44.

schiede sicher nicht sein, da es sich um stark faziell gebundene Formen handelt. Schaffer hat ja<sup>34</sup> darauf hingewiesen, daß selbst die weniger faziesgebundenen Mollusken der Eggenburger Schichten mehr jenen des Tortons als des Helvets, weiter jenen von Asti und den rezenten des Roten Meeres gleichen als altersmäßig viel nahestehenderen. Bei noch stärker auf bestimmte Fazien beschränkten Organismen, wie Korallen<sup>35</sup>, Bryozoen, Rudisten<sup>36</sup>, Cirripediern, geht die Entwicklung, wenn einmal der dem Biotop entsprechende Grundtypus erreicht ist, viel langsamer vor sich, als bei anderen.

#### IV. Ökologische Folgerungen.

Die beschriebenen Korallen entstammen zwei verschiedenen Biotopen: einem weichen Kalksandstein und einem groben Quarzsand, dessen Körner vereinzelt scharfkantig und bis 7 mm breit sind, die meisten aber entweder wenig gerundet und bis 3 mm breit oder gut gerundet sind und bis 2 mm Durchmesser haben; sie enthalten ferner Glimmerschüppchen bis 1 mm Länge.

Von den Bryozoen entstammen nur *Myriapora truncata* und *Cillia cilliae* dem Kalksandstein. *Cillia* ist eine gebrechliche Form, die sich in grobem Sediment kaum erhalten konnte. Die *Myriapora* liegt in einem überaus seltenen guten Erhaltungszustand vor, da sonst z. B. in den Eggenburger Schichten nur abgebrochene Enden bekannt sind. Auch dies deutet also auf ruhigere Sedimentation während der Entstehung des Kalksandsteins.

Alle anderen Bryozoen stammen aus den Sanden, und zwar *Diaperoecia rugulosa* und *Reteporidaea reussi* aus Feinsanden, *Hornera striata*, *Tretocyclocia distincta*, *Ceriodora chaetetioides*, *Cellaria fistulosa* und die Holoporellen aus groben Sanden. Von ihnen verrät jede einzelne den Standort in stark bewegtem Wasser, und zwar jede Möglichkeit, dessen Wirkung zu begegnen. *Hornera* ist eine reticulierende Gattung, *Tretocyclocia* hat besonders dickstämmige, *Ceriodora* knollenförmige Zoarien, *Cellaria* ist eine artikuliert Form, *Holoporella globularis* eine durch Anheftung an Algen bewegliche und *H. polythele* wieder eine knollenförmige, dabei aber, ähnlich den Riff-Korallen, besonders schnellwüchsige

<sup>34</sup> Schaffer 1925; Das Miozän von Eggenburg. — Abh. Geol. Bundesanst. 22, Heft 3, S. 62.

<sup>35</sup> Vgl. etwa die große Ähnlichkeit der burdigalen mit der tortonen Korallenfauna (Kuehn 1925) oder die Tatsache, daß eozäne Korallenarten bis ins Miozän gehen.

<sup>36</sup> Kürzlich (Kuehn in Natur u. Technik, 9, S. 443, Wien 1954) wurde gezeigt, welche geringfügige Entwicklungsschritte bei den Rudisten in etwa 1 Million Jahre erfolgen.

Form. So läßt sich kaum mehr eine weitere Ausbildung erdenken, die geeignet wäre, der seitlichen, zeitlich verschiedenen Wasserbewegung zu begegnen. Spräche nicht bereits das Sediment, so würde die Bryozoenfauna dieses Biotop als im Bereiche starker Wasserbewegung gelegen charakterisieren. Alle Arten sind Seichtwasserformen, die Algen, an denen *Holoporella globularis* anhaftete, konnten nur bis 80 m Tiefe gedeihen. Die Einrichtungen zur Überwindung größerer Wasserbewegung (Gezeiten, Strömungen) lassen aber auf noch geringere Tiefe schließen.

### Zusammenfassung.

1. Aus den Retzer Sanden werden 10 Arten beschrieben, davon eine Art und eine Gattung neu.

2. Von den 8 bekannten Arten sind 5 nur oder auch aus dem Burdigal, 7 nur oder auch aus dem Torton bekannt. Dies würde ein falsches Bild von der Altersstellung geben; es beruht aber nur auf der ungenügenden Kenntnis der tertiären Bryozoenfaunen.

3. Die Zoarienformen erwiesen sich als verlässliche Faziesanzeiger. In der Grobsandfauna treten sämtliche Typen der Sicherung gegen stark bewegtes Wasser auf.

4. Die neue Gattung *Cillia* erreicht die Verfestigung der Frontalwand bis zu ähnlicher Form, aber auf anderem Wege wie die Pelmatoporiden.

Der geologisch-paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien, besonders Herrn Dr. F. Bachmayer, danke ich für ihre entgegenkommende Unterstützung bei der Suche nach den Originalen von Reuss und Manzoni. Für die mühevollen photographischen Aufnahmen danke ich den Herren H. Petrak (Naturhistorisches Museum) und H. Schwertner.

### Literaturverzeichnis.

- Bassler, R. S.: Bryozoa. — Fossilium Catalogus I, pars 67, 229 S. s'Gravenhage 1925.
- Bobies, C. A.: Über bryozoenführende Sedimente im inneralpinen Wiener Becken. — Mitt. Geol. Ges., 21, 24—34. Wien 1928.
- Bronn, H. G.: Lethaea geognostica, 2, 2. Aufl., 1350 S., 48 Taf. Stuttgart 1897.
- Brown, D. A.: The tertiary cheilostomatous Polyzoa of New Zealand. — Brit. Mus. Nat. Hist., 405 S. London 1952.
- Buge, E.: Note préliminaire sur les Bryozoaires du Pliocène du Cap Bon (Tunisie). — C. r. Soc. géol. France, 347—348. Paris 1947.
- Les Bryozoaires du Savignéen de Touraine. — Mém. Mus. nat. Hist. nat., N. S. 27, 63—93, Taf. 5—7. Paris 1948.
- Solution de problèmes bryozoologiques à l'aide des rayons X. — Bull. Mus. nat. hist. nat. (2) 21, 160—163, Taf. 1. Paris 1949.

- Canu, F.: Contribution à l'étude des Bryozoaires fossiles. VI. Tortonien de Baden. — Bull. Soc. géol. France (4) **13**, 125—126. Paris 1913.
- Canu, F. & Bassler, R. S.: North American early tertiary Bryozoa. — Bull. U. S. Nat. Mus., **106**, 879 S., 162 Taf. Washington 1920.
- Studies on the cyclostomatous Bryozoa. — Proc. U. S. Nat. Mus., **61**, Art. 22, 160 S., 28 Taf. Washington 1922.
- North American later tertiary Bryozoa. — Bull. U. S. Nat. Mus., **125**, 302 S., 47 Taf. Washington 1923.
- Contribution à l'étude des Bryozoaires d'Autriche et de Hongrie. — Bull. Soc. géol. France (4) **24**, 672—690, Taf. 23—25. Paris 1924.
- Les Bryozoaires du Maroc et de Mauretanie. — Mém. Soc. sci. nat. Maroc, Nr. 10, 80 S., 9 Taf. Rabat 1925.
- Bryozoaires marins de Tunisie. — Ann. Station océanographique, Nr. 5, 91 S., 13 Taf. Salammbô 1930.
- The Bryozoan fauna of the Vincentown limesand. — Bull. U. S. Nat. Mus., **165**, 108 S., 21 Taf. Washington 1933.
- Canu, F. & Lecoindre, G.: Les Bryozoaires cheilostomes des Faluns de Touraine et d'Anjou. — Mém. Soc. géol. France, N. S. Mém. **4/1**, 1—130, Taf. 1—25. Paris 1925.
- Les Bryozoaires cyclostomes des Faluns de Touraine et d'Anjou. — Mém. Soc. géol. France, N. S. Mém. **4/2**, 131—212, Taf. 26—44. Paris 1934.
- Dartevelle, E.: Bryozoaires fossiles de l'Oligocène de l'Allemagne. Palaeont. Z., **26**, 181—204. Stuttgart 1952.
- Kühn, Othmar: Die Bryozoen des Miocäns von Eggenburg. — Abh. geol. Bundesanst., **22/3**, 21—39, Taf. 2, Wien 1925.
- Die Korallen und Bryozoen des Tegels von Kreta. — Praktika griech. Akad. Wiss., **11**, 171—181, Taf. 1, Athen 1936.
- Eine miozäne Zwergfauna von Kreta und die Entstehung mariner Zwergfaunen. — Zentralbl. f. Min. usw. B, 255—270. Stuttgart 1936.
- Lagaij, R.: The pliocene Bryozoa of the Low Countries and their bearing on the marine stratigraphy of the North-Sea region. — Mededel. geol. Stichting (C) **5**, 239 S., 26 Taf. Maastricht 1952.
- Manzoni, A.: I Briozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. II. Denkschr. Akad. Wiss., math.-nat. Kl., **37**, 49—78, Taf. 1—17. Wien 1877.
- Dasselbe, III. — Ibid. **38**, 1—24, Taf. 1—18. Wien 1877.
- Michelin, H.: Iconographie zoophytologique. 348 S., 79 Taf. Paris 1840 bis 1847.
- Münster, G. v.: Bryozoa in Goldfuss, A.: Petrefacta Germaniae, **1**, 28—41, Taf. 8—12. Düsseldorf 1827.
- Reuss, A. E.: Die fossilen Polyparien des Wiener Tertiärbeckens. — Haidingers naturw. Abh., **2**, 1—109, Taf. 1—11. Wien 1847.
- Die fossilen Bryozoen des österreichisch-ungarischen Miocäns. — Denkschrift Akad. Wiss. math.-nat. Kl., I, **33**, 141—190, Taf. 1—12. Wien 1874.
- Roger, J. & Bugé, E.: Les Bryozoaires du Rédonien. — Bull. Soc. géol. France (5), **16**, 217—230. Paris 1946.
- Stoliczka, F.: Fossile Bryozoen aus dem tertiären Grünsandstein der Orakei-Bay bei Auckland. — Reise der Novara, Geol. Teil, I, 2. Paläontologie, 89—158, Taf. 17—20. Wien 1865.
- Suess, E.: Untersuchungen über den Charakter der österreichischen Tertiärablagerungen. I. Über die Gliederung der tertiären Bildungen zwischen dem Manhart, der Donau und dem äußeren Saume des Hochgebirges. — Sitz.-Ber. Akad. Wiss., math.-nat. Kl., I, **54**, 1—66, Taf. 1—2, Wien 1866.

- Tenison Woods, J. E.: Corals and Bryozoa of the Neozoic period in New Zealand. — Paleontology of New Zealand, 4, XVI—34, 3. Taf. Colonial Mus., Geol. Survey Dept. Wellington 1880.
- Vetters, H.: Geologisches Gutachten über die Wasserversorgung der Stadt Retz. — Jahrb. geol. Reichsanst., 67, 461—480, Taf. 18—19. Wien 1918.
- Vigneaux, M.: Révision des Bryozoaires néogènes du bassin d'Aquitaine et essai de classification. — Mém. Soc. géol. France, N. S. 28, Mém. 60, 155 S., 11 Taf., Paris 1949.
- Voigt, E.: Morphologische und stratigraphische Untersuchungen über die Bryozoenfauna der oberen Kreide. I. Die cheilostomen Bryozoen der jüngeren Oberkreide in Norddeutschland, im Baltikum und in Holland. — Leopoldina, 6, 379—579, Taf. 1—39. Leipzig 1930.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse](#)

Jahr/Year: 1955

Band/Volume: [164](#)

Autor(en)/Author(s): Kühn Othmar

Artikel/Article: [Die Bryozoen der Retzer Sande. 231-248](#)