

Über vollständige eingeschriebene Vielseite.

Von dem e. M. Prof. Dr. **Emil Weyr**.

Eine Involution n -ten Grades ist durch zwei ihrer Gruppen vollkommen und unzweideutig bestimmt. Oft kann sich jedoch auch die Frage einstellen: „durch wie viel Paare entsprechender Elemente ist eine Involution n -ten Grades gegeben?“

Diess soll im Folgenden kurz erörtert werden.

Denken wir uns die Involution als Tangenteninvolution auf einem Kegelschnitte; ihr Erzeugniss, die Involutionseurve (Ort der Schnittpunkte einander entsprechender d. h. derselben Gruppe angehöriger Tangenten) ist eine Curve $(n - 1)$ -ter Ordnung, welche also durch $\frac{(n-1)(n+2)}{2}$ Punkte bestimmt ist, nur

muss dafür Sorge getragen werden, dass sie wirklich eine Involutionseurve ist. Dazu ist nun nothwendig und hinreichend, dass diese Curve einem vollständigen, dem die Involution tragenden Kegelschnitte umschriebenen n -Seite umschrieben ist, d. h. durch alle seine $\frac{n(n-1)}{2}$ Ecken hindurchgeht.

Denken wir uns also aus einem beliebigen Punkte der Curve $(n - 1)$ -ter Ordnung, welche als Involutionseurve auftreten soll an den Trägerkegelschnitt die beiden Tangenten gelegt, so wird eine von ihnen die Curve noch in $(n - 2)$ Punkten treffen, von denen an den Kegelschnitt noch $(n - 2)$ Tangenten gehen, welche die andere Tagente in $(n - 2)$ Punkten und sich gegenseitig in $\frac{(n-2)(n-3)}{2}$ Punkten schneiden. Wenn nun alle diese $(n - 2) + \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ d. i. also $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ Punkte der Curve angehören, so wird sie eine Involutionseurve sein.

„Soll also eine Curve $(n-1)$ -ter Ordnung Involutioncurve bezüglich eines gegebenen Kegelschnittes sein, so zählt diess für $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ die Curve beschränkende Bedingungen.“

Die Curve, und damit auch die Involution wird nun gegeben sein, wenn wir noch so viele Punkte der Curve kennen, damit die zuletzt gefundene Zahl auf $\frac{(n-1)(n+2)}{2}$ d. h. auf die Zahl der eine Curve $(n-1)$ -ter Ordnung bestimmenden Bedingungen erhöht wird. Diese Zahl ist also

$$\frac{(n-1)(n+2)}{2} - \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 2(n-1).$$

Da nun jeder Punkt ein Tangentenpaar der Involution liefert und umgekehrt, so ist hiermit bewiesen:

„Eine Involution n -ten Grades ist bestimmt durch $2(n-1)$ Elementenpaare.“

Diese Bestimmung hört auf eindeutig zu sein, wenn n den zweiten Grad übersteigt, da es schon zwei Involutionen dritten Grades gibt, welche als durch vier Elementenpaare bestimmt erscheinen.

Den letzten Satz kann man offenbar auch so aussprechen:

„Eine Curve $(n-1)$ -ter Ordnung, welche Involutioncurve für einen gegebenen Kegelschnitt als Träger sein soll, ist (nicht eindeutig) bestimmt durch $2(n-1)$ ihrer Punkte.“

Da nun ein Kegelschnitt wiederum fünf einfache Bedingungen darstellt, so kann man sobald, dieser Kegelschnitt unbestimmt gelassen wird, zu der letzten Zahl noch die Zahl fünf hinzufügen, und erhält den Satz:

„Eine Involutioncurve $(n-1)$ -ter Ordnung ist (nicht eindeutig) durch $2(n-1) + 5$ Bedingungen bestimmt.“

Hiebei ist zu bemerken, dass zugleich der Träger-Kegelschnitt als mitgegeben erscheint.

Was nun die Curven selbst betrifft, so erhält der letzte Satz erst für $n-1=4$ eine Bedeutung, da jede Curve erster ($n=2$), zweiter ($n=3$) und dritter Ordnung ($n=4$) als Involutioncurve unendlich vieler Involutionen zweiter, dritter, resp. vierter Ordnung betrachtet werden kann. Wird jedoch $n=5$ also

$n - 1 = 4$ so ist $2(n - 1) + 5 = 13$, wogegen eine Curve vierter Ordnung erst durch 14 Bedingungen gegeben ist.

Hieraus folgt zunächst:

„Unter den Curven vierter Ordnung, welche dreizehn gegebenen Bedingungen genügen (z. B. durch 13 Punkte gehen), gibt es nur eine bestimmte Anzahl, welche Involutionseurven sind.“

Hieraus folgt weiter:

„Eine Curve vierter Ordnung ist im allgemeinen keine Involutionseurve.“

Ist eine Curve vierter Ordnung Involutionseurve, so tritt sie (der Natur der Involution nach) auf als Ort der Ecken unendlich vieler, einem Kegelschnitte umschriebener, vollständiger Fünfseite. Umgekehrt ist jede, einem vollständigen Fünfseite umschriebene Curve vierter Ordnung eine Involutionseurve, wobei der dem Fünfseite eingeschriebene Kegelschnitt als Träger-Kegelschnitt auftritt.¹ Wir können daher mit Rücksicht auf obigen Satz nun auch den folgenden aussprechen:

„Einer Curve vierter Ordnung lässt sich im Allgemeinen kein vollständiges Fünfseit einschreiben. Gibt es jedoch ein solches, so gibt es auch noch unendlich viele, welche alle einem und demselben Kegelschnitte umschrieben sind.“

Wenn die Tangenteninvolution n -ten Grades eine Gruppe mit zwei Doppelementen besitzt, so ist der Schnittpunkt dieser Doppelemente nothwendiger Weise ein Doppelpunkt der Involutionseurve, dessen Tangenten offenbar jene beiden Doppelemente harmonisch trennen. Ferner folgt auch unmittelbar, dass die sämtlichen weiteren $(n - 4)$ Tangenten einer solchen Gruppe Doppeltangenten der Involutionseurve sind, und ihre Berührungspunkte auf jenen zwei Doppelementen liegen. Schliesslich sieht man auch leicht ein, dass die Involutionseurve durch die Berührungspunkte des Trägers mit den beiden Doppelementen hindurchgeht.

Allgemeiner: Enthält eine Gruppe der Tangenten-Involution r Doppelemente, so sind ihre $r \binom{r-1}{2}$ Schnittpunkte Doppel-

¹) Vergleiche: „Ueber Involutionen höherer Grade.“ Crelle-Borchardt. Bd. 72, pag. 289.

punkte der Involutioncurve. Die Tangenten der Involution in einem solchen Doppelpunkte trennen die beiden, durch ihn gehenden Doppелеlemente der Involution harmonisch. Die Involutioncurve geht auch durch die r Berührungspunkte des Träger-Kegelschnittes mit den r Doppелеlementen. Die in der Gruppe erübrigenden $n - 2r$ Tangenten sind r -fache Tangenten der Involutioncurve. Die Berührungspunkte jeder dieser r -fachen Tangente sind ihre Schnittpunkte mit den r Doppелеlementen.

Wenn eine Curve vierter Ordnung C_4 einen Doppelpunkt d von der Beschaffenheit besitzt, dass seine Tangenten mit den nach den Berührungspunkten einer Doppeltangente gehenden Strahlen ein harmonisches Büschel bilden, so ist die Curve eine Involutioncurve.

In der That, es sei Δ die Doppeltangente mit den Berührungspunkten $\delta\delta'$, so dass also $d\delta$ und $d\delta'$ mit den beiden Tangenten der Curve im Punkte d ein harmonisches System bilden; aa' seien die weiteren Schnitte der Curve mit den Geraden $d\delta$, $d\delta'$. Man construire nun den Kegelschnitt, welcher dem Dreiseite $d\delta\delta'$ eingeschrieben ist, und die Seiten $d\delta$, $d\delta'$ in aa' resp. berührt, er sei K . Irgend eine Tangente M_5 von K möge C_4 in $m_1 m_2 m_3 m_4$ schneiden aus welchen Punkten wir an K die Tangenten $M_1 M_2 M_3 M_4$ legen und betrachten nun die Involution fünften Grades, welche durch $M_1 M_2 M_3 M_4$ als eine Gruppe und durch $d\delta$, $d\delta'$, $d\delta$, $d\delta'$, Δ als zweite Gruppe gegeben erscheint. Die Involutioncurve dieser Involution wird nach früheren in d einen Doppelpunkt besitzen, dessen zwei Tangenten zu $d\delta$, $d\delta'$ harmonisch sind; sie wird ferner durch a , a' gehen, und in δ und δ' die Gerade Δ berühren, und schliesslich auch die Punkte $m_1 m_2 m_3 m_4$ enthalten. Nun bilden aber alle Curven vierter Ordnung, welche durch $a a' m_1 m_2 m_3 m_4$ hindurchgehen, Δ in $\delta\delta'$ berühren, und d zum Doppelpunkte haben, ein Curvenbüschel, weil diese Bedingungen zu 13 einfachen Punkten aequivalent sind. Die Doppelpunkts-Tangentenpaare bilden also eine quadratische Involution in welcher es nur ein einziges Paar von Strahlen geben wird, welche das Strahlenpaar $d\delta$, $d\delta'$ harmonisch trennen; d. h. es gibt in dem Büschel dieser Curven nur eine einzige solche mit der erwähnten harmonischen Eigenschaft am Punkte d , und das ist nach Annahme eben unsere Curve C_4 .

Hiedurch ist nachgewiesen, dass die Involutioncurve der oben festgesetzten Tangenteninvolution fünften Grades unsere Curve vierter Ordnung ist.

Wir haben früher gesehen, dass die Frage, ob eine Curve vierter Ordnung eine Involutioncurve ist, darauf hinauskommt zu untersuchen, ob sich der Curve ein vollständiges Fünfseit einschreiben lässt oder nicht. Man kann nun diese Frage in eine andere, vielleicht einfachere Fassung bringen, und dann so beantworten:

„Eine Curve vierter Ordnung ist dann eine Involutioncurve, d. h. es lassen sich derselben unendlich viele vollständige Fünfseite einschreiben, wenn es auf der Curve drei in gerader Linie liegende Punkte gibt, deren Tangenten ein der Curve eingeschriebenes Dreieck bilden.“

Sind nämlich $t_1 t_2 t_3$ jene drei auf der Geraden G liegenden Punkte, $T_1 T_2 T_3$ ihre drei Tangenten und t der vierte Schnittpunkt von G mit der Curve, so kann man einen Kegelschnitt K construiren, welcher $G T_1 T_2 T_3$ berührt, und zwar G im Punkte t . Diese vier Geraden, G doppelt gezählt, stellen ein der Curve eingeschriebenes, dem K umschriebenes vollständiges Fünfseit dar. Hiedurch ist die letzte Behauptung erwiesen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [81_2](#)

Autor(en)/Author(s): Weyr Emil

Artikel/Article: [Über vollständige eingeschriebene Vielseite, 80-84](#)