

Anthriscus sylvestris-Randgesellschaften (Tab. 5)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Lfd. Nr.	Wiesige Ausbildung								Urtica dioica-Ausb.					I	II	III	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Aufn. Nr.	S51	W69	O15	W17	S50	O60	O61	W18	S36	E6	W58	E4	S2	4	4	5	Zahl der Aufnahmen
Seehöhe in 10m NN	92	78	78	79	90	81	81	78	89	90	88	88	82	82	83	87	Mittlere Seehöhe in 10m NN
Deckung in %	100	100	100	100	100	90	90	95	100	70	100	100	100	100	95	95	Mittlere Deckung in %
Artenzahl	20	20	16	16	21	21	20	16	16	14	11	10	7	18	20	12	Mittlere Artenzahl
<i>Anthriscus sylvestris</i>	22	33	22	.	33	22	11	.	33	11	11	33	11	3	3	V	Wiesen-Kerbel
<i>Heracleum sphondylium</i>	.	11	33	33	33	22	23	33	11	22	.	33	11	3	4	IV	Wiesen-Bärenklau
<i>Trisetum flavescens</i>	.	+	11	+	11	11	11	22	+	3	4	I	Wiesen-Goldhafer
<i>Ranunculus acris</i>	.	+	11	.	+	+	+	2	3	.	Scharfer Hahnenfuß
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	.	+	+	+	.	.	+	.	+	3	1	I	Gewöhnlicher Frauenmantel
<i>Vicia cracca</i>	+	11	.	.	.	+2	12	.	+	2	2	I	Vogel-Wicke
<i>Stellaria graminea</i>	+	r	.	11	3	.	.	Gras-Sternmiere
<i>Poa angustifolia</i>	11	+	11	.	+	3	1	.	Schmalblättriges Rispengras
<i>Trifolium pratense</i>	+	+	+	11	4	.	Rot-Klee
<i>Plantago lanceolata</i>	+	11	+	11	4	.	Spitz-Wegerich
<i>Lupinus polyphyllus</i>	33	I	Vielblatt-Lupine
<i>Galium aparine</i>	11	11	II	Klett-Labkraut
<i>Bromus inermis</i>	33	I	Wehrlose Trespe
<i>Rubus idaeus</i>	11	11	.	.	.	II	Himbeere
<i>Urtica dioica</i>	22	11	+	55	.	.	IV	Große Brennnessel
VOK																	
Molinio-																	
Arrhenateretea:																	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	11	11	12	.	.	11	12	.	.	+	33	.	.	3	2	II	Glatthafer
<i>Ranunculus repens</i>	33	11	.	+	+	.	+	.	.	11	11	.	.	3	2	II	Kriechender Hahnenfuß
<i>Poa trivialis</i>	.	.	11	.	.	+	+	+	+	+	.	+	.	1	2	III	Gewöhnliches Rispengras
<i>Galium mollugo</i> agg.	+	+	.	.	+	+	+	.	.	.	22	.	.	2	3	I	Wiesen-Labkraut
<i>Veronica chamaedrys</i>	.	11	+	.	+	.	.	.	r	+	.	.	.	2	1	II	Gamander-Ehrenpreis
<i>Rumex acetosa</i>	.	.	+	.	+	.	+	+	+	1	2	I	Wiesen-Sauerampfer
<i>Phleum pratense</i>	11	.	.	.	+	.	.	.	+	1	1	I	Wiesen-Lieschgras
<i>Alopecurus pratensis</i>	.	.	11	.	.	11	11	1	2	.	Wiesen-Fuchsschwanz
<i>Festuca pratensis</i>	.	.	.	+	.	11	11	1	2	.	Wiesen-Schwingel
<i>Carum carvi</i>	11	.	.	+	2	.	Echter Kümmel
Begleiter:																	
<i>Achillea millefolium</i> agg.	+	+	+	+	+	11	11	+	r	+	.	.	.	4	4	II	Wiesen-Schafgarbe
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	+	+	11	+	22	11	11	22	+	+	.	.	.	4	4	II	Gewöhnlicher Löwenzahn
<i>Dactylis glomerata</i>	11	11	11	.	11	33	22	+2	.	.	22	11	.	3	4	II	Knautgras
<i>Elymus repens</i>	.	.	+	33	11	22	23	+	.	.	.	11	11	2	4	II	Acker-Quecke
<i>Hypericum maculatum</i>	.	+	.	r	+	.	.	.	+	.	12	.	+2	2	1	III	Flecken-Johanniskraut
<i>Vicia sepium</i>	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	1	II	Zaun-Wicke
<i>Lathyrus pratensis</i>	+	.	.	+	11	.	2	.	I	Wiesen-Platterbse
<i>Holcus mollis</i>	+	.	.	11	11	.	.	1	.	I	Weiches Honiggras
<i>Glechoma hederacea</i>	.	11	.	.	11	+	.	.	.	1	1	I	Gundelrebe
<i>Pimpinella major</i>	.	.	+	.	.	11	22	1	2	.	Große Bibernelle
<i>Festuca rubra</i> agg.	22	.	.	.	+	1	1	.	Rot-Schwingel
<i>Acer pseudoplatanus</i> juv.	+	+	.	.	.	1	.	I	Berg-Ahorn juv.
<i>Epilobium montanum</i>	+	+	2	.	.	Berg-Weidenröschen
Moose	.	.	11	.	.	11	11	1	2	.	Moose

Außerdem in Lfd.Nr. 1: 11 *Agrostis stolonifera*; + *Medicago sativa*; r *Alnus alnobetula*;
Lfd.Nr. 2: + *Knautia arvensis*; r *Hesperis matronalis*; Lfd.Nr. 4: + *Agrostis capillaris*; r
Prunella vulgaris; Lfd.Nr. 6: +2 *Tanacetum vulgare*; + *Trifolium repens*; r *Leontodon*
autumnalis; r *Erigeron annuus*; Lfd.Nr. 7: + *Lolium perenne*; + *Fallopia convolvulus*; +
Sonchus arvensis; Lfd.Nr. 8: + *Bellis perennis*; r *Leucanthemum vulgare*; r *Silene*
dioica; r *Rumex obtusifolius*; Lfd.Nr. 9: + *Betula pendula*; + *Lapsana communis*;
Lfd.Nr. 10: + *Geranium phaeum*; Lfd.Nr. 11: +2 *Viola arvensis*; + *Galeopsis tetrahit*;
Lfd.Nr. 12: + *Epilobium angustifolium*