





Noctuidae = Eulen
und

Geometridae = Spinner



Noctuiden = Eulen

Obwohl die Frühjahrswetterlage mit weit über dem Durchschnitt liegenden Temperaturen und sehr mäßigen Niederschlägen eine vielversprechende Falterausbeute an Noctuiden erwarten ließ, waren die tatsächlich getätigten Funde enttäuschend gering. Die Ursache der Enttäuschungen mag darin zu suchen sein, daß das äußerst schlechte Wettergeschehen des Vorjahres nur wenigen Individuen der vielen Noctuiden-Arten die Möglichkeit bot sich zu kopulieren. Die Eiablagen waren herabgesetzt, die Fundausbeuten des heurigen Frühjahres mußten gering bleiben. Einige Arten allerdings waren sehr zahlreich vertreten; z.Bsp. *Acronicta alni* im Frühjahr und *Brotolomia meticulosa* L., welche letztere im Spätsommer und Frühherbst stellenweise in großer Anzahl und Häufigkeit anzutreffen war.

Folgende Funddaten wurden vermerkt:

<u>Demas</u>			
<i>coryli</i> L.	11.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
<u>Acronicta</u>			
<i>leporina</i> L.	6.6.1966	Steyr	(Moser)
	13.8.1966	Trattenbach/Ennstal, 750m	(Wimmer)
<i>aceris</i> L.	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Hofmann)
<i>alni</i> L.	2.6.1966	Ternberg/Paukengraben, stellenweise sehr massiert	(Hofmann)
<i>psi</i> L.	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Hofmann)
<u>Bryophila</u>			
<i>algae</i> F.	17.8.1966	Trattenbach/Ennstal	(Wimmer)
<u>Diphtera (Moma)</u>			
<i>alpium</i> Osb. = <i>orion</i> Esp.	21.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m	(Wimmer)
<u>Diphtera (Moma, Trichosea)</u>			
<i>ludifica</i> L.	Zu dem vorjährigen Bezirkserstfund gesellen sich heuer weitere Funde von der gleichen Örtlichkeit.		
	10.6.1966)		
	13.6.1966)	Trattenbach/Kametrieß, 780m	(Bachl)
	15.6.1966)		
	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß, 1 ♂	(Wesely)
<u>Agrotis</u>			
<i>strigula</i> Thnbg.	im 6.1966	e.l. St. Lorenz/Mondsee	(Kremslehner)
<i>polygona</i> F.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m	(Moser)
	9.9.1966	Ternberg/Ennstal	(Bachl)
	11.9.1966	Ternberg/Bäckengraben, 480m	(Kremslehner)
<i>janthina</i> Esp.	14.8.1966	Trattenbach, häufig	(Wimmer)
<i>linogrisea</i> Esp.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m	(Moser)

Agrotis

<u>candelarum</u> Hb.	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß 3, 800m (Hofmann)
	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m (Moser)
<u>depuncta</u> L.	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß (Hofmann)
	12.8.1966	Ternberg (Kremslehner)
	11.9.1966	
<u>glareosa</u> Esp.	2.9.1966	Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)
	9.9.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m (Hofmann)
<u>lucipeta</u> F.	26.7.1966	Ternberg/Kruotenbrett 1, ca. 1000m (Kremslehner)
	2.9.1966	Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)
	9.9.1966	Ternberg/Paukengraben (Hofmann)
	10.9.1966	Ternberg/Bäckengraben, ca. 480m (Kremslehner)

Mamestra

<u>chrysozona</u> Bkh.	im 5.1966	e.l. Enns, O.Ö. (Kremslehner)
	im 5.1966	e.l. Linz/Kleinmünchen (Kremslehner)
	29.7.1966	Reichraming im Ennstal Raupen (Kremslehner)
<u>serena</u> F.	29.7.1966	Ternberg/Paukengraben (Wimmer)
<u>advena</u> F.	18.7.1966	Schönau im Ennstal, O.Ö. (Wimmer)

Dianthoecia

<u>caesia</u> Bkh.	9.6.1966	Trattenbach/Kreuzmauersattel, 780m am Mischlicht (Wesely)
<u>filigramma</u> Esp.		
<u>f.xanthocyanea</u> Hb.	9.6.1966	Trattenbach/Kreuzmauersattel, 780m am Mischlicht (Wesely)
<u>albimacula</u> Bkh.	14.8.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m (Wimmer)
<u>compta</u> F.	im 5.1966	e.l. Ternberg (Kremslehner)
	8.7.1966	Trattenbach, Raupen (Kremslehner)
<u>cucubali</u> Fuessl.	18.5.1966	Trattenbach/Ennstal (Wimmer)
<u>carpophaga</u> Bkh.	29.7.1966	Ternberg/Paukengraben (Wimmer)

Lamprosticta (Chariptera)

<u>viridana</u> Walch.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m (Moser)
	20.8.1966	Ternberg/Paukengraben (Wimmer)
	9.9.1966	Ternberg/Paukengraben

Celaena (Luperina)

<u>matura</u> Hufn.	14.8.1966	Trattenbach/Kametrieß, 800m (Wimmer)
---------------------	-----------	--------------------------------------

Hadena


<u>porphyrea</u> Esp.	2.9.1966	Ternberg im Ennstal (Wimmer)
<u>gemina</u> Hb.	4.1.1966	e.l. Steyr (Hofmann)
	im 12. 65	e.l. Weyer i. Ennstal (Kremslehner)

Dipterygia


<u>scabriuscula</u> L.	16.6.1966	Trattenbach/Kametrieß (Hofmann)
------------------------	-----------	---------------------------------

Rhizogramma

<u>detersa</u> Esp.	29.7.1966	Reichraming/Kuhgraben (Kremslehner)
	6.8.1966	Trattenbach im Ennstal (Wimmer)



1



2

Bildkommentar zu Schwarztafel 5

Bild 1 : *Catocala fraxini* L.: Die Art ist weit verbreitet, sie hat in den Au-Gebieten oder in ähnlich gelagerten Biotopen unseres Bezirkes vorwiegend jedoch im Flachland ihr mehr oder weniger häufiges Vorkommen; vereinzelt wurde der Falter auch in den nahen Voralpentälern in Höhenlagen bis zu 650 m am Licht gefangen. Die Raupe wurde an Schwarzpappel gefunden.

15.8.1964 ♀ Steyr/Münichholz (Hofmann)

Falter in natürlicher Größe; Aufnahme Kollege Frz. Hofmann.

Bild 2 ; oben links: *Charixoptera (Lamprosticta) viridana* Walch.: Eine gute Art, deren Verbreitung in unserem Bezirk noch ungenügend bekannt ist. Sie kommt hauptsächlich in den Tälern der Voralpen im Ennstal in sehr mäßigen Beständen vor, im Flachland wurde das Tier noch nicht gefunden. Fest steht lediglich daß die Art keine besonderen Ansprüche an den Biotop stellt; sie wurde an extrem warmen Hanglagen ebenso gefunden wie an ausgesprochen feuchten, moorigen Bergwiesen- und Weiden. Der Falter wird alljährlich in einigen Stücken am Licht gefangen. Seine festgestellte Höhenverbreitung liegt bei etwa 900-950 m.

9.7.1964 ♂ Ternberg/Paukengraben in ca. 530 m am Licht (Müllner)

oben rechts: *Hadena gemma* Tr.: Ebenfalls eine gute Art, deren Vorkommen sich auf die Nebentäler der Ennstaler-Voralpen beschränkt. Sie liebt feuchte, etwas sumpfige Bergwiesen, Weiden, moorige Almböden, Lichtungen usw. und hält sich mit Vorliebe an warmen Orten auf. Im Flachland wurde das Tier noch nicht gefunden. Der Falter wird alljährlich in einigen Stücken am Licht erbeutet. Die festgestellte Höhenverbreitung liegt bei etwa 800 m.

7.8.1964 ♂ Ternberg/Paukengraben in ca. 540 m am Licht (Müllner)

unten links: *Heliothis dipsacea* L.: Die Art die ohne Zweifel zu den bekannteren Wanderfaltern zählt, wird bei uns in klimatisch besonders günstigen Jahren sowohl im Bergland an heißen, trockenen Berglehnen, Hängen usw. als auch an geeigneten Örtlichkeiten im Flachland unseres Bezirkes sehr spärlich gefunden. Einige versuchte Eizuchten mißlingen, die abgelegten Eier waren stets unbefruchtet. Die nachgewiesene Höhenverbreitung liegt bei 780 m.

7.8.1964 ♂ Ternberg/Paukengraben in etwa 520 m (Müllner)

unten rechts.: *Celaena (Luperina) matura* Hufn.: Der Falter der mancherorts zu den besseren Arten zählt besitzt in unserem Bezirk in den Nebentälern der Ennstaler-Voralpen sein heimatliches Refugium. Sein Vorkommen beschränkt sich auf mehr oder weniger inselartige Biotope, die stellenweise sehr zahlreich bevölkert sein können. Er liebt warmfeuchte Bergwiesen, aufgelockerte frische Buschhalden ebenso wie extrem warme, mit Buschwerk bestandene, trockene Hanglagen. Der Falter kommt gerne ans Licht und an den Köder. Die festgestellte Höhenverbreitung liegt bei 800 m.

27.7.1965 ♂ Ternberg/Paukengraben in ca. 540 m am Licht (Müllner)

Alle Falter in natürlicher Größe; Aufnahme Kollege K. Müllner

Eriopus (Callopietria)purpureofasciata Pili.

12.7.1966 Ternberg/Paukengraben (Moser)

Habrynthisscita Hb.

17.6.1966 Trattenbach/Kametrieß (Bachl)

Brotolomiametioullosa L.Massenaufreten in Trattenbach/Ennstal
beim Mischlicht (Hofmann)Naeniatypica L.im 12. 65 e.o. St. Ulrich b. Steyr (Wesely)
7.8.1966 Mauthausen/Mühlviertel (Kremslehner)Hydroeciamicacea Esp.

8.8.1966 Steyr (Moser)

lucens Frr.

18.8.1966 St. Lorenz/Mondsee (Kremslehner)

Gortynaochracea Hb.

24.9.1966 Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)

Tapinostolafulva Hb.10.9.1966)
11.9.1966) Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)Diese Art dürfte erst in jüngster Zeit zu-
sagende Lebensbedingungen im genannten Ge-
biet gefunden haben, sie war mir aus dem
Gemeindegebiet Ternberg noch nicht bekannt
(Kremslehner)Caradrinarespersa Hb.

im 1966 e.l., Trattenbach (Kremslehner)

Hydrillapullustris Hb.

11.6.1966 Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)

Amphipyratetra F.20.8.1966 Ternberg/Paukengraben, 530m (Wimmer)
28.8.1966 Ternberg in ca. 540 m (Kremslehner)perflua F.7.8.1966 Ternberg/Paukengraben (Wimmer)
18.8.1966 Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)Taeniocampagothica L.

19.2.1966 Brunnenschutzgebiet Steyr (Wesely)

Der überall häufige Falter wurde nur wegen
seiner sehr zeitigen Erscheinungszeit ver-
merkt, er wurde an einem Eichenstamm sitzend
aufgefunden (Wesely).populeti Tr.

im 3.1966 e.l., Enns, O.Ö. (Kremslehner)

munda Esp.9.3.1966 Krenstorf/Linz-Land sehr zahl-
reich am Köder (Bachl, Müllner, Wesely).Plastenissubtusa F.

12.8.1966 Ternberg/Paukengraben (Kremslehner)

Orthosiahelvola L.

20.9.1966 Ternberg/Paukengraben (Wimmer)

Orthosia

nitida F. 24.9.1966 Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)

Xanthia

citrage L. 24.9.1966 Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)

aurage F. 20.9.1966 Ternberg/Paukengraben (Wimmer)

flavage F. von eingetragenen Raupen aus St. Ulrich
b. Steyr und aus dem Brunnenschutzbiet
Steyr schlüpfen die Falter bereits im
Monat Juni, der 1. te Falter sogar im Mai.
(Wesely)

Orrhodia (Cerastis)

vaccinii L. 9.3.1966 Kronstorf/Linz-Land, Falter sehr
zahlreich am Köder (Bachl, Müllner, Wesely)

rubiginea F. 18.4.1966 Ternberg/Paukengraben (Wimmer)

Xylina

furcifera Hufn. 9.3.1966 Kronstorf/Linz-Land, 1 Falter
am Köder (Wesely)

Xylomiges conspiciellaris

f. melaleuca View. 26.4.1966 Ternberg/Paukengraben (Müllner)

Lithocampa

ramosa Esp. 17.5.1966 Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)

9.6.1966 Trattenbach/Kreuzmauersattel
in etwa 780m l. o. Geringe Eiab-
lage erfolgt; Zucht leicht; doch Sterblich-
keit der Raupen kurz vor der Verpuppung groß.
2 Puppen überwintern! (Wesely)

14.6.1966 Trattenbach/Kametrieß (Bachl)

Calophasia

lunula Hufn. 30.7.1966 Reichraming im Ennstal,
Raupen in ca. 1000 m. (Kremslehner)

Cucullia

asteris Schiff. 29.7.1966 Reichraming im Ennstal
Raupen (Kremslehner)

lucifuga Hb. 18.5.1966 Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)

artemisiae Hufn. 28.6.1966 }
30.6.1966 } e.l.
9.7.1966 } Steyr/Münichholz (Hofmann)
10.7.1966 }

26.6.1966 bis
2.8.1966 e.l. Steyr/Münichholz (Moser)

absinthii L. 3.7.1966 }
6.7.1966 } e.l. Steyr/Münichholz (Hofmann)
12.7.1966 }

26.6.1966 bis
2.8.1966 e.l. Steyr/Münichholz (Moser)

Plusia

C-aureum Knoch. im 1966 e.l. Ternberg/Bäckengraben (Kremsl.)

<u>Plusia</u>			
<u>moneta</u> F.	20.8.1966 } 20.9.1966 }	Ternberg	(Wimmer)
	Zwei sehr späte Funde, die vermutlich den verregneten Sommermonaten zuzuschreiben sind.		
<u>chryson</u> Esp.	12.7.1966 21.7.1966 29.7.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m Ternberg im Ennstal Reichraming im Ennstal	(Moser) (Wimmer) (Kremslehner)
<u>interrogationis</u> L.	14.8.1966	Ternberg/Paukengraben	(Wimmer)
<u>Erastria</u>			
<u>uncula</u> Cl.	17.6.1966	Steyr	(Moser)
<u>fasciana</u> L.	11.6.1966	Trattenbach	(Wimmer)
<u>Catocala</u>			
<u>fraxini</u> L.	11.9.1966 20.9.1966 26.9.1966	Ternberg/Bäckengraben Ternberg/Paukengraben Steyr/Neuschönau	(Kremslehner) (Wimmer) (Kremslehner)
<u>Lasperia</u> (Aventia)			
<u>flexula</u> Schiff.	10.7.1966	Trattenbach im Ennstal	(Wimmer)
<u>Boletobia</u> (Parascotia)			
<u>fuliginaria</u> L.	15.7.1966 4.8.1966	Linz/Kleinmünchen Steyr/Ennsleite	(Kremslehner) (Müllner)
<u>Zanclognatha</u>			
<u>grisealis</u> Hb.	10.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
<u>emortualis</u> Schiff.	14.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
<u>Bomolocha</u>			
<u>fontis</u> Thnbg.	14.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)

Berichtigung zum Abschlußbericht 1965, Folge (Jahrgang) 67

Zum Bildkommentar der Schwarztafel 2, Bild 1 soll es richtig
heissen:

"Erwachsene Raupen von Cucullia artemisiae Hfn. aus
Steyr/Hausleiten an ihrer Futterpflanze
Artemisia vulgaris".

Ferner

"Im selben Maße tritt auch Cucullia absinthii L. auf;
deren Raupen gleichfalls an Artemisia vulgaris in
Anzahl gefunden werden".

(Irrtümlich wurde die Futterpflanze der beiden Cucullien mit Artemisia campestris bezeichnet, die aber bei uns nicht vorkommt).

Geometriden = Spanner

Von den vielen gemeldeten Geometriden-Funden des Jahres 1966 sind beschämend wenige dem engeren Heimatbezirk zugehörig. Weitaus mehr Daten wurden aus anderen Bundesländern gemeldet, von denen die wichtigsten in der Spalte "Falterfunde aus den Bundesländern" aufgenommen wurden. Es ist jammerschade, daß den Geometriden im eigenen Heimatbezirk so wenig Beachtung geschenkt wird.

Folgende Funddaten wurden vermerkt:

Numeria

<i>capreolaria</i> F.	9.9.1966	Ternberg/Paukengraben, 530m (Wimmer)
	10.9.1966	Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)
	11.9.1966	

Hibernialeucophaearia Schiff.

	19.2.1966	Steyr/Gleink (Müllner)
	19.2.1966	Brunnenschutzgebiet Steyr in Anzahl an den Stämmen von Eichen und Birken (Wesely)
	22.2.1966	
	6.3.1966	Steyr (Moser)
	9.3.1966	Kronstorf/Linz-Land, i. Anzahl am Köder (Bachl, Müllner, Wesely)

<i>marginaria</i> Bkh.	9.3.1966	Kronstorf/Linz-Land, in Anzahl mit der Taschenlampe von ver- schiedenen Sträuchern abgeleuchtet. (Bachl, Müllner, Wesely)
------------------------	----------	--

Anisopteryx

<i>aesclaria</i> Schiff.	9.3.1966	Kronstorf/Linz-Land, in einigen Stücken am Köder (Bachl, Müllner)
--------------------------	----------	--

Phigalia

<i>pedaria</i> F.	11.2.1966	St. Ulrich b. Steyr, 2 ♂ an Eichenstämmen (Wesely)
	19.2.1966	Brunnenschutzgebiet Steyr, 8 Stück an Eichen- und Birken- stämmen (Wesely)
	22.2.1966	

Amphydasis

<i>betularia</i> L.	Diese Art trat heuer an den verschiedenen Örtlichkeiten ziemlich zahlreich in Erschei- nung. Genauere Daten siehe "Amphydasis betu- laria-Bericht".	
---------------------	--	--

Boarmia maculata

<i>f. bastelbergeri</i>	5.8.1966	Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)
<i>repandata</i> L.	21.7.1966	Ternberg im Ennstal (Wimmer)
<i>lichenaria</i> Hufn.	30.7.1966	Trattenbach/Kametrieß (Wimmer)
	12.8.1966	Ternberg/Paukengraben (Kremslehner)

Die Art scheint feuchtes Wetter zu lieben
(Kremslehner)

Gnophos

<i>obscuraria</i> Hb.	27.8.1966	Ternberg/Bäckengraben (Kremslehner)
-----------------------	-----------	-------------------------------------

<u>Ortholitha</u>			
moeniata Sc.	16.8.1966	Steyr/Hausleiten	(Wimmer)
<u>Larentia (Cidaria)</u>			
kollararia HS.	14.5.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
flavioinctata Hb.	14.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
tephaceata Hb.	24.9.1966	Ternberg/Bäckengraben in ca. 500m	(Kremslehner)
verberata Sc.	26.7.1966	Ternberg/Kruckenbrett in ca. 1000m	(Kremslehner)
galiata Hb.	11.6.1966	Trattenbach, ca. 750 m	(Wimmer)
luctuata Hb.	6.6.1966	Trattenbach/Schoberstein in etwa 1000m	(Wimmer)
alchemillata L.	29.7.1966	Reichraming/Kuhgraben	(Kremslehner)
minorata Tr.	27.8.1966	Ternberg/Bäckengraben in ca. 500m	(Kremslehner)
blomeri Curt.	14.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
<u>Phibalapteryx</u>			
aemulata Hb.	13.6.1963	Trattenbach	(Kremslehner)
	26.6.1965	Trattenbach, ca. 850m	(Wimmer)

Ein Großteil der nachstehend angeführten Eupitheciën stammt aus vergangenen Jahren. Die Tiere nicht bestimmt, konnten in den verflossenen Abschlußberichten keine Erwähnung finden. Die nun nachgeholte Determination besorgten die Herren Dr. Mack, Gmunden und Dr. Klimesch, Linz.

<u>Eupithecia (Tephroclistia)</u>			
venosata F.	10.6.1966	Trattenbach/Ennstal	(Moser)
	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
egenaria HS.	25.6.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
extraversaria HS.	2.7.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
pyreneata Mab.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
linariata F.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
	7.8.1966	Mauthausen/Mühlviertel 2 Raupen	(Kremslehner)
laquaearia HS.	23.8.1963	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
scabiosata Bkh. = ..			
subumbrata Schiff.	9.6.1963	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
	20.6.1965	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
subfulvata Hw. =			
icterata Vill.	12.7.1966	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
innodata Hufn.	20.8.1965	Ernstshofen/Grenzfauna N.Ö.	(Moser)
impurata Hb.	23.7.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
	29.7.1966	Reichraming/Kuhgraben	(Kremslehner)

Eupithecia (Tephroclistia)

isogrammaria HS.=			
haworthiata Dbl.	26.6.1965	Trattenbach	(Kremslehner)
	26.6.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
plumbeolata Hw.	7.6.1965	Kremsmünster	(Kremslehner)
	19.6.1965	Weyer im Ennstal	(Kremslehner)
veratraria HS.	7.7.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
tresignaria HS.	13.6.1963	Trattenbach	(Kremslehner)
selinata HS.	20.6.1965	Ternberg/Paukengraben	(Moser)
vulgata Hw.	1.6.1963	Trattenbach	(Kremslehner)
	15.8.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
denotata Hb.	im 1965	e.l. Ternberg	(Kremslehner)
	2.7.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
assimilata Gn.	19.6.1965	Weyer im Ennstal	(Wimmer)
	27.8.1964	Steyr	(Moser)
absinthiata Cl.	26.6.1964	Trattenbach/Wendbachtal	(Moser)
	31.7.1964	Ternberg	(Kremslehner)
expallidata Gn.	12.8.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
	12.8.1966	Ternberg/Paukengraben	(Kremslehner)
pimpinellata Hb.	26.6.1964	Trattenbach/Wendbachtal	(Moser)
	23.8.1965	Trattenbach/Kametrieß	(Wimmer)
distinctaria HS.	10.6.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
	19.6.1965	Weyer im Ennstal	(Wimmer)
	26.6.1965)	Trattenbach	(Kremslehner)
	5.7.1963)		
silinata Stdfs.	24.7.1965	Moserboden/Kaprun,	
		Salzburg in ca. 2100m	(Moser)
exiguata Hb.	13.5.1966	Kleiner Kohlergraben bei Klein-	
		raming/Bezirk Steyr	(Moser)
	18.5.1966	Trattenbach/Kametrieß	(Moser)
sobrinata Hb.	23.7.1965	Trattenbach, 800m	(Wimmer)
	23.8.1963)		
	28.8.1964)	Ternberg/Paukengraben	(Moser)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [0008](#)

Autor(en)/Author(s): Kremslehner Karl

Artikel/Article: [Noctuiden= Eulen 24-32](#)