

VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN DER KÄFERARTEN DREIER SAFTSTELLEN AN EICHEN AUS DER UMGEBUNG VON STEYR (OÖ.)

Heinz Mitter, Steyr

I. Einleitung

Es ist seit langem bekannt, daß manche Käferarten, die in der Literatur als selten bezeichnet werden, an blutenden Bäumen, also an Saftstellen (insbesondere von Eichen) oft in Anzahl festgestellt werden. Drei solche Saftstellen in der Umgebung Steyrs wurden von mir in den letzten Jahren an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen untersucht. Die Ergebnisse sollen hier kurz dargestellt werden.

II. Funddaten, arten- und mengenmäßige Erfassung

- 1) Saaß, ca. 7 km südwestlich von Steyr, Seehöhe 400 m, Saftstelle an Eiche in ca. 1 m Höhe, im Waldesinneren. 22. und 23. Juli 1972

Arten: Fam. NITIDULIDAE

<i>Epuraea silacea</i> HBST.	6 Ex.
<i>Epuraea terminalis</i> MANNERH.	2 Ex.
<i>Epuraea neglecta</i> HEER	1 Ex.
<i>Cryptarcha strigata</i> F.	1 Ex.
<i>Cryptarcha undata</i> OLIV.	3 Ex.
<i>Glischrochilus hortensis</i> FOURC.	1 Ex.

Insgesamt 6 Arten in 14 Exemplaren.

- 2) Steyr, nördlicher Stadtrand, Stadlmayr-Wald, Seehöhe 320 m, Saftstelle an Eiche in ca. 1,25 m Höhe, am Waldrand. 17. und 18. August 1973

Arten: Fam. NITIDULIDAE

<i>Epuraea terminalis</i> MANNERH.	5 Ex.
<i>Soronia grisea</i> L.	2 Ex.
<i>Cryptarcha strigata</i> F.	6 Ex.

Fam. EROTYLIDAE

<i>Dacne bipustulata</i> THUNB.	1 Ex.
---------------------------------	-------

Fam. SCARABAEIDAE

<i>Liocola lugubris</i> HBST.	1 Ex.
-------------------------------	-------

Fam. CERAMBYCIDAE

<i>Phymatodes testaceus</i> L.	1 Ex.
--------------------------------	-------

Insgesamt 6 Arten in 16 Exemplaren.

- 3) Staning, ca. 6 km nordöstlich von Steyr, Seehöhe 290 m, Saftstelle an Eiche in ca. 2 m Höhe, am Rand einer Lichtung. 19. und 20. Mai 1979

Arten: Fam. NITIDULIDAE

<i>Epuraea unicolor</i> OLIV.	2 Ex.
<i>Soronia grisea</i> L.	7 Ex.
<i>Cryptarcha strigata</i> F.	3 Ex.
<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> F.	200 Ex. (ca.)
<i>Glischrochilus hortensis</i> FOURC.	3 Ex.

Fam. MYCETOPHAGIDAE

<i>Litargus connexus</i> GEOFFR.	1 Ex.
----------------------------------	-------


Fam. TENEBRIONIDAE*Cylindronotus aeneus* SCOP.

1 Ex.

Fam. CERAMBYCIDAE*Phymatodes testaceus* L.

1 Ex.

Insgesamt 8 Arten in ca. 218 Exemplaren.

III. Graphische Darstellung des mengenmäßigen Vorkommens der einzelnen Arten aller drei SaftstellenIV. Diskussion und Zusammenfassung

Insgesamt wurden 14 verschiedene Arten festgestellt, eine davon, *Cryptarcha strigata* F., war an allen drei Saftstellen anzutreffen; *Epuraea terminalis* MANNERH., *Soronia grisea* L., *Glischrochilus hortensis* FOURC. und *Phymatodes testaceus* L. an jeweils zwei Saftstellen. Auffällig ist die enorme Anzahl von *Glischrochilus quadriguttatus* F. an der dritten Saftstelle, während an den beiden vorhergehenden Saftstellen diese Art nicht festzustellen war.

Literatur:

DALLA TORRE, K.W.v., (1879): Die Käferfauna von Oberösterreich, Linz

FREUDE-HARDE-LOHSE, (1967): Die Käfer Mitteleuropas, Bd.7, Krefeld

GANGLBAUER, L., (1899): Die Käfer von Mitteleuropa, Bd.3, Wien

HORION, A., (1960/61): Faunistik der deutschen Käfer, Bd.7 und 8, Überlingen/Bodensee

REITTER, E., (1908-16): Fauna Germanica, Bd.2-4, Stuttgart

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [0014](#)

Autor(en)/Author(s): Mitter Heinz

Artikel/Article: [VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN DER KÄFERARTEN
DREIER SAFTSTELLEN AN EICHEN AUS DER UMGEBUNG VON STEYR \(OÖ.\)
61-62](#)