

Zehnte Sammelreise in die Ligurischen Voralpen

(Hinterland von Alassio) vom 12. März bis 22. April 1981)

Von Dr. Franz Burgermeister,
Voldererweg 26
A-6112 Wattens, Tirol (Österreich).

Wie bei meinen früheren neun Reisen (siehe Jahresbericht 1981) wählte ich auch diesmal als Standquartier die Pension "La Pineta" bei Testico/Andora, Provinz Savona.

Die meiste Zeit meines Aufenthaltes war es empfindlich kalt, daher auch der Tagfang äußerst dürftig.

Ich zähle nun als Ergänzung zu meinem Vorbericht die wichtigsten Arten auf, die ich auf dieser Reise im besammelten Gebiet feststellen konnte. (Nomenklatur nach Seitz.)

- 1) Euchloe belia Cr. (ausonia Hb.) Ab Mitte April bei La Crocetta (siehe Planskizze im Vorbericht) in Anzahl frische, sehr große Tiere.
- 2) Leptidea sinapis L. Fliegt in Einzelstücken schon ab Mitte März, wenn die Sonne einmal kurz durch die Wolken bricht.
- 3) Lycaena cyllarus Rott. (Glaucopsyche alexis Poda) Die ersten Stücke dieser im Gebiet überaus häufigen Art erst ab Mitte April.
- 4) Notodonta anceps Goeze. Ab Anfang April in zunehmender Häufigkeit fliegend. (Testico am Licht)
- 5) Drymonia chaonia Hb. Ab Mitte April in Anzahl am Licht, auch mehrfach frische ♀♀.
- 6) Polyploca ridens F. Flugspitze bereits Mitte März. Durchwegs frische, sehr dunkle Stücke am Licht.
- 7) Rhyacia faceta Tr. In größerer Anzahl bereits ab Mitte März am Licht. Da ein großer Teil der Tiere abgeflogen war, ist die Flugspitze zu noch früherer Zeit anzunehmen.
- 8) Monima miniosa F. Ab Mitte März in Anzahl frische Tiere am Licht.
- 9) Monima stabilis View. Die weitaus häufigste Art der Gattung.
- 10) Monima gothica L. Nur einzeln, Flugzeit laut früheren Beobachtungen später anzunehmen.
- 11) Spudaea rutililla Esp. "Das" Massentier dieser Jahreszeit. In Färbung und Zeichnung äußerst variabel.
- 12) Anua tirhaca Cr. Nur 1 frisch aussehender ♂ der f. absens Wkr. mit einfarbig gelben Hfln. ohne eine Spur von Schwarz am 27.3. am Licht.
- 13) Endromis versicolora L. Nur 1 ♂ 13.3. am Licht.
- 14) Eudia pavonia L. In Anzahl sehr große ♀♀ am Licht.
- 15) Chesias rufata F. Auch jetzt nur einzelne, frische Stücke.
- 16) Nyssia florentina Stefan. ♂♂ einzeln am Licht, sowie bei Teg an Hauswänden nahe der Lichtquellen. - Mein Sammelfreund Martin Trasischker aus Klagenfurt fing in den Vormittagsstunden auf einem steilen Wiesenhang unterhalb des Dorfes Testico einige ♀♀ an Grashalmen sitzend: - leider hatten sie ihre Eier bereits abgelegt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Steyrer Entomologenrunde](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [0016](#)

Autor(en)/Author(s): Burgermeister Franz

Artikel/Article: [Zehnte Sammelreise in die Ligurischen Voralpen \(Hinterland von Alassio\) vom 12.März bis 22.April 1981\) 59](#)