© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Steyrer Entomologenrunde 26 (1992): 3-33

EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER MICROLEPIDOPTERENFAUNA VON OBERÖSTERREICH UND VON RUBRING/ST.VALENTIN IN NIEDERÖSTERREICH

Josef Wimmer, Steyr und Franz Hofmann, Rubring

Von den Leuchtabenden und den Tagesexkursionen des letzten Jahres wurden auch die Microlepidopteren mitgenommen, diese wurden Herrn Dr. Klimesch vorgelegt und von diesem bestimmt, einige der Pterophoriden bestimmte Herr Dir. Arenberger, Wien, beiden Herrn herzlichsten Dank, aber zugleich auch die Bitte, uns auch im nächsten Jahr wieder zu unterstützen!

Erfreulicherweise stellte sich heraus, daß drei Arten neu für Oberösterreich sind, es sind dies:

Algedonia luctualis Hübner 1793
Caryocolum proximum Haworth 1823
Eucosma metzneriana Treitschke 1830

Lageskizze der besammelten Örtlichkeiten in Oberösterreich



Plesching/Linz (A), Mönchgraben/Linz (B), Scharlinz/Linz (C), Enghagen/Enns (D), Rubring/St.Valentin (E), Haag, Niederösterreich (F), Reitnerberg bei Ternberg (G) und Schönau a.d. Enns (H)

Für den Ausdruck der Verbreitungskarten einiger Arten aus der Zoodat möchten wir uns bei Herrn Prof. Dr. Reichl recht herzlich bedanken! Es handelt sich um folgende Arten: Doloploca punctulana D. & Sch., Cochylis epilinana Dup., Caryocolum proximum Hw., Eidophasia messingiella F.R., Eucosma metzneriana Tr. und Dichomeris ustalella F. Verbreitungskarten am Ende des Beitrages!

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

In Oberösterreich sind wir ja durch das Erscheinen des 6. und 7. Bandes des Werkes "Die Schmetterlinge Oberösterreichs", die die Microlepidopteren behandeln und von Herrn Dr. Klimesch bearbeitet wurden, in der glücklichen Lage, ein umfangreiches Wissen über die Verbreitung der Microlepidopteren zu besitzen; aus diesem Werk sind auch die meisten Erläuterungen und Bemerkungen entnommen, die in diesem Beitrag verwendet werden.

In Niederösterreich erschien ja die letzte umfassende Arbeit, der Prodromus, der auch die Microlepidopteren berücksichtigt, im Jahre 1915! Natürlich sind inzwischen zahlreiche Arbeiten faunistischer Natur erschienen, doch nur wenige behandeln auch die Microlepidopteren, allerdings hat Dr. Kasy bei der Bearbeitung einiger Naturschutzgebiete immer auch die Microlepidopteren berücksichtigt. Es ist daher besonders erfreulich, daß in unserem Nachbarland Bayern ein "Prodromus der Lepidopteren Nordbayerns" erschienen ist, der auch die Microlepidopteren erfaßt, Herausgeber ist die Arbeitsgemeinschaft Nordbayerischer Entomologen, Redakteur Werner Wolf.

Leider ist es Tatsache, daß manche Sammler durch derartige Faunenlisten, in denen Arten angeführt werden, die in ihren Sammlungen fehlen, dazu angeregt werden, diese Biotope oftmals zu besuchen. Wer kann es dann einem Kollegen verdenken, daß er nicht mehr bereit ist, seine Daten, sei es nun in der Zoodat (Tiergeographische Datenbank Österreichs) oder in Zeitschriften zu publizieren. Das extreme Endergebnis sehen wir ja hautnah in der Wachau in Niederösterreich, hier sah sich die Niederösterreichische Landesregierung dazu veranlaßt, den Lichtfang generell zu verbieten! Den Schaden haben leider die Kollegen, die für ihre Arbeiten Vergleichsmaterial benötigen. Bedauerlicherweise wurden bei den Leuchtabenden, die in der Wachau durchgeführt wurden, kaum Micros mitgenommen, ich schließe mich da nicht aus, so dürfte bestimmt die eine oder andere Art unentdeckt bleiben! Das Positive an dem Verbot dürfte aber sein, daß auch andere Gebiete bearbeitet werden!

Bei der Bearbeitung von Lepidopteren kommt man ohne Vergleichsmaterial nicht aus, ganz besonders bei den Microlepidopteen, so ist man leider gezwungen, die Imagines mitzunehmen, es wäre aber bestimmt einer Überlegung wert, die Weibchen zu schonen, bei den Macrolepidopteren wäre dies oft kein Problem!

Über den Wert von Faunenlisten läßt sich natürlich streiten, doch möge man bedenken, daß es doch in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, den Ist-Zustand zu dokumentieren, um auch noch kommenden Generationen eine Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, auch werden derartige Listen zur Biotopbewertung im Zuge einer Unterschutzstellung herangezogen. Es ist daher erforderlich, die Lepidopteren in ihrer Gesamtheit zu erfassen, dazu gehören aber auch die "häufigen" Arten. bei Einzelfunden von "Raritäten" ist es leider oft so, daß diese die Entwicklung nicht im Biotop durchmachen. In diesem Beitrag wurden Arten, die bereits im Vorjahr von angeführten Örtlichkeiten gemeldet wurden, nicht mehr angeführt. Möge dieser Beitrag auch andere Kollegen dazu veranlassen, ebenfalls Microlepidopteren mitzunehmen und evtl. weiterzugeben, damit das Wissen über ihre Vielfalt und Verbreitung in unserem schönen Heimatland erweitert wird!

Artenliste:

Systematik nach Leraut 1980. Um eine Verwechslung mit diversen Synonymen zu vermeiden, wurde auch die Numerierung übernommen.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Falls kein Name angegeben, so wurden die Daten von beiden Autoren gemeinsam erarbeitet. Die Aufsammlungen in Rubring/St.Valentin und Haag führte Herr Hofmann durch, Plesching/Linz, Mönchgraben/Linz und Scharlinz/Linz bearbeitete Herr Wimmer, zum Teil im Auftrage der Naturkundlichen Station der Stadt Linz, Leiter Mag. Gerhard Pfitzner. Alle Daten aus Oberösterreich wurden in der Zoodat (Tiergeographische Datenbank Österreichs) gespeichert. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind die meisten Bemerkungen dem 6. und 7. Band der "Schmetterlinge Oberösterreichs" entnommen.

OPOSTEGIDAE

137 Opostega crespusculella Zeller 1839

Schönau 9.8.91

In O.Ö. vom Alpenvorland und vom Alpengebiet gemeldet, dazu kommt noch ein Fund vom Pöstlingberg, Flugzeit Juni bis Juli, im Alpengebiet auch noch später, wie es dieser Fund beweist, der Fundort Schönau a.d. Enns liegt nur 500 m hoch.

INCURVARIIDAE

149 Lampronia oehlmanniella Hübner 1796

Schönau 12.7.91
Scharlinz 30.5.91

Steigt in O.Ö. bis ca. 1500 m auf, Flugzeit Ende Mai bis Juni, in höheren Lagen auch noch im Juli, aus allen drei Landesteilen, dem Mühlviertel, dem Alpenvorland und dem Alpengebiet, gemeldet.

183 Adela reaumurella Linnaeus 1758

Rubring 4.5.90

In O.Ö. aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, Flugzeit Ende April - Mai.

TINEIDAE

371 Nemapogon cloacella Haworth 1828

Schönau 7.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai, Juli bis August.

396 Trichophaga tapetzella Linnaeus 1758

Rubring, coll. Lichtenberger

Aus allen drei Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juni bis August, in Häusern, selten im Freien um Ablagerungsstätten gefunden.

403 Tinea pellionella Linnaeus 1758

Rubring 16.6.89 und 24.7.91

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai - September, in Wohnungen und auch, wenngleich seltener, im Freien, zwei bis drei Generationen.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

LYONETIIDAE

433 Lyonetia clerkella Linnaeus 1758

Schönau a.d. Enns 7.7.91
Mönchgraben 8.7. und 8.8.91

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai - Juni und August, zwei Generationen, überwinternd.

443 Bucculatrix frangulella Goeze 1783

Schönau a.d. Enns 5.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai bis Juli.

GRACILLARIIDAE

466 Caloptilia alchimiella Scopoli 1763

Rubring 18.5.91

In Eichenbeständen verbreitet, Flugzeit April, Mai - Juni und August - September.

476 Caloptilia syringella Fabricius 1794

Rubring 23.5.91

In Laubgehölzen und Gärten in O.Ö. mit dem Vorkommen von Fraxinus und Syringa sehr verbreitet und nirgends selten, Flugzeit Mai, Juli - August, aus allen Landesteilen gemeldet.

499 Callisto denticulella Thunberg 1794

Rubring 1.6.91

In Gärten und Gebüsch mit Malus-Vorkommen, Flugzeit Mai bis Juni, von allen Landesteilen gemeldet.

566 Phyllonorycter emberizaepenella Bouché 1834

Rubring 30.5.91

In O.Ö. aus allen drei Landesteilen gemeldet, im Mai und im August.

ETHMIIDAE

597 Ethmia funerella Fabricius 1787

Mönchgraben/Linz 8.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai und Juli, 2 Generationen. Im Gebirge bis ca. 1400 m vorkommend, im Juni, einbrütig.

599 Ethmia pusiella Linnaeus 1758

Schönau a.d. Enns

In allen Landesteilen, Flugzeit Juli bis August

602 Ethmia bipunctella Fabricius 1775

Rubring 1.8.86

Mühlviertel und Alpenvorland, Flugzeit Mai - Juni und August bis September, zweibrütig.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

STATHMOPODIDAE

606 Stathmopoda pedella Linnaeus 1761

Schönau a.d. Enns 5.7.91

Vom Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, nur in Tallagen beobachtet, Flugzeit Juli bis Anfang August.

OECOPHORIDAE

624 Tichonia tinctella Hübner 1796

Schönau a.d. Enns 24.7.91
Mönchgraben/Linz 8.8.91

Alpenvorland und Alpengebiet, Flugzeit Mai - Juli.

625 Batia unitella Hübner 1796

Plesching 5.8.91
Scharlinz 13.7.91
Rubring e.p. 18.6.89

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai bis Juli, einbrütig.

634 Borkhausenia minutella Linnaeus 1758

Rubring 28.5. und 10.6.88

Aus N.Ö. liegt auch eine Meldung aus Waidhofen/Ybbs vor. In O.Ö. von allen Landesteilen gemeldet, Hauptflugzeit Mai - Juni, mehrbrütig Hauder stellte diese Art noch in einer Höhe von 1250 m, auf der Gradenalm, im Alpengebiet, von Ende Juli bis Anfang August fest.

637 Bisigna procerella Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 1.7.91
Rubring 21.6.91

In O.Ö. aus dem Mühlviertel und vom Alpenvorland gemeldet, Flugzeit Juni bis Anfang August, einbrütig, spätester Fund am 20. September.

643 Harpella forficella Scopoli 1763

Schönau 9.8.91
Mönchgraben 8.7.91
Plesching 14.8.91

Kommt in O.Ö. in allen drei Landesteilen vor, Flugzeit Ende Juni bis August, einbrütig.

647 Hypercallia citrinalis Scopoli 1763

Schönau 12.7.91

Alpenvorland und Alpengebiet, wird immer nur einzeln gefunden, Flugzeit Ende Mai bis Juli.

650 Anchinia cristalis Scopoli 1763

Mönchgraben 8.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juni bis Juli. einbrütig.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

652 Carcina quercana Fabricius 1775

Plesching 14.8.91

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, besonders auf warmen Plätzen, dies trifft ja auch auf die Sandgrube Plesching zu, Flugzeit Juli bis August, einbrütig.

654 Hofmannophila pseudopretella Stainton 1849

Rubring 9.7. und 1.8.88

In Häusern, Magazinen, Vorratskammern, seltener im Freien in Waldungen, mehrbrütig.

682 Diurnea fagella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 30.4.78 und 2.2.89

Aus N.Ö. liegt auch ein Fund von Waidhofen/Ybbs vor, in O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit März bis April, einbrütig.

687 Semioscopis steinkellneriana Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 23.3.91
Rubring 9.4.89, 2. und 12.4.90In O.Ö. aus allen Landesteilen bekannt, Flugzeit März bis April, einbrütig.

697 Depressaria pastinacella Duponchel 1838

Mönchgraben 2.9.91
Rubring e.p. 10.9.88

Aus dem Mühlviertel nur ein Fund von Puchberger, Grein e.l. 31.8.85, an Heracleum sphondilium, vom Alpenvorland mehrere Funde und aus dem Alpengebiet: Spital am Pyhrn, Kornerriese e.l. 1.3. - 14.9.33 (Klimesch).

709 Depressaria douglasella Stainton 1849

Reitnerberg/Ternberg 6.9.91

Von allen Landesteilen gemeldet.

712 Depressaria albipunctella Hübner 1796

Mönchgraben 8.7.91

Aus dem Mühlviertel von der Urfahrwänd, e.l. 27.6.47, Daucus (Klimesch), vom Alpenvorland und vom Alpengebiet liegen mehrere Funde vor.

732 Agonopteryx heracliana Linnaeus 1758

Mönchgraben 23.3. und 8.7.91
Rubring 7.8.91

Von allen Landesteilen gemeldet.

739 Agonopteryx propinquella Treitschke 1835

Mönchgraben 2.4. und 24.7.91
Rubring 20.3.90

St. Peter i.d. Au, Karlstift in N.Ö., auch zahlreiche Angaben aus dem benachbarten Bayern, wie Regensburg, Landshut, Haag bei Freising und Umgebung München, aus O.Ö. nur aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland bekannt. Praktisch alle Fundstellen im Donautal, Pöstlingberg, Linz, Kopl-Steinwänd, Linz-Donauauen und Eferding.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

742 Agonopteryx liturosa Haworth 1811

Enghagen 10.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet.

749 Agonopteryx petasitis Standfuß 1851

Schönau 2., 8., 22. und 30.8.91

Vom Mühlviertel und dem Alpengebiet gemeldet, Flugzeit Juni - August, einbrütig.

766 Agonopteryx angelicella Hübner 1813

Schönau 4.8.91

Vom Alpengebiet und dem Alpenvorland gemeldet.

772 Agonopteryx ciliella Treitschke 1832

Rubring 22.3., 3. und 25.10.89

Auch aus Waidhofen/Ybbs gemeldet, in O.Ö. aus allen Landesteilen bekannt, aus dem Mühlviertel allerdings nur ein Nachweis, Eidenberg 21.9.71 (Klimesch).

COLEOPHORIDAE

900 Coleophora frischella Linnaeus 1758

Scharlinz 13.7.91

Aus allen Landesteilen bekannt, auf Hängen und Trockenwiesen, in Scharlinz auf einer Waldlichtung, steigt im Alpengebiet bis 1800 m auf, Flugzeit Mai bis August.

934 Coleophora currucipennella Zeller 1839

Schönau 7.7.91

Mehrere Funde aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, aus dem Alpengebiet bisher nur ein Fund aus Micheldorf.

945 Coleophora serenella Duponchel 1843

Schönau 5.7.91
Mönchgraben 1.7.91

Nach Funden vom Mühlviertel und dem Alpenvorland nun auch ein Fund aus dem Alpengebiet, Flugzeit Juni - Juli.

1036 Coleophora vestianella Linnaeus 1758

Plesching 5.8.91

Bisher liegen nur Funde aus dem Alpengebiet vor, Flugzeit Juni - August.

MOMPHIDAE

1111 Mompha propinquella Stainton 1851

Mönchgraben 8.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, steigt nicht in höhere Lagen auf, Flugzeit Mai - Juli.

GELECHIDAE

1232 Isophrictis striatella Denis & Schiffermüller 1775

Plesching 5.8.91

Mühlviertel und Alpenvorland, Flugzeit Juni - Juli.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1240 Eulamprotes unicolorella Duponchel 1843

Schönau 5.7.91
Mönchgraben 8.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, wegen der Schwierigkeit der Erkennung der Art bloß nach äußeren Merkmalen ist ihre Verbreitung im Lande noch unklar, es liegen nur einzelne Funde vor (lt. Dr. Klimesch).

1241 Eulamprotes atrella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 2.8.91

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juli bis August.

1289 Stenolechia gemmela Linnaeus 1758

Scharlinz 27.8.91

Zahlreiche Daten aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, aus dem Alpengebiet nur aus Losenstein gemeldet, allerdings liegt dieser Fund bereits 90 Jahre zurück (4.8.1902, Mitterberger).

1339 Bryotropha terrella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 3.6.88

In O.Ö. von allen Landesteilen gemeldet, im Alpengebiet bis 1300 m aufsteigend, Flugzeit Ende Mai bis August.

Chionodes luctuella Hübner 1793

Schönau 7.7.91

Nach mehreren Funden vom Mühlviertel und vom Alpenvorland nun auch ein Fund im Alpengebiet, Flugzeit Mitte Juni bis Juli.

1377 Filatima spurcella Duponchel 1843

Rubring 16.6.91

Aus O.Ö. liegen nur wenige zweifelhafte Funde vor: Pfenningberg, Umgebung von Steyr und Neupernstein bei Micheldorf. In Niederösterreich von mehreren Zonen gemeldet, Prodromus 1915: Östlicher Bruchrand der Alpen, östliche Sandsteinzone, Leithagebirge, Hainburger Berge und Hügelland unter dem Manhartsberg, Dr. Kasy führt diese Art in seiner Arbeit über das Naturschutzgebiet "Glaslauterriegel-Heferlberg" und auch in seiner Arbeit über "Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes Hackelsberg" an. In den Arbeiten "Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des östlichen Neusiedler-See-Gebietes (Dr. Kasy) und "Die Schmetterlingsfauna des südlichen Burgenlandes" (Dr. Issekutz) ist spurcella nicht angeführt. Aus Bayern wird München angegeben und im Prodromus von Nordbayern gibt es Meldungen von der Zone 6 (Mittlere und Südliche Frankenalb) und von der Zone 12 (Mainfränkische Platten). Nach Dr. Klimesch ist Filatima spurcella Dup. aus Frankreich, Süd-Deutschland, Österreich und Kleinasien gemeldet.

1441 Caryocolum fischerella Treitschke 1833

Plesching 14.8.91

Aus dem Alpenvorland und dem Mühlviertel, von der Insel Wörth bei Grein, e.l. 4.6.83, leg. Puchberger, gemeldet.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1460 Caryocolum proximum Haworth 1828

Mönchgraben 23.8.91 Neu für Oberösterreich!

Zur Verbreitung dieser Art gibt Dr. Klimesch an: Frankreich, Westdeutschland, Polen, Österreich, Dänemark, Niederlande, Ostdeutschland, Schweiz, Ungarn, Italien, Sardinien , Jugoslavien, Albanien, Rumänien, europäisches Rußland (P. Huemer 1988), zufolge des Catalogus Lepidopterorum Fenniae (1977) auch in Finnland vorkommend, Huemer (1988) erwähnt aber das Fehlen der Art in Skandinavien. Im Prodromus der Lepidopteren Nordbayerns wird diese Art von folgenden Zonen angegeben: 6 Mittlere und Südliche Frankenalb, 10 Fränkisches Keuper-Lias-Land (Becken), 16 Frankenwald und Bayerisches Vogtland und 17 Fichtelgebirge und Münchberger Hochfläche.

1491 Syncopacma taeniolella Zeller 1839

Scharlinz 13.7.91

Aus O.Ö. von allen Landesteilen nachgewiesen, Flugzeit Juli bis August.

1496 Acompsia cinerella Clerck 1759

Schönau 5.7.91
Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91

Kommt in allen Landesteilen vor, Hauptflugzeit Juni - Juli, in höheren Lagen noch im August, bis in Höhen von 1600 m verbreitet.

1500 Anacampsis populella Clerck 1759

Plesching 5., 10. und 14.8.91

Vom Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, Flugzeit Juni - Juli.

1528 Dichomeris ustalella Fabricius 1794

Schönau 7.7.91

Bisher nur aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, nun auch ein Fund aus dem Alpengebiet, Flugzeit in den niederen Lagen Mai - Juni.

EPERMENIIDAE

1557 Epermenia illigerella Hübner 1796

Rubring 8.7.91

In O.Ö. vom Mühlviertel, allerdings nur ein Fund (Unterweißenbach 1984, Gerstberger) und vom Alpenvorland gemeldet. Im Prodromus 1915 von den Zonen 10 Donauauen, 13 Rohrwald und 16 Wachau angegeben, Dr. Issekutz meldet diese Art vom südlichen Burgenland von Eberau und Kohfidisch, Dr. Kasy von den Zitzmannsdorfer Wiesen im östlichen Neusiedler-Seegebiet (leg. Glaser, det. Dr. Klimesch). Im Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns wird diese Art von mehreren Zonen angegeben.

YPONOMEUTIDAE

1596 Argyresthia goedartella Linnaeus 1758

Plesching 14.8.91
Mönchgraben 8. und 23.8.91

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Schönau 9.8.91

Meist in Anzahl am Licht, besonders im Mönchgraben. Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juli - September.

1606 Argyresthia conjugella Zeller 1839

Schönau 12.7.91

Vom Mühlviertel und vom Alpengebiet gemeldet, steigt im Alpengebiet bis 1700 m auf, Flugzeit Juni bis Juli, in höheren Lagen auch noch im August.

1609 Argyresthia pruniella Clerck 1759

Plesching 5. und 14.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, geht bis 1000 m hoch, Flugzeit Mai - Juni und Juli - August, 2 Generationen.

1610 Argyresthia curvella Linnaeus 1761

Plesching 5. und 14.8.91
Mönchgraben 28.7.91

Von allen Landesteilen gemeldet, steigt nicht in höhere Lagen auf, Flugzeit Mai bis August.

1613 Yponomeuta evonymella Linnaeus 1758

Mönchgraben 8.7.91

Mühlviertel und Alpenvorland, Flugzeit Juni - Juli.

1614 Yponomeuta padella Linnaeus 1758

Rubring e.l. 28.6.84

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juli - August.

1619 Yponomeuta plumbella Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 17.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, im Mühlviertel allerdings nur aus Steyregg, Flugzeit Juli - August.

1650 Prays fraxinella Bjerkander 1784

Mönchgraben 8.7.91

Kommt in allen Landesteilen vor, Flugzeit Juni bis Mitte Juli.

1661 Ypsolopha scabrella Linnaeus 1761

Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91

Aus O.Ö. liegen bisher nur drei Nachweise aus dem Alpengebiet vor (Damberg bei Steyr, Veichltal bei Windischgarsten und Küpfern im Ennstal).

1670 Ypsolopha parenthesella Linnaeus 1761

Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, besonders aus dem Mühlviertel liegen zahlreiche Fundmeldungen vor, Flugzeit Juni bis September.

1671 Ypsolopha ustella Clerck 1759

Rubring 20.6.91

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

In O.Ö. zahlreiche Fundmeldungen aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, auch aus Waidhofen/Ybbs gemeldet.

1674 Ypsolopha vitella Linnaeus 1758

Reitnerberg 6.9.91

In O.Ö. bisher nur Funde aus dem Alpenvorland, Flugzeit Juli bis August.

1675 Plutella xylostella Linnaeus 1758

Mönchgraben Anfang Juli bis Mitte August 91
Schönau 24.7.91
Rubring 23.5.91

In O.Ö. in allen Landesteilen sehr verbreitet, Flugzeit Juni bis November.

1683 Eidophasia messingiella Fischer v. Röslerstamm 1840

Schönau 5.7.91

Bisher aus O.Ö. nur einzelne Funde bekannt. Mühlviertel: Sarmingstein; Alpengebiet: Micheldorf, Kremsursprung, Gradenalm 1300 m und Warscheneckgebiet, Untere Wurzeralm. In Niederösterreich von mehreren Zonen gemeldet, ebenso aus Nordbayern.

CHOREUTIDAE

1742 Anthophila fabriciana Linnaeus 1767

Rubring e.l. 1., 17., 24. und 26.5.88

Aus allen Landesteilen gemeldet, steigt bis 1600 m auf, Flugzeit Mai bis September.

TORTRICIDAE

1754 Pandemis corylana Fabricius 1794

Schönau 3. - 25.8.91
Plesching 14.8.91
Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91
Rubring e.l. 14.7.88 und e.l. 25.5.89

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, besonders vom Alpenvorland, Flugzeit Juli - August.

1755 Pandemis cerasana Hübner 1786

Rubring e.p. 29.5.86

Zahlreiche Funde aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, nur wenige aus dem Alpengebiet, aus Niederösterreich von Ostrong und Ysper gemeldet.

1756 Pandemis cinnamomeana Treitschke 1830

Schönau 8.8.91

Aus allen Landesteilen liegen zahlreiche Funde vor, Flugzeit Juni - Juli.

1757 Pandemis heperana Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 8.8.91
Plesching 5.8.91
Rubring e.l. 26.6.86, 29.6. und 7.7.88, 3.6.89

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Nach zahlreichen Funden vom Mühlviertel und vom Alpenvorland nun auch ein Fund vom Alpengebiet, Flugzeit Juni bis Juli, spätestes Funddatum 19. September. Aus Niederösterreich auch aus St.Peter i.d. Au gemeldet.

1766 Archips podana Scopoli 1763

Mönchgraben 27.8.91
Rubring e.l. 14.6.88

Vom Mühlviertel und dem Alpenvorland liegen mehrere Funde vor, vom Alpengebiet nur aus Küpfern gemeldet, Flugzeit Juni bis Juli.

1768 Archips crataegana Hübner 1799

Rubring e.l. 7.7.88 und 7.6.89

In O.Ö. nur wenige Daten vom Alpenvorland und dem Alpengebiet, Flugzeit Juni bis Juli. In Niederösterreich von mehreren Zonen gemeldet, auch aus Nordbayern von einigen Zonen gemeldet.

1772 Syndemis musculana Hübner 1799

Enghagen 22.5.91
Rubring 21.6.91

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Ende April bis Mai und Juli, alpin nur einbrütig, steigt bis 1700 m auf. Aus Niederösterreich aus Karlstift gemeldet.

1790 Adoxophyes orana Fischer v. Röslerstamm 1834

Mönchgraben 2.9.91
Scharlinz 27.8.91

Im Alpengebiet bisher noch nicht festgestellt, Flugzeit Juni - August.

1792 Ptycholoma lecheana Linnaeus 1758

Rubring e.l. 14.5.89 und e.l. 22.5.90

Nur aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet.

1801 Epagoge grotiana Fabricius 1781

Mönchgraben 6.7.91

Mehrere Funde aus dem Mühlviertel, wenige vom Alpenvorland und dem Alpengebiet, Flugzeit Ende Juni bis Juli.

1809 Pseudoargyrotoza conwagana Fabricius 1775

Schönau 5. und 7.7.91

Zahlreiche Funde aus dem Alpenvorland, nur wenige aus den anderen Landesteilen, Flugzeit Juni bis August.

1815 Eulia ministrana Linnaeus 1758

Scharlinz 30.5.91
Rubring e.l. 9.4.89

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai, in höheren Lagen Juli bis August, steigt bis 1500 m auf.

1826 Cnephasia alticolana Herrich-Schäffer 1851

Rubring 29.5. und 6.6.88

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Wenige Angaben aus dem Mühlviertel, zahlreiche aus dem Alpengebiet, Höhenverbreitung bis 1700 m, Flugzeit je nach Höhenlage Mai bis August.

1827 Cnephasia interjectana Haworth 1811

Rubring 23.5.90

Zahlreiche Daten vom Mühlviertel und dem Alpenvorland, vom Alpengebiet nur aus Micheldorf gemeldet, Flugzeit Juni bis August, tritt auch als Schädling an Zuckerrübe auf.

1835 Tortricodes alternella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 2.3.89, 21.3.90 und 17.3.91

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit März - April. Aus Niederösterreich von St.Peter in der Au gemeldet.

1846 Eana penziana Thunberg & Becklin 1791

Schönau mehrmals, 5.7. - 9.8.91

Von allen Landesteilen gemeldet, aus dem Alpenvorland lediglich von Kopl-Steinwänd, 10.7.55 Mitterndorfer. Höhenverbreitung bis 1600 m, spätestes Funddatum 12. September.

1856 Doloploca punctulana Denis & Schiffermüller 1775

Scharlinz 30.5.91

Von dieser wärmeliebenden Art liegen nur wenige Funde im Lande vor, aus dem Alpenvorland nur eine Angabe aus Vöcklabruck, 1.5.46 Foltin. Flugzeit April - Mai.

1860 Tortrix viridana Linnaeus 1758

Rubring 7.4.74, 2.5.75, 30.4.78, 26.5.89 und e.l. 28.3.89

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juni - Juli, aus Niederösterreich von Ysper gemeldet.

1863 Croesia forskaleana Linnaeus 1758

Schönau 9.8.91
Plesching 14.8.91

Vom Mühlviertel und vom Alpenvorland bereits bekannt, nun auch ein Fund aus dem Alpengebiet, Flugzeit Juni - August.

1865 Acleris laterana Fabricius 1784

Schönau 30.8.91
Mönchgraben 8.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Juli - August.

1867 Acleris sparsana Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 3.10.91

Kommt in allen Landesteilen vor, Hauptflugzeit im August.

1868 Acleris rhombana Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 13.9.86

Kommt in O.Ö. in allen Landesteilen vor, aus Niederösterreichreich von Ostrong gemeldet.

1869 Acleris aspersana Hübner 1817

Mönchgraben 2.9.91

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Ende Juli bis August, geht bis 1400 m, hier im September.

1870 Acleris ferrugana Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 8.7.91
Scharlinz 13.7.91
Rubring 21.3.90

Diese Art wurde erst in neuerer Zeit als eigene Art anerkannt, deshalb sind praktisch alle früheren Daten unsicher.

1876 Acleris variegana Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 2.9.91
Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit August bis September und Oktober.

1894 Acleris emargana Fabricius 1775

Schönau 3.10.91

Zahlreiche Funddaten aus allen Landesteilen, Flugzeit von August bis November.

1896 Celypha striana Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 9.7.71

In O.Ö. aus allen Landesteilen bekannt, aus Niederösterreich von Waidhofen/Ybbs, Flugzeit August bis November.

1899 Celypha rufana Scopoli 1763

Plesching 14.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Ende Mai und Juni, einzeln im August, wahrscheinlich 2 Generationen.

1903 Olethreutes arcuella Clerck 1759

Rubring 23.6.88

In O.Ö. aus dem ganzen Lande bekannt, steigt lokal bis 1400 m auf, Flugzeit Mai - Juni.

1914 Olethreutes lacunana Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 5.7.91
Mönchgraben 23.8.91
Rubring 12.6.88

Im ganzen Land verbreitet, steigt bis 1600 m auf, meist häufig auftretend, Flugzeit Mai bis August, tritt in zwei Generationen auf.

1916 Olethreutes bipunctana Fabricius 1794

Enghagen 10.7.91

Von allen Landesteilen gemeldet, steigt bis 1600 m auf, Flugzeit Ende Juni - Juli.

1934 Hedya salicella Linnaeus 1758

Schönau 5.7.91

Nun auch ein Fund vom Alpengebiet, aus den anderen Landesteilen bereits gemeldet, Flugzeit Ende Mai bis Juni und ab Mitte August, zweibrütig.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

1952 Endothenia quadrimaculana Haworth 1811

Schönau 12.6.91
Mönchgraben 8.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, Hauptflugzeit Juni bis Anfang August.

1976 Eudemis porphyrana Hübner 1799

Enns 20. und 21.6.91

Von dieser erst spät als distinctes Taxon anerkannten Art liegen nur wenige überprüfte Meldungen vor (Dr. Klimesch).

1992 Ancylis unculana Haworth 1811

Schönau 5. und 19.7.91
Plesching 5.8.91

Alpenvorland und Alpengebiet, vom Mühlviertel nur eine Angabe, Grein 1.5.84, Puchberger. Geht bis 1400 m, Flugzeit Ende April - Mai, in Hochlagen Juni - Juli.

1993 Ancylis apicella Denis & Schiffermüller 1775

Scharlinz 30.5.91

In allen Landesteilen verbreitet, Flugzeit Ende April bis Juni und August, zwei Generationen.

2005 Epinotia immundana Fischer v. Röslerstamm 1839

Scharlinz 22.5.91

Nur wenige Daten aus allen Landesteilen, Flugzeit Mai bis Juni und Juli bis August, 2 Generationen.

2012 Epinotia tedella Clerck 1759

Schönau 5.7.91

Aus dem ganzen Land gemeldet, im Hügelland oft massenhaft auftretend, Flugzeit Mai bis Juli.

2018 Epinotia cruciana Linnaeus 1761

Rubring e.l. 20.5.89

Aus allen Landesteilen bekannt, Höhenverbreitung bis 1900 m, Flugzeit je nach Höhenlage Ende Juni bis Ende August.

2025 Epinotia pygmaeana Hübner 1799

Mönchgraben 2.4.91

Angaben aus allen Landesteilen, bis 1300 m, Flugzeit April bis Juni, je nach Höhenlage.

2035 Gypsonoma dealbana Frölich 1828

Rubring e.l. 4.6.89

Im ganzen Lande sehr verbreitet, Ende Mai bis Juli. Von Niederösterreich auch von Ennsdorf gemeldet.

2037 Gypsonoma minutana Hübner 1799

Enghagen 10.7.91

Von allen Landesteilen bekannt, Flugzeit im Juni.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2042 Gibberifera simplana Fischer v. Röslerstamm 1836

Haag 30.5.91

Von O.Ö. nur wenige Funde aus der Linzer Gegend bekannt. In der "Schmetterlingsfauna des Südlichen Burgenlandes" wird diese Art von Dr. Issekutz von Kohfidisch angeführt (det. Dr. Klimesch), aus Südbayern ist diese Art von Regensburg gemeldet, auch im "Prodromus der Schmetterlinge Nordbayerns" wird diese Art von einigen Zonen erwähnt.

2043 Epiblema cynosbatella Linnaeus 1758

Reitnerberg bei Ternberg 12.6.91

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Mai - Juli.

2050 Epiblema grandaevana Lienig & Zeller 1846

Schönau 3.10.91

Vom Alpen- und vom Voralpengebiet gemeldet, lokal bis 1300 m verbreitet, Flugzeit Juni bis Juli.

2052 Epiblema foenella Linnaeus 1758

Mönchgraben 8.8.91
Plesching 14.8.91

Vom Mühlviertel und vom Alpenvorland gemeldet, Flugzeit Ende Juni - August.

2054 Epiblema farfarae Fletscher 1938

Schönau 5. und 7.7.91

Viele Funddaten vom Alpengebiet, aber auch aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, bis 1200 m aufsteigend, Hauder gibt für diese Art, die er unter E. brunnichiana Froelich führt, zwei Generationen an: Mai - Juli und Juli - September.

2061 Epiblema hepaticana Treitschke 1835

Schönau 7.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, bis 1600 m, Juni - Juli.

2078 Eucosma hohenwartiana Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 18.7.91

In allen Landesteilen verbreitet, bis 1000 m, Flugzeit Mai bis August.

2079 Eucosma cana Haworth 1811

Schönau 5. und 7.7.91
Mönchgraben 8.8.91
Plesching 5.8.91

Im ganzen Land verbreitet, bis 1200 m, Juni - August.

2080 Eucosma obumbratana Lienig & Zeller 1846

Mönchgraben 8.7.91

In allen Landesteilen beobachtet, Mai und Juli, spätester Fund am 1. September.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2091 Eucosma aemulana Schläger 1849

Schönau 5.7.91

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juli - August.

2100 Eucosma campoliliana Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 5. und 12.7.91

Zahlreiche Funddaten aus allen Landesteilen, Flugzeit Ende Juni - August.

Eucosma metzneriana Treitschke 1830

Enghagen 18.6.90 Neu für Oberösterreich!

Zur allgemeinen Verbreitung bemerkt Dr. Klimesch: "Diese Art zeigt eine vorwiegend östliche Verbreitung, nachgewiesen in Ost- und Norddeutschland, Niederösterreich, Mähren, Südtirol, Ungarn, Galizien, Südost-Rußland, Dalmatien und Sibirien".
Im Prodromus von Niederösterreich (1915) wird diese Art von folgenden Zonen angegeben: 2 Östliche Kalkalpen, 3 Östlicher Bruchrand der Alpen und 10 Donauauen. Dr. Kasy erwähnt diese Art in seinen Arbeiten vom Hackelsberg und Heferlberg und Glaslautererriegel, weiters in seiner Arbeit "Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des östlichen Neusiedler-See-Gebietes, im "Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns" von folgenden Zonen angegeben: 5 Nördliche Frankenalb, 6 Mittlere und Südliche Frankenalb, 10 Fränkisches Keuper-Lias-Land (Becken), 12 Mainfränkische Platten und 15 Bayerische Hoch-Rhön, auch in dem Werk "Motýle Slovenska", Andrej Reiprich 1960, wird diese Art angegeben.
Zur Biologie bemerkt Dr. Klimesch: Die Raupe lebt in Endtrieben älterer Artemisia vulgaris-Stöcke, auch A. absinthium und vielleicht auch anderer Artemisia-Arten, bei uns kommt als Futterpflanze wohl Artemisia vulgaris in Betracht.

2112 Rhyacionia buoliana Denis & Schiffermüller 1775

Scharlinz 13.9.91

Zu dieser Art bemerkt Dr. Klimesch in dem 7. Band des Werkes "Die Schmetterlinge Oberösterreichs"; Über die Verbreitung im Lande kann erst nach einer Überprüfung der Funde unter Heranziehung der Kopulationsapparate beider Arten ein klares Bild gewonnen werden. Nach den bisher gewonnenen Eindrücken dürfte Rh. pinicolana Doubl., die von älteren Autoren nicht berücksichtigt wurde, im Lande verbreiteter und häufiger sein.

2163 Cydia fagiglandana Zeller 1841

Scharlinz 13.7.91

Von allen Landesteilen angegeben, Flugzeit Juni bis Anfang August.

2174 Cydia pomonella Linnaeus 1758

Plesching 5. und 14.8.91
Mönchgraben 10.8.91
Steyr/Stein 10.8.91
Rubring 7. und 23.6.89, e.p. 23.5. und 3.6.89

In Gärten verbreitet, Flugzeit Mai bis Juli.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

COCHYLIDAE

2258 Phalonidia curvistrigana Stainton 1859

Schönau 17.8.91

Es liegen Meldungen vom Alpenvorland und aus dem Alpengebiet vor, Flugzeit Mai und Juli, August.

2259 Phalonidia manniana Fischer v. Röslerstamm 1839

Schönau 7. und 12.7.91

Nur aus dem Alpenvorland und aus dem Alpengebiet gemeldet, Flugzeit Mai - Juli.

2270 Agapeta hamana Linnaeus 1758

Schönau 25.8.91
Plesching 14.8.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, im Gebirge bis 900 m, Flugzeit Juni - Juli.

2271 Agapeta zoegana Linnaeus 1767

Plesching 14.8.91
Rubring 1.8.86

Kommt in allen Landesteilen vor, Juni bis Ende August.

2276 Eupoecilia angustana Hübner 1799

Schönau 5. und 7.7.91

Bisher nur vom Mühlviertel und dem Alpengebiet bekannt, steigt bis 1200 m auf, Flugzeit Mai - Juni und Juli - August.

2282 Aethes cnicana Westwood 1854

Schönau 5.7.91
Mönchgraben 24.7.91

Alpenvorland und Alpengebiet, Flugzeit Mai und Juli bis August.

2297 Aethes hartmanniana Clerck 1759

Schönau 5.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, viele Funde aus dem Alpengebiet. Diese, in O.Ö. meist häufige Art, geht bis 1700 m, Flugzeit von Mitte April bis Juli in zwei Generationen, in höheren Lagen nur in einer Generation, im Juli.

2320 Cochylis dubitana Hübner 1799

Schönau 9. und 30.8.91

Es liegen Funde aus allen Landesteilen vor, im Alpengebiet bis gegen 1400 m verbreitet, Flugzeit Mai - Juni und Juli - August, in höheren Lagen im Juli und August.

2324 Cochylis epilinana Duponchel 1843

Plesching 14.8.91

Dazu Dr. Klimesch: Cochylis epilinana Dup. wurde von mir bereits im Traunsteingebiet (28.6.42, ein Männchen) in einem zweifelhaften Exemplar gefunden, aber nicht in die Fauna aufgenommen. Zur Verbreitung bemerkt Dr. Klimesch:

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Deutschland, Belgien, Mittelitalien, Galizien, Kaukasus und Kärnten; nach RZOWSE (MP 1970) kommen noch folgende Gebiete dazu: Marokko, Kanarische Inseln, Spanien, Schweden, Finnland, Polen, Ukraine, Ungarn, Bulgarien, Jugoslavien, Mazedonien, Albanien, Griechenland, Kaukasus, Kleinasien, Palästina und Nord-Syrien.
Dr. Kasy führt in seiner Arbeit über "Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes Pischeldorfer Fischawiesen, östliches Niederösterreich" diese Art an, im "Prodromus der Schmetterlingsfauna Nordbayerns" wird diese Art von den Zonen 6 Mittlere und Südliche Frankenalb und 12 Mainfränkische Platten angegeben, auch Dr. Issekutz meldet sie von Pinkafeld in seiner Arbeit vom südlichen Burgenland.

PYRALIDAE

2350 Chrysoteuchia culmella Linnaeus 1758

Schönau 5.7.91
Pierbach 25.6.89
Rubring 18.6.89

In O.Ö. von allen Landesteilen gemeldet, geht bis 1300 m, Hauptflugzeit Juni - Juli, meist häufig.

2351 Crambus pascuella Linnaeus 1758

Schönau 5.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, geht bis 1200 m, Hauptflugzeit Ende Juni bis Anfang August.

2357 Crambus nemorella Hübner 1813

Rubring 4.6.88, 14. und 15.6.89

Häufigste Crambus-Art in O.Ö., in allen Landesteilen verbreitet, auf Wiesen, Flugzeit Mai - August.

2360 Crambus perlella Scopoli 1763

Rubring 28.6. und 1.7.88, 20.6.89

In O.Ö. von allen Landesteilen gemeldet, auf feuchten Wiesen sehr verbreitet, bis in eine Höhe von 1800 m, Flugzeit Juni - August.

2364 Agriphila tristella Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 18.6. und 25.8.91
Mönchgraben 8.7. und 8.9.91
Plesching 14.8.91
Rubring 27.8.88

Im ganzen Lande gefunden, nur geringe Höhenverbreitung, Flugzeit Mitte Juli bis Anfang September.

2366 Agriphila inquinatella Denis & Schiffermüller 1775

Plesching 5. und 14.8.91
Rubring 28.8.88

Wird im Land hauptsächlich am Licht erbeutet, es liegen relativ wenige Funde vor, Flugzeit Ende Juli bis August.

2370 Agriphila selasella Hübner 1813

Schönau 9.8.91

Vom Alpengebiet nicht gemeldet, vom Mühlviertel nur aus Sandl, wird vielfach mit tristella verwechselt.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2371 Agriphila straminella Denis & Schiffermüller 1775

Mönchgraben 29.7. und 23.8.91
Rubring 11.8.88

In O.Ö. von allen Landesteilen gemeldet, verbreitet und meist häufig, Flugzeit Juni - August, in höheren Lagen auch noch später.

2376 Catoptria myella Hübner 1796

Schönau 10. und 12.7.91, je ein Männchen

Beide Falter wurden genitaluntersucht. Die tatsächliche Verbreitung dieser Art in O.Ö. läßt sich erst nach morphologischer Untersuchung eines umfangreichen Materials feststellen.

2379 Catoptria pyramidellus Treitschke 1832

Schönau 7.7. bis 30.8.91

Es liegen Funde aus dem Alpengebiet vor, geht bis 1800 m, Flugzeit je nach Höhenlage Juni bis Mitte August.

2388 Catoptria pinella Linnaeus 1758

Scharlinz 5.7.91, det. Lichtenberger

Mehrere Funde aus dem Alpenvorland, vom Mühlviertel nur ein Fund von Kefermarkt, Flugzeit Juli bis Mitte August.

2396 Catoptria falsella Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 24.7., 17.8. und 22.8.91

Einzeln in allen Landesteilen von Ende Juni - September.

2410 Thisanotia chrysonuchella Scopoli 1763

Rubring 8.5., 17.5. und 13.6.89

Kommt in O.Ö. in allen Landesteilen vor, geht bis 1500 m.

2418 Platytes alpinella Hübner 1813

Plesching 14.8.91

Nur Funde vom Alpenvorland, Juli bis August.

2431 Scoparia subfusca Haworth 1811

Schönau 5.7., 9.8., 17.8. und 30.8.91

In allen Landesteilen von Juni bis Juli festgestellt.

2432 Scoparia pyralella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 1. und 20.6.89

Kommt in allen Landesteilen vor, steigt bis 1500 m auf, Flugzeit Mai - Juli, in höheren Lagen Ende Juni bis Anfang August.

2433 Scoparia ingratella Zeller 1846

Plesching 14.8.91

Alpengebiet und Alpenvorland, Flugzeit je nach Höhenlage Mai, Juni bzw. Juli, August.

2435 Scoparia basisstrigalis Knaggs 1866

Plesching 14.8.91

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Rubring 20.6.89

Von allen Landesteilen gemeldet, Flugzeit Juni - Juli.

2443 Eudonia truncicolella Stainton 1849

Plesching 14.8.91

Im ganzen Land verbreitet, Mai - August.

2468 Evergestis sophialis Fabricius 1787

Schönau 9.8.91

Nur wenige Funde aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, zahlreiche vom Alpengebiet, Flugzeit Juni - August.

2469 Evergestis forficalis Linnaeus 1758

Rubring e.l. 3.8.87 und 9.5.88

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, vom Alpengebiet allerdings nur ein Fund aus Micheldorf, 2 Generationen, Mitte Mai bis Anfang September.

2490 Pyrausta aurata Scopoli 1763

Schönau 5., 7. und am 12.7.91
Mönchgraben 8.7.91
Rubring 23.5.87

Aus allen Landesteilen angegeben, steigt in den Alpen bis 1300 m auf, 2 Generationen, Mai - Juni, Mitte Juli - August.

2496 Pyrausta cespitalis Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 10.7.89

Kommt in allen Landesteilen vor, bis 1600 m, Flugzeit April - Mai und Juli - September, in höheren Lagen im Juli - August in einer Generation.

2516 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis Hübner 1796

Plesching 5.8.91

Von allen Landesteilen gemeldet, aus dem Alpengebiet nur wenige Funde, Flugzeit April - Mai, Juni - August, wahrscheinlich in 2 Generationen.

2517 Sitochroa palealis Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 12.6.91
Rubring 31.7.89 und 24.7.90

Hofmann fand eine Raupe in der Dolde von wilder Möhre im September, die Raupe überwinterte erwachsen und verpuppte sich im Frühjahr. Im Mühlviertel und im Alpenvorland nur wenige Standorte, Flugzeit Juli - August.

2526 Eurrhypara hortulata Linnaeus 1758

Rubring 25.6.89

In O.Ö. nur vom Mühlviertel und dem Alpenvorland gemeldet, Flugzeit Juni - Juli.

2528 Phlyctaenia coronata Hufnagel 1767

Schönau 5.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, steigt nicht in höhere Lagen auf, Mitte Mai - Ende August.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2532 Algedonia luctualis Hübner 1793

Schönau 5.7.91 Neu für Oberösterreich!

Dr. Klimesch bemerkt zu dieser Art: Allgemeine Verbreitung östlich! Niederösterreich: Westliche Kalkalpen (Neubruck, Traxler), Donauauen, Rohrwald, Hügelland unter dem Manhartsberg, weiters Ungarn, Polen, USSR bis Amur, östliches Deutschland: Harz (Wolfsbüttel - nördlichster Fundort!), Leipzig (Urbeschreibung!); Frankreich: nur alte Einzelfunde: Gebiet von Saone und Loire, Hautes Pyrénées und Saint Sauveur.
Auch im Werk "MOŤYLE SLOVENSKA" von Andrej Reiprich abgebildet mit folgenden Angaben: "Pyrausta luctualis Hb., samica. Čierna, škvrny biele (Slovenský raj, 18.VI.1952)".

2538 Opsibotys fuscalis Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 2.8.88

Aus allen Landesteilen liegen Funde vor, im Alpengebiet nur wenig aufsteigend, Flugzeit Juni - Juli.

2540 Udea lutealis Hübner 1809

Reitnerberg bei Ternberg 6.9.91

Nur vom Mühlviertel und dem Alpengebiet gemeldet, bis 1000 m, Flugzeit Juni - Juli, in höheren Lagen bis in den August.

2561 Utea ferrugalis Hübner 1796

Schönau 3.10.91
Rubring 21. und 30.10.87

Wanderfalter, besonders durch Lichtfang festgestellt, bevorzugt Tallagen, Mai - Oktober.

2562 Mecyna flavalis Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 21. und 30.10.87, 15.7.88

Nue wenige Angaben aus allen drei Landesteilen, Flugzeit Juni bis August.

2573 Diasemoia litterata Scopoli 1763

Scharlinz 30.5.91

Kommt in allen drei Landesteilen vor, geht bis 2000 m. Flugzeit Mai - August in zwei Generationen, in höheren Lagen von Ende Juni an.

2586 Pleuroptya ruralis Scopoli 1763

Rubring e.l. 29.6., 3. und 5.7.88

Im Alpengebiet bis 1500 m, Flugzeit Juni bis August.

2592 Hypsopygia costalis Fabricius 1775

Rubring 28.7.90

Mehrere Funde aus dem Alpenvorland, nur ein Fund aus dem Mühlviertel, vom Pöstlingberg, Mitte Juni - Anfang August.

2596 Synaphe punctalis Fabricius 1775

Rubring 6. und 18.8.89

In O.Ö. aus allen Landesteilen gemeldet, steigt im Gebirge kaum über 1000 m auf, Flugzeit Juli, August.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2610 Pyralis farinalis Linnaeus 1758

Rubring 5.8.91

Mehrere Funde aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland, aus dem Alpengebiet nur ein Fund von Hinterstoder-Polstersand, Flugzeit Mai - August, September, wohl in zwei Generationen, die "Mehlmotte" ist in letzter Zeit bedeutend seltener geworden (Dr. Klimesch).

2614 Aglossa pinquinalis Linnaeus 1758

Rubring 5.8.89

Es liegen aus allen Landesteilen Meldungen vor, Flugzeit Ende Juni - August.

2622 Aphomia sociella Linnaeus 1758

Rubring, coll. Lichtenberger

In O.Ö. in allen Landesteilen verbreitet, Flugzeit Juni bis August.

2665 Phycita roborella Denis & Schiffermüller 1775

Rubring 1.8.78

Mühlviertel und Alpenvorland, nur in den wärmeren Teilen, Flugzeit Juni - August.

2668 Dioryctria abietella Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 25.8.91

Im ganzen Land sehr verbreitet, in Nadelwäldern, Flugzeit Juni bis Juli.

2685 Hypochalcia ahenella Denis & Schiffermüller 1775

Schönau 8.8.91

Steigt im Alpengebiet bis 1600 m auf, auch aus den anderen Landesteilen gemeldet, Ende Mai bis Anfang August.

2695 Metriostola betulae Goeze 1778

Rubring 17.6.87

Mühlviertel und Alpengebiet, Flugzeit im Juni.

2714 Acrobasis tumidana Denis & Schiffermüller 1775

Rubring e.l. 7.6.88 und e.l. 15.6.89

Aus O.Ö. liegen nur wenige Funde aus dem Mühlviertel und dem Alpenvorland vor, Flugzeit Juli.

2736 Eurhodope rosella Scopoli 1786

Rubring 1.8.86

In O.Ö. aus dem Mühlviertel nur vom Pfenningberg gemeldet, mehrere Funde aus dem Alpenvorland.

2782 Phycitodes binaevella Hübner 1813

Mönchgraben 8.7. bis 27.8.88

Diese wärmeliebende Art ist im Lande nur wenig beobachtet, Mühlviertel und Alpenvorland, Juni bis August.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2788 Plodia interpunctella Hübner 1813

Rubring 8., 9. und 23.7.88, 27.8.88 und 24.7.91

In O.Ö. im Alpenvorland mehrere Angaben, aus dem Mühlviertel nur aus Grein von Puchberger gemeldet.

2793 Ephestia elutella Hübner 1796

Rubring 31.5.88 und 20.5.91

Nur wenige Funddaten aus allen Landesteilen.

PTEROPHORIDEN

2811 Oxyptilus chrysodactylus Denis & Schiffermüller 1775

Plesching 14.8.91

Von allen Landesteilen gemeldet, steigt bis 1000 m auf, Flugzeit Mai - Juni und Ende Juli - August, wohl in zwei Generationen.

2873 Adaina microdactyla Hübner 1813

Scharlinz 13.7.91

Aus allen Landesteilen gemeldet, steigt nicht in höhere Lagen auf, Flugzeit Mai - August.

2887 Emmelina monodactyla Linnaeus 1758

Mönchgraben 29.7.91

Mehrere Angaben aus dem Alpenvorland, nur wenige vom Mühlviertel und dem Alpengebiet, steigt im Gebirge bis 1200 m auf, Flugzeit Juli bis Oktober, November, überwinternd.

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Literatur

Arbeitsgemeinschaft Nordbayerischer Entomologen e.V., 1988, Prodromus der Lepidopterenfauna Nordbayerns (Redaktion Werner Wolf)

Issekutz, L., 1972, DIE SCHMETTERLINGSFAUNA DES SÜDLICHEN BURGENLANDES, II. TEIL: MICROLEPIDOPTERA

Kasy, F., 1965, Zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des östlichen Neusiedler-See-Gebietes (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Heft 34, 1964 - 1965)

1978, Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes Hackelsberg, Nordburgenland (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Supplement 1978)

1982, Die Schmetterlingsfauna des WWF-Naturreservates "Hundsheimer Berge" in Niederösterreich (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen , Supplement 1982)

1985, Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes "Pischeldorfer Fischawiesen", östliches Niederösterreich (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Supplement 1985)

1987, Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes "Glaslauterriegel-Heferlberg" südlich von Wien (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, Supplement 1987)

1989, Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des WWF-Naturreservates Marchauen/Marchegg (mit Nani-Au) in Niederösterreich (Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen)

Kusdas, K., und Reichl, E.R., Die Schmetterlinge Oberösterreichs, Teil 6 (1990) und Teil 7 (1991): Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge), Bearbeiter: Klimesch, J.

LEP. SEKTION DER K.K.ZOOL.BOTAN. Gesellschaft IN WIEN, 1915, PRODROMUS der LEPIDOPTERENFAUNA VON NIEDERÖSTERREICH

Leraut, P., 1980, LISTE SYSTEMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LEPIDOPTERES DE FRANCE, BELGIQUE ET CORSE

Skala, H., 1932-1932, Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens

Spuler, A., 1910, Die Schmetterlinge Europas, Kleinschmetterlinge

Wimmer, J., 1991, EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER MICROLEPIDOPTERENFAUNA VON OBERÖSTERREICH (Steyrer Entomologenrunde 25 1991: 42 - 52

Anschrift der Verfasser:

Josef Wimmer
Feldstr. 3 D
A-4400 Steyr
Austria

Franz Hofmann
Asternstr. 27
A-4300 St.Valentin
Austria



© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at





ZOODAT 30/4/1992

© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Steyrer Entomologenrunde

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: 0026

Autor(en)/Author(s): Hofmann Franz, Wimmer Josef

Artikel/Article: EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER MICROLEPIDOPTERENFAUNA VON Oberösterreich und von Rubring/ St.Valentin in Niederösterreich 3-33