

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUS SALZBURG 2008

Christine MEDICUS und Hemma GRESSEL

Das Jahr 2008 stand, wie bereits 2007, im Zeichen des Projektes „Vielfalt für Neumarkt.“ Eingeladen von der Gemeinde Neumarkt, kartierten verschiedene Arbeitsgruppen des „Netzwerks Natur Salzburg“ im gesamten Gemeindegebiet. Neben der Erfassung des Arteninventars war besonders die Ausweisung ökologisch wichtiger Korridore, Pufferzonen und Vernetzungen im Gemeindegebiet und darüber hinaus von Bedeutung. Erstmals wurden Maßnahmen interdisziplinär für verschiedene Organismengruppen abgestimmt. Die vorgeschlagenen Korridore wurden bereits im räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Neumarkt am Wallersee berücksichtigt. Die Abschlusspräsentation erfolgte im November 2009 in der Gemeinde Neumarkt. Die Ergebnisse des Projektes wurden Anfang 2010 in der Reihe Naturschutzbeiträge des Amtes der Salzburger Landesregierung veröffentlicht.

Ein Schwerpunkt der Ornithologischen Erhebungen lag wiederum im Weidmoos, das sich zu einem landesweit überaus bedeutenden Vogelschutzgebiet mit hoher Dynamik entwickelt hat. Auch 2008 kamen wieder etliche Erstnachweise für dieses Gebiet dazu. Die Lachmöwe brütete 2008 erstmals im Weidmoos. In diesem Zusammenhang gilt unser besonderer Dank Herbert Höfelmaier, der das Weidmoos schwerpunktmäßig bearbeitet und seine Beobachtungen (inklusive der Beobachtungen weiterer Beobachter) regelmäßig digital an die Biodiversitäts-Datenbank am Haus der Natur meldet. Außerdem wurde auch 2008 wieder im Rahmen des LIFE-Projektes ein vom Naturschutz Land Salzburg beauftragtes Gebietsmonitoring in Form von Transektzählungen durch N. Pühringer, M. Brader und C. Ragger durchgeführt um die weitere Entwicklung dieses Lebensraumes zu dokumentieren.

Sehr positiv hat sich auch das Braunkehlchen-Projekt im Lungau weiterentwickelt. Am 24.11. 2008 fand in Salzburg ein „Braunkehlchen-Treffen“ statt, bei dem es zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen den Braunkehlchenprojekten in Tirol (Katharina Peer), Oberösterreich (Hans Uhl)

und Salzburg (Werner Kommik) kam. Werner Kommik berichtete, dass er in den vergangenen zwei Jahren unzählige Einzelgespräche mit zirka 120 Bewirtschaftern führte und etwa 100 Landwirte zum Mitmachen gewinnen konnte. Schließlich beteiligten sich die Landwirte mit 430 Parzellen im Ausmaß von ca. 600-700 ha Fläche am ÖPUL-Förderprogramm. Die spätsommerliche Zählung der Braunkehlchen zeigte im Projektgebiet im Oberlungau mit einem deutlichen Zuwachs an Braunkehlchen gegenüber 2007 bereits schöne Erfolge.

Weitere Schwerpunkte der Beobachtung lagen 2008 wiederum im Mitterpinzgau durch Josef Robl, im Pongau durch Norbert Ramsauer und im Fuschlseegebiet durch John Parker.

Einige Mitarbeiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft und BirdLife-Mitglieder nahmen 2008 am Nationalpark Hohe Tauern – Tag der Artenvielfalt, der in diesem Jahr im Salzburger Anteil im äußersten Westen des Nationalparks, im Wildgerlostal, im Oberpinzgau stattfand. Dies war besonders wertvoll, da in weiten Teilen des Pinzgaues, besonders im Oberpinzgau aktive, ornithologische Mitarbeiter fehlen und die Anfahrtswege für die meisten Beobachter viel zu lang sind.

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitarbeitern für ihre Arbeit und ihre Meldungen bedanken. Nur auf der Basis einer möglichst großen Mitarbeiterzahl und einer genauen Datensammlung kann die Entwicklung der Vogelbestände verfolgt werden und Maßnahmen für ihren Schutz ergriffen werden.

2008 wurden mehr als 4000 Beobachtungen gemeldet und in die Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur digital übernommen, wobei jene Daten, die im Rahmen der internationalen bzw. nationalen Projekte der Wasservogelzählung (26 Zähler an fast 30 Gewässern bzw. Gewässerstrecken) und des österreichweiten Brutvogel-Monitorings von Salzburger Ornithologen erhoben wurden, dabei nicht einberechnet wurden.

ZUM KLIMA IN SALZBURG 2008

(Quelle: www.zamg.ac.at)

Das Jahr 2008 war bei normalen bis - im Flachgau und Salzkammergut - unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen (unter 90 % des Normalwertes) allgemein übernormal warm. Die Jahresmittel der Lufttemperatur zeigten im Norden Salzburgs Abweichungen verbreitet unter 1,0 °C vom langjährigen Durchschnitt. In großen Teilen der inneralpinen Bereiche lagen die Temperaturabweichungen jedoch bei 1 bis 1,4 (1,8)°C. In Österreich gesamt gesehen, gehört das Jahr 2008 zu den wärmsten fünf Jahren seit Messbeginn. Einziger Monat mit nahezu überall unternormalen Monatsmitteln war der September

2008. Österreichweit am meisten übernormal waren die Temperaturen im Jänner und Februar. Die wenigsten Sonnenstunden von allen Landeshauptstädten wurden mit nur 1799 in Salzburg gezählt.

Klima und Wetterverlauf 2008 in den einzelnen Monaten:

Der Jänner war, bis auf die ersten Tage, durchwegs sehr mild. Der tiefste Wert von -18,3 °C wurde am 1.1. in St. Michael/Lungau gemessen. Neuschneesummen von mehr als 10 cm waren an der Nordabdachung der nördlichen Kalkalpen zu finden. Im Vergleich zum Normalwert lag Salzburg bei den

Sonnenstunden mit 174 % deutlich über dem Mittelwert (106 statt normal 61 Stunden).





Abbildung: Monatsmittelwerte der Temperatur 2008 in der Stadt Salzburg (Flughafen) und in Bischofshofen im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten




Abbildung: Monatliche Niederschlagssummen in mm im Jahr 2008 in der Stadt Salzburg im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten.

Der Februar war bei wiederum übernormalen Temperaturen in den meisten Landesteilen zu trocken. Die Monatsmittel der Lufttemperatur lagen verbreitet 2,5 °C über den Normalwerten. Um die Monatsmitte herrschten etwa eine Woche lang winterliche Temperaturen, zuvor und danach lagen die Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt. Die Monatssummen des Niederschlags lagen nahezu überall unter 75 % des Normalwertes. Es gab verbreitet gar keinen und selbst auf den Bergen nur wenig Neuschnee.

Der März wies bei normalen bis übernormalen Niederschlagsmengen nur geringe Abweichungen von den Temperaturnormalwerten auf. In der Karwoche und um die Osterfeiertage kam es zu einem Winterrückfall, die Schneefälle erreichten aber vielfach nicht die Mengen aus Vergleichsmonaten der letzten Jahre. Als Beispiel sei Bad Gastein (2008 60 cm, 2007 100 cm) genannt.

Der April war normal temperiert. Gleich nach Monatsbeginn erfolgte ein intensiver Kälterückfall, bis 8. April, danach wurde es sehr rasch wärmer und die Temperaturmittel schwankten um den Normalwert. Aus höheren Tallagen wurden noch einige Tage mit Neuschnee gemeldet, so fielen im Pinzgau und Pongau 30 bis 50 cm Schnee.

Der Mai war übernormal warm, die Monatsmittel der Lufttemperatur lagen etwa 2,5 °C über dem Normalwert. Nach der Monatsmitte gab es einen Kälteeinbruch mit den tiefsten Temperaturen um den 20. Mai. Eine Woche später folgte eine fröhliche Hitzewelle mit Temperaturen bis über 30 °C. Die Niederschläge erreichten verbreitet nur 25 bis 75 % der Normalmengen.

Der Juni brachte gewitterbedingt sehr unterschiedliche Niederschlagsmengen und war allgemein sehr warm. Am 13./14.6. wurde durch Kaltluft aus Nordost ein Temperatursturz zur „Schafskälte“ hervorgerufen. Nach einer klaren Nacht meldete Mariapfarr am 14. Juni den Tiefstwert von -1,0 °C. Von 19. Juni bis Monatsende war es wieder sehr warm bis heiß.

Im Juli brachten Gewitter wiederum sehr unterschiedliche Niederschlagsmengen. Die mittlere Temperatur lag im normalen Bereich, der Temperaturverlauf war aber durch häufige Wechsel von kurzen kälteren und wärmeren Phasen geprägt. Erst in der letzten Juliwoche stellte sich ein stabileres sommerlich warmes Wetter ein.

Der August war normal bis leicht übernormal temperiert. Wie im Juli gab es häufige Wechsel warmer und kühler Tage. Der absolut tiefste Temperaturwert wurde am 25. 8. in Mariapfarr mit 2,0 °C ermittelt.

Der September war unternormal temperiert. Bis zum 12. 9. lagen die Temperaturen aber teilweise weit über dem Normalwert. Vor allem am 5. und 6. 9. herrschte sommerlich heißes Wetter. Ab dem 13. stürzten die Mittelwerte mit einem Kaltlufteinbruch in wenigen Tagen um 10 bis 15 °C auf weit unternormale Werte. Das absolute Monatsminimum (-3,2 °C) wurde am 28. 9. in St. Michael/Lungau gemessen. Die Niederschläge blieben häufig unter 75 % des Normalwertes.

Der Oktober war normal bis leicht übernormal temperiert. Im Temperaturverlauf wechselten immer wieder warme und kühle Tage, zuletzt herrschte sehr kühles Wetter. Absolut tiefste Temperaturen: 4,4 °C am 5. 10. in St. Michael/Lungau.

Der November war übernormal warm. Der Temperaturverlauf zeigt in den beiden ersten Dekaden teilweise weit überdurchschnittlich hohe Tagesmittelwerte. Danach folgte ein frühwinterlicher Kälteeinbruch. Von Westen bis in den Pongau fielen weniger als 75 % der normalen Niederschlagsmengen.

Im Dezember war es bis Weihnachten übernormal warm, strengen Frost gab es erst ab dem 26. Dezember.

Extreme Wetterlagen 2008:

Am 1. März richtete der Wintersturm „Emma“ nördlich des Alpenhauptkammes schwere Schäden an. In den Niederungen erreichten die stärksten Böen Spitzenwerte bis 140 km/h (Salzburg- Flughafen); auf den Bergstationen wurden maximale

Windgeschwindigkeiten von 140 bis 160 km/h gemessen. Im Flachgau und Tennengau waren große Teile zeitweise ohne Strom.

Durch den Sturm fielen in den Wäldern Salzburgs geschätzte 177.000 Festmeter Holz an. Ansonsten blieb Salzburg 2008 vor ärgeren Unwettern, Hagelereignissen und Überschwemmungen weitgehend verschont.

ARTENLISTE

Beobachter:

Folgende Beobachter (ohne Titel) haben mit ihren Beobachtungen diese Zusammenstellung ermöglicht:

Hannes Ackerl, Johann Aigner, Ernst Albegger, Isolde Althaler, Thomas Anzböck, Hannes Augustin, K. Behrends, Manfred Bernhard, Viktoria Bernhard, Andreas Bernhardt, Heinrich Brennsteiner, Karl Breuer, Josef Buchmayr, Josef Danner, Marion Deutsch-Reitinger, Albert Duft, Janet Ehrenleitner, Karin Feuchter, Deborah Fölsche, Gertrude Friese, Sonja Frühwirth, Sabine Ganitzer, Isgard Geistberger, Siegfried Gerstner, Michael Graf, Franz Gramlinger, Carl-Heinz Gressel, Gustav Gressel, Hemma Gressel, Ernst & Grete Griehser, Johann Griessner, Susanne Grill, Patrick Gros, Franz Gruber, Walter Gstader, Erich Haas, Gundi Habenicht, Johann Habsburg-Lothringen, Hildegard Hanek, Bernd Hauser, Klaus & Marianne Hering, Hermann Hinterstoisser, Gertraud Hintschich, Gerhard Hofmann, Michael Hubka, Gerold Jäger, Reinhard Kaiser, G. Klingersberger, Kocher-Habeler, Susanne Kocher, Anneliese Köck, Werner Kommik, Josef Kreuzberger, Birgit & Thomas

Krisch, V. Kutschera, Martin Kyek, Manfred Lackinger, Sabine Laimböck, Alexander Leitner, Robert Lindner, Johann Machart, Gerald Malle, Andreas Maletzky, Alexander Maringer, Christine Medicus, Reinhard Medicus, Karin Messerer, Bernhard Müller, Johann Naglmayr, Günther Nowotny, John Parker, Gisela Parker, Wolfgang Petz, C. Pichler, Hanns Pischel, Günther Prem, Remo Pobst, Robert Pröll, Norbert Ramsauer, André Rega, Hans Reifenstein, Christine Ringl, Josef Robl, Herbert Ruhdorfer, Karl Schaad, Horst Scheibl, Herr Schallaböck, Robert Scheck, Walter Schlauss, Franz Schönauer, Herr Schönleitner, Maria Schweichhart, Kurt Schwaiger, Arno Sigl, Erich Sinn, Leopold Slotta-Bachmayr, Alois Skotnik, Gerd Spreitzer, Susanne Stadler, Eberhard Stüber, Silvia Stürzer, Harald und Anna Sutter, Andreas Thomasser, Heinz Thomasser, Wolfgang Trattler, Hans Uhl, Sepp Unterberger, Matthias Uphues, Ulrich Wacht, Andrea Wagner, Herbert Wagner, Waltraud Wagner, Ingrid Wawra, Anton Wegscheider, Brigitte Weißenbrunner; Monika Wengler, Martin Wieland, August Wessely, Norbert Winding, Ulrike Wiesniewski, Hubert Worlicek.

Im Text verwendete Abkürzungen:

ESG Europaschutzgebiet
NSG Naturschutzgebiet
* bei der AFK (Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich) meldepflichtige Art

M Männchen
W Weibchen
ad. Adult
juv. Juvenil
Jk Jugendkleid
Ex. Exemplar

SEETAUCHER - SCHREITVÖGEL

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner wurden 9 Ex. gezählt, im März nur 2 Ex. am Mattsee (RAMSAUER 2008). Am 23.3. 1 Ex. in Golling, Bluntauenseen (M. Uphues), am 5.4. am Leopoldskroner Weiher 1 Ex. (H. Gressel, Ch. Medicus). - Zur Brutzeit wurden im Weidmoos mind. 13-15 Reviere in Röhrichtbestandenen Kleingewässern gezählt (PÜHRINGER et al. 2009). Brutnachweise: am 22.5. 1 Paar mit 3 juv., am 12.6. 3 ad. mit 2 juv. und am 13.7. 1 ad. mit 3 juv. (H. Höfelmaier). Eine Brutzeitbeobachtung liegt vom Hundsfeldsee in Obertauern vor: 15.7. 1 Ex. (A. Rega) und aus dem Lungau: 21.6. hielt sich

ein ad. am Teich beim Golfplatz St. Michael auf (W. Kommik, H. Gressel). - Im Herbst am 11.11. 1 Ex. im Seekanal am Obertrumer See Nordufer (P. Gros), 16.11. 3 Ex. am Wallersee (Ch. Medicus) und am 30.11. 1 Ex. am Schloßteich in Freisaal (G. Hintschich).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner 2008 wurden 31 Ex. gezählt (25 Ex. am Mattsee, 5 Ex. am Fuschlsee, 1 Ex. an der Salzach zwischen Hallein und Urstein), Mitte März 77 Ex. überwiegend an Mattsee, Wallersee und Grabensee (RAMSAUER 2008). Am Frühjahrszug hielt sich 1 Ex. am 24. und 30.3. am Baggerteich in St. Michael/ Lungau auf (W.

Kommik). - Im Weidmoos übersommerte 2008 offenbar ein einzelner Haubentaucher, denn dieser wahrscheinlich idente Vogel, wurde am 11.5. und zwischen 27.7. und 3.9. mehrfach beobachtet (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, PÜHRINGER et al. 2009). Im renaturierten grenznahen Ainringer Moor in Bayern brütete der Haubentaucher 2008 erfolgreich (3 Paare, 8 Junge; J. Machart). Am 4.5. 1 Ex. brütend am Wallersee im Neumarkter Hafen (C.-H. Gressel, G. Gressel). - Am 5.10 hielt sich ein Ex. an der Saalach im Bereich des Stausees Rott auf (S: Frühwirth). Bei der Wasservogelzählung Mitte November wurden 326 Ex. überwiegend an Wallersee und Trumer Seen gezählt (RAMSAUER 2009)



Kormoran 9.11.2008 bei Mattsee (Foto: J. Danner)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Am 13.2. in der Salzachau bei Weitwörth 26 Ex. auf Schotterteich (E. Sinn). Das Weidmoos wird nach der Erstbeobachtung 2006 inzwischen außerbrutzeitlich von 1 bis 10 Ex. frequentiert. Am 18.4. 12 Ex., das Maximum wurde mit insgesamt 26 Vögeln am 2.4. erreicht (PÜHRINGER et al. 2009., E. Stüber, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). - Am 12.9. am Obertrumer See Nordwest-Ufer 6 Ex. in Bäumen sitzend (E. Stüber), am 16.9. 1 Ex. am Salzachstau bei St. Johann, Plankenau (N. Ramsauer), am 25.9. vormittags über der Salzach in Nonntal 78 Ex. in Formationsflug von Süden nach Norden fliegend (A. Maletzky), am 9.11. in Mattsee, Weyerbucht 1 Ex. (J. Danner), am 16.11. Wallersee bei Zell 6 Ex. in Formationsflug nach W abfliegend (Ch. Medicus), 21.12. Wallersee, Seekirchen 11 Ex. im Flug (J. Danner).

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Im Weidmoos ist die Rohrdommel möglicherweise Brutvogel, da sie im Juni mehrfach rufend nachgewiesen werden konnte (PÜHRINGER et al 2009). Am 22.5. z.B. flog 1 Ex. über den Nordwestteil des Weidmooses (H. Höfelmaier). - Ein Überwinterer hielt sich im Jänner 2008 im ESG Salzachauen bei Anthering auf (A. Köck).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): Im Weidmoos war die Zwergdommel auch 2008 wahrscheinlich Brutvogel. Nach 2002, 2005 und 2007 gab es erneut Brutverdacht für mindestens ein Paar: Erstbeobachtung am 6.6. (2 Ex) zwischen 4.7. und 28.7. noch 3 weitere Einzelbeobachtungen, am 4. und 20.7. jeweils ein Paar (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart, J. Griessner, B. Müller). Im grenznahen Ainringer Moor/Bayern gelang am 29.7. ein Brutnachweis durch die Sichtung von 2 Jungvögeln (A. Sigl, Mitteilung J. Machart)



Zwergdommel: am 28.7.2008 im Weidmoos (Foto H. Höfelmaier)

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am 21.4. hielt sich ein adultes Ex. am stark verwachsenen Sighartsteiner Weiher bei Neumarkt am Wallersee auf. Ebenda wurde vermutlich der gleiche Vogel zwischen 21.5. und 28.5. fünfmal am Abend fischend beobachtet (G. Hofmann). Am 17.5. 1 Ex. (dasselbe?) an der Fischach bei Seekirchen (J. Danner, J. Machart, O. Stöhr). Ein weiteres adultes Ex. hielt sich regelmäßig im ESG Bürmooser Moor auf, so zum Beispiel am 28.5. (R. Kaiser).

***Kuhreiher (*Bubulcus ibis*):** 2008 kam es zu außergewöhnlich vielen Sichtungen von Kuhreihern im nördlichen Flachgau. Es handelte sich sehr wahrscheinlich um aus dem Zoo Salzburg entflozene Tiere, wie H. Hanek in Erfahrung bringen konnte. Am 23.4.2008 wurde 1 Ex. am Voggenberg bei Bergheim beobachtet (M. Kyek). Zwischen 25.5. und 1.6. hielten sich 1 Ex., am 15.6. und 23.6. 2 Ex., am 6.8. beachtliche 4 Ex. und am 10.8. wiederum 1 Ex. im Weidmoos und in den Wiesen südlich und südöstlich davon in Maxdorf auf (PÜHRINGER et al 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart, B. und V. Kutschera, L. Kaiser). Im Juni konnte auch 1 Ex. bei Strasswalchen gesichtet werden (M. Lackinger). Die Beobachtungen wurden durch die Avifaunistische Kommission Österreich bereits anerkannt.



Kuhreiher: am 23.6.2008 in einer Fettwiese bei Maxdorf, Foto: V. Kutschera

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Die einzige Meldung stammt vom grenznahen Ainringer Moor in Bayern, wo J. Machart am 4.8 einen Durchzügler beobachten konnte.

Silberreiher (*Casmerodius albus*): Durchzügler und Wintergast, der im Weidmoos inzwischen schon ganzjährig in teilweise beachtlichen Zahlen auftritt (PÜHRINGER et al. 2009): im Februar und März konnten im Weidmoos Trupps bis maximal 48 Ex. (17.2.) und ca. 30 Ex. (12.3.) beobachtet werden (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Weitere Nachweise, abseits des Weidmooses: 13.2. Salzachau bei Weitwörth 5 Ex. (E. Sinn, M. Kyek), 27.2. Obertrumer See, NW Ufer 1 Ex. (E. Stüber), 15.3. NSG Zeller See-Südufer, Ostlacken 2 Ex. (J. Robl), 22.3. Antheringer Au 1 Ex. (A. Agic). - Zur Brutzeit, von April bis Juli, hielten sich ein bis 4 nichtbrütende Nahrungsgäste im Weidmoos auf (H. Höfelmaier). Am 1.5. konnten auch 2 Ex. im ESG Wenger Moor gesichtet werden (J. Danner). - Am Herbstzug wurden am 17.8. 15 Ex. und am 21.8. 11 Ex. im Weidmoos gesichtet (H. Höfelmaier). Ebenda am 12.9. 8 Ex. (E. Stüber) und am 17.9. 11 Ex. (H. Höfelmaier). Am 11.9. landeten im NSG Zeller See-Südufer 4 Ex. am Seeufer (J. Robl). Die Art ist regelmäßig in geringer Zahl Wintergast an den Vorlandseen und an der Unteren Salzach: am 16.11. im NSG Wallersee Bayerhamer Spitz 1 Ex. (Ch. Medicus), im Trumer Seen-Gebiet 4 Ex. (B. & Th. Krisch, H. Wagner, S. Ganitzer) sowie in Siggerwiesen 4 Ex. (Th. Anzböck) und am 5.10. und 25.11. jeweils 2 Ex. in der Antheringer Au (E. Sinn). 17.12. Grabensee 1 Ex. (H. Gressel).

Graureiher (*Ardea cinerea*): Im Jahr 2008 wurden von den Bezirksverwaltungsbehörden (Flachgau, Tennengau, Pongau, Pinzgau, Lungau) insgesamt 93 Abschüsse bewilligt. Gemeldet wurden insgesamt 46 Abschüsse, davon 11 im Flachgau, 16 im Tennengau, 15 im Pinzgau, 3 im Pongau und einer im Lungau (Auskunft Rechtsdienst der Abt. 4 des Amtes der Salzburger Landesregierung vom 3.4.2009). Von 4.1. bis 28.3. hielten sich in Wals meist 1 bis 3 Ex. regelmäßig in Wiesen und am Moosbach Nahrung suchend auf, am 29.1. 4 Ex., am 4.2., 18.2. und 28.3. sogar 6 Ex., es handelte sich dabei vermutlich um Vögel der Brutkolonie beim Zoo Salzburg (H. Hanek, K. Schaad). 2008 mind. 2 Brutpaare in der Lieferinger Au (E. Sinn). Zwischen 9.6. und 13.11. hielt sich regelmäßig 1 jagendes Ex. an der Salzach beim Volksgarten (Aubach-Mündung) auf (S. Frühwirth). Im Weidmoos ist der Graureiher ganzjähriger Nahrungsgast in 1 bis 7 Ex., am 23.6. 10 Ex. (PÜHRINGER et al. 2009), am 17.8. 11 Ex. und am 28.8. sogar 12 Ex. (H. Höfelmaier). Am 16.6. im Hochfilzener Moor 6 Ex. (W. Gstader), am 21.6. 1 juv. Ex. im NSG Zeller See-Südufer (J. Robl), am 21.6. 4 Ex. bei St. Michael/Lungau (W. Kommik, H. Gressel), am 18.7. 1 Ex. in Obertauern beim Postturm (A. Rega), am 11.9. landeten am Zeller See im NSG am Südufer 23 Ex. am Seeufer (J. Robl).

Purpureiher (*Ardea purpurea*): Die einzige Beobachtung dieses seltenen Gastes gelang am 11.5. mit 2 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Im grenznahen Ainringer Moor, in Bayern wurde je 1 Ex. am 27.4. und am 29.7. beobachtet (J. Machart).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): Die erste Sichtung erfolgte im Frühjahr bereits am 3.3. bei Bergheim (M. Kyek). In der Brutzeit 2008 gelangen Sichtungen von 1 bis 3 Ex. überwiegend im Bereich

Plainfeld, Pabenschwand, Koppler Moor, weiters von der Wiestalschlucht bei Ebenau, vom Schafberg, aus dem Gebiet zwischen Thalgau und Eugendorf sowie aus Neumarkt, Neufahrn, Wertheim/Haslach, Sommerholz, Irrsberg sowie aus Schleedorf, Köstendorf und Michaelbeuern (K. Erlmoser, H. Scheibl, K. Breuer, H. Hinterstoisser, M. Kyek, S. Stadler, W. Petz, G. Hofmann, Ch. Medicus, J. Buchmayr, M. Lackinger, I. Wawra). Ein diesjähriger Schwarzstorch wurde am 25.8. bei Obertrum, Lindenhof beobachtet (R. Pröll, Mitteilung H. Augustin). Ende August/ Anfang September konnte bei St. Koloman, nahe Mahdhasl 1 ad Ex. regelmäßig bei der Nahrungssuche beobachtet werden (R. Scheck). Die späteste Sichtung gelang am 23.9. bei Thalgau (K. Erlmoser).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Im Stadtgebiet von Salzburg kreisten am 18.3. 2 Ex. über der Salzach bei Herrnau (S. Stadler), am 5.5. suchte 1 Ex. in einer Wiese südlich Schloss Aigen nach Nahrung (U. Wiesniewski). Am 31.3. 1 Ex. über der Moosach kreisend, am 17.4. 2 Ex. über dem nordwestlichen Weidmoos kreisend, ebenda am 23.6. 1 Ex. bei der Nahrungssuche (PÜHRINGER et al. 2009). Am 4.5. 1 Ex. im Flug bei Eugendorf (G. Gressel). Am 3.8. kreist 1 Ex. über dem Spielplatz im Hellbrunner Park, möglicherweise ein Ex. des im Zoo Salzburg brütenden Paares (S. Frühwirth). - Während des Herbstzuges wurde am 24.8. ein adulter Storch beim Aineck/Katschberg-Paß nach Süden ziehend beobachtet (H. Ackerl, I. Wawra)

Heiliger Ibis (*Threskiornis aethiopicus*): Am 5.4. flogen 4 Ex. über den St. Peter Wiesen nahe Schloß Leopoldskron (H. Gressel, Ch. Medicus). Es handelte sich vermutlich um Gefangenschaftsflüchtlinge aus dem Zoo Salzburg (Mitt. H. Hanek). Am 8.6. und 9.6. hielt sich 1 Ex. im NSG Zeller See-Südufer in einer abgezaunten Weide zusammen mit Norikern und Pinzgauer Rindern auf und suchte dort nach Futter (S. Gerstner, V. Bernhard, Kocher-Habeler).



Heiliger Ibis, am 9. und 10.6. 2008 im Naturschutzgebiet Zeller See-Südufer (Foto: S. Gerstner)

ENTENVÖGEL

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Am 13.1. am Zellersee 25 Ex. (davon 9 immatur), am 15.3. 21 Ex. (davon 3 immatur) (J. Robl). - Am Leopoldskroner Weiher brütete am 5.4. bereits 1 Ex., das Nest war

nahe der Fischerhütte (H. Gressel, Ch. Medicus). Im Weitmoos brütete der Höckerschwan 2008 zum ersten Mal: Nestfund am 25.5., von 8 pulli wurden 6 flügge und konnten bis 22.11. beobachtet werden (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger u. a.). 16.11. 6 ad. und 2 immat. Am Zeller See (J. Robl).

Singschwan (*Cygnus cygnus*): Am 24.2. 3 Ex. am Wallersee, in der Seekirchner Bucht im Flug beobachtet (J. Danner).

Streifengans (*Anser indicus*): Am 3.6. konnte ein Ex., wohl ein Gefangenschaftsflüchtling im Strandbad Seekirchen auf der Liegewiese weidend beobachtet werden (J. Danner).



Streifengans: 3.6.2008 im Strandbad Seekirchen (Foto J. Danner)

Kaisergans (*Anser canagicus*): Ein sicherlich aus Gefangenschaft entwichenes Exemplar dieser in Nordost-Sibirien und in Alaska um die Beringsee beheimateten Art hielt sich zwischen Februar und April an der Salzach im Bereich Lehener Brücke auf, so am 28.2. (J. Machart), 16.3. (H. Hanek) und 9.4. (H. Augustin).



Kaisergans am 28.2.2008 an der Salzach in Salzburg, Lehen (Foto J. Machart)

Graugans (*Anser anser*): Nichtautochthone, brütende Graugänse sind teilweise ganzjährig vor allem im Trumerseen-Gebiet, am Wallersee, im Weitmoos und am Leopoldskroner Weiher in der Stadt Salzburg zu beobachten: Am 20.1. hielten sich bei Seeham, Eisenharting 40 bis 50 Ex. weidend auf einer Wiese auf, ebenda waren am 28.2. etwa 30 Ex. (W. Köhler). Am 8.2. wurden im Weitmoos ca. 50 Ex. gezählt (H. Höfelmaier) und in Thumegg, W Leopoldskroner Weiher ruhten 22 Ex. in einer Wiese

(H. Gressel). Am 20.3. bei Fraham am Obertrumer See 1 Paar (K. Messerer), am 22.3. am Obertrumer See-NW Ufer nahe dem Mattigausfluss 32 Ex. (E. Stüber). Der Brutbestand dürfte im Weitmoos bei ca. 10 Paaren liegen; mehrere Brutnachweise durch die Beobachtung führender Paare ab 6.4. (Paar mit 10 pulli) liegen vor. Das Weitmoos wird im Juni auch als Rückzugsgebiet während der Großgiedermauser genutzt (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Zwischen 1.4. und 27.5. konnten regelmäßig 4 Ex. an der Salzach zwischen Neualm und Hallein beobachtet werden (J. Ehrenleitner). Im grenznahen Ainringer Moor /Bayern wurden am 27.4. ca. 20 Ex. und am 4.8. 70 Ex. gezählt (J. Machart). 17.12. ca. 20 Ex. am Grabensee (H. Gressel).

Kanadagans (*Branta canadensis*): Von Mitte Februar bis Anfang März hielt sich ein Ex. an der Glan in Lehen auf (H. Ruhdorfer). Am 1.4. wurde ein Ex. an der Salzach zwischen Neualm und Hallein auf Kiesflächen neben der Salzach bzw. entlang der Straße beobachtet; am 26.4. wurde vermutlich das gleiche Tier an der Straße tot aufgefunden (J. Ehrenleitner). Am 16.11. 2 Ex. an der Salzach zwischen Hallein und Urstein (S. Grill)

***Weißwangengans (*Branta leucopsis*):** Am 27.5. 1 Ex., wohl Gefangenschaftsflüchtling an der Salzach zwischen Neualm und Hallein (J. Ehrenleitner).

Rostgans (*Tadorna ferruginea*): Auch 2008 brütete die Art, nach dem Erstbrutnachweis 2006 wieder im Weitmoos: am 7.5. ein Paar mit 3 pulli, von 22. bis 26.5. nur mehr ein Junges. Erst am 17.8. konnten wieder 3 ad. W und 2 unausgefärbte Jungvögel beobachtet werden (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Am 4.8. 5 Ex. im grenznahen Ainringer Moor /Bayern (J. Machart).

Mandarinente (*Aix galericulata*): Am 16.11. 2 Ex. an der Salzach zwischen Acharting und Saalachmündung (A. Maletzky), am 30.11. in Salzburg, am Leopoldskroner Weiher 2 M (G. Hintschich), wohl von der Tierhaltung R. Scheck kommend.

Brautente (*Aix sponsa*): Am 4.3. 1 M am Almkanal in Nonntal (H. Gressel), Mitte März 1 Ex. am Mattsee beobachtet (B. & Th. Krisch).

Moschusente (*Cairina moschata forma domestica*): Am 19.9. 2 bis 3 Ex. in Salzburg am Leopoldskroner Weiher (Ch. Medicus), am 16.11 bei der Wasservogelzählung 2 Ex. an der Salzach zwischen Hallein und Urstein (S. Grill), 9 Ex. zwischen Hallein und Kuchl (K. Schaad) und 5 Ex. am Leopoldskroner Weiher (K. & M. Hering).

Pfeifente (*Anas penelope*): Mitte März 2008 45 Ex. am Mattsee (B & Th. Krisch, RAMSAUER 2009). Am 5.11. im Weitmoos 1 M und 2 W, am 10.11. ebenda 2 W (Erstbeobachtung für das Weitmoos; H. Höfelmaier).

Schnatterente (*Anas strepera*): Am 13.1. am Zeller See 1 M und 1 W (J. Robl), Mitte März 4 Ex. am Wallersee (Ch. Medicus). Nach dem ersten Brutnachweis im Weitmoos im Jahr 2007 gelangen 2008 wieder zahlreiche Brutzeitbeobachtungen von maximal 2 Paaren (am 4.4.) bzw. 7 M (am 26.6.)

(PÜHRINGER et al 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart). Im Spätsommer und Herbst wurden zwischen 17.8. und 5.11. mehrfach 1 bis 3 Ex. im Weidmoos beobachtet (H. Höfelmaier). Am Zeller See hielten sich am 16.11. 2 M und 1 W auf (J. Robl).

Krickente (*Anas crecca*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner nur 28 Ex. an der Unteren Salzach, 6 Ex., im Rückhaltebecken Thalgau (RAMSAUER 2008). Am 24.2. im Rückhaltebecken Thalgau 4 Ex. (W. Köhler), am 5.4. am Leopoldskroner Weiher 1 M, 1 W (Ch. Medicus, H. Gressel). - In der Brutzeit: 2008 hielten sich nur ca. 5 Brutpaare im Weidmoos auf, es gelang kein sicherer Brutnachweis. Auch die außerbrutzeitlichen Zahlen liegen deutlich unter denen der Vorjahre (max. 5-10 Ex. am 6.8) (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, PÜHRINGER et al. 2009). Vom Pinzgau nur ein Brutzeitdatum: 16.6. Hochfilzener Moor 1 Ex. (W. Gstader). - Im Herbst am 11.9. am Zeller See 6 W oder immat. (J. Robl), am 16.9. 1 W bei St. Johann, Salzachkraftwerk Plankenau (N. Ramsauer), 28.9. 4 Ex. und am 2.11. 3 Ex. im ESG Bürmooser Moor (R. Kaiser).

Stockente (*Anas platyrhynchos*): Bei der Wasservogelzählung im März 2008 mit 842 Ex. die zweithäufigste Wasservogelart nach dem Blässhuhn (RAMSAUER 2008). Brutnachweise: im Weidmoos am 12.5. W mit 9 pulli, am 8.6. W mit 8 pulli, am 25.6. W mit 4 juv., am 7. bzw. 13.7. je 2 Familien mit 5 bzw. 5-7 juv; (H. Höfelmaier). Im Lungau am 4.7. am Prebersee 1 W mit 10 juv. (A. Rega). Höchstegelegener Brutnachweis von 27.7. bis 31.7. in Obertauern am Hundsfeldsee (1787 m): 1 W mit mind. 7 pulli (E. Haas). Am 12.7. am Finkausee im Wildgerlostal 5 Ex. (N. Ramsauer). - Im Herbst am 3.9. ca. 50 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier).

Knäkente (*Anas querquedula*): Im März und April im Weidmoos mehrfach am Durchzug: Maximum am 18.4. 5 M und 2 W (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Wahrscheinlich auch Brutvogel im Weidmoos: am 2., 7. und 22.5. je 1 M, am 25.5. 1 M und 1 W und am 26.6. 1 W (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier).

Löffelente (*Anas clypeata*): Am 16.3. in Siggerwiesen 8 Ex. (Th. Anzböck). Im Weidmoos am 17.4. 1 M (PÜHRINGER et al. 2009) und am 18.4. sogar 2 Paare (E. Stüber). Am 21.4. 1 Paar im Südteil und am 12.6. noch 1 M im zentralen Weidmoos (H. Höfelmaier) – ein Brutversuch ist somit nicht ausgeschlossen.

Kolbenente (*Netta rufina*): Am 15.3. wurden am Zeller See 3 M und 1 W gezählt (J. Robl), am 5.4. am Leopoldskroner Weiher 2 M, und an den St. Peter Teichen 2 M und 1 W (Ch. Medicus, H. Gressel), am 16.11. am Mattsee 4 Ex. (B. & Th. Krisch).

Tafelente (*Aythya ferina*): Bei der Wasservogelzählung im März insgesamt 279 Ex, davon allein 160 Ex. am Fuschlsee (J. Parker) und 51 Ex. am Grabensee (B. & Th. Krisch). Im Weidmoos 2 bis 4 Ex. von 24.2. bis 12.3., 2 Paare am 21.4. und schließlich 1 W am 22.5. (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, M. Schweichhart) – eine Brut bzw. ein Brutversuch ist denkbar.

Reiherente (*Aythya fuligula*): Mit etwa 800 Ex. bei der Wasservogelzählung Mitte März dritthäufigste Art nach Blässhuhn und Stockente. - Brutzeit: Am 25.5. ein großer Trupp von 83 Ex. im Weidmoos. 2008 mindestens eine erfolgreiche Brut: 14.6. 1 W mit 6 pulli, am 23.6. nur mehr 4 übrig (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, N. Ramsauer). Der Brutbestand wird auf 3 bis 5 Paare geschätzt (PÜHRINGER et al. 2009). Zur Brutzeit am 16.6. 3 Ex. im Hochfilzner Moor /Grießensee (W. Gastader), wo der Bestand offenbar in den letzten Jahren stark abgenommen hat. Am 31.5. am Bruckbergkanal /NSG Zeller See-Südufer 1 Paar (K. Schwaiger), am 21.6. im NSG Zeller See-Südufer 1 M (J. Robl) und am 12.7. im Wildgerlostal am Finkau-See in 1420 m ein Paar (H. Ackerl, Ch. Medicus, N. Ramsauer).



Moorente am 6.7.2008 im Weidmoos (Foto H. Höfelmaier)

Moorente (*Aythya nyroca*): Am 27.2. 1 Ex., am 21.4. 1 W und am 6.7. 1 Ex. im Weidmoos (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier). Am 16.11. 1 Ex. am Obertrumer See (H. Wagner & S. Ganitzer), am 21.12. Wallersee, nahe Henndorfer Strandbad 1 Ex. (J. Aigner).

Bergente (*Aythya marila*): Mitte März 2008 1 Ex. am Wallersee (Ch. Medicus).

Eiderente (*Somateria mollissima*): Am 13.1. am Salzachstau Högmoos ein Ex. (N. Ramsauer), am 5.4. auf den St. Peter-Teichen (Tierhaltung R. Scheck) 2 M und 1 W (H. Gressel, Ch. Medicus). 26.4. Salzburg, Glan bei Schließelbergerweg 1 W (M. Uphues).

Schellente (*Bucephala clangula*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner insgesamt 93 Ex., davon 36 Ex. auf der Salzach zwischen Oberndorf und Landesgrenze (RAMSAUER 2008), am 16.3. 24 Ex. am Grabensee (B. & Th. Krisch). Am 1.4. und 5.4. am Leopoldskroner Weiher 1 Paar, 1 M, an den St. Peter Teichen, 1 W und 1 M und am Almkanal 1 Paar (vermutlich von Tierhaltung R. Scheck) (H. Gressel, Ch. Medicus).

Büffelkopffente (*Bucephala albeola*): Ein M dieser nordamerikanischen Art hielt sich gemeinsam mit einem Schellenten-Weibchen am 23.1. an der Salzach bei Urstein auf, wohl ein Gefangenschaftsflüchtling (I. Geistberger), ebenda Mitte März 1 Ex. (S. Grill, RAMSAUER 2008).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Am 16.11. 1 Ex. am Wiestalstausee (H. Pischel).



Ein Büffelkopf-Erpel, offenbar verpaart mit einer Schellente am 31.1.2008 an der Salzach bei Urstein (Foto: I. Geistberger).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Am 13.1. am Zeller See 1 W (J. Robl), 21.12. 2 M am Wallersee in der Seekirchner Bucht (J. Danner).

Gänsesäger (*Mergus merganser*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner wurden 59 Ex. gezählt, davon 53 Ex. an der Salzach im Bereich zwischen Stadt Salzburg und Landesgrenze (RAMSAUER 2008). Am 20.1. bei Mattsee, Johannisbrücke 2 M, 1 W (W. Köhler), am 15.2. im Weidmoos 3 M und 2 W (H. Höfelmaier). Am 5.4. auf den St. Peter-Teichen (Tierhaltung R. Scheck) 3 Paare (H. Gressel, Ch. Medicus). Den ganzen November hielt sich 1 M am Waha-Weiher in Bürmoos auf (R. Kaiser).

Kappensäger (*Lophodytes cucullatus*): Am 5.4. hielt sich 1 M dieser attraktiven nordamerikanischen Taiga-Art mit der auffälligen, namensgebenden Federhülle auf den St. Peter Teichen auf (Tierhaltung R. Scheck) (Ch. Medicus, H. Gressel). Am 17.12. verunglückte 1 M morgens in Salzburg, in der Erzabt-Klotz-Straße. Es fiel laut Günther Prem, dem Leiter des Reptilienzoos im Haus der Natur, direkt vor ihm „vom Himmel“. Der Vogel könnte von Nachzuchten von R. Scheck stammen, die entflohen sind und sich schon seit längerem nicht mehr regelmäßig bei den St. Peter Teichen aufhielten. Das Präparat des Kappensägers befindet sich in der Sammlung des Hauses der Natur.



Kappensäger-Männchen: verunglückt am 17.12. in Salzburg, Nonntal. Präparat in der Sammlung am Haus der Natur

***Schwarzkopfruderente (*Oxyura jamaicensis*):** Vom 15.6. bis 23.6., am 5.7, 15.7. und vom 27.7. bis 31.7. hielt sich jeweils wohl das gleiche Männchen im Prachtkleid am Hundsfeldsee in Obertauern, in 1787 m NN auf (F. Gruber, H. Reifenstein, K. Feuchter, E. Haas, M. Haffner, A. Rega, H. Gressel). Die Beobachtung wurde von der Avifaunistischen Kommission Österreich anerkannt.

Weißkopfruderente (*Oxyura leucocephala*): Am 5.4. konnten 2 M aus Gefangenschaftszucht an den St. Peter Teichen bei der Tierhaltung von R. Scheck in Salzburg beobachtet werden (H. Gressel, Ch. Medicus.).

Rotschulterente (*Callonetta leucophrys*): Am 16.9. hielt sich in St. Johann, beim Salzachkraftwerk Plankenau ein zutrauliches Männchen mit grünem Ring, wohl ein Zooflüchtling auf (N. Ramsauer). Die Art ist in Südamerika beheimatet.

GREIFE – RALLEN

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Weidmoos: am 24.5. 2 Ex. und am 25.5. 1 Ex. über dem Südostteil des Weidmooses (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), wohl Brutvogel der Umgebung. Am 28.6. 1 dunkles W bei Filzmoos (N. Ramsauer). - Herbstzug: Am 24.8. 2 Ex. ad. über Katschbergpass nach Süden ziehend (H. Ackerl, I. Wawra)

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Frühjahrszug: Am 17.4. 1 Ex. kreist im Nordwesten des Weidmooses zusammen mit 3 Rotmilanen (PÜHRINGER et al. 2009). Brutzeitbeobachtungen von der Salzachau im Bereich „Oberau“ bei Weitwörth am 5.5. (S. Stadler), aus dem Raum Wallersee: am 11.5. und 16.5. im ESG Wallersee Wenger Moor jeweils 1 Ex., das von 3 Brachvögeln und einem Kiebitz bzw. von einer Rabenkrähe attackiert wurde (J. Danner), am 29.5. ein Ex. bei Neumarkt /Neufahrn (W. Petz). Südlich des Weidmooses kreiste 1 Ex. am 12.7. (H. Höfelmaier) und am 15.7. wurden am Voggenberg, nahe Luginger- und Ragginger See 2 Ex. beobachtet (W. Köhler). Die Brutzeitbeobachtungen deuten auf mindestens 2 Brutpaare im Flachgau hin.

Rotmilan (*Milvus milvus*): Frühjahrszug: Im Weidmoos am 12.4. 1 Ex. und am 17.4. 3 Ex. kreisend (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier), 18.4. 1 Ex. bei Neufahrn (W. Petz), 15.5. 1 Ex. bei Neumarkt (I. Wawra). - Herbstzug: Im Weidmoos am 17.8. 1 Ex. (H. Höfelmaier) und am 3.9. ein Ex. von Bussarden gehasst (B. Weissenbrunner).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Am 1.11. saß ein adulter Seeadler für etwa 15 Minuten auf Bäumen im Weidmoos, ehe er nach Westen weiterzog (H. Höfelmaier).

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*): 30.3. Badgastein, Kötschachtal 1 ad. Ex. (N. Ramsauer), zwischen 11.6. und 27.8 5 Beobachtungen von zumeist 2 Ex. im Raum Nassfeld (J. Naglmayr), 3.11. Obertauern, Pleißingkeil 2 Ex. in ca. 2500 m mit 2 Steinadlern, ein Vogel überflog die Beobachter sehr tief (H. Wagner, S. Ganitzer).



Bartgeier am 3.11. beim Pleißingkeil, bei Obertauern (Foto: H. Wagner)

Gänsegeier (*Gyps fulvus*): 19.7. Kaprun, Hocheiser 1 Ex. schraubt sich hoch (A. Wessely), 24.7. Rauris, Krumltal 2 Ex. und SE Bräuhütte 4 Ex., 26.7. Rauris, Goldlacklscharte 2 Ex. (N. Ramsauer), 6.8. Nassfeld, Eselkar, 2000 m 5 Ex., 14.9. Rauris, Krumltal 13 Ex. (J. Naglmayr), 4.10. Rauris 1 Ex. (E. Albegger)

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Erste Beobachtung: 20.3. 1 W im Weidmoos (F. Gramlinger). Im Weidmoos brüteten 2008 2 Paare mit Erfolg. Ein Paar konnte am 18.7. mit 2 flüggen juv. beobachtet werden (H. Höfelmaier, S. Stadler, G. Giglmayr, PÜHRINGER et al. 2009), ein Brutpaar hielt sich im ESG Wenger Moor im Bereich Prager Fischer/Wallerbachspitz auf (Ch. Medicus). - Herbstdurchzug: 11.9. NSG Zeller See-Südufer 1 juv. Ex. (J. Robl), 5 diesjährige Ex. am 17.9. im Weidmoos, zuletzt am 4.10. 1 W und 1 Jungvogel. (H. Höfelmaier).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Wintergast: Im Weidmoos von Jahresbeginn bis 17.4. zu sehen: im Hochwinter zumindest 3 verschiedene Vögel. - Erste Herbstbeobachtung am 29.9. im Weidmoos; es folgen durchgehend Beobachtungen von 1 bis 2 schlichten Ex. bis 27.11. (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger, J. Griessner, M. Schweichhart, H. Uhl).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Am 5.5. im ESG-Wenger Moor 1 Ex. (J. Danner)

Habicht (*Accipiter gentilis*): Am 3.9. 1 diesjähriger Habicht auf Starenjagd im Weidmoos; am 5.9. 1 Ex. (dasselbe?) nahe der Zufahrtsstraße jagend (H. Höfelmaier).

Sperber (*Accipiter nisus*): 26.1. 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), am gleichen Tag 1 W in Maxglan (G. Hintschich), 6.3. Leopoldskroner Moor 1 Ex. (S. Stadler). - Brutzeit: 25.5. 1 W im NSG Trumer Seen bei Zellhof (E. Stüber), am gleichen Tag 1 Ex. im Weidmoos, wohl Brutvogel der Umgebung (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart), 12.5. Neumarkt, Aubachtal 1 Ex. (Ch. Medicus), 12.7. Wildgerlostal 1 Ex. (N. Winding). - Nachbrutzeitlich am 11.8. Fusch, Weichselbachtal 1 Ex. (H. Hinterstoisser), 2.8. St. Veit, Hochglocker 1 Ex., 22.8. Riedingtal 1 Ex. (N. Ramsauer), 10.8. Hundsfeld – Hundskogel 1 juv. Ex. (R. Probst, G. Malle), 20.8. Maxglan 1 Ex., 22.8. Salzburg Glanhofen 1 Ex. (S. Stadler), im August 2008 1 Ex. in Plainfeld (H. Scheibl), 7.11. 1 Ex. im

Weidmoos (H. Höfelmaier), 13.11. 1 M bei Seeham, Außerwall (K. Messerer), 22.11. St. Veit, Mülldeponie 1 M. mit erbeuteter, für ihn zu schwerer Amsel (N. Ramsauer).

Mäusebussard (*Buteo buteo*): Winterliche Konzentrationen: 6.1. 11 Ex. beim Weidmoos, 17.2. 10 Ex. ebenda (H. Höfelmaier). Brutzeitbeobachtungen von der Umgebung des Weidmooses (1 bis 2 Paare), in der Gemeinde Neumarkt/Wallersee Beobachtungen von Neufahrn, Schalkham Klausbachtal, Steinbachtal, Hangwaldmühle, Wallester, Wiedweng /Edhof, Seeleiten, ESG Wenger Moor, in Köstendorf von Fahrnberg und vom Wenger Wald (Ch. Medicus, W. Petz, I. Wawra), Henndorf (H. Gressel), Scheffau/ Riersberg (M. Uphues), Saalfelden, Maria Alm (J. Robl), St. Michael (W. Kommik), St. Margarethen, Tamsweg (A. Rega). Am 12.5. 1 Ex. Girlandenflug in Neumarkt, Klausbachtal (Ch. Medicus). Am 2.8. bei St. Veit, Hochglocker ein ad. und ein kürzlich ausgeflogener, bettelnder Jungvogel (N. Ramsauer). – Am 2.11. 10 Ex. bei Köstendorf/Tödtleinsdorf (A. Leitner).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): 16.1. 2 Ex. kreisen um Eibleck (J. Machart). In Goldegg /Weng, Vorderploin 1 Ex. am 3.2., 2 Ex. am 18.2.; am 17.4. stürzen 2 Adler ineinander verkrallt aus großer Höhe senkrecht herunter, trennen sich gerade noch rechtzeitig über dem Haus (A. Aichhorn). 18.2. Steinernes Meer, Hundstod ein Ex. (M. Uphues), am 30.3. 1 ad. in Badgastein, Kötschachtal (N. Ramsauer), außer-alpin am 4.5. 1 immat. Ex. über dem Wallersee kreisend (C.-H. Gressel, G. Gressel), im Juni 2008 ein Ex. zwischen Arnsdorf und Stierling (H. Griessner), am 11.7. 1 Ex. im Ankenkar (H. Ackerl) und 1 Paar im Wildgerlostal (N. Ramsauer, N. Winding u.a.), am 26.7. 1 Ex. im Rauristal /Ritterkar, Anfang August reißt 1 Ex. im Hundsfeld 1 Murmeltier (K. Behrends), 10.8. ebenda 1 Paar und 1 Jungvogel (R. Probst, G. Malle), 28.8. im Riedingtal 1 diesjähriges Ex. (N. Ramsauer) und am 6.8. 1 Ex. im Göriachtal, Hillebrandkogel /Ötschenriegel (S. Stadler), 26.9. Hintersee 1 Ex. (M. Kyek), regelmäßige Sichtungen aus dem Gasteiner Tal (Nassfeld, Siglitztal, Weißenbachtal, Kötschachtal) und dem Rauriser Krumltal (J. Naglmayr). Am 4.10. bei Rauris 4 Ex., 3 davon diesjährig (E. Albegger).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Frühjahrszug: am 20.4. ein Ex. im Rüttelflug und im Stoßflug am Grabensee (G. Kleiter), ein Ex. überflog am 24.5. das Weidmoos und wurde von Lachmöwen attackiert (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). - Herbstzug: ein ad. saß bei Dauerregen am 14.9. in einem dünnen Baum im Weidmoos (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), ein Ex. am 15.9. in der Salzachau bei Weitwörth, im neuen Teichgebiet „Oberau“ kreisend und rüttelnd (S. Unterberger).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): Mai 2008 Brut in Nistkasten in Pfarrkirche Hallein (M. Uphues), Brut in Gebäude in Goldegg/Weng, Vorderploin: 5.4. Begattung, 3.6. Junge schlüpfen, 4.7. erster Jungvogel ausgeflogen (A. Aichhorn). Brutzeitbeobachtungen 2008 von Salzburg (Gneis, Mönchsberg, Donnenbergpark), Lamprechtshausen, Eching, St. Georgen, Michaelbeuern, Neumarkt (Edhof, Maierhof, Wiedweng, Neufahrn,

Diesenberg, Handwaldmühle), Köstendorf (Weng), Obertauern, Hundsfeld (H. Gressel), Prebersee, Fuscher Lacke (A. Rega), Saalfelden, Uttendorf /Ödenwinkeltal, Badgastein, Bad Hofgastein, Wildgerlostal (Ankenkar, Finkau) (H. Ackerl, H. Höfelmaier, Ch. Medicus, J. Naglmayr, W. Petz, H. Pischel, N. Ramsauer, J. Robl, E. Sinn, E. Stüber, I. Wawra, A. Wegscheider,). In Neumarkt, östlich Sighartstein am 17.5. bereits flügge Junge (I. Wawra).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Frühjahrszug: am 4. und 7.5. jeweils 7 M und 2 W, am 12.5. noch 3 M, am 15.5. 1 M und 2 W bei der Insektenjagd über den Wasserflächen (H. Höfelmaier).

Merlin (*Falco columbarius*): Am 3.12. 1 W in den Walser Wiesen nahe Haberlander Jagend (H. & A. Sutter)

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Erste Beobachtung: 30.4. Weidmoos 1 Ex. Insekten jagend (H. Höfelmaier). - Brutzeit: Beobachtungen vom Weidmoos (H. Höfelmaier), Antheringer Au (E. Sinn) und Blinkingmoos (J. & G. Parker), ESG Wenger Moor (Ch. Medicus), bei St. Veit (N. Ramsauer) und bei Tamsweg, Lasaberg (A. Rega). - Herbst: 21.8. 1 Ex. in St. Johann (N. Ramsauer), 31.8. 1 Ex. bei Neufahrn (W. Petz), letzte Beobachtung im Weidmoos am 5.9. 1 Ex. (H. Höfelmaier).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Am 21.4. versuchte ein vorjähriges W einen einzelnen Kiebitz im Weidmoos zu schlagen: Mehr als 10 Stöße führen z.T. bis dicht über den Boden, der Kiebitz konnte jedoch mit blitzschnellen Wendungen erfolgreich ausweichen und der Falke gab schließlich auf (PÜHRINGER et al. 2009). 1.5. 2 Ex. bei St. Koloman (Mitteilung M. Uphues), 28.5. 1 Ex. bei Guggental (J. Machart), 8.7. 1 Ex. im Blühnbachtal und im September 1 Ex. an der Salzach bei Hallein (M. Uphues), am 21.8. schlägt 1 Ex. eine junge Krähe in Oberplainfeld (H. Scheibl).

Haselhuhn (*Bonasia bonasia*): 28.8. Riedingtal 1 M singt kurz, 25.10 bei St. Johann 1 M gesehen (N. Ramsauer), 28.11. Abersee, in 1400 m 1 Ex. (J. Machart).

Alpensneehuhn (*Lagopus mutus*): Am 12.7. Wildgerlostal, Salzboden ein Losungsfund (G. Nowotny), Keeskarscharte auf 2759 m 1 M (A. Wegscheider), 27.7. Scheffau am Tennengebirge, Schwerwand, 2050 m 1 W (M. Uphues).

Haselhuhn (*Bonasia bonasia*): 28.8. Riedingtal 1 M singt kurz, 25.10 bei St. Johann 1 M gesehen (N. Ramsauer), 28.11. Abersee, in 1400 m 1 Ex. (J. Machart).

Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*): 14.4. Wagrain, Griebenkareck: Spuren und Losungen (J. Machart), 17.4. Raum Wieslerhörndl-Alpigl-Höbkaralm mind. 2 M gehört (S. Stadler), 26.7. Bruck/ Glocknerstraße, Pichlberg Brutnachweis (K. Schwaiger), 28.9. bei St. Veit 1 bis 2 M, 25.10 bei Mühlbach am Hochkönig 2 Hähne (N. Ramsauer), 12.11. Flachau, Jandlalm 2 M bei der Herbstbalz (A. Wessely)

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): 9.6. Lessachtal Federnfund von M auf Forststraße, 1520 m (W. Petz), 2.9. Viehofen, Lochalm 1 Ex. (H.

Hinterstoisser). 2008 Nachweise von St. Veit, Bischofshofen und Radstadt (N. Ramsauer) und Altenmarkt (J. Machart).

***Steinhuhn (*Alectoris graeca*):** 17.8. Untersberg, nahe Geiereck, 1 Ex. sonnte sich am Rand von Latschenfeld (erstes Schönwetter nach Dauerregen) (S. Stürzer) (an AFK gemeldet).

Rebhuhn (*Perdix perdix*): 26.4. ESG Wenger Moor, Prager Fischer 1 Ex. (N. Ramsauer).

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Am 14.6. 1 Ex. in naturnahem Garten in Salzburg, Josefiu (D. Fölsche). Am 23.6. 1 schlagendes M im östlichen Weidmoos (PÜHRINGER et al. 2009). Westlich des ESG Weidmoos verhörte H. Höfelmaier am 7., 18. und 20.7. Wachtelrufe. Am 10. und 14.7. je 1 Ex. rufend im Steinfeld bei Mariapfarr, 19.7. 1 ruft bei St. Margarethen (W. Kommik).

Fasan (*Phasianus colchicus*): 1 M sucht am 21.5. in Garten in Leopoldskron-Moos auf Komposthaufen nach Futter und balzt (Ch. Medicus). Brutnachweise dieser durch Fütterung jagdlich geförderten Art im Wenger Moor, den Oichtenrieden und im Weidmoos (hier mind. 8 bis 9 Reviere; Brutnachweis am 25.5. durch Eischalenfunde) (H. Höfelmaier, J. Danner, M. Lackinger).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Im Weidmoos 2008 deutlich weniger häufig als 2007. An 11 Stellen des Gebietes konnten revierhaltende Vögel zwischen 21.4. und 23.6. nachgewiesen werden. Am 7.7. 1 ad. und 1 juv. im südlichen Weidmoos (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier). 10.12. 1 Ex. in Bischofshofen beim Salzachkraftwerk Kreuzberg-Maut futtersuchend (S. Laimböck).

Tüpfelsumphuhn (*Porzana porzana*): Am 21.4. eine kurze Rufreihe im Weidmoos zu hören (PÜHRINGER et al. 2009)

Wachtelkönig (*Crex crex*): 21.6. NSG-Zeller See-Südufer 1 M rufend (J. Robl), 28.7. St. Michael, Golfplatzrand in ungemähter Wiese 1 Ex. kurz rufend (W. Kommik)

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Im Weidmoos 2008 12-13 Reviere; am 23.6. 1 ad. mit 2 pulli, (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier). 5.4. Salzburg, Donnenbergpark 1 Ex. auf kleinem Teich (H. Gressel, Ch. Medicus), 30.11. Salzburg, Leopoldskroner Weiher 4 Ex. (G. Hintschich).

Blässhuhn (*Fulica atra*): Bei der Mittwinterzählung im Jänner hielten sich die meisten Blässhühner am Fuschlsee (288) und am Mattsee (153) auf. Mitte März war das Blässhuhn mit 957 Individuen der häufigste Wasservogel. - Die Brutreviere wurden im Weidmoos Ende Februar bezogen. Am 25.5. wurden 37 Reviere ermittelt, davon 13 mit Brutnachweis. Der Gesamtbestand dürfte bei ca. 55 Paaren (!) liegen (PÜHRINGER et al. 2009). Am 1.6. und 5.6. Brutnachweise von Obertrumer See und Wolfgangsee, Blinkingmoos (R. Lindner, J. Parker), 16.6. Hochfilzener Moor, Griebenensee mind. 1 Familie (W. Gstader), 21.6. St. Michael, Teich bei Golfplatz 1 ad. und 2 juv. (W. Kommik, H. Gressel).- Herbst: Am 16.11. 680 Ex. am Zeller See (J. Robl).

Kranich (*Grus grus*): Im Freimoos bei Kuchl am 20.3. 4 Stück (F. Schönauer). Im Weidmoos am

12.3. 2 Ex. nach Norden abfliegend und eine extrem späte Sichtung am 22.5: 1 Ex. kreisend und dann nach Westen abfliegend (H. Höfelmaier, R. Lindner, M. Schweichhart)!

LIMIKOLEN - SPECHTE

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*): In Bergheim hielten sich auf einer Aufschüttungsfläche für ein Gewebegebiet im Mai 2008 3 Familien mit Jungen auf. Der Brutplatz wurde trotz Bautätigkeit zur Bodenverfestigung beibehalten (S. Unterberger, M. Kyek). Im neuen Feuchtgebiet „Oberau“ bei Weitwörth wurden von Anfang April bis Juni regelmäßig 2-3 Ex. festgestellt (M. Kyek, S. Stadler). Im Juni hielt sich im Gewerbegebiet Ursteinau 1 Paar auf (H. Thomasser). Im Weidmoos konnten 2008 1-2 Reviere bestätigt werden. Im Nordwesten am 21.4. 2 Einzelbeobachtungen; im Südteil am 7.5. 1 ad., am 24.7. 1 juv., am 30.7. 2 Ex. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Am 16.6. im Hochfilzener Moor 1 Ex. (W. Gstader), am 21.6. im ESG Tauglgries 2-3 Ex. (H. Thomasser, A. Duft). Im ESG Tauglgries wurden 2008 die Zonen in denen ein Betretungsverbot von 1. April bis 31. Juli besteht genau markiert und durch die Salzburger Berg- und Naturwacht kontrolliert, was sich als erfolgreich erwies und in den kommenden Jahren weitergeführt werden sollte.



ESG Tauglgries, Markierung der temporären Schutzzone für Flussuferläufer und Flussregenpfeifer

***Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*):** Am 24.8. im Gebiet des Ainecks 3 Ex. (2 ad., 1 juv.) bei der Nahrungssuche in einem Zeitraum von ca. 11 bis 18 Uhr beobachtet. In dem Beobachtungsgebiet gibt es Planungen für eine Windkraftanlage (H. Ackerl, I. Wawra). Die Beobachtung wurde am 29.11.2009 von der AFK anerkannt.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Frühjahrszug: erstmals im Weidmoos am 17.2. 2 Ex. und am 27.2. ca. 130 Ex. (H. Höfelmaier). Am 22.2. erstmals 2 Ex. im ESG Oichtenriede, am 25.2. hunderte Ex. in Lamprechtshausen, nahe Gewerbegebiet Ering (M. Lackinger), 14.3. Salzburg, Flughafen 10 Ex. (S. Stadler). - Brutzeit: Am 22.3. im ESG/NSG Oichtenriede 22 Ex. (E. Stüber). Im Weidmoos 2008 etwa 14-15 Paare; Brutnachweise am 17.4. (Eischalenfund), am 21.4. (1 brütender ad., 1 verlassenes Vollgelege, 1 leere Nestmulde), am 25.5. (1 Altvogel mit 2 pulli, an 2 Stellen Eischalenfunde), 1.6. 1 W mit 4 juv. und am 23.6. (1 Paar mit 2 juv. und ein verwaister pullus). Größere

Ansammlungen von Nichtbrütern mehrfach im Nordteil des Weidmooses z.B. ca. 120 Ex. am 23.6. (H. Höfelmaier, PÜHRINGER et al. 2009). Im ESG Wallersee, Wenger Moor am 23.5. 2 Ex. eine Rohrweihe attackierend, im NSG Fischtaginger Spitz am 24.5. 2 Ex. (J. Danner). In Neumarkt/Neufahrn am 17. und 18.4. je 1 Ex., in Neumarkt/Schalkham am 28.4. 3 Ex. (I. Wawra), ebenda am 6.5. 1 Ex. (W. Petz), bei Matzing am 24.6. 1 Ex. (I. Wawra). 20.4. in Köstendorf, Fahrnberg 2 Paare attackieren 2 Mäusebussarde (Ch. Medicus), 30.6. Schleedorf/ Roid auf brachem Feld mind. 6 Ex. (W. Köhler). 20.6. Bruck an der Glocknerstr./Pichl 1 Ex. (K. Schwaiger), 8.6. bei St. Margarethen/Lungau 4 Ex. und 12.6. bei Mauterndorf/Steindorf 1 Ex. (W. Kommik).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Je 1 Ex. am 17. und 21.4. (PÜHRINGER et al. 2009, H. Uhl) im Weidmoos; am Wegzug 12 diesjährige Ex. am 14.9. und 4 Ex. am 21.9. im Südteil des Weidmooses (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Hinweise auf Überwinterung: Bei der Wasservogelzählung Mitte Jänner 3 Ex. im Rückhaltebecken Thalgau (J. Parker) und eine Beobachtung am 16.2. im ESG Oichtenriede bei Thalhausen (J. Buchmayr). - An 5.4., 18.4. und 19.4. je 1 Ex. (E. Stüber) sowie am 26.4. 2 Ex. balzend im ESG Oichtenriede (H. Höfelmaier). 24.4. 1 Ex. im Leopoldskroner Moor auffliegend (S. Stadler), Weidmoos: am 12.3. 3 Ex. und am 9.4. 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier, M. Schweichhart). Wahrscheinlicher Brutvogel im Weidmoos mit 1-2 Revieren. Nur am 25.5. 1 balzfliegendes/ meckernendes M im Nordwesten, im Nordosten ein weiteres mögliches Revier (PÜHRINGER et al. 2009). Am 12.4. im ESG Wenger Moor, Prager Fischer 1 Ex. balzfliegend, 3 und 1 Ex. auffliegend (Ch. Medicus). - Im Sommer im Weidmoos am 6.7. 3 Ex., am 28.7. 5 Ex., am 6.8., 10.8. und 14.8. je 6 Ex. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger). - Herbstbeobachtungen: 4.10. und 27.10. je 1 Ex. im Weidmoos, am 1.11. Maximum mit 21 Ex., die durch Seeadler aufgescheucht südwärts abflogen (H. Höfelmaier, PÜHRINGER et al. 2009), 10.10. 1 Ex. im Kapruner Moor (O. Stöhr). Am 25.9. 1 Ex., am 28.9. 6 Ex., am 2.11. 1 Ex. im ESG Bürmoos sowie am 8.12. 3 Ex. ebenda auf der Retensionsfläche im Rodinger Winkel (R. Kaiser), am 16.11. im Rückhaltebecken Thalgau 10 Ex. (J. Parker, E. & G. Griehser).

Waldschnepe (*Scolopax rusticola*): 25.5. Bürmoos, Nähe Grundlose Straße 2 Ex. und 28.5. ESG Bürmooser Moor 1 Ex. (R. Kaiser). - 31.8. Tamsweg/Lasaberg 2 Ex. am Waldrand (W. Kommik), 2.11., 3.11. und 23.11. je 1 Ex. im ESG Bürmooser Moor (R. Kaiser).

Uferschnepfe (*Limosa limosa*): Nach dem Erstnachweis 2007 im Weidmoos erneut ein Durchzügler am 17.4. im Seichtwasser im Nordwesten des Gebietes zusammen mit anderen Limikolen (PÜHRINGER et al. 2009, H. Uhl).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Erste Sichtung: 16.2. Oichtenriede bei Thalhausen 1 Ex. (J. Buchmayr). Am 18.3. 3 Ex., 5.4. 10 Ex. und 26.4. 6 Ex. im ESG Oichtenriede, mind. 4 Ex. im ESG Wenger Moor, am 31.3. NSG am Nordufer des

Obertrumer Sees 5 Ex. und am 1.6. 1 Ex. Revierflug (O. Stöhr, E. Stüber, H. Höfelmaier, R. Lindner). Hinweise für erfolgreiche Bruten: am 11.5. wurde im ESG Wenger Moor ein Schwarzmilan heftig von 3 Ex. angegriffen (J. Danner), am 31.5. attackierte 1 Ex. ebenda heftig eine Rohrweihe, das Paar führte wohl Junge (Ch. Medicus). Am 27.5. fliegen 3 Ex. im NSG Fischtaginger Spitz Scheinangriffe (J. Danner). Im Weidmoos am 7.3. 7 Ex. und am 12.3. 12 Ex., im April und Mai überfliegende bzw. rufende Einzelvögel im Nord- und Ostteil. 2 Reviere waren am 17.4. im Grenzgebiet zu Oberösterreich an der Moosach zu finden. 1 Paar zeigte auf oö. Seite Balzverhalten mit Scheinnisten in einer Streuwiese, das 2. Paar flog mehrfach in den Nordteil des Weidmooses ein bzw. wieder von dort heraus (PÜHRINGER et al. 2009, H. Uhl). - Herbstzug: 18.8. Salzburg, Glanhofen beim Flughafen 2 Ex., am 26.9. ebenda 1 Ex. (S. Stadler, Ch. Ringl)

Regenbrachvogel (*Numenius phaeops*): Am 14.4. in Kuchl, Freimoos 2 Ex. am Durchzug (J. Kreuzberger).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Weidmoos: 1 Ex. im Prachtkleid am 23.6., 1 später Durchzügler am 27.11. (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Am 28.8. 1 Ex. vom Weidmoos nach Osten abfliegend (H. Höfelmaier).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Während des Heimzuges am 17.4. 1 Ex. im Weidmoos (PÜHRINGER et al. 2009, H. Uhl). - Am Wegzug am 10.8. 1 Ex. ebenda (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Weidmoos: am Heimzug nur am 12.4. 1 Ex. und am 17.4. 3 Ex. (J. Griessner, H. Uhl, PÜHRINGER et al. 2009). - Am Wegzug jeweils 1 bis 3 Ex. von 23.6. bis 31.8., max. 4 Ex. am 6.8. (PÜHRINGER et al. 2009., H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Nachweise liegen nur vom Weidmoos vor. Am Frühjahrszug nur wenige Nachweise, so am 29.3. 2 Ex. unter Kiebitzen, am 21.4. 5 Ex., am 2. und 15.5. je 1 Ex. - Ab 24.6. beginnt der Wegzug mit 2 Ex., zwischen 1.7. und 5.9. 1 bis 8 Ex., am 4.7. Maximum mit 16 Ex. im Südteil des Weidmooses. Insgesamt stehen einer Summe von 60 Ex. am Wegzug nur 6 Ex. am Heimzug gegenüber. (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Am 24.3. an einer Lacke beim Grabensee 1 Ex. (J. Aigner), am 26.4. am Tauglgries bei Vigaun 3 Ex. (A. Sigl), am 21.5. 2 Ex. auf Flussinsel der Salzach in Hallein, oberhalb Neumayer-Brücke (M. Uphues). Am 14.6. 1 Ex. im ESG Tauglgries (H. Thomasser, A. Skotnik), 21.6. 1 Ex. im Gewerbegebiet Ursteinau (A. Thomasser), im Juni 1 Paar im neuen Feuchtgebiet „Oberau“ bei Weitwörth (M. Kyek). - Am 14.8. bei St. Veit, Salzach 1 Ex. (N. Ramsauer), am 7.9. bei Kuchl, Kellau an der Salzach 1 Ex. (M. Uphues).

***Thorshühnchen (*Phalaropus fulicaria*):** Am 23.12.2008 wurde 1 Ex. von Th. Sickinger am Fuschlsee beobachtet. Die Beobachtung wurde von

der AFK anerkannt (Sitzung vom 29.11. 2009 auf www.birdlife-afk.at). Es handelt sich um den Erstnachweis dieser Art im Land Salzburg (siehe Beitrag von Th. Sickinger in diesem Heft).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*): Im Weidmoos kam es 2008 erstmals zu einem erfolgreichen Brüten der Lachmöwe: Zwischen 23.3. und 5.4. waren mehrfach ca. 20 Ex. im zentralen Gewässerbereich zu beobachten (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Am 25.5. gelang der seit mehreren Jahren erwartete erste Brutnachweis: Mindestens 4 besetzte Nester auf Seggenbülden! Am 23.6. konnten unter gesamt 33 Lachmöwen in der Kolonie 4 diesjährige juv. und mind. 2 nicht flugfähige pulli. beobachtet werden (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Im grenznahen Ainringer Moos (Bayern) brüteten am 27.4. 10 Ex. auf einer Schilfinsel, am 29.7. 1 Paar mit 2 juv. (J. Machart).



Lachmöwe mit Jungen am 30.7.2008 im Weidmoos (Foto: H. Höfelmaier)

Sturmmöwe (*Larus canus*): Bei der Mittwinterzählung nur 3 Ex. am Mattsee, Mitte März ebenda 11 Ex. (B. & Th. Krisch). 20.1. Fuschl am See 3 Ex. überfliegend (W. Köhler).

Mittelseemöwe (*Larus michahellis*): Im Weidmoos mehrere Nachweise von je 1-2 Ex. von 22.3.-23.6. im zentralen Bereich, z.T. intensiv von den Lachmöwen angehasst. Südwestlich des Weidmooses waren am 4.7. außerdem noch 4 ad./1 immat. bei der Nahrungssuche auf einer Wiese zu sehen (PÜHRINGER et al. 2009., H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Im grenznahen Ainringer Moor (Bayern) 2008 eine erfolgreiche Brut auf einer Schilfinsel: am 4.8. 1 ad. und 1 juv. (J. Machart).

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*): Im Weidmoos konnten 2008 erstmals Flussseeschwalben nachgewiesen werden: Je 2 Ex. am 6.7. und 18.7. (H. Höfelmaier).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Im Weidmoos wurden am 9.5. 15 bis 20 Ex. jagend über Wasserflächen beobachtet (H. Höfelmaier)!

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): am 1.6.2008 ein adultes Ex. zusammen mit einer Trauerseeschwalbe am Nordufer des Obertrumersees jagend und auf Boje rastend (R. Lindner).

Straßentaube (*Columba livia f. domestica*): Im Weidmoos Nahrungsgast: Am 23.6. 5 Ex. (PÜHRINGER et al. 2009).

Ringeltaube (*Columba palumbus*): Erste Beobachtung: 23.2. Weidmoos 1 Ex. überfliegend, am 15.3. am Durchzug mehr als 60 Ex. (H. Höfelmaier). - Im Weidmoos 2008 mindestens 7 Reviere (PÜHRINGER et al. 2009); Brutzeitbeobachtungen von Neumarkt bei Kollmannsroid, Schalkham und Diesenberg (W. Petz, A. Wegscheider), von Henndorf, Berg (H. Pischel) und Flachauwinkel in 1000 m (S. Stadler).

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): Brutzeitbeobachtungen von Puch (H. Hinterstoisser), Salzburg Thumegg und Leopoldskron (H. Gressel), Bürmoos (E. Stüber), Neumarkt, Maierhof (Ch. Medicus) und Neufahrn (W. Petz), Henndorf, Berg (H. Pischel) und Zeller See-Gebiet (J. Robl). Am 6.11. sitzt ein Sperber-Weibchen auf einer Türkentaube mitten auf der H. Lönsstraße in Salzburg, Leopoldskron - die Taube entkommt aber durch Störung durch nahende Schulkinder (R. Medicus).

Kuckuck (*Cuculus canorus*): Am 12.4. erstmals in ESG Wenger Moor und westlich des Strandbades Neumarkt singend (Ch. Medicus), am 14.4. Ankunft in Goldegg/Weng (A. Aichhorn), am 19.4. in den Oichtenrieden (H. Gressel), weiters am 21.4. erstmals in Salzburg, Lieferinger Au und im Weidmoos singend (E. Sinn, PÜHRINGER et al. 2008). Im Weidmoos je 3 bis 4 singende M am 30.4., 7.5. und 22.5. (H. Höfelmaier). Brutzeitbeobachtungen weiters von Salzburg, Leopoldskron-Moos, Salzachau bei Weitwörth, Bürmooser Moor, Oichten-Riede, Neumarkt (Neufahrn, Diesenberg, Handwaldmühle, Sighartstein > Sommerholz), St. Jakob am Thurn Strobl, Niedergadenalm, Saalfelden, Maria Alm, Obertauern, St. Michael i. Lungau (H. Höfelmaier, E. Stüber, W. Petz, Ch. Medicus, H. Pischel, S. Stadler, G. Habe nicht, J. Robl, H. Gressel, A. Rega, W. Kommik). Letztmalig singend gemeldet am 25.6. von Neumarkt (W. Petz, I. Wawra). Letzte Beobachtung: am 2.8. in St. Veit, Hochglockner, 4 Sichtungen in 10 Minuten (N. Ramsauer).

Schleiereule (*Tyto alba*): Ende Juni 2008 wurde erstmals wieder eine Brut aus einem Schuppen bei Holzhausen gemeldet (Mitteilung L. Slotta-Bachmayr). In diesem Bereich kam die Schleiereule vermutlich bis in die 1970er Jahre hinein noch vor (F. Spindler). Am 23.11. beobachtete der Sohn von E. Sinn in der Antheringer Au eine Schleiereule, die in einem verschließbaren Hochstand mit Glasfenstern und Türe gefangen war und gegen die Scheiben flatterte. Er konnte sie befreien und stellte fest, dass der Hochstand innen durch Kot stark verschmutzt war (E. Sinn).

Uhu (*Bubo bubo*): 2008 Nachweis einer erfolgreichen Brut mit 2 Jungen am Haunsberg (S. Unterberger) und mind. ein Jungvogel am Mönchsberg (E. Sinn). In Holzhausen, Oberholz 1 Ex. am 15.11. bei der Treibjagd beobachtet (A. Stegbuchner, Mitteilung R. Kaiser).

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*): 3.6. St. Michael, Speiereck 1 Ex. rufend (W. Kommik).

Waldkauz (*Strix aluco*): Anfang Jänner 2008 ein Rupfungsfund am Gaisberg-Rundwanderweg – Prädator Uhu? (J. Parker), 9.2. Obertrum, Kopfberg

1 Totfund an der Straße (W. Köhler), 18.3. 1 ruft bei Unkenberg (G. Jaritz). 3.5. Neumarkt am Wallersee, Wiedweng mind. 2 rufende (C.-H. Gressel, G. Gressel). Am 10.4. in Puch, Koierboden 3 Eier in Nistkasten, am 12.5. 1 ad. ca. 50 m südlich des Nistkastens tot gefunden, 17.5. 2 juv. ebenda beringt (S. Unterberger, J. Parker). Am 11.6. in St. Veit bei Nistkastenbrut 2 juv. bereits außerhalb des Kastens, das 3. und 4. juv. folgen am 12. und 15.6. (N. Ramsauer). - Ende August 1 Totfund in Wassertonne in Niedernsill, Gaisbichl (W. Schlauss), 10.9. 1 ruft bei Plainfeld (K. Erlmoser), im Herbst 2008 in Salzburg, Hans-Webersdorfer-Str. 1 graues Ex. tot am Balkon, wohl Scheibenanflug (M. Wengler).



Sepp Unterberger bei einem von ihm gebauten und betreuten Nistkasten mit 2 jungen Waldkäuzen in Puch, Koierboden am 17.5. 2008 (Foto: J. Parker)

Waldohreule (*Asio otus*): Ab Anfang Juni 2008 mehrmals mind. einen rufenden Jungvogel bei Rehhof gehört (J. Ehrenleitner). 26.12. Zell am Wallersee, nahe Bahn 1 Ex. in Feldgehölz (R. Türk).

Raufußkauz (*Aegolius funereus*): Am 9.3. in Tamsweg, bei Seetal 2 Ex. in 1250 m im schattseitigen Wald rufend (G. Spreitzer), 19.7. Zickenberg bei St. Michael, 1500 m 3 Jungvögel (W. Kommik, A. Rega).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): Am Vormittag des 23.9. wurde ein Ziegenmelker auf einem Balkon am Mönchsberg nahe Sedlmayrweg entdeckt. Der Vogel flog erst kurz nach 17 Uhr wieder weg (E. Stein).

Mauersegler (*Apus apus*): Im Weidmoos waren die ersten 2 Ex. über den Wasserflächen jagend bereits am 21.4. zu beobachten. Weiters 20-30 Ex. am 30.4. und 40-50 Ex. am 2.5. Am 8.5. 3 Ex. bei Maria Alm (J. Robl). Zur Brutzeit im Weidmoos häufiger Nahrungsgast (H. Höfelmaier), im NSG Blinkingmoos/ Wolfgangsee am 5.6. 20 Ex. jagend (J. & G. Parker). 29.4. erste Sichtung in Salzburg, Pioniersteg 11 Ex. (E. Sinn), in Neumarkt erst am 7.5. 4 Ex. (W. Petz). In Puch, Schmiedpointstraße Ankunft der ersten Segler am 4.5., am 25.6. 2 juv. im Nistkasten, die Jungen fliegen am 12.8. aus (S. Unterberger). 10.6. 2 Ex. bei Maria Alm, Schinking (J. Robl). Am 17.8. liegt in Salzburg, Mülln 1 flugunfähiger Jungvogel auf dem Stöckelpflaster, die Aufzucht misslingt (E. Sinn). Letzte Beobachtungen am 21.8. mit 6 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier).



Ziegenmelker am 23.9. auf einem Balkon am Mönchsberg (Foto: E. Stein)

Alpensegler (*Tachymartia melba*): 5.7. Zederhaustal, Marislwand, 2200 m 2 Ex. im Flug (W. Kommik), 27.8. Gasteiner Tal, Eselkar, 2000 m 15 Ex. (J. Naglmayr).

Eisvogel (*Alcedo atthis*): 26.1. in Puch, bei Schotterteich 1 Ex. (S. Unterberger), 14.2. Kraftwerk Hallein-Gamp 2 Ex. (A. Bernhardt), 24.2. und 31.3. je 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), am 6.4. 1 Ex. am Grabensee (J. Aigner). - Brutzeitbeobachtungen: Im Mai in Seekirchen an der Fischach (B. Hauser), im ESG Wenger Moor, Wallerbach (J. Danner), am Sighartsteiner Weiher bei Neumarkt (G. Hofmann), an Teich bei Urstein (M. Uphues), in der Lieferinger Au und Oichtenau (E. Sinn), im Juni in der Antheringer Au (E. Sinn). In Salzburg gelang 2008 kein Brutnachweis, allerdings brütete der Eisvogel erfolgreich in der Freilassinger Au, knapp jenseits der Grenze in Bayern (E. Sinn). - Am 24.7. in Hallein, oberhalb Neumayer-Brücke 1 Ex., am 9.9. 1 Ex. in Kuchl, Bürgerausee (M. Uphues). Am 21.8. 1 Ex. in Hallwang an der Fischach (W. Petz), im ESG Wenger Moor je 1 Ex. am 28.8. und 29.9. (J. Danner). Im Weidmoos einzelne Vögel zwischen 28.7. und 10.11. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger, H. Uhl, PÜHRINGER et al. 2009) sowie Fang (Japannetz) und Beringung eines Ex. am 13.10 (J. Parker). Am 1.10. 1 Ex. bei Niedernsill, 5.10. Achartinger Au 2 Ex. (E. Sinn), 8.10. ESG Bürmooser Moor 1 Ex. (R. Kaiser), am 21.10. 1 Ex. bei Urstein (M. Kyek), 4.11. 1 Ex. in Lieferung, 8.11. 2 Ex. jagen sich am Fuschsee nahe Schloß Fuschl (E. Sinn), 16.11. je 1 Ex. bei der Wasservogelzählung an Wallersee, Auersperg Teichen und Salzachseen (Ch. Medicus, E. Sinn, M. Graf), 4.12. 1 Ex. an der Fischach bei Bergheim (E. Sinn), 5.12. 1 Ex. an der Königseeache bei Rif (Karin Feuchter) .

Wiedehopf (*Upupa epops*): Frühjahrsdurchzug: Am 8.4. bei Eugendorf 1 Ex. im Flug (J. Machart), zwischen 1.4. und 17.4. mehrere Beobachtungen an den Ortsrändern von St. Michael, Tamsweg und St. Margarethen im Lungau. Am 17.4. in Tamsweg 1 Ex. von Katze gefangen (W. Kommik), 24.4. nahe Mooshamer Moor 1 Ex. (M. Kyek). - Am Herbstzug am 7.8. 1 Ex. bei Neufahrn (W. Petz).

Wendehals (*Jynx torquilla*): Am 2.6. 1 Ex. in St. Johann (N. Ramsauer), am 11.7. Salzburg, Kommunalfriedhof 1 ad. und 2 flügge juv. (H. & A. Sutter). 28.7. St. Michael, Rand von Golfplatz 2 Ex., davon 1 flügger juv. auf und in Reisighaufen (W. Kommik)

Grünspecht (*Picus viridis*): In Goldegg, Weng 1 lachendes Ex. erstmals am 16.1. (A. Aichhorn). Im Weidmoos am 24.2. 1 rufendes Ex., am 21.4. 1 Ex. rufend an der Moosach, am 25.5. 1 ad. Futter suchend (H. Höfelmaier). Am 11.2. in Salzburg Thumegg Rufe, am 5.3. und 1.4. im Donnersbergpark gehört (H. Gressel). Im März 2008 Rufe in der Akademiestraße und Faistauergasse in Salzburg (M. Hubka) und am 16.3. in Kleißheim und am Salzachsee je 1 W (J. Machart). Am 15.3. am Zellersee 2 Ex. und am 20.4. in Maria Alm Hangleiten u. Schinking je 1 singend (J. Robl). Brutzeitbeobachtungen in Neumarkt (Maierhof, Edhof, Seeleiten), ESG Wenger Moor (Ch. Medicus). Am 25.7. 3 Ex. in Tamsweg, Lasaberg (A. Rega). Je 1 Ex. im August 2008 in Salzburg /Glanhofen, Grödig/St. Leonhard und Goldegg (S. Stadler), 4.11 1 Ex. in Koppl, Guggenthal (P. Gros)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): Am 9.1. 1 Ex. bei Glanhofen, Flughafen (S. Stadler), am 29.1. in der Antheringer Au (U. Moritz). Im Jänner 2008 im Oichtental bei Schönberg (J. Buchmayr), am 25.2. in Wals, Saalachtarm 1 Ex. im Flug (M. Kyek). Am 27.4. in Neumarkt, am Weg zur Goldenen Kutsche und am 4.5. bei Diesenberg Futterhöhlen, am 31.5. 1 Ex. im ESG Wenger Moor (Ch. Medicus), 1.6. bei Wertheim/Haslach 1 Ex. (I. Wawra), 30.4. und 14.5. Henndorf, Berg (H. Pischel) und am 31.10. Henndorf, Steinwandl (H. Wagner), 8.6. Koppler Moor 1 Ex. (E. Stüber), 12.7. 1 Ex. im Wildgerlostal bei Krimml (H. Ackerl). 27.7. Bad Hofgastein, Mitterberg 5 Ex. in 1200 m (J. Naglmayr), 27.5. Fraßspuren bei Tweng (H. Gressel), 10.6. Flachau, Dachebenalm Fraßspuren (S. Stadler). Im Weidmoos von 12.1. bis 28.8. mehrfach einzelne Ex. Nahrung suchend bzw. das Gebiet überfliegend (PÜHRINGER et al. 2009 und H. Höfelmaier).

Buntspecht (*Dendrocopos major*): Im Jänner fast täglich ein Paar im Garten bei Nüssen (H. Gressel). Brutzeitbeobachtungen von Eettenau, Weidmoos, Blinklingmoos, Neumarkt am Wallersee (Neufahrn, Sommerholz, Diesenberg, Kollmannsroid), Salzburg, Leopoldskron, Lieferinger Au, Wagrain (E. Stüber, H. Höfelmaier, J. & G. Parker, W. Petz, H. Pischel, A. Wegscheider, Ch. Medicus, J. Machart, E. Sinn), von Krimml, Wildgerlostal (N. Winding), Maria Alm (Hinterreit, Kohlreit, Schinking), Saalfelden Reit und Metzger Steinalm (J. Robl). Brutnachweis durch Bettelrufe von juv. vom Salzachkai beim Haus der Natur (Ch. Medicus).- Am 18. und 19.9. hackt ein Buntspecht Löcher in die gedämmte Fassade eines Wohnhauses in Puch. Nach dem Streuen von Cayenne Pfeffer in die Löcher und dem Aufhängen verschiedener glänzender Streifen wird der Specht nicht mehr am Haus gesehen. (S. Unterberger)

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*): Am 8.2. 1 W bei der Nahrungssuche und trommelnd westlich Freilichtmuseum Großmain (P. Gros) und am 26.3. in Fürstenbrunn im Bereich der Untersberg-Schiabfahrt in 550 m 2 Ex., eines davon auf Pappel trommelnd (J. Machart).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): 5.3. Hallein, Rehhof 1 Ex. im Garten (J. Ehrenleitner). Im Weidmoos 1 Ex. am 17.8. (H. Höfelmaier), 1

singendes Ex. am 2.9. östlich des Beobachtungsturmes (PÜHRINGER et al. 2009).



Weißrückenspecht am 8.2. bei Großmain (Foto: P. Gros)

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): 17.5. Strobl, Niedergadenalm 1 trommelt (S. Stadler), 2.8. 2 Ex. bei St. Veit, Pronebenalm an abgestorbener Fichte futtersuchend (N. Ramsauer), 2.11. Filbling, Westgrat in totholzreichem Fichtenwald und Windwurf 1 Ex. (G. Klingensberger, U. Wacht, Mitteilung N. Winding)

SINGVÖGEL

Feldlerche (*Alda arvensis*): Frühjahrsdurchzug: 22.2. mind. 24 Ex, bei Neufahrn (W. Petz), 23.2. mind. 4 Ex. bei Loig (W. Köhler), 27.2. Lamprechts-hausen Schwerting 10 Ex. (S. Stadler), 22.3. Oichtenriede 1 Ex. (E. Stüber), 30.3. 1 Ex. das Weidmoos überfliegend. (H. Höfelmaier). - Brutzeit: In Salzburg, Glanhofen, Flughafen am 3.6. 1 singendes M, 4.6. Leopoldskron-Moos 1 Revier (S. Stadler), beim Weidmoos je 1 singendes M am 18.4. und 23.6. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, PÜHRINGER et al. 2008). Zw. 30.4. und 29.5. in Neumarkt bei Neufahrn, 2 singende M. zwischen Sighartstein und Sommerholz, 1 singendes M bei Sommerholz (W. Petz, H. Pischel). 16.4. 2 M im NSG Zeller See-Südufer (K. Schwaiger), 21.6. 2 M ebenda singend (J. Robl), 21.6. St. Michael/Lungau 1 Ex. Singflug (W. Kommik, H. Gressel). – Herbstzug: 28.9. St. Veit, Hohegg 1809m 1 Ex. überfliegend Richtung SW (N. Ramsauer)

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Jeweils in größeren gemischten Schwalbentrupps waren am 21.4. 3 Ex. und am 24.8. je 1 Ex. im Weidmoos zu beobachten (H. Höfelmaier, PÜHRINGER et al 2009).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*): Am 13.3. in Schwarzach, südlich des Umfahrungstunnels 15-20 Ex. fliegend, in Rauris 1 Ex. (S. Stadler), 30.3. Badgastein, Kötschachtal, Himmelwand 2 Ex. (N. Ramsauer), 15.5. Burg Hohenwerfen 2 Ex., 28.5. 2 Ex. Nockstein-Gipfel (J. Machart), 9.7. Mautstelle Ferleiten 3 Nester (A. Rega), 20.7. Twenger Au, Steinbruch 2 Ex. fliegen Nest an (H. Gressel), 24.7. Rauris, Krumltal 2 Ex. und Nest in Felswand (N. Ramsauer), 25.7. 3 Ex. bei Muhr (A. Rega), 4.10. mehr als 10 Ex. bei Rauris (E. Albegger).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): Erste Beobachtungen: am 27.3. 1 Ex. in St. Gilgen (E. Sinn), am 29.3. 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier). Am 12.4. bei Regen und Kälte mind. 60 Ex. knapp über der Seefläche jagend bei Neumarkt, Wallersee (Ch. Medicus). Im Weidmoos häufiger Nahrungsgast über den Wasserflächen; maximal ca. 150 Ex. am 21.4. und am 2.5. (H. Höfelmaier, PÜHRINGER et al. 2009). 2008 in Ramingstein beim Lenzbauern 7 bis 8 Brutpaare (E. Prodingner). Am 10.6. 3 Ex. bei Maria Alm, Almdorf (J. Robl). Brutzeitbeobachtungen aus dem Lungau von Pischelsdorf, Göriach, St. Andrä, Lintsching, Unternberg u. Lasaberg (A. Rega). - Am 15.9. in Salzburg an der Salzach hunderte Schwalben, davon bis zu einem Drittel Rauchschwalben (A. Maletzky), am 29.9. beim Pioniersteg mehrere unter ca. 200 Mehlschwalben (E. Sinn). Am 27.10. noch 1 Ex. im Weidmoos jagend (H. Höfelmaier).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): Ankunft in Goldegg, Weng am 14.4. (A. Aichhorn). Im Weidmoos 15 bis 20 Ex. am 18.4. (H. Höfelmaier, F. Gramlinger) sowie je ca. 20 Ex. am 21.4. und am 2.5. (PÜHRINGER et al. 2009). - Brutzeitbeobachtungen von Köstendorf, Weng und Neumarkt Wiedweng, Edhof und Hangwaldmühle (altes Nest) (Ch. Medicus). 12.7. Wildgerlostal, Wh. Finkau, 1420 m 1 Nest mit Jungen, 30.7. Stubachtal, Ghf. Vorhofalm ca. 25 Nester, in denen teilweise noch Junge gefüttert werden (Ch. Medicus). Am Archehof in Goldegg/Weng zog ein Weibchen 2 Bruten auf, das Männchen war nur sehr selten anwesend (A. Aichhorn). In Ramingstein noch 2 Ex. im Oktober fütternd (M. Wieland), 3 Brutnachweise aus Obertauern und Brutzeitmeldungen vom Lungau aus Pischelsdorf, Göriach, Weißpriach, Lasaberg, Muhr (A. Rega). - Herbstzug: Bei Kälte und Regen am 15.9. hunderte Mehlschwalben an der Salzach zw. Lehener Brücke und Steg in der Hernau, ermattete Vögel wurden gefunden bzw. suchten an Hausfassaden Schutz. Am 16.9. morgens ca. 30 Ex. im 3. Stock von Amtsgebäude am Mozartplatz im Inneren eines gekippten Kastenfensters gefangen, wo sie Schutz vor Kälte und Regen gesucht hatten (A. Wagner).



Mehlschwalben am 16.9. gefangen in gekipptem Kastenfenster, wo sie vor der Kälte Schutz gesucht hatten. (Foto: Andrea Wagner)

Baumpieper (*Anthus trivialis*): 20.4. ESG Wenger Moor Pragerfischer 2 M singen, 27.4. Sommerholz Weg zur Goldenen Kutsche 2 M singen (Ch. Medicus), 22.5. Weidmoos 1 Ex. singend (H. Höfelmaier), 5.6. Blinklingmoos 1 Ex. singend (J. & G. Parker), 8.6. 1 Ex. im Koppler Moor (E. Stüber), 17.5. Stobl, Niedergadenalm mehr als 7 Ex., 10.6. Flachauwinkel, Dachebenalm 2 Ex. singend (S. Stadler), 12.7. Krimml, Wildgerlostal, Trisslalm 1 singt kurz (Ch. Medicus), Brutzeitbeobachtungen von Maria Alm Almdorf, Hangleiten und Hinterjetzbach (J. Robl).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): 15.3. 1 Ex. am Zeller See-Südufer (J. Robl), 19.4. ESG/NSG Oichtenriede 1 Ex. auf Pflock (E. Stüber), 24.4. Wenger Moor 1 Ex. (H. Gressel), 16.6. im Hochfilzener Moor 3 Ex. singend (W. Gstader), 21.6. NSG-Zeller See-Südufer 4 Ex., davon 1 Ex. singend, ebenda am 11.9. 1 Ex. gesehen (J. Robl).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*): Überwinterung: Nach dem ersten Auftreten 2007 im Weidmoos traten im Jahr 2008 außergewöhnlich große Trupps auf, wobei von PÜHRINGER et al. (2008) ein Schlafplatz im Weidmoos vermutet wurde. Am 12.1. in den Wiesen im SW des Weidmooses ca. 80 Ex. und am 8.2. im Weidmoos wiederum ca. 80 Ex., ebenda am 7.3. 16 Ex., am 12.3. 27 Ex. und am 16.3. mehr als 20 Ex.. Am 2.4. 42 Ex. bereits im Brutkleid; am 9.4. noch 8 Ex. beobachtet (H. Höfelmaier, M. Schweichhart), das letzte Ex. im Frühling am 21.4. (PÜHRINGER et al. 2008). - Brutzeit: 14.4. Wagrain, Aufstieg zum Wagrainer Haus 2 Ex. (J. Machart), 17.5. Stobl, Niedergadenalm 2 Reviere (S. Stadler), am 23. und 28.6. fütternde Ex. in Obertauern, Hundsfeld (H. Gressel), 9.7. 15-20 Reviere entlang der Glocknerstraße (A. Rega), 12.7. Wildgerlostal, Gerlosseen 3 singende M, Weg zur Keeskarscharte 1 Paar in 2300 m, 8 singende M (A. Wegscheider), im Wildgerlostal weiters 1 fütterndes Ex. und 1 Paar mit flüggen juv. (N. Winding). 30.7. Mühlbach am Hochkönig, Aufstieg Erichhütte Richtung Birgkarscharte mehr als 4 M singend (S. Stadler). 6.8. mind. 10 Ex. bei den Landavirseen, Lungau (S. Stadler), Brutnachweise mit fütternden ad im Hundsfeld, Obertauern am 23.6., 28.6., 17.7. und 18.7. (H. Gressel, A. Rega). - Herbst: Ab Oktober treffen die Wasserpieper wieder im Weidmoos ein: erstmals am 6.10. 25-30 Ex., im Oktober dann im Schnitt 50 Ex. (H. Höfelmaier). Am 1.11. 15 Ex., danach am 5., 10. und 27.11. jeweils ca. 50 Ex. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger, PÜHRINGER et al 2008).

Schafstelze (*Motacilla flava*): Am 11.5. 1 Ex. bei der Nahrungssuche auf einer frisch gemähten Wiese nahe dem Weidmoos (H. Höfelmaier, F. Gramlinger).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*): Am 10.1. 1 Ex. an Teich im Donnenbergpark (H. Gressel), 21.1. Glan nahe Salzacheinmündung 1 Ex. (A. Maringer). - Brutzeitbeobachtungen aus Neumarkt (Forstweg Klausbach, Aubachtal, Schichtlwiese, Nähe Hangwaldmühle, Sighartstein, Sommerholz), Uttendorf (Tauernmoossee S), (Ch. Medicus, H. Gressel, H. Pischel, H. Brennsteiner), Wagrain (J. Machart), 1 fütterndes W am Hundsfeldsee,

Obertauern (H. Gressel). 17.6. Lessach, Mühlbach Nest mit 4 juv. (W. Petz), 29.7. St. Koloman, Mahdhiasl flügge diesj. Ex. am Bach (R. Scheck). - Am 31.8. 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 24.9. Voglau, Aubachfall 1 Ex. (S. Stadler).

Bachstelze (*Motacilla alba*): Erstbeobachtung und Frühjahrszug: 2.3. und 9.3. Neumarkt am Wallersee, Neufahrn je 1 Ex. (W. Petz), 3.3. Ankunft in Goldegg/Weng (A. Aichhorn), 12.3. Weidmoos 20 Ex. (H. Höfelmaier). - Brutzeit: 20.4. Maierhof 1 Ex. mit Nistmaterial (Ch. Medicus), 14.5. zwischen Sighartstein und Sommerholz 1 ad mit 2 juv., 1 ad. mit 3 juv. (H. Pischel) 5.6. Blinklingmoos 4 juv. (J. Parker), 10.6. Maria Alm, Almdorf 1 Ex. fütternd (J. Robl), 13.6. Neufahrn 1 Ex. mit Nistmaterial und 1 diesj. Ex. (W. Petz), 15.7. 1 ad. und 1 juv. im Hundsfeld, Obertauern (A. Rega). - Herbstzug: 11.9. Zeller See-Südufer 8 Ex. (J. Robl), 15.9. Salzburg, Glanhofen mind. 15 Ex. in Acker (S. Stadler), 6.10. Weidmoos 20-25 Ex. in Trupp (H. Höfelmaier), 16.11. Seekirchner Bucht 1 Ex. (Ch. Medicus), 27.11. Weidmoos 11 Ex. (H. Höfelmaier).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): Am 12.1. Seeham, Innerwall ca. 20 Ex. (K. Messerer). - Am 30.11. 30 Ex. in Hof, Ortszentrum und am 11.12. 150 Ex. in Kleßheim in Bäumen sitzend (J. Machart). Am 8. und 9.12. ernten in Leopoldskronmoos, Richard-Berndl-Straße, ca. 200 Ex. an Büschen des Gemeinen Schneeballs alle Beeren ab (Russmann), von 9. bis 11.12. sammeln sich jeweils mehr als 100 Ex. in einer Fichte in der Eichethofsiedlung, Fischhornstraße (E. Wagner), am 30.12. ein Schwarm von mindestens 14 Ex. in Seekirchen (H. Worlicek). Im Dezember in Salzburg, in der Hellbrunner Allee mind. 150 Ex. (J. Habsburg-Lothringen), am 31.12. bei St. Johann, Ureiting, Salzachpromenade ein einzelnes Ex. (N. Ramsauer)



Seidenschwanz am 30.12. in Seekirchen (Foto: H. Worlicek).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): 2.1. Faistenau Weissenbach 1 Ex., 29.1. Maria Alm, Unternberg 1 singt (J. Robl), 24.2. Thalgau, Brunnbach 2 Ex. (W. Köhler), 28.2. Lenzing, Stößen 2 Ex., 2.3. Maria Alm, Unternberg 2 Ex. (J. Robl), 21.4. Salzach, rechtsufrig nahe Staatsbrücke 1 Ex. (S. Frühwirth), 15.5. Salzach nahe Nonntaler Brücke 1 Ex. (C. Pichler), 4.5. Neumarkt, Pfongauer Bach bei Diesenberg 1 Ex. (Ch. Medicus), 21.6. St. Michael, Murbrücke Nest (W. Kommik, H. Gressel), 29.6. 1 Ex. in Grödig, Königseeache (U. Wiesniewski).

Butnachweise: 2008 Brut in St. Martin, Murbrücke (W. Kommik), 4.7. 2 ad. und 1 juv im Wengergraben, Pfarrwerfen (G. Friese), 12.7. 1 Ex. mit Futter in 1750m im Wildgerlostal (N. Winding), 20.7. Tweng, Taurach 2 Ex. (H. Gressel), 19.8. 1 Ex. im ESG Tauglgries (S. Stadler).

Zaunkönig (*Nannus troglodytes*): Am Rand des Weidmooses am 28.6. 1 ad. mit 2 juv. (H. Höfelmaier), am 12.7. 1 Familie mit flüggen juv. in Krimml, Wildgerlostal (N. Winding), 24.7. Nestfund im Krummtal (N. Ramsauer). Brutzeitbeobachtungen aus Maria Alm, Saalfelden (J. Robl), Neumarkt, Aubachtal, Klausbachtal Seeleiten, Goldene Kutsche, Wenger Moor u. a. (Ch. Medicus)

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*): 6.3. 1 Ex. in Itzling (E. Sinn), 8.3. 1 Ex. bei Futterplatz in Maria Alm, Unterberg (J. Robl), 25.3. 1 Ex. bei Fütterung in Bruck (K. Schwaiger) – 14.4. Wagrain, Aufstieg zum Wagrainer Haus 10 Ex. singend (J. Machart). 2 Reviere am 21.4. im Weidmoos (PÜHRINGER et al. 2008). 10.6. Flachauwinkel, Dachebenalm 2 M singen, 12.7. Wildgerlostal 1 singt in 2090 m (N. Ramsauer), 30.7. Erichhütte Richtung Birgkarscharte mehr als 2 Ex. (S. Stadler). Weitere Brutzeitbeobachtungen vom Hundsfeld (H. Gressel), Neumarkt: Wenger Moor, Marieninsel, Aubachtal, Goldene Kutsche, Kolomanstaferl, Stubachtal, Gaulmösl (Ch. Medicus).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*): Am 26. und 28.1. je 1 ad. Ex. auf der Festung Hohensalzburg (E. Sinn). Beim Archehof Vorderploin in Goldegg/Weng erscheinen Alpenbraunellen nur an sehr stürmischen Wintertagen, so am 2.1. ein M und am 26.3. ein bereits 2003 beringter Vogel (A. Aichhorn). - Brutzeit: 12.7. Wildgerlostal: Wildgerlosseen 1 M singend, Aufstieg zur Keeskarscharte 13 Ex. davon 3 M singend, 1 Ex. mit Nistmaterial (A. Wegscheider), 27.7. Scheffau am Tennengebirge, Schwere-Fuß 1 Ex. (M. Uphues). – Winterbeobachtungen: 26. und 28.1. je 1 ad. Ex. auf der Festung Hohensalzburg (E. Sinn), 31.12. Nockstein-Gipfel 2 Ex. (P. Gros).

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*): Erster Gesang in Goldegg, Weng am 25.2. (A. Aichhorn). Am 18.6. Neumarkt, Neufahrn flügge juv. (I. Wawra).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 20.5. Lamprechthausen 1 M sang nachts in Gärten und konnte bis zum 27.5. immer wieder gehört werden (W. Trattler).

Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*): Im Weidmoos ist der Bestand mit 15 bis 16 Revieren entlang des untersuchten Transekts mit den Ergebnissen aus 2006 (13-15 Rev.) bei gleicher Erhebungsmethode vergleichbar (PÜHRINGER et al. 2009). Erstbeobachtung: am 30.3. 2 singende M, letzte Beobachtung am 31.8. ein M singend und Verfolgungsjagd mit zweitem Ex. (H. Höfelmaier). Am 18.4. Seekirchen beim Strandbad ein singendes M und ein W (H. Wagner), im ESG Bürmooser Moor am 12.5. 3 Ex. (E. Stüber).

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*): Im Jahr 2008 etwa 11 Reviere im Hundsfeldmoor, Obertauern. Am 26.5. singt

erstmal ein M auf der Körner Höhe, im Juli 5 juv. (J. & T. Kohl) und 1 juv. am 20.7. (H. Gressel)

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Am 23.3. erste Beobachtung im Weidmoos (H. Höfelmaier), am 28.3. reger Durchzug in Salzburg an der Salzach (R. Lindner). Ankunft in Goldegg/Weng 2008 erst am 10.4., sonst viel früher (A. Aichhorn). 28.6. futtertragend in Neumarkt, Wierer (Ch. Medicus), 12.7. Krimml, Wildgerlostal, 1780 m 1 ad. füttert juv. (N. Winding). 2008 in der Umgebung von Maria Alm mehr als 15 Reviere festgestellt, am 9.6. und 16.7. Nestlinge (J. Robl).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): Am 18.4. kam ein M in Goldegg/Weng, Vorderploin an und sang unentwegt, es erschien aber kein W, das M zog Ende Juni erfolglos ab (A. Aichhorn). Am 12.5. 1 singendes M in Lieferung, am 15.5. 1 singendes M in Golling/Obergäu (J. Machart). Am 14.5. bei Henndorf/Berg und Neumarkt/Sommerholz je 1 singendes Ex. (H. Pischel), 20.4. Maria Alm, Schinking 1 M singend, 30.4. Saalfelden, Markt 1 M singend (J. Robl), 30.4. bis Ende August 1 Brutpaar am Ortsrand St. Michael mit erfolgreicher Brut in Nistkasten, am 9.5. 3 M in St. Michael (W. Kommik), in Leopoldskron-Moos, R.-Berndl-Straße Brut unter Dachvorsprung, am 25.5. letztmalig Bettelrufe gehört, Brut wegen Ausbleiben des allein fütternden Weibchens erfolglos (Ch. Medicus); 17.6. 1 futtertragendes M. in St. Veit (N. Ramsauer). - Herbstzug: 26.9. Strubklamm 1 M immat. Totfund auf Straße (M. Kyek), 28.9. Salzburg Maxglan 1 W (S. Stadler)

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): 1 W am 9.5. im Weidmoos, 10 Ex. am 11.5. in frisch gemähter Mähwiese in Holzhausen (H. Höfelmaier, F. Gramlinger). Am 10.5. 8 Ex. am Südrand des NSG Zeller See-Südufer auf Zaun und am 1.6. in Bruck an der Glocknerstraße Richtung Pichldorf 2 Ex. auf Stacheldrahtzaun (K. Schwaiger), am 5.6. im NSG Blinkingmoos 2 M, 1 W (J. & G. Parker) und am 17.6. in Sportgastein, Nassfeld 1600 m 2 Ex. (J. Naglmayr). 21.6. St. Michael, W Mur: mind. 5-6 Reviere: ad. füttern teilweise schon flügge juv. Lonka-Mäander E St. Rupert: 1 M singt (W. Kommik, Ch. Medicus). 29.8. Salzburg, Glanhofen mind. 4 Ex. sitzen auf Flughafenumzäunung (S. Stadler), 6 Ex. am 31.8. und 1 diesj. Ex. am 5.9. südlich des Weidmooses (H. Höfelmaier), 15.9. Bischofshofen, Kreuzbergmaut 1 Ex. auf Pfosten sitzend (M. Kyek)

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): Frühjahrszug: am 15.3. im NSG Zeller See-Südufer 3 M und 1 W (J. Robl). Am 28.3. an der Salzach zw. Nonntaler Brücke und Müllner Steg 1 M und 1 W (R. Lindner). - Brutzeit: Am 24.5. 1 Paar in Kleßheim im NW der Tourismusschule an Ackerrand mit einzelnen Büschen Futter suchend. Am 1.6. 1 Paar im NSG Blinkingmoos, Wolfgangsee (Ch. & R. Medicus). Im Weidmoos 2008 kein einziger Nachweis - als Brutvogel wieder verschwunden (PÜHRINGER et al. 2008)!

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): Frühjahrsdurchzug: 1 W am 4.4. auf einem Grenzpflock nahe Parkplatz S Weidmoos (H. Höfelmaier). Am 20.4. nach Kälteeinbruch zwischen St. Michael und St. Margarethen 15 Ex. (W. Kommik). - Brutzeit:

12.7. Wildgerlostal, Weg zur Keeskarscharte 4 singende M (A. Wegscheider). Nach Wettersturz mit Schnee bis 1800 m am 23.7. 1 M auf Misthaufen am Südrand des NSG Zeller See-Südufer (K. Schwaiger). 26.7. Rauris, Ritterkar 1 Familienverband (N. Ramsauer), 6.8. 1 Ex. beim oberen Landawirsee, Lungau (S. Stadler). - 26.9. Salzburg, Glanhofen 1 Ex. (S. Stadler)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 18.4. Wagrain, Grafenbergalm 10 Ex. (J. Machart), 13.5. Neumarkt, Kollmannsroid 1 Ex. (A. Wegscheider), 17.5. Strobl, Niedergadenalm 1 singt, 2 Ex. (S. Stadler), 9.6. Tauglboden, Tuschenriedel 1 Ex. (M. Uphues), 5.7. Obertauern, Hundsfeld mehr als 3 Ex. (K. Feuchter).

Amsel (*Turdus merula*): Am 15.1. erstmals Gesang um 6.30 Uhr in Maxglan (S. Stadler), am 17.1. in Strobl, Weißenbach 1 Teilalbino (Kopf rein weiß, teilweise noch Vorderrücken weiß) bei Futterstelle (Schallaböck), 20.1. Salzburg, Itzling 1 M singt, am 19.2. erster Gesang in Goldegg, Weng (A. Aichhorn). 21.4. Salzburg Lieferung 1 Nest in Berberitze (E. Sinn). 19.5. 1 M Teilalbino mit fast weißem Kopf in Salzburg, Zwergelgarten (W. Wagner), 17.12. 1 M singt in Salzburg, Maxglan (S. Stadler).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): Im Weidmoos nur außerhalb der Brutzeit von 23.2. bis 2.4. (max. 100-120 Ex. überfliegend am 2.4.) und von 5.9. bis 15.11. beobachtet (max. 11 am 7.11.; H. Höfelmaier, M. Schweichhart, F. Gramlinger). Am 12.4. in ESG Wenger Moor Schwarm von ca. 30 Ex. (Ch. Medicus). - Brutzeit: 20.4. Saalfelden, Rain 7 Ex. und je 1 Ex. bei Maria Alm, Almdorf u. Hinterreit (J. Robl), 1.6. Gschwendter Wiesen/ Wolfgangsee 3 Ex. (Ch. & R. Medicus), 16.6. Hochfilzener Moor 2 Ex. (W. Gstader), 21.6. St. Michael Golfplatz futtersuchende Ex. und flügge juv werden gefüttert (W. Kommik),

Singdrossel (*Turdus philomelos*): Erster Gesang am 15.3. bei Maria Alm, Schlossberg (J. Robl). Ankunft in Goldegg/Weng am 16.3. (A. Aichhorn). 1 M singt am 5.4. in einem Garten in Salzburg, H. Lönsstraße in Fichtengruppe (Ch. Medicus). Am 30.4. ein brütendes Ex. bei Sighartstein/Wertheim, ebenda am 1.6. flügge Junge (I. Wawa)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): Im Weidmoos am 23.3. mehr als 10 Ex. unter Wacholderdrosseln (H. Höfelmaier), am 31.3. ca. 30 Ex. ebenda (PÜHRINGER et al 2009). - 30.11. Niederalm, Achenpromenade 6 Ex. (K. Feuchter). Am 25.11. in der Achartinger Au 8 Ex. futtersuchend (E. Sinn).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Am 24.6. flügge Junge bei Neumarkt, Wiedweng (I. Wawra), 12.7. flügge juv. im Wildgerlostal (Ch. Medicus).

Feldschwirl (*Locustella naevia*): Weidmoos: 2008 nur 2-3 Revieren, ein enormer Bestandseinbruch im Vergleich zu den Vorjahren (2005: 18 Rev., 2006: 14 Rev., 2007: 23-25 Rev.) (PÜHRINGER et al 2009)!

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Im Weidmoos am 21.4. 1 singendes M (PÜHRINGER et al. 2009).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): Häufigster Singvogel im Weidmoos mit ca. 45

Revieren. Der einzige Brutnachweis gelang H. Höfelmaier am 6.7., 1 Paar fütterte im Südteil 4 Junge (PÜHRINGER et al. 2009). Am 15.6. 1 M singt in Salzburg, Gneis (Ch. Medicus), 16.6. Hochfilzener Moor 1-2 singend (W. Gstader), 21.6. 3 singende M im NSG Zeller See-Südufer (J. Robl).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): Im Weidmoos häufiger Brutvogel der Schilfflächen mit 16-17 Revieren entlang des untersuchten Transekts (PÜHRINGER et al. 2009).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): Je 1 singendes M am 22.5., 5.6. und 8.6. im Südteil des Weidmooses (H. Höfelmaier).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): 13.5. Salzburg, Leopoldskron-Moos 1 Ex. am Durchzug singend, später nicht mehr hier gehört (Ch. Medicus), 5.6. Wolfgangsee, Blinkingmoos 3 singende M (J. Parker), 5.6. Bruck/Glocknerstr. 1 singendes M (K. Schwaiger), 10.6. Saalfelden, Rain 1 M singend (J. Robl)

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): am 26.4. 1 Ex. in der Lieferinger Au (E. Sinn). Ein Nahrung suchender Durchzügler am 9.5. im Weidmoos (H. Höfelmaier). - Brutzeitbeobachtungen: 30.6. 1 M singt in Salzburg, H. Löns-Gasse (Ch. Medicus), 29.7. Bruck an der Glocknerstraße mehrere Ex. (K. Schwaiger), 30.7. Uttendorf, Tauernmoossee S 1 Ex. (Ch. Medicus)

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): Am 1.5. in Salzburg, Tauxgasse 1 Ex. am Durchzug (H. Gressel), 15.5. Neumarkt am Wallersee, Ulbering 1 M singend (E. Stüber)

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): Im Weidmoos 2008 6 Reviere in gehölzdominierten Bereichen (PÜHRINGER et al. 2009). Brutzeitbeobachtungen aus dem ESG Wenger Moor, vom Aubachtal, Gemeinde Neumarkt (Ch. Medicus), dem NSG Zeller See-Südufer, aus Maria Alm (Rain, Unterberg und Schinking). Am 17.7. 2 juv. in Maria Alm Unterberg beringt (J. Robl).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): 14.5. Neumarkt, Nähe Sighartstein 1 Ex. brütend (H. Pischel), 29.7. Salzburg, Itzling: 1 Paar füttert Nestlinge in Weigelie (E. Sinn)

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*): Am 28.5. 5 M im Nocksteingebiet singend (J. Machart)

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*): 20.4. Maria Alm, Kohlreit 1 M singt (J. Robl), 17.5. in Strobl, Niedergadenalm 1 M singt in Laubwald (S. Stadler), 4.5. Neumarkt, Holzmann, 12.5. Neumarkt, Klausbachtal je 1 singt, 17.5. Puch, Filind 2 singend (Ch. Medicus, S. Unterberger), 28.5. im Nocksteingebiet 1 M singend (J. Machart).

Zilpzalp (*Phylloscopus collypita*): Früheste Beobachtungen 2008 am 22.3. im Weidmoos 1 Ex. (H. Höfelmaier), am 23.3. in Neufahrn (W. Petz), am 29.3. in Goldegg/Weng in 1074 m (A. Aichhorn) und am 31.3. bei Maria Alm, Unterberg (J. Robl). Am 28.4. in Neumarkt bei Kollmannsroid mit Nistmaterial (I. Wawra.). Im Weidmoos häufiger Brutvogel mit allein am 21.4. (zur Hauptgesangszeit der Art) 35 Revieren (PÜHRINGER et al 2009)!

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): Erste Beobachtung: 5.4. 1 Ex. singend im Weidmoos (H. Höfelmaier). Neben Sumpfrohsänger und Blaukehlchen "der" Charaktervogel des Weidmooses: im April 38 singende M, im Mai 26 singende M. Brutnachweis am 26.5. durch die Beobachtung eines futtertragenden Altvogels (PÜHRINGER et al. 2009, H. Höfelmaier). Am 16.6. ein Familienverband mit flüggen noch unselbständigen Jungen im Hochfilzener Moor (W. Gstader).

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*): Zwischen 6. und 9.2. 1 Ex. bei Futtersäckchen in Itzling (E. Sinn). - Erster Gesang in Goldegg, Weng am 24.2. (A. Aichhorn). Brutzeitbeobachtungen von Neumarkt bei Diesenberg und Kollmannsroid (A. Wegscheider), von Wagrain, Grafenbergalm (H. Machart). - Ein Ex. flog am 14.11. in Hallein gegen eine Fensterscheibe, erholte sich wieder und konnte nach einer Stunde abfliegen (O. Stöhr).



Wintergoldhähnchen am 14.11. in Hallein (Foto O. Stöhr)

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*): Am 19.8. südlich Neumarkt, Haslach 26 Ex. (I. Wawra)

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): 31.5. 1 M singend im ESG Wenger Moor, 1.7. Neufahrn, Gelege unter Carport wird bebrütet (W. Petz), 16.7. Bruck/Glocknerstraße 1 Paar mit 3 juv. (K. Schwaiger), 31.7. Leopoldskron-Moos 1 Paar füttert mind. 2 eben flügge juv. (Ch. Medicus). Am 27.7. 2 Ex., am 17.8. 5 Ex. (Familienverband), Brutzeitbeobachtungen ferner aus Lintsching und Pischelsdorf im Lungau (A. Rega). - Herbstzug: 5.9. 1 Ex. im Weidmoos (H. Höfelmaier), 20.9. Leopoldskron-Moos 1 Ex. bei Ansitzjagd (Ch. Medicus), 27.9. Rauchenbichl 1 Ex. (H. & A. Sutter), 28.9. Oberndorf, Salzach 2 Ex. (E. Sinn).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*): Frühjahrszug: 1 W am 25.4. in Salzburg, Leopoldskron-Moos in Garten, 1 Ex. am 26.4. im Wenger Moor (Ch. Medicus). - Herbstdurchzug: Je 1 Ex. im Weidmoos am 24.8. und 19.9. (H. Höfelmaier). 17.9. in Salzburg Maxglan 1 graues Ex. (S. Stadler), 20.9. Salzburg, Leopoldskron-Moos 1 Ex. (Ch. Medicus).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*): Am 12.1. 10 Ex. am Wallerbach im ESG Wenger Moor (Ch. Medicus), 16.2. Oichtenriede bei Thalhausen ca. 20 Ex. (J. Buchmayr). - 16.3. 3 Paare, eines Nistmaterial suchend in Untereching, Salzachau (E. Sinn), 16.5. Lieferinger Au ein Nest in Esche, ca. 20

m hoch, wird mehrfach angefliegen (E: Sinn), 16.6. Hochfilzener Moor 1 Familie (W. Gstader), 27.6. 12 Ex. bei Bruck, Salzachböschung (K. Schwaiger).

Sumpfmeise (*Parus palustris*): 5.4. Salzburg, Leopoldskroner Allee 1 Ex. bei Bruthöhle (H. Gressel, Ch. Medicus), 12.4. Neumarkt, Seeleiten 1 Paar, ein Ex. davon schlüpft in hohlen Aststumpf von Rotbuche (Ch. Medicus), 23.8. in Koppl, Spechten-schmiede 1 Ex. (S. Stadler).

Weidenmeise (*Parus montanus*): Erster Gesang am 7.2. in Goldegg, Weng (A. Aichhorn). 1.5. Neumarkt südlich Aring 1 Nest mit Jungen (I. Wawra), 12.5. 1 ruft in Fichtenbestand in Neumarkt, Klausbachtal (Ch. Medicus), 21.6. 1 Familie mit flüggen juv. in Weißpriach, Lonka-Mäander-Gebiet (W. Kommik, Ch. Medicus), 6.8. 1 Ex. im Göriachtal, Vd. Zugriegelalm (S. Stadler)

Haubenmeise (*Parus cristatus*): 28.2. 1 Ex. beim Königswäldchen in Leopoldskron (Ch. Medicus). Am 10.3. 1 Ex. beim Höhlenbau in Goldegg, Weng (1074 m) (A. Aichhorn). Brutzeitbeobachtungen: Krimml, Wildgerlostal 1 ruft am 12.7. in 1950 m (N. Ramsauer), Neumarkt Klausbachtal und Sommerholz (Ch. Medicus).

Blaumeise (*Parus caeruleus*): 5.4. 1 Ex. schlüpft mit Nistmaterial in Straßenlaterne am Almkanal, Donnenbergpark (H. Gressel, Ch. Medicus), 31.5. ESG Wenger Moor 2 ad füttern an Bruthöhle in Esche in Wallerbachau (Ch. Medicus)

Tannenmeise (*Parus ater*): Wildgerlostal, Leitenkammerklamm 3 flügge juv (Ch. Medicus), Finkau mehr als 5 juv. (N. Ramsauer).

Kohlmeise (*Parus major*): Bereits am 14.1. erster Gesang in Goldegg, Weng (A. Aichhorn). 14.4. bei Neumarkt, Lengroid brütend, Neumarkt: 1.6. bei Sighartstein flügge juv., Schalkham am 10.6. flügge Junge, am 17.6. Nest mit Jungen (I. Wawra). 28.5. Maria Alm, Unterberg 8 juv. in Nistkasten (J. Robl), 12.7. Wildgerlostal, Ghf. Finkau, ad. füttern juv., Gebäudebrut (Ch. Medicus)

Kleiber (*Sitta europaea*): Salzburg, Königswäldchen: 1 Ex. polstert am 5.4. seine Bruthöhle mit Rindenstückchen aus (Ch. Medicus, H. Gressel), Neumarkt: 14.4. bei Sighartstein brütend (I. Wawra), 20.4. im ESG Wenger Moor 1 Paar mit Nistmaterial (Ch. Medicus).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*): Winterbeobachtungen: 24.2. St. Gilgen Zwölferhorn 1 Ex. (E. Sinn), 1 Ex. am 1.3. in Hofgastein Wieden am Haus (J. Naglmayr), 20.3. 1 Ex. oberhalb Grubachstraße nahe Mahdhiasl (R. Scheck), 22.3. 1 Ex. bei Annaberg (J. Machart). - Brutzeit: 12.5. Nassfeld bei Bärenfall, 1500 m 1 Ex. (J. Naglmayr), 22.6. Untersberg, Dopplerwand in 1800 m 1 Ex., 2.7. Hoher Göll Salzburger Kamin/Schusterweg, 2300 m 1 Ex. (M Uphues), 5.7. Göriach, 2300 m 1 Ex. (W. Kommik). Beim Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2008 konnten am 12.7. im Wildgerlostal 3 Reviere festgestellt werden: in 1800 m 1 Ex. füttern bei Nest in Felswand E Weißkar (N. Winding), in ca. 2200 m im Ankenkar 1 Ex. einen wahrscheinlichen Nistplatz aufsuchend (H. Ackerl), in Felswand im Trogtalschluss (Aufstieg Keeskarscharte) 1 Ex. (A. Wegscheider, vgl. dazu auch

GROS et al. 2009). 24.7. 1 Ex. in Rauris, Krumltal (N. Ramsauer).

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*): Erster Gesang am 22.3. in Goldegg, Weng (A. Aichhorn). Brutnachweis in Puch, Kirchenwirtschwald in einer von Sepp Unterberger entwickelten Nisthilfe, und zwar unter einem langen Rindenstück, das er an einem Baumstamm anliegend befestigt hatte: 6.4. Nestbau, 17.4. ad. brütend, 5. und 11.5. ad. füttern 5 juv., 12.5. juv. ausgeflogen. Am 29.6. füttert 1 ad. in Forstau, Winkl hinter einem alten Fensterladen an Almhütte (S. Kocher). 12.7. mehrere Ex. in Krimml, Wildgerlostal (N. Winding, N. Ramsauer).



Waldbaumläufer futtertragend an Hüttenwand (Foto: S. Kocher)

Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*): Brutzeitbeobachtungen von Salzburg, Leopoldskron, Lieferinger Au, Untereching, Salzachtreppe (Ch. Medicus, E. Sinn). Am 11.4. und 12.5. in St. Veit in ca. 700 m singend, erstmals hier Brutverdacht (N. Ramsauer).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): 18.4. 4 Ex. im ESG Weidmoos (E. Stüber)

Pirol (*Oriolus oriolus*): Zur Brutzeit, am 8.8. in der Salzachau bei Weitwörth, nahe „Oberau“ singend (M. Kyek), am 16.5. in der Lieferinger Au 1 Ex. (E. Sinn). - Ein weibchenfärbiges Ex. am 14.8. im Weidmoos durchziehend. (H. Höfelmaier, M. Schweichhart).

Neuntöter (*Lanius collurio*): 29.5. Neumarkt am Wallersee 1 M (H. Pischel), 10.6. Maria Alm, Hangleiten 1 W, 21.6. NSG Zeller See-Südufer 2 M Revierkampf (J. Robl), 1 M bei Steindorf in Hecke in Rest von Blockflur (W. Kommik, Ch. Medicus u. a.). 16.7. Radstadt, Dechantswiese 1 M singend (N. Ramsauer), 17.7. NSG Zeller See, Südrand 1 M auf Misthaufen (K. Schwaiger), am 27.7. 1 M auf Sitzwarte im Weidmoos (H. Höfelmaier), 28.7. St. Michael, am Rand des Golfplatzes 1 Paar mit 2 Jungen auf Reisighaufen (W. Kommik), 28.7. 1 M in der Salzachau beim neuen Feuchtgebiet „Oberau“ (M. Kyek). 2008 bei Goldegg/Weng, Vorderpöln in Gebüsch brütend (A. Aichhorn).

Raubwürger (*Lanius excubitor*): Zwischen 6.1. und 30.3. und von 6.10. bis 27.10. je 1 Ex. im Weidmoos, am 18.10. 2 Ex. beobachtet (H. Höfelmaier, F. Gramlinger, M. Schweichhart).

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*): 17.3. 1 Paar beim Nestbau in der Michael-Pacher-Straße in Salzburg (S. Stadler), 12.4. ESG Wenger Moor 2 Paare balzend: verschiedene rollende u. klickende Laute (Ch. Medicus), im Juli 2008 2 Jungvögel in Grödig, Buchbichl (U. Wiesniewski).

Elster (*Pica pica*): 13.2. Salzburg, Tauxgasse 9 Ex. in Birke (H. Gressel). 16.3. Zeller See 1 Ex. (J. Robl). Am 3.4. 1 Ex. in St. Veit, hier bislang aber kein Brutvogel (N. Ramsauer). Am 31.5. 1 Nest in Pappel in Neumarkt, Maierhof (Ch. Medicus), Brutzeitbeobachtungen von Neumarkt, Neufahrn und Wenger Moor (W. Petz). Im Juli je 1 Ex. im Weißpriachtal, Unternberg bis Pischelsdorf und bei St. Margarethen (A. Rega).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): Neumarkt, östlich Sighartstein 1 Ex. am 28.4. (I. Wawra). In Krimml, Wildgerlostal am 12.7. 2 flügge Jungvögel (N. Winding).

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*): 17.2. Untersberg, Gebirgsjägerdenkmal ca. 20 Ex. sitzen beim Jausnen auf Kopf und Knien und fressen aus der Hand (G. Jäger), 13.3. Mittersill, Nationalparkzentrum 80 bis 90 Ex. (S. Stadler). 15.6. Schafberg, Himmelspforte 3 Ex. (O. Stöhr), 9.7. 10 Ex. bei Fuscher Lacke (A. Rega), 12.7. Krimml, Wildgerlostal 10 Ex. (N. Winding), 24.7. Rauris, Rohrmooser Alm 6 Ex. (ad. mit flüggen juv.) (N. Ramsauer), 30.7. Taghaube ca. 6 Ex. (S. Stadler).

Dohle (*Corvus monedula*): Am 7.1. fliegen abends ca. 300 Ex. hektisch rufend vom Schlafplatz in Salzburg, Glanhofen auf, verfolgt von einem großen Vogel (vermutlich ein Uhu) (S. Stadler). Am 8.2. Salzburg, Tauxgasse 12 Ex. in Nussbaum (H. Gressel), am 24.2. abends in Leopoldskron-Moos 25 bis 30 Ex. nach Westen überfliegend (Ch. Medicus), 22 Ex. am 16.3. bei St. Georgen/ Eching rastend (E. Sinn), am 17.3. mehr als 100 Ex. beim Corviden-Schlafplatz in Glanhofen (S. Stadler), am 5.4. mehr als 5 Ex. in den St. Peter Wiesen (H. Gressel, Ch. Medicus), 2 Ex. überfliegen das Weidmoos am 21.4. (PÜHRINGER et al. 2009), ca. 30 Ex. sind am 24.4. in der Achartinger Au (E. Sinn). - Brutzeitbeobachtungen von bis zu 15 Ex. aus der Gemeinde Neumarkt von Wiedweg, Seeleiten, Holzmann, Diesenberg und Schalkham (A. Wegscheider, W. Petz, Ch. Medicus). Am 31.3. trägt 1 Paar Nistmaterial bei der Stiftskirche Mattsee ein, am 1.6. Brutnachweis am Buchberg bei Mattsee (W. Köhler). Am 4. und 5.5. jeweils 1 Ex. in St. Johann im Flug (N. Ramsauer).

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*): 6.1. zwischen Anif und Grödig ca. 100 Ex. (I. Althaler), 17.3. Salzburg, Glanhofen mind. 500 Ex. bei Schlafplatz (S. Stadler). - Am 9.2. 1 Ex. mit Nistmaterial bei Goldegg, Weng (A. Aichhorn), 21.6. Mariapfarr, Lonka-Mäander 1 besetzter Horst in Fichte in ca. 10 m Höhe (W. Kommik, Ch. Medicus), 22.6. Maria Alm, Unternberg 2 ad. füttern 2 juv. (J. Robl). Am 22.7. im Wirtschaftsgrünland bei Lintsching 50 Ex., zwischen Pischelsdorf und Unternberg 40 Ex., am 24.7. bei Tamsweg 70 Ex. (A. Rega), 12.7. Wildgerlostal, Trisslalm 1 Paar in Almwiese futtersuchend (Ch. Medicus).

Kolkrabe (*Corvus corax*): Am 20.1. in Fuschl, Elmaustein 1 Ex. (W. Köhler); Brutzeit: am 12.5. in Neumarkt, Klausbachtal 3-4 Ex. (Ch. Medicus), am 28.5. am Nocksstein 1 Ex. (J. Machart). - In Fuschl, Weichselbachtal am 6.11. 2 Ex. (H. Hinterstoisser).

Star (*Sturnus vulgaris*): Erstbeobachtung im Weidmoos am 8.2. 120 Ex. (H. Höfelmaier). In Saalfelden Obsmarkt am 29.2. 1 Ex. bei der Fütterung (J. Robl). Am 8.3. im Weidmoos mind. 1000 Ex., am 12.3. ca. 5000 Ex. am Durchzug (H. Höfelmaier). Ankunft in Goldegg/Weng in 1074 m am 4.4. (A. Aichhorn). - Bereits am 15.5. 100 bis 200 Ex. im Weidmoos beim Schlafplatzanflug im Schilf, am 25.5. schon mind. 1000 Ex. beim Schlafplatzanflug. Am 1.6. östlich von Sighartstein 50 Ex. (I. Wawra), am 28.6. Neumarkt, Wierer ein Schwarm von ca. 70 Ex. auf Kirschbaum (Ch. Medicus). - Herbstzug: 11.9. NSG Zeller See-Südufer ca. 200 Ex. nahrungssuchend (J. Robl), 4.10. Puch mind. 100 Ex. (H. Hinterstoisser). Im Spätherbst waren im Weidmoos am 5.11. wieder 100 bis 150 am Schlafplatz, die Letzt-Beobachtung waren 3 überfliegende Ex. am 27.11. (H. Höfelmaier)

Haussperling (*Passer domesticus*): Brutnachweise 2008 im Puch (H. Hinterstoisser) zur Brutzeit in Maria Alm (Almdorf und Schinking) und Saalfelden, Rain (J. Robl), sowie in Neumarkt und Köstendorf (Ch. Medicus). - Im Weidmoos wurde am 27.08. 1 Ex. von J. Parker mit einem Japannetz gefangen und beringt (PÜHRINGER et al. 2009)

Feldsperling (*Passer montanus*): Brutzeitbeobachtungen: 20.4. Maria Alm, Almdorf 3 Ex. (J. Robl), 23.5. 2 Ex. in der Lieferinger Au, bei Stallungen der Trabrennbahn (E. Sinn), 20.4. in Köstendorf, Weng und Neumarkt Edhof (Ch. Medicus), 13.5. in Neumarkt in Kollmannsroid und Diesenberg (A. Wegscheider), 15.6. 2. Brut in Nistkasten in Leopoldskron-Moos wird gefüttert (Ch. Medicus), 21.6. bei St. Michael im Lungau (W. Kommik), 25.7. 10 Ex. bei St. Margarethen/Lungau (A. Rega). - 16. und 23.11. St. Veit 2 Ex. bei Futterhaus (N. Ramsauer).

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*): 12.7. Wildgerlostal, Keeskarscharte, 2300 m 10 Ex. (A. Wegscheider). 25.7. je 1 Ex. in Rauris Mitterastental und Badgastein Kalkbretterkopf, 26.7. 1 Ex. in Rauris, Ritterkar (N. Ramsauer). 2008 7 Ex. beim Arthurhaus/Hochkönig beringt (A. Aichhorn), 55 Ex. An der Glocknerstraße beringt (J. Parker, R. Lindner).

Buchfink (*Fringilla coelebs*): Am 21.2. erster stümperhafter Gesang, viel schöner am 25.2. bei Goldegg, Weng (A. Aichhorn). 23.5. 1 Nest mit Jungen in ca. 8 m Höhe in Erle in der Lieferinger Au (E. Sinn), am 21.6. füttert ein M ein flügges juv. in St. Michael, nahe Mur (W. Kommik, H. Gressel).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Nach Wintereinbruch am 3.3. in Bruck/Glocknerstr. ca. 50 Ex. Im Garten (K. Schwaiger), am 4.3. in Leopoldskron > 150 Ex. (4 Trupps) (S. Stadler), am 5.3. in Kuchl, Garnei mind. 50 Ex. an Fütterung (Schönleitner), ca. 15 Ex. bei Fütterung in Leopoldskron-Moos (Ch. Medicus), ca. 100 Ex. bei Fütterung in St. Michael/Lg. (W. Kommik) und am 6.3. 80-90 Ex. im Garten in Itzling (E. Sinn). Am 18.3. in

Neufahrn 30 Ex. (W. Petz), am 20.3. in Seeham/Innerwall ca. 50 Ex. bei Schneesturm an Fütterung (K. Messerer), am 24.3. ein Schwarm von ca. 200 Ex. bei Goldegg/Weng (A. Aichhorn), am 26.3. in Itzling 6 Ex. (E. Sinn) und am 3.4. noch ca. 50 Ex. in Maxglan (M. Bernhard) und ca. 70 Ex. in Puch bei Fütterung (S. Unterberger). Am 20.4. noch 1 W im ESG Wenger Moor (Ch. Medicus). Im Lungau täglich am Futterhaus bis 22.4. (W. Kommik). - Herbst: Erste Beobachtungen am 19.10 1 W in der Taugasse (H. Gressel), am 27.10. in Itzling 1 Ex. (E. Sinn) und am 28.10. in Seekirchen 80 Ex. (H. Wagner. Erste Sichtung im Lungau/St. Michael am 6.11. (W. Kommik).

Girlitz (*Serinus serinus*): Am 24.4. in Salzburg, Nissenstraße erstmals singen gehört (Ch. Medicus), 27.5. Lieferinger Au 1 singt (E. Sinn), 14. und 29.5. bei Neumarkt, Sommerholz (H. Pischel), 25.5. Twenger Au 2 singend (H. Gressel), 25.7. 1 Ex. bei Tamsweg, Lasaberg (A. Rega).

Zitronengirlitz (*Serinus citrinella*): beim Arthurhaus 2008 6 Ex. beobachtet (A. Aichhorn)

Stieglitz (*Carduelis carduelis*): 15.7. 2 ad. und 4 juv. im Hundsfeld, Obertauern (A. Rega)

Grünling (*Carduelis chloris*): 10.3. 1 Paar sammelt Nistmaterial in Neumarkt, Neufahrn (W. Petz).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): 10.6. Flachauwinkel, Dachebenalm mehr als 4 singende M (S. Stadler), 12.7. Krimml, Wildgerlostal 1 M (N. Winding). - 16.11. Zeller See 20 Ex. (J. Robl), 22.11. St. Veit, Salzachufer: Schwarm von 80 Ex. (N. Ramsauer).

Hänfling (*Carduelis cannabina*): 17.6. Badgastein, Nassfeld 1700 m 3 Ex. (J. Naglmayr), 21.6. Obertauern, Hundsfeld 1 Ex. (M. Deutsch-Reitinger), 11.7. bei Tweng, Grobeck 5 Ex. (A. Rega), 30.7. Anstieg Erichhütte Richtung Birgkarscharte 7 Ex. überfliegend (S. Stadler), 12.9. Seekarscharte: Trupp von ca. 10 Ex. Richtung Obertauern überfliegend (S. Stadler).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): 18.4. Wagrain, Aufstieg Grafenbergalm 3 Ex. (J. Machart), 16.6. Hochflizener Moor 1 Ex. (W. Gstader), am 23.6. 1 W mit Kotballen im Hundsfeld, Obertauern (H. Gressel), 25.7. ebenda ca. 25 Ex. (A. Rega), 12.7. Krimml, Wildgerlostal 2 M, 1 Ex. (N. Winding), 30.7. Tauernmoossee/Gaulmösl 1 gebrauchtes Nest in Latsche (Ch. Medicus, H. Gressel).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Am 28. und 29.1. betteln flügge Junge einer Winterbrut laut am Waldrand bei Goldegg/Weng (A. Aichhorn). 18.2. Neumarkt/Hiesenberg 1 M (Ch. Medicus), 14.4. Aufstieg zum Wagrainer Haus 15 Ex. in Schwarm (J. Machart), 17.4. Schwarm nahe Hochwiesalm, Faistenau (H. Wagner), 10.6. Flachauwinkel, Dachebenalm mehr als 3 Ex. (S. Stadler), 15.6. Saalfelden, Metzger Stein Alm (J. Robl), 12.7. Krimml, Wildgerlostal 1 Ex ruft in 2086 m (N. Ramsauer), 12.9. Obertauern, Seekarscharte Trupp von 9 Ex. (S. Stadler), am 3.12. St. Martin/Tennengebirge, in 1600 m am Aufstieg zum Korein 40 Ex. auf Lärchen Samen fressend (J. Machart).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): 31.5. im ESG Wenger Moor, Wallerbachspitz 1 M singend (Ch. Medicus): zweiter Nachweis am Wallersee seit dem Erstnachweis eines vorjährigen M durch K. Mazzucco und Ausobsky im Jahr 1966. 4.6. Zeller See-Südufer 1 M singt (K. Schwaiger), 5.6. Strobl, Blinklingmoos 1 singt (J. Parker), 16.6. Hochfilzener Moor 3 M singend, mindestens 2 davon immatur (W. Gstader). 21.6. NSG Zeller See-Südufer 3 M singend (J. Robl) und St. Michael, Murbrücke W bei St. Martin 1 singt kurz (W. Kommik, Ch. Medicus u.a.).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): 6.1. 1 Paar beim Futterhaus in Salzburg, Tauxgasse (H. Gressel), 17.3. Salzburg Itzling 1 Paar (E. Sinn). – 15.6. Saalfelden, Metzger Stein Alm 1 ruft (J. Robl), 12.7. Wildgerlostal 1 W, 1 ruft (Ch. Medicus), 14.7. 1 M im Hundsfeld, Obertauern (A. Rega), 30.7. 1 Ex. am Weg von der Erichhütte zur Birgkarscharte (S. Stadler). – Herbst: im Weidmoos am 7.11. 1 M und am 22.11. 2 M und 2 W Erlensamen fressend (H. Höfelmaier).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*): St. Veit 2.4. 1 Ex. bei Futterhaus (N. Ramsauer), Neumarkt, Wiedweg 20.4. 1 Ex. (Ch. Medicus), ebenda am 24.6. 1 Ex., 30.4. bei Sighartstein 1 Paar (I. Wawra), beim Weidmoos 1 Ex. am 25.5. (PÜHRINGER et al. 2009).

Goldammer (*Emberiza citrinella*): 6.2. St. Martin/Lungau 10-15 Ex. (A. Wessely). Erster Gesang in Goldegg, Weng am 22.2. (A. Aichhorn). Verbreiteter Brutvogel im Weidmoos: am 23.6. 9 revierhaltende M (PÜHRINGER et al. 2009). Brutzeitbeobachtungen aus Neumarkt am Wallersee (I. Wawra, Ch. Medicus u. a.), aus St. Michael, Pischelsdorf, Thomatal, Weißpriachtal, Saumoos, St. Margarethen (A. Rega), aus der Umgebung Maria Alm etwa 10 Reviere (J. Robl). Am 21.6. 1 M und 1 flügger Jungvogel im Weißpriachtal bei Abaham (W. Kommik, Ch. Medicus).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*): Erste Beobachtung: 30.3. Weidmoos 1 W (H. Höfelmaier). Im Weidmoos 2008 ca. 20 Reviere; am 25.5. 1 futtertragendes Paar (PÜHRINGER et al. 2009). Weitere Brutzeitbeobachtungen vom Wallersee bei Seekirchen und Wenger Moor (H. Wagner, W. Petz), Obertrumer See bei Seeham (R. Lindner) und Blinklingmoos am Wolfgangsee (J. Parker). Am 16.6. im Hochfilzener Moor 1 singendes M (W. Gstader), im NSG Zeller See-Südufer am 21.6. 4 M (J. Robl) und am 16.7. in Radstadt, Dechantswiese 1 M sichernd (N. Ramsauer).

Wissenschaftliche Vogelberingung 2008

2008 wurden von J. PARKER 138 Individuen (80 Nestlinge, 58 Fänglinge) und von J. ROBL 66 Individuen beringt. Insgesamt wurden 204 Vögel von 25 Arten beringt. Ein wichtiger Schwerpunkt war auch 2008 wieder die Beringung von Schneesperlingen im Rahmen des Projektes von R. LINDNER & J. PARKER an der Großglockner Hochalpenstraße.

Vogelart	J. Robl	J. Parker
Waldkauz		1
Eisvogel		1
Mauersegler		3
Rauchschwalbe		11
Gebirgsstelze	2	
Heckenbraunelle		2
Gartengrasmücke	2	
Mönchsgrasmücke	19	8
Zilpzalp	1	8
Fitis	1	2
Teichrohrsänger		6
Blauehlchen Weißstern.		1
Hausrotschwanz	8	17
Rotkehlchen	4	6
Amsel	2	2
Singdrossel	2	2
Blaumeise	2	1
Kohlmeise	19	8
Sumpfmeise		1
Kleiber	1	
Buchfink	1	
Zeisig		1
Goldammer	2	1
Hausperling		1
Schneesperling		55

Tabelle 1 Wissenschaftliche Vogelberingungen im Jahr 2008

Literatur:

AFK - AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION ÖSTERREICH Sitzung vom 29.11.2009, <http://www.birdlife-afk.at/>

PÜHRINGER N., M. BRADER & CH. RAGGER (2009): Ornithologische Erhebung Weidmoos – Bericht 2008. Gutachten i. A. des Amtes d. Salzburger Landesreg. - Abt. Naturschutz, 38 S.

GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS (2009): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2008, 11.-13. Juli 2008 - Wildgerlostal (Salzburg). Ergebnisbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 80 Seiten. - download möglich unter:

http://www.hohetauern.at/dmdocuments/2008_Dateien/Forschung/Projekte/tag_der_artenvielfalt_2008_internet.pdf

RAMSAUER N. (2008): Ergebnisse der Wasservogelzählung 2007/2008 im Land Salzburg. – Salzburger Vogelkundl. Ber. 13: 55-59.

RAMSAUER N. (2009): Ergebnisse der Wasservogelzählung 2008/2009 im Land Salzburg. – Salzburger Vogelkundl. Ber. 14: 28-32.

Anschrift der Verfasser:

Hemma GRESSEL
Tauxgasse 29
5020 Salzburg
hemma.gressel@tele2.at

Mag. Christine MEDICUS
Richard-Berndl-Straße 9
5020 Salzburg
christine.medicus@hausdernatur.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Salzburger Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Medicus Christine, Gressel Hemma

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg 2008 38-59](#)