

der größeren, auf Holz wachsenden Typusform abgetrennt. Ich vermute aber, daß es sich nur um eine belanglose Standortsform handelt, ohne systematischen Wert. Unterschiedlich wird von den Findern der Geschmack beurteilt: Nach Derbsch bitterlich-mehlartig, nach Moser mehlartig, mild bis stark bitter. Kühner erwähnt nur einen Mehlgерuch.

### Literatur

- Derbsch, H. (1954): Pilzfunde auf einem Waldpfad. Z. f. P. 17, S. 9  
 Kreisel, H., Herausgeber (1987): Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik, S. 17  
 Kühner, R. (1953): *Naucoria firma* Peck — *Agrocybe commun* à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Schweiz. Z. f. P. 31: 9–10, S. 145–151  
 Moser, M. (1978): *Fungorum rariorum Icones coloratae VII*, Vaduz

### Kennen Sie sich aus?

Ein Gattungsvergleich im Überblick, Folge 1: Einige „Stachelinge“

(Terrestrische Thelephoraceen mit stacheligem Hymenophor)

Die erdbewohnenden Pilze der Familie Thelephoraceae leben in Ektomykorrhiza mit Laub- und Nadelbäumen auf nährstoffarmen Böden. Sie bilden einjährige Fruchtkörper aus, deren Substanz fleischig, korkig oder lederig ist. Das Hymenophor kann ganz fehlen (Thelephora) oder röhrenförmig (Boletopsis), lamellig-zahnförmig (Lenzitopsis) und stachelförmig (Bankera, Hydnellum, Phellodon, Sarcodon) sein. Die Sporen sind stets ornamentiert (warzig-höckerig-stachelig). Die Gattungen mit stacheligem Hymenophor werden nachstehend synoptisch verglichen.

Gattung	Substanz	Geruch nach Maggi	Farbe der reifen Stacheln	Aufgeblas. Hyphen	Sporenpulver	Sporen	Wachstumsmerkmale
<b>Bankera</b> Stacheling 2 Arten	ungezont zäh- fleischig	+	grau	+	weiß	hyalin kugelig- breit- ellips.	Umwach- sungs- tendenz
<b>Hydnellum</b> Korkstacheling 17 Arten	gezont kork- holzartig	—	purpur- braun	—	braun	bräun- lich Umriß unregel- mäßig	Einschlie- ßungs- tendenz
<b>Phellodon</b> Duftstacheling 4 Arten	gezont faserig zäh holzartig	+	bräun- lich- grau	—	weiß	hyalin kugelig- ellips.	Einschlie- ßungs- tendenz
<b>Sarcodon</b> Stacheling 15 Arten	ungezont brüchig nicht korkartig	—	purpur- braun	+	braun	bräun- lich Umriß unregel- mäßig	Umwach- sungs- tendenz

Bo.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Südwestdeutsche Pilzrundschau](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [24\\_1\\_1988](#)

Autor(en)/Author(s): Bollmann Achim

Artikel/Article: [Kennen Sie sich aus? Ein Gattungsvergleich im Überblick, Folge 1: Einige „Stachelinge“ \(Terrestrische Thelephoraceen mit stacheligem Hymenophor\) 13](#)