

Cortinarien-Funde in Baden-Württemberg

Achim Bollmann, Mainzer Straße 41, 70499 Stuttgart

Teil 1: Bestandsaufnahme bisheriger Funde

In einer Fortsetzungs-Serie möchte ich über die *Cortinarien*-Funde aus Baden-Württemberg berichten, die ich fotografieren konnte. Als Einstieg hier zunächst eine Fundübersicht von 100 Arten. Alle genannten Funde sind durch mindestens ein Farbdiaapositiv meiner Diathek belegt. Aus Platzgründen wird für jede genannte Art nur ein Fundbeispiel angegeben, und zwar mit Jahreszahl : Meßtischblattnummer. Die geklammerte Zahl dahinter gibt zudem die Gesamtzahl der bisher fotografierten Funde aus anderen Jahren und Meßtischblättern von Baden-Württemberg an.

In den späteren Folgen sollen dann einzelne Funde bzw. Fundgruppen ausführlicher diskutiert werden.

<i>C. alboviolaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Weißvioletter D.	92:7321/3	(4)
<i>C. anserinus</i> (Vel.) Henry	Buchen-K.	90:7322/3	(6)
<i>C. anthracinus</i> (Fr.) Fr.	Rotbraunrandiger H.	93:7715/3	(1)
<i>C. aprinus</i> Melot	Wildschwein-G.	90:7322/3	(1)
<i>C. argutus</i> Fr. var. <i>fraudulosus</i>	Spitzbasiger Sk.	91:8016/2	(2)
<i>C. armeniacus</i> (Schff.: Fr.) Fr.	Aprikosen-W.	91:7420/1	(1)
<i>C. atrocaeruleus</i> (Moser) Moser	Schwarzblauer W.	87:7120/4	(1)
<i>C. atrovirens</i> Kalchbr.	Schwarzgrüner K.	90:7817/1	(5)
<i>C. aureofulvus</i> Moser	Goldfuchsiger K.	91:8016/2	(2)
<i>C. aureopulverulentus</i> Moser	Goldstaub-K.	90:7321/3	(1)
<i>C. balteatoclaricolor</i> J. Schäffer	Hellgegürtelter Sk.	92:7420/1	(1)
<i>C. balteatocumatilis</i> Henry ex Orton	Braunvioletter Sk.	91:7321/3	(5)
<i>C. bivelus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Birken-G.	87:7715/3	(1)
<i>C. bolaris</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Rotschuppiger R.	82:7321/3	(1)
<i>C. boudieri</i> Henry	Ockergrauer Buchen-K.	88:7622/1	(1)
<i>C. brunneus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Dunkelbrauner G.	91:7715/4	(3)
<i>C. bulliardii</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Feuerfüßiger G.	82:7420/1	(1)
<i>C. caeruleus</i> (Schff.) Fr.	Blauer K.	86:7321/3	(6)
<i>C. caerulescentium</i> Henry	Weißbockerlicher K.	89:7220/1	(2)
<i>C. caesiocanescens</i> (Moser) K. et R.	Violettgrauer K.	90:7716/4	(5)
<i>C. caesiocortinatus</i> J. Schäffer	Rundsporiger K.	90:7817/1	(3)
<i>C. caesiostamineus</i> Henry	Bitterlicher K.	91:8016/2	(2)
<i>C. callisteus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Rhabarberfüßiger R.	92:7420/1	(1)
<i>C. calochrous</i> (Pers.: Fr.) Gray	Amethystblättriger K.	89:7817/1	(5)
<i>C. camphoratus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Bocks-D.	92:7420/1	(4)
<i>C. cephalixus</i> Fr.	Körnigrauer Sk.	93:7317/4	(2)
<i>C. cinnabarinus</i> Fr.	Zinnoberroter Buchen-H.	92:7420/1	(3)
<i>C. cinnamomeus</i> (L.: Fr.) Gray	Zimtbrauner H.	82:7320/4	(4)
<i>C. cliduchus</i> Fr. ?	Gelbgegürtelter Sk.	89:7817/1	(1)
<i>C. corrosus</i> Fr.	Vergrabener K.	91:8016/2	(2)
<i>C. cotoneus</i> Fr.	Olivbrauner R.	90:7817/1	(1)
<i>C. croceocaeruleus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Sf.	84:7220/2	(3)
<i>C. croceus</i> (Schff.: Fr.) Big. et Guill.	Safranblättriger H.	92:7420/1	(6)
<i>C. cumatilis</i> Fr.	Taubenblauer Sk.	93:7715/3	(1)
<i>C. delibutus</i> Fr.	Blaublättriger Sf.	90:7817/1	(2)
<i>C. dibaphus</i> Fr.	Bunter K.	93:7320/4	(2)

<i>C. dionysae</i> Henry	Mehligriechender K.	90:7817/1	(1)
<i>C. diosmus</i> Kühner	Doppelgeruch-D.	87:7320/4	(1)
<i>C. elegantior</i> (Fr.) Fr.	Strohgelber K.	91:7420/1	(3)
<i>C. elegantissimus</i> Henry	Prächtiger K.	82:7220/2	(6)
<i>C. erythrinus</i> Fr.	Rosastieliger W.	86:7120/4	(2)
<i>C. evernius</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Rettich-G.	93:7816/2	(1)
<i>C. glaucopus</i> (Schff.: Fr.) Fr.	Reihiger K.	91:7320/2	(7)
<i>C. haasii</i> (Moser) Moser	Violettstieliger K.	83:7817/1	(1)
<i>C. hemitrichus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Weißflockiger G.	93:7218/1	(3)
<i>C. hinnuleus</i> (Sow.) Fr.	Erdigriechender G.	89:7120/4	(1)
<i>C. humicola</i> (Quélet) Maire	Kegeliger R.	92:7420/1	(3)
<i>C. infractus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Sk.	90:7817/1	(2)
<i>C. ionophyllus</i> Moser	Violetter Rettich-G.	93:7816/2	(1)
<i>C. laniger</i> Fr.	Zimtroter G.	90:7817/1	(4)
<i>C. limonius</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Löwengelber R.	89:7715/4	(1)
<i>C. malicorius</i> Fr.	Orangegrüner H.	93:7317/4	(3)
<i>C. melanotus</i> Kalchbr.	Braunnetziger R.	93:7716/4	(3)
<i>C. metrodii</i> Henry	Orangelgelber Sf.	93:7317/4	(1)
<i>C. mucosus</i> (Bull.Fr.) Kickx	Heide-Sf.	86:7220/1	(2)
<i>C. multiformis</i> (Fr.) Fr.	Sägeblättriger K.	82:7321/3	(3)
<i>C. nanceiensis</i> Maire	Gelbflockiger Sk.	90:7716/4	(2)
<i>C. nemorensis</i> (Fr.) Britz.	Verfärbender Sk.	86:7321/4	(3)
<i>C. ochroleucus</i> (Schff.: Fr.) Fr.	Hellgelber Sf.	93:7120/4	(1)
<i>C. odorifer</i> Britz.	Anis-K.	92:8016/2	(1)
<i>C. olidus</i> Lange	Weißstieliger Sk.	89:7420/1	(3)
<i>C. orellanus</i> Fr.	Orangefuchsigiger R.	93:7715/3	(2)
<i>C. orichalceus</i> (Batsch) Fr.	Kupferroter K.	92:8016/2	(3)
<i>C. paleaceus</i> (Fr.) Fr.	Pelargonien-G.	91:7715/4	(1)
<i>C. papulosus</i> Fr.	Körnighütiger Sk.	91:7420/1	(4)
<i>C. percomis</i> Fr.	Würziger Sk.	82:7420/1	(3)
<i>C. phoeniceus</i> (Bull.) Maire	Rotgenatterter H.	93:771513	(2)
<i>C. praestans</i> (Cordier) Gillet	Schleihereule	92:7321/3	(8)
<i>C. privignoides</i> Henry	Zwiebel-W.	92:7420/1	(1)
<i>C. pseudoglaucopus</i> (J. Schäffer) Quadr.	Violettgerandeter K.	91:8016/2	(4)
<i>C. pseudosulphureus</i> Henry ex Orton	Grünlings-K.	81:7321/3	(3)
<i>C. purpurascens</i> (Fr.) Fr.	Purpurfleckender K.	88:7120/4	(6)
<i>C. purpureobadius</i> (Karsten) Karsten	Purpurbrauner W.	78:7321/3	(1)
<i>C. rubellus</i> Cooke	Spitzgebuckelter R.	83:7320/4	(5)
<i>C. rubicundulus</i> (Rea) Pearson	Gilbender R.	78:7321/3	(1)
<i>C. rufolivaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Violettroter K.	92:7322/3	(2)
<i>C. salor</i> Fr.	Gelbbauer Sf.	90:7817/1	(2)
<i>C. sanguineus</i> (Wulfen: Fr.) Gray	Blutroter H.	93:7217/4	(1)
<i>C. saporatus</i> Britz.	Breitknolliger K.	92:7320/4	(1)
<i>C. saturninus</i> (Fr.) Fr.	Blaufleischiger W.	78:7321/3	(1)
<i>C. sebaceus</i> Fr.	Seidiger Sk.	84:7321/3	(2)
<i>C. semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Blutblättriger H.	93:7217/4	(3)
<i>C. splendens</i> Henry	Leuchtendgelber K.	93:7817/1	(6)
<i>C. subbalaustinus</i> Henry	Zimtblättriger Birken-W.	91:712014	(3)
<i>C. subelegantior</i> Henry ?	Falscher Messing-K.	84:7420/2	(1)
<i>C. subtortus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Olivgelber Weihrauch-Sk.	93:7816/2	(3)
<i>C. talus</i> Fr.	Falbbältriger Honig-K.	89:7220/1	(1)

<i>C. terpsichores</i> Melot	Violettblauer K.	88:7320/4	(1)
<i>C. tortuosus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Silberstieliger G.	91:7715/4	(2)
<i>C. torvus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Wohlriechender G.	93:771513	(1)
<i>C. traganus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Lila D.	82:7420/1	(2)
<i>C. trivialis</i> Lange	Natternstieliger Sf.	79:7220/1	(4)
<i>C. turgidus</i> Fr.	Tonweißer D.	79:7220/1	(1)
<i>C. urbicus</i> Fr.	Ockerfarbener W.	91:7120/4	(1)
<i>C. variegatus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Sk.	90:7817/1	(5)
<i>C. varius</i> (Schff.: Fr.) Fr.	Ziegelgelber Sk.	91:7420/1	(6)
<i>C. venetus</i> (Fr.) Fr.	Grüner R.	84:7318/3	(2)
<i>C. violaceus</i> (L.: Fr.) Gray	Dunkelvioletter S.	86:7320/4	(3)
<i>C. vulpinus</i> (Vel.) Henry	Fuchsigbrauner Sk.	81:7318/2	(2)
<i>C. xanthophyllus</i> (Cooke) Henry	Goldblättriger K.	84:7321/4	(5)

Abkürzungen:

D = Dickfuß, G = Gürtelfuß, H = Hautkopf, K = Klumpfuß, R = Raukopf, S = Schleierling, Sf = Schleimfuß, Sk = Schleimkopf, W = Wasserkopf

(Fortsetzung folgt)

Anmerkung zum Farbbild Seite 49

Cortinarius terpsichores Melot – Adeliger Klumpfuß (Namensvorschlag) Subgenus Phlegmacium, Sektion Caerulescentes

Das Bild zeigt einen Fund vom 18. September 1988 aus dem Schönbuch. Josef Pernpointner fand die Pilzgruppe am kalkgeschotterten Wegrand in einem Laubwald-Areal nahe Dettenhausen (MTB 7320/4), am Fundort stehen Buchen und Fichten. Die Farbschönheit der Pilze wurde allgemein bewundert. Nach Moser wurde die Art zunächst als *Cort. cyaneus* (Bres.) Moser bestimmt, eine spätere Überprüfung ergab jedoch *Cort. terpsichores*, was auch der norwegische Phlegmacium-Kenner T. E. Brandrud bestätigte.

Kurzbeschreibung des abgebildeten Fundes:

Hut **dunkelviolettblau** (Kornerup-Wanscher 18 A 8/B 8), Mitte noch dunkler, sehr schleimig, 4–7 cm breit

Lamellen jung hellbläulich, später blaßgrau-violettlich, dünn, am Rand stark untermischt
Cortina hyalin-weiß

Stiel zylindrisch mit gerandet-knolliger Basis, **reinweiß**, am Knollenrand mit **blauvioletten** Velumresten, Knollenunterseite ocker gefleckt

Fleisch weiß in Hut und Stiel, in der Stielspitze leicht bläulich, Geschmack anfangs mild, dann unangenehm muffig, Geruch deutlich erdartig, mit KOH (20%ig) keine auffallenden Farbreaktionen

Sporen **ellipsoid**, z. T. etwas mandelförmig, nicht zitronenförmig, isoliert dickwarzig, hellbraun (10) 11–12 (13)/(6,2) 6,8 (7,4) µm; Q = (1,45) 1,6–1,7 (1,90), $\bar{Q} = 1,61$

Cortinarius cyaneus soll nach Moser mehr oder minder zitronenförmige Sporen haben, sowie gefärbten Stiel, weißlichen Knollenrand und deutlich größeren Hut.

Cortinarius caerulescens hat deutlich kleinere, mandelförmige Sporen, einen heller gefärbten, bald ockerlich ausblassenden Hut und einen gefärbten Stiel. A. Bollmann

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Südwestdeutsche Pilzrundschau](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [30 2 1994](#)

Autor(en)/Author(s): Bollmann Achim

Artikel/Article: [Cortinarien-Funde in Baden-Württemberg 46-48](#)