müssen, gibt es aber einen klugen Vorschlag. Das zuständige Komitee (Commitee for Fungi) könnte eine Konservierungs-Maßnahme akzeptieren und den Typus der Gattung *Coprinus* ändern, also anstatt *Coprinus comatus* einen „Nicht-Tintling" zum Neotypus auswählen und dann den bisherigen Typus vielleicht in *Eucoprinus comatus* umbenennen. Dann könnte die Mehrzahl der Tintlinge in einer Gattung *Coprinus* verbleiben und der Familienname *Coprinaceae* wäre auch wieder gültig.

Was ist derzeit zu tun? Meine Meinung hierzu: Abwarten, was die weitere Auswertung der neuen Daten bringt und wie sich schließlich das Komitee hinsichtlich einer neuen Typusart für die Tintlinge entscheidet. Also nur keine vorschnellen Namensänderungen!

Literatur

HOPPLE, J. S. & R. VILGALYS (1994): Phylogenetic relationships among coprinoid taxa... Mycologia **86**: 96-107.

REDHEAD, Scott A. (2001): Bully for *Coprinus*. Field Mycology **2(4)**:118-126.

VILGALYS, R., J.-M. MONCALVO, J. JOHNSON & J. S. HOPPLE (2001): *Coprinus* Pers. and the disposition of *Coprinus* species s. l. Taxon **50**: 203-241.

Pilzfunde im Gebiet Langendorf/Elbe aus den Jahren 1976 bis 1991

Heinz und Vera MICHAELIS, Unter den Rüstern 12, 12167 Berlin

Unsere regelmäßigen Urlaube im Gebiet Langendorf/Elbe (MTB 2833 Dömitz), Puttloser Moor (M7FB 2932 Dannenberg), Landwehr, Große Lucie (MTB 2933 Groß Gusborn) und Gorleben, Gartow, Elbholz (MTB 2934 Lenzen/Elbe) in den Monaten Juni bis Anfang Oktober gaben uns in den Jahren 1976 bis 1991 die Möglichkeit, vom westlichen Elbufer, damals noch Grenze zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, bis zum Naturschutzgebiet Lucie und der Umgebung von Gorleben das Pilzaufkommen zu beobachten. Wir hatten bisher keine Möglichkeit, unsere Pilzfunde mit schriftlichen Berichten anderer über die Pilzflora dieses Gebietes zu vergleichen. Da wir diese Gegend jedoch 15 Jahre lang immer wieder besucht haben, mag es durchaus von Interesse sein, mit dem vorliegenden Beitrag über unsere eigenen Erfahrungen zu berichten. Neben einer Zusammenstellung der in diesen Jahren dort gefundenen Großpilzarten, soll auf einige für uns besonders auffällige Pilzarten genauer eingegangen werden.

Insgesamt wurden von uns 218 verschiedene Pilzarten (195 Basidiomyceten und 23 Ascomyceten) festgestellt. Sie sind in der folgenden dreiteiligen Tabelle jeweils alphabetisch aufgeführt. Natürlich wurde damit lediglich ein ganz kleiner Teil der insgesamt im genannten Gebiet vorkommenden Pilzarten erfasst, zumal wir unsere Beobachtungen auf die Monate Juni bis Anfang Oktober beschränken mussten. Die Bestimmungen der Pilzarten wurden, sofern erforderlich, mikroskopisch abgesichert, denn ein Mikroskop hatten wir als unverzichtbares Werkzeug immer in den Pilzurlauben dabei.

Zusammenstellung der gefundenen Pilzarten

(auf die mit einem * versehenen Arten wird näher eingegangen)

Basidiomyceten (Ständerpilze)

Agaricus abruptibulbus (Schiefknolliger Anis-Champignon)
Agaricus arvensis (Schaf-Champignon)
*Agaricus bernardii** (Dünen-, Salzwiesen-Champignon)
Agaricus bisporus (Zucht-Champignon)
Agaricus bitorques (Stadt-Champigon)
Agaricus campestris (Wiesen-Champigon)
Agaricus lanipes (Breitschuppiger Champignon)
Agaricus meleagris (Perlhuhn-Champignon)
Agaricus silvaticus (Wald-Champignon)
Agaricus subflocculosus (Flockiger Champignon)
Agaricus xanthoderma (Karbol-Champigon)
Agrocybe erebia (Lederbrauner Ackerling)
Agrocybe praecox (Voreilender Ackerling)
Agrocybe putaminum (Falber Ackerling)
Agrocybe semiorbicularis (Halbkugeliger Ackerling)
Amanita citrina (Gelber Knollenblätterpilz)
*Amanita crocea** (Orangegelber Scheidenstreifling)
Amanita fulva (Fuchsiger Scheidenstreifling)
Amanita gemmata (Narzissengelber Wulstling)
Amanita muscaria (Fliegenpilz)
Amanita pantherina (Pantherpilz)
Amanita phalloides (Grüner Knollenblätterpilz)
Amanita rubescens (Perlpilz)
Amanita spissa (Grauer Wulstling)
Amanita vaginata (Grauer Scheidenstreifling)
Armillaria ostoyae (Hallimasch)
Bovista nigrescens (Schwärzender Bovist)
Bovista plumbea (Bleigrauer Zwergbovist)
Bovista pusilla (Winziger Bovist)
Calocybe persicolor (Rosenroter Schönkopf)
Calvatia caelata (Hasen-Stäubling)
Calvatia excipuliformis (Beutel-Stäubling)
Cantharellus cibarius (Pfifferling)
Clitocybe clavipes (Keulenfuß-Trichterling)
Clitocybe gibba (Ockerbrauner Trichterling)
Collybia acervata (Büschel-Rübling)
Collybia asema (Horngrauer Rübling)
Collybia confluens (Knopfstieliger Rübling)
Collybia dryophila (Waldfreund-Rübling)
Collybia fusipes (Spindeliger Rübling)
Collybia hariolorum (Striegeliger Rübling)
Collybia maculata (Gefleckter Rübling)
Collybia peronata (Brennender Rübling)
Collybia tuberosa (Braunknolliger Zwergrübling)
Conocybe aporos (Frühlings-Glockenschüppling)
Conocybe rickenii (Dung-Samthäubchen)
Coprinus atramentarius (Grauer Tintling)
Coprinus cinereus (Schuppiger Tintling)
Coprinus comatus (Schopf-Tintling)
Coprinus disseminatus (Gesäter Tintling)
Coprinus micaceus (Glimmer-Tintling)
Coprinus niveus (Schneeweißer Tintling)
Coprinus plicatilis (Gemeiner Scheibchen-Tintling)
Cortinarius alboviolaceus (Weißvioletter Dickfuß)
Cortinarius armillatus (Geschmückter Gürtelfuß)
Cortinarius bolaris (Rotschuppiger Raukopf)
Cortinarius cinnamomeus (Zimt-Hautkopf)
Cortinarius delibutus (Blaublättriger Schleimfuß)
Cortinarius hemitrichus (Weißflockiger Gürtelfuß)
Cortinarius mucosus (Heide-Schleimfuß)
Cortinarius paleaceus (Duftender Gürtelfuß)
Cortinarius pholideus (Schuppiger Dickfuß)
Cortinarius rubellus (Spitzgebuckelter Raukopf)
Cortinarius semisanguineus (Blutblättriger Hautkopf)
Cortinarius traganus (Lila Dickfuß)
Entoloma icterinum (Zitronengelber Rötling)
Hebeloma crustuliniforme (Tonblasser Fälbling)
Hebeloma mesophaeum (Dunkelscheibiger Fälbling)
Hebeloma radicosum (Wurzelnder Fälbling)
Hebeloma sinapicans (Rettich-Fälbling)
Hypholoma capnoides (Rauchblättriger Schwefelkopf)
Hypholoma fasciculare (Grünblättriger Schwefelkopf)
Hypholoma sublateritium (Ziegelroter Schwefelkopf)
Inocybe aeruginascens (Grünender Risspilz)

Inocybe cookei (Strohgelber Risspilz)
Inocybe dulcamara (Bittersüßer Risspilz)
Inocybe fastigiata (Kegliger Risspilz)
Inocybe geophylla (Erdblättriger Risspilz)
Inocybe lacera (Struppiger Risspilz)
Inocybe lanuginosa (Wolliger Risspilz)
Inocybe mixtilis (Gerandetknolliger Risspilz)
Inocybe napipes (Rübenstieliger Risspilz)
Inocybe ovatocystis (Varietät des Wolligen Risspilzes)
Inocybe sambucina (Fliederweißer Risspilz)
Kuehneromyces mutabilis (Stockschwämmchen)
Laccaria amethystina (Violetter Lacktrichterling)
Laccaria bicolor (Zweifarbiger Lacktrichterling)
Laccaria laccata (Rötlicher Lacktrichterling)
Lacrymaria lacrymabunda (Tränender Saumpilz)
*Lacrymaria var. pyrotricha** (Feuerfarbener Saumpilz)
Lactarius blumii (Flaumiger Milchling)
Lactarius camphoratus (Kampfer-Milchling)
Lactarius deliciosus (Echter Reizker)
Lactarius helvus (Bruch-Reizker)
Lactarius musteus (Heide-Milchling)
Lactarius necator (Olivbrauner Milchling)
Lactarius quietus (Eichen-Milchling)
Lactarius rufus (Rotbrauner Milchling)
Lactarius vellereus (Wolliger Milchling)
Lentinus lepideus (Schuppiger Sägeblättling)
Lentinus tigrinus (Getigerter Knäueling)
Lepiota aspera (Spitzschuppiger Schirmling)
Lepiota cristata (Stink-Schirmling)
Lepiota echinella (Borstiger Schirmling)
Lepiota ventriosospora (Gelbflockiger Wollstiel-Schirmling)
Lepista inversa (Fuchsiger Rötelritterling)
Lepista nebularis (Nebelgrauer Rötelritterling)
Lepista nuda (Violetter Rötelritterling)
Leucoagaricus pudicus (Rosablättriger Egerlingsschirmling)
Lycoperdon molle (Weichlicher Stäubling)
Lycoperdon perlatum (Flaschen-Stäubling)
Lycoperdon pyriforme (Birnen-Stäubling)
Macrolepiota excoriata (Acker-Riesenschirmling)
Macrolepiota procera (Parasolpilz)
Macrolepiota rachodes (Safran-Schirmling)
Megacollybia platyphylla (Breitblättriger Rübling)
Melanoleuca candida (Blasser Weichritterling)
Mycena galericulata (Rosablättriger Helmling)
Panaeolina foenisecii (Heu-Düngerling)
Paxillus atrotomentosus (Samtfuß-Krempling)
Paxillus involutus (Kahler Krempling)
Paxillus panuoides (Muschel-Krempling)
Phallus impudicus (Stinkmorchel)
Psathyrella candolleana (Behangener Faserling)
Psathyrella hydrophila (Wässriger Mürbling)
Rhodocybe truncata (Würziger Tellerling)
Rozites caperata (Reifpilz, Zigeuner)
Russula adusta (Rauchbrauner Schwärz-Täubling)
Russula aeruginea (Grasgrüner Täubling)
Russula amoenolens (Camembert-Täubling)
Russula atropurpurea (Purpurschwarzer Täubling)
Russula badia (Zedernholz-Täubling)
Russula caerulea (Buckel-Täubling)
Russula claroflava (Gelber Graustiel-Täubling)
Russula cyanoxantha (Frauen-Täubling)
Russula decolorans (Orangeroter Graustiel-Täubling)
Russula emetica (Spei-Täubling)
Russula fellea (Gallen-Täubling)
Russula foetens (Stink-Täubling)
Russula grisea (Braungrauer Reif-Täubling)
Russula laurocerasi (Mandel-Täubling)
Russula lutea (Dotter-Täubling)
Russula nigricans (Dickblättriger Schwärz-Täubling)
Russula ochroleuca (Ockergelber Täubling)
Russula paludosa (Apfel-Täubling)
Russula pectinata (Kratzender Kamm-Täubling)
Russula pulchella (Verblassender Täubling)
Russula solaris (Sonnen-Täubling)
Russula turci (Jodoform-Täubling)
Russula velenovskyi (Ziegelroter Täubling)
Russula vesca (Speise-Täubling)
Russula virescens (Grüngefelderter Täubling)
Russula xerampelina (Herings-Täubling)
Scleroderma areolatum (Gefelderter Kartoffelbovist)
Scleroderma citrinum (Dickschaliger Kartoffelbovist)
Strobilurus stephanocystis (Milder Kiefern-Zapfenrübling)
Strobilurus tenacellus (Bitterer Kiefern-Zapfenrübling)

Suillus granulatus (Körnchen-Röhrling)
Suillus grevillei (Gold-Röhrling)
Suillus luteus (Butter-Röhrling)
Suillus piperatus (Pfeffer-Röhrling)
Suillus variegatus (Sand-Röhrling)
Tricholoma albobrunneum (Weißbrauner Ritterling)
Tricholoma saponaceum (Seifen-Ritterling)
Tricholoma sulphureum (Schwefel-Ritterling)
Tricholoma terreum (Erd-Ritterling)
Xerocomus badius (Maronen-Röhrling)
Xerocomus chrysenteron (Rotfuß-Röhrling)
Xerocomus rubellus (Blutroter Röhrling)
Xerocomus subtomentosus (Ziegenlippe)

Bjerkandera adusta (Angebrannter Rauchporling)
Coltricia perennis (Dauer-Porling)
Calocera cornea (Pfriemförmiger Hörnling)
Calocera viscosa (Klebriger Hörnling)
Daedalea quercina (Eichen-Wirrling)
Fomes fomentarius (Echter Zunderschwamm)
Ganoderma lipsiense (Flacher Lackporling)
*Ganoderma lucidum** (Glänzender Lackporling)
*Inonotus cuticularis** (Flacher Schillerporling)
Laetiporus sulphureus (Schwefel-Porling)
Phaeolus schweinitzii (Kiefern-Braunporling)
Piptoporus betulinus (Birkenporling)
Polyporus lepideus (Mai-Porling)
Polyporus leptocephalus (Löwengelber Porling)
Polyporus squamosus (Schuppiger Porling)
Ramaria pallida (Blasse Koralle)
Ramaria stricta (Steife Koralle)
Stereum gausapatum (Eichen-Schichtpilz)
Stereum hirsutum (Zottiger Schichtpilz)
Stereum rugosum (Runzeliger Schichtpilz)
Thelephora terrestris (Erd-Warzenpilz)
Trichaptrum fuscoviolaceum (Zahnförmiger Lederporling)
Trametes gibbosa (Buckel-Tramete)
Trametes hirsuta (Striegelige Tramete)
Trametes versicolor (Schmetterlings-Tramete)

Ascomyceten Schlauchpilze
Aleuria aurantia (Gemeiner Orangebecherling)
Ascobolus furfuraceus (Kleiiger Kotling)
Bulgaria inquinans (Schmutzbecherling)
Colpoma quercinum (Eichen-Schildbecherling)
Dasyscyphus acutipilus (*Spitzhaariges Schilfbecherchen)*
*Helvella corium** (Lederige Lorchel)
*Helvella costifera** (Grauweißer Rippenbecherling)
Helvella crispa (Herbst-Lorchel)
Helvella lacunosa (Gruben-Lorchel)
Hypoxylon fragiforme (Rötliche Kohlenbeere)
Lasiobolus ciliatus (Borstiger Kotling)
*Lasiosphaeria ovina** (Eiförmiger Kohlenkugelpilz)
Mollisia cinerea (Aschfarbenes Weichbecherchen)
Peziza badia (Kastanienbrauner Becherling)
Peziza depressa (Rotbrauner Becherling)
Peziza limosa (Schlamm-Becherling)
Peziza varia (Riesen-Becherling)
Peziza vesiculosa (Blasiger Becherling)
Sepultaria arenicola (Eingesenkter Sandborstling)
Ustulina deusta (Brandkrustenpilz)
Xylaria hypoxylon (Geweihförmige Holzkeule)
Xylaria longipes (Langstielige Holzkeule)
Xylaria polymorpha (Vielgestaltige Holzkeule)

Unter den vorgenannten Arten sollen nun die acht markierten, welche uns aus unterschiedlichen Gründen besonders interessant erschienen, noch etwas genauer betrachtet werden.

Agaricus bernardii (Quélet 1878) Saccardo 1887 Abb. 1
Dünen-Egerling, Salzwiesen-Champignon

Dieser dickfleischige Champignon besitzt einen grobschuppigen, zerklüfteten, weißen Hut und am Stiel einen einfachen, aufsteigenden Ring. Das Fleisch ist lebhaft rötend. Im Alter und beim Kochen entwickelt sich ein aufdringlicher, fischartiger Geruch. Wir fanden drei Fruchtkörper dieser Spezies, welche vorwiegend auf salzhaltigen Wiesen längs der Nord- und Ostseeküste vorkommt, im September 1983 in den Wiesen zwischen Deich und Elb-

Abb. 1: *Agaricus bernardii* – Dünen-Egerling, Salzwiesen-Champignon. Foto: H. MICHAELIS

ufer, etwa einen Kilometer westlich von Langendorf/Elbe (MTB 2833 Domitz). An einem vergleichbaren Standort hatten wir diese Pilzart noch nie vorher gefunden und hier auch nicht erwartet. Allerdings ist der Pilz in neuerer Zeit auch im Binnenland auf Weiden und Wiesen mit (künstlich) erhöhtem Salzgehalt sowie zum Beispiel an Autobahnrändern aufgetreten. Es war für uns ein Erstfund und wir wissen nicht, ob diese Art von anderen im beschriebenen Gebiet schon einmal registriert worden ist.

Amanita crocea (Quélet 1889) Kühner et Romagnesi 1953
Orangegelber Scheidenstreifling

Der Hut von *A. crocea* ist meist leuchtend orangegelblich bis etwas bräunlich, dünnfleischig, kahl, der Rand etwas gewellt. Der Stiel ist hohl und wie der Hut gefärbt und genattert. Die Scheide ist innen und außen weiß. Von dieser für uns seltenen Pilzspezies fanden wir im August 1990 zwei gut entwickelte Fruchtkörper im Gras ganz in der Nähe der Straße von Lüchow nach Zadrau im Naturschutzgebiet Große Lucie (MTB 2933 Groß Gusborn).

Lacrymaria lacrymabunda (Bulliard 1785: Fries 1821) Patouillard 1887
var. *pyrotricha* Feuerfarbener Saumpilz, Feuerfaserling

Hut und Stiel dieser Varietät *pyrotricha* sind feuerfarbig orange bis fuchsigbraun, der Hut ist filzig-schuppig, der Stiel unberingt; die Lamellen sind tränend, fleckig. Der Fund dieses Pilzes in Langendorf/Elbe (MTB 2833 Domitz) war für uns sehr auffällig. Er wuchs am Rand eines Mischwaldes an einem Feldweg, der entlang eines brachliegenden Ackers führt, zusammen mit der Stammart *Lacrymaria lacrymabunda*, dem Tränenden Saumpilz. Von beiden Pilzarten standen jeweils vier Fruchtkörper dicht beieinander an diesem Standort, so dass sie eine gewisse Zusammengehörigkeit erkennen ließen.

Abb. 2: *Ganoderma lucidum* – Glänzender Lackporling. Foto: H. MICHAELIS

Ganoderma lucidum (Curtis 1781: Fries 1821) Karsten 1881 Glänzender Lackporling
Abb. 2

Der Glänzende Lackporling, der durch seinen roten von einer Lackkruste überzogenen Hut und Stiel jedem Pilzfreund auffällt, hat auch bei unserem Fund für Begeisterung gesorgt. Wir fanden ihn an der Grenze zwischen Puttloser Moor und Landwehr (MTB 2933 Groß Gusborn) am liegenden Stamm einer alten Eiche, der etwa 15 m lang und 1 m dick war. Das Umfeld bestand aus einem Farn-Dickicht. Auf diesem Stamm hatten sich 1978 etwa 20 unterschiedlich große Fruchtkörper entwickelt, die ausschließlich aus *G. lucidum* bestanden. In dieser Menge hatten wir diese Art noch nie an einem Standort gesehen. Über die folgenden vier Jahre haben wir diesen Eichenstamm und das Auftreten der Fruchtkörper jeweils im Juli/August beobachtet. Danach waren neue Fruchtkörper nicht mehr erschienen. Da die Fruchtkörper dieser ökologisch zu den Weißfäulepilzen zählenden Spezies im Gegensatz zu dem bei uns wesentlich häufigeren Flachen Lackporling (*G. lipsiense* = *G. applanatum*) einjährig sind, erfolgte offensichtlich keine weitere Fruktifikation mehr. Vermutlich war das mächtige Substrat dann doch erschöpft und der vegetative Teil des Pilzes zugrunde gegangen. Auch Fruchtkörper anderer Großpilzarten fanden wir in den folgenden Jahren auf dem immer noch vorhandenen Eichenstamm nicht.

Inonotus cuticularis (Bulliard 1789: Fries 1821) Karsten 1879 Flacher Schillerporling
Abb. 3 & 4

Eine auffällige Gruppe Fruchtkörper dieser Pilzart fanden wir einmal im September 1984 im Naturschutzgebiet Große Lucie (MTB 2933 Groß Gusborn). Der Pilz wuchs in einem hohlen Buchenstumpf. Im Innern des Buchenstumpfes war die dachziegelartige Anordnung und Struktur der Fruchtkörper sehr gut erkennbar. Mikroskopisch waren die für *Inonotus cuticularis* typischen, braunen, merkwürdig gestalteten, am Ende mehrfach ankerförmig verzweigten Setae im Hutfilz deutlich sichtbar. Dieser Fund war für uns insofern von besonderer Bedeutung als wir diesen bei uns relativ seltenen Schillerporling zum ersten Mal

Abb. 3: *Inonotus cuticularis* – Flacher Schillerporling. Foto: H. MICHAELIS



Abb. 4: *Inonotus cuticularis* – Flacher Schillerporling: ankerförmig verzweigte Seten im Hutfilz. Foto: H. MICHAELIS

Abb. 5: *Helvella corium* – Lederige Lorchel
Foto: H. MICHAELIS

in der Nähe von Schnega westlich von Bergen (Dumme) gefunden hatten. In den folgenden Jahren konnten wir ihn in der Region nicht feststellen.

Helvella corium (Weberbauer 1873) Massee 1895

= *Cyathipodia corium* (Weberbauer) Boudier

Lederige Lorchel, Schwarzer Stielbecherling
Abb. 5

Ebenfalls im Gebiet Langendorf/Elbe und zwar im Gras am Rand eines feuchten Gehweges im Puttloser Moor (MTB 2932 Dannenberg) fanden wir im Juni 1984 fünf Fruchtkörper der bei uns seltenen Lederigen Lorchel. Sie fielen uns vor allem durch den deutlichen Stiel und die fast schwarze Färbung auf. Die mikroskopische Überprüfung bestätigte die Bestimmung. Über den Zeitraum unserer Pilzbeobachtungen war dies unser Erstfund; auch in späteren Jahren fanden wir keine weiteren Fruchtkörper mehr. Ob diese Pilzart von anderen in der Region bereits beobachtet worden ist, wissen wir nicht.

Lasiosphaeria ovina (Fries) Cesati & de Notaris

= *Leptosphaeria ovina* (Persoon) Fuckel

Schaf-Haarkugelpilz, Eiförmiger Kohlenkugelpilz, Abb. 6

Im Naturschutzgebiet Große Lucie (MTB 2933 Groß Gusborn) fanden wir erstmals im Juni 1981 eine Gruppe der im Durchmesser nur 0,4 bis 0,5 mm großen Perithecien, die bei dieser Art von einem weißen „Haarfilz" überzogen sind, auf morschem Laubholz. Mikroskopische Kennzeichen sind u. a. die zylindrischen bis nierenförmig gebogenen Ascosporen, die in zwei Reihen im Ascus liegen. Die zahlreichen Asci und fadenförmigen Paraphysen treten beim Quetschen der Perithecien als zitronengelbe Masse aus. Der Pilz gilt bei uns als ziemlich selten, kommt jedoch im genannten Gebiet offenbar häufiger vor, denn wir haben ihn dort später noch mehrfach gefunden.

Helvella costifera Nannfeldt 1953

= *Paxina costifera* (Nannfeldt) Stangl

Grauweißer Rippenbecherling,
Grauweiße Lorchel

Einen einzelnen, fast schüsselförmigen Fruchtkörper dieser Pilzart fanden wir im Juni 1984 im Naturschutzgebiet Große Lucie (MTB 2933 Groß Gusborn) im grasigen Rand eines Waldweges. Auffallend waren besonders die groben und stark hervortretenden Rippen an der Außenseite der graubräunlichen, fast ungestielten Fruchtkörper. Auch die mikromorphologischen Merkmale stimmten mit den Literaturangaben überein. Der Pilz, ein typischer Vertreter der Rippenbecherlinge (ehemals *Paxina*) war für uns neu und zudem fanden wir ihn im genannten Gebiet nur dieses eine Mal. Auch von anderen sind uns keine weiteren

Funde bekannt. Die Art gilt als kalkliebend und ist bei uns in Laubwäldern oder unter Gebüsch selten zu finden.

Abschließend möchten wir noch hinzufügen, dass wir hoffen, mit diesem Bericht über unsere im Lauf von 15 Jahren zusammengetragenen Beobachtungen im Gebiet Lüchow-Dannenberg einen ergänzenden Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora in diesem Gebiet leisten zu können. Für uns war es immer wichtig, uns mit einem kleinen Stückchen der Natur, unserem Lebensraum, vertraut zu machen. Dabei hatten – und haben auch heute noch – bei uns neben den Menschen, Freunden und Bekannten in einer Region auch die Pilze einen besonderen Platz.

Literatur

BREITENBACH, J. & F. KRÄNZLIN (1986): Pilze der Schweiz, Bd. 2 (Nichtblätterpilze). Mycologia, Luzern.

DENNIS, R. W. G. (1978): British Ascomycetes. J. Cramer, Vaduz.

GERHARDT, E. (1997): Der große BLV Pilzführer. BLV-Verlagsges. mbH., München.

JAHN, H. (1979): Pilze, die an Holz wachsen. Bussesche Verlagshandlung, Herford.

JÜLICH, W.: Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze, Bauchpilze. VEB G. Fischer, Jena, 1984.

LANGE, J. E. (1935-1940): Flora Agaricina Danica, Vol. I-V. Recato A/s, Copenhagen.

MICHAEL, E., B. HENNIG & H. KREISEL (1986): Handbuch für Pilzfreunde, 2. Bd. Gustav Fischer, Jena.

MIGULA, W. (1913): Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1. und 2. Abt. Friedr. von Zezschwitz, Gera.

MOSER, M. (1963): Ascomyceten (Schlauchpilze). Gustav Fischer, Stuttgart.

MOSER, M. (1983): Die Röhrlinge und Blätterpilze. Gustav Fischer, Stuttgart.



Abb. 6:
Lasiosphaeria ovina – Schaf-Haarkugelpilz: Habitus, Asci, Paraphyse, Sporen Skizze: H. MICHAELIS

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Südwestdeutsche Pilzrundschau

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: 40_1_2004

Autor(en)/Author(s): Michaelis Heinz, Michaelis Vera

Artikel/Article: Pilzfunde im Gebiet Langendorf/Elbe aus den Jahren 1976 bis 1991 9-17