

Floristische Beiträge aus Salzburg, VIII

Contributions to the flora of Salzburg, VIII

**Christian EICHBERGER, Walter STROBL &
Claudia ARMING**

Schlagwörter: Flora, Gefäßpflanzen, Salzburg, Österreich, Nachträge, Ergänzungen.

Key words: flora, vascular plants, Salzburg, Austria, additions.

Zusammenfassung: Ergänzungen und Nachträge zur Verbreitung von über 400 Gefäßpflanzentaxa im Bundesland Salzburg werden vorgestellt. Es sind dies Funde aus den Jahren 1978 bis 2005, sie stammen aus allen Teilen Salzburgs. Abschließend werden Korrekturen der Autoren zu Funden aus einigen früheren Publikationen zusammengestellt.

Summary: Additions concerning the distribution of more than 400 taxa of the vascular plants in the Federal Province of Salzburg have been compiled. The new floristic records from 1978 to 2005 cover all districts of Salzburg. Finally corrections concerning records published in earlier articles are added.

1. Einleitung und Methodik

Die vorliegende Zusammenstellung enthält neue Fundorte von Gefäßpflanzen aus fast allen Bezirken Salzburgs. Zahlreiche Funde waren Ergebnis der „Biotopkartierung Salzburg“ (NOWOTNY & HINTERSTOISSER 1994); mit freundlicher Genehmigung des Amtes der Salzburger Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Mag. G. Nowotny, werden diese Daten veröffentlicht.

Bei den Pflanzenfunden handelt es sich um Nachweise, die durchwegs Lücken im Verbreitungsatlas von WITTMANN et al. (1987) füllen. Bei früheren Publikationen (ARMING & EICHBERGER 1999, EICHBERGER 1995, EICHBERGER & ARMING 1996-2002, EICHBERGER et al. 2003-2006, STÖHR et al. 2004, SCHRÖCK et al. 2004, STROBL 1988-2000, STROBL & STÖHR 2001 u.ä.) wurden sie meist wegen Platzmangels nicht berücksichtigt. Im Laufe der Jahre wuchs eine größere Menge solcher an sich wertvollen Nachweise mit genauen Fundorten heran. Daher

wurde die kurzfristige Möglichkeit einer Publikation in der Zeitschrift Sauteria dankbar angenommen.

Wie schon bei den letzten Beiträgen folgt die wissenschaftliche Nomenklatur WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998; in einigen Punkten aktualisiert bei HAEUPLER & MUER 2000; verwendet wurde in wenigen Fällen weiters FITSCHEN 1987, ROTHMALER 2002). Die deutschen Pflanzennamen sind ebenfalls WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998) entnommen; bei stark divergierenden deutschen Namen wird jener von ADLER et al. (2004) bzw. FISCHER et al. (2005) angefügt. Jeder Fundortangabe ist der entsprechende Quadrant der Florenkartierung Mitteleuropas (NIKL FELD 1978) nachgestellt.

Die Ortsbezeichnungen und ihre Schreibweise sind den entsprechenden aktuellen Blättern der Österreichischen Karte 1:50.000 des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen entnommen. In manchen Fällen wurden zusätzlich lokal bekannte, nicht in den Kartenwerken verzeichnete Namen angefügt, wie beispielsweise Bauern- und Hofnamen.

Der jeweilige Sammler ist abgekürzt wiedergegeben. Dabei bedeuten CA Claudia Arming, CE Christian Eichberger und WS Walter Strobl. Alle übrigen Sammler werden ungekürzt angeführt. Die Belege der Pflanzenfunde befinden sich, wenn nicht anders angegeben, in den Privatherbarien der jeweiligen Sammler (Herbarium Claudia Arming, Koppl; Herbarium Christian Eichberger, Salzburg) bzw. im Herbarium des Fachbereichs für Organismische Biologie der Universität Salzburg (SZU). Aus letzterem wurden Belege folgender Sammler mit aufgenommen: F. Eberleín, M. Enzinger, D. Ganglmaier (= D. Laudert), B. Griehser, J.P. Gruber, H.D. Gürtler, W. Hofbauer, S. Krause, R. Krisai, Th. Niederseer, E. Rouschal und O. Stöhr.

2. Pflanzentaxa

Abies alba MILL. — Weiß-Tanne

Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Straßenböschung bei Bachverbauung, ca. 1210msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

Acer platanoides L. — Spitz-Ahorn

Flachgau, Strobl, Rettenkogel-Unterhang, Waldsaum nördlich Unterbergeralm, ca. 680msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

Achillea clavennae L. (= *A. clavenae* L.) — Bittere Schafgarbe, Weißer Speik

Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein-Südwestwand, ca. 1660msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

Aconitum variegatum L. — Bunter Eisenhut

Flachgau, Fuschl am See, Eibenseebach-Ufergehölz, ca. 780msm; 8145/4 (vid. WS, 03.08.1990).

***Actaea spicata* L. — Schwarzfrüchtiges Christophskraut**

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Buchenwald an der Laimeralm-Straße, ca. 600msm; 8246/4 (vid. WS, 1994).

***Adenostyles alliariae* (GOUAN) KERN. — Grauer Alpendost**

Flachgau, Strobl, Ramsau, lichter Buchenwald unterhalb Laufenbergalm, ca. 1130msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Agrimonia eupatoria* L. — Kleiner Odermennig, Echter Odermennig**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Waldsaum oberhalb Haßberg, ca. 580msm; 8044/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Waldlichtung westlich Schöffaubach und östlich Forststraße, ca. 540msm; 8247/3 (vid. WS, 1997). — Tennengau, St. Koloman, Seewaldsee, Almweide oberhalb Auerhütte, ca. 1170msm; 8345/4 (vid. WS, 1992). — Pongau, Werfen, Blühnbachtal, Straße oberhalb Blühnbach südlich Tunnel, ca. 660msm; 8544/2 (vid. WS, 17.09.1989).

***Agrimonia procera* WALLR. — Großer Odermennig, Duft-Odermennig**

Flachgau, St. Gilgen, Hochthron-Osthang, Forststraße im Wetzsteingraben, ca. 850msm; 8346/1 (vid. WS, 1991). — Tennengau, Abtenau, Voglau, Straßenböschung bei Wegscheid, ca. 880msm; 8346/3 (vid. WS, 1991).

***Agrostis alpina* SCOP. — Alpen-Straußgras**

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Untersberg, Kiefernbestand östlich dem Alten Steinbruch, ca. 800msm; 8243/4 (leg. WS, 10.07.1984; SZU).

***Agrostis canina* L. — Sumpf-Straußgras**

Tennengau, Adnet, Niedermoor unmittelbar östlich des Gehöftes Oberschnait, ca. 820msm; 8244/4 (vid. CA, 22.07.1999). — Pongau, Bischofshofen, Haidberg, degeneriertes Hochmoor nordöstlich des Gehöftes Hochmoos, ca. 820msm; 8545/3 (leg. CA, 02.07.1996). — Pinzgau, Mittersill/Paß Thurn, Fichtenhochmoor etwa 400m südöstlich des Paß Thurn und nordwestlich Wasenmoos, ca. 1240msm; 8640/3 (leg. CA, 23.07.2000). — Pinzgau, Mittersill/Paß Thurn, Übergangsmoor etwa 1000m nördlich des Gehöftes Vorderegg, ca. 1200msm; 8640/4 (vid. CA, 28.07.2000). — Pinzgau, Maishofen, Streuwiese unmittelbar südlich des Lahntal Moores, nordöstlich Neubrünnen, ca. 760msm; 8642/2 (vid. CA, 26.07.1997). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorrest nördlich des Schlosses Prielau, ca. 755msm; 8642/4 (leg. CA, 05.07.1997). — Pinzgau, Mittersill/Paß Thurn, Feuchthlandschaftsrest etwa 300m ostsüdöstlich des Gehöftes Vorderegg, ca. 1170msm; 8740/2 (vid. CA, 30.07.2000).

***Agrostis gigantea* ROTH — Riesen-Straußgras**

Tennengau, Puch, Urstein, Ruderalfläche im Augebiet Urstein etwa 300m westlich Prähausen, ca. 440msm; 8244/4 (leg. CA, 27.07.1999; Biotop wurde inzwischen durch Baumaßnahmen zerstört).

***Ajuga genevensis* L. — Genfer Günsel, Heide-Günsel**

Tennengau, Puch, Wegrain südl. Kobleiten, ca. 620msm; 8244/4 (vid. WS, 1999).

© Verlag Alexander Jusch-Dortheimer, Tübingen, Brüssel, Download unter: <http://www.jusch-dortheimer.de>
Alchemilla hoppeana (RCHB.) DALLA TORRE — Hoppes Frauenmantel, Kalk-Silbermantel

Flachgau, Großgmain, Untersberg, Grünerlengebüsch unterhalb Vierkaser, ca. 1520msm; 8243/4 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Strobl, Osterhorn-Gruppe, Almweide am Südhang des Labenberges, ca. 1610msm; 8346/3 (vid. WS, 1991).

Alisma plantago-aquatica L. s.str. — Gewöhnlicher Froschlöffel

Flachgau, Ebenau, Hinterebenau, Holzlagerplatz am Schwarzbach, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Allium carinatum L. ssp. *carinatum* — Gekielter Lauch i.e.S.

Tennengau, St. Koloman, Tauglboden, Straßenböschung beim Gasthof Grundbichl, ca. 800msm; 8345/2 (leg. T. Vogt, 11.08.1983; SZU).

Alnus incana (L.) MOENCH — Grau-Erle

Tennengau, St. Koloman, wasserzügiger Hang oberhalb Almweg zur Tenneralm, ca. 1020msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Graben zwischen Ramsaualm und Sonntagkaralm, ca. 880msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

Alopecurus aequalis SOBOL. — Rotgelbes Fuchsschwanzgras

Pinzgau, Taxenbach, Höf, Lacke unterhalb der Forststraße ins Wolfbachtal, ca. 970msm; 8743/2 (vid. WS, 1995).

Amaranthus retroflexus L. — Zurückgekrümmter Fuchsschwanz, Rauh-Fuchsschwanz

Flachgau, Wals, Viehausen, Gemüseacker westlich Eichetsiedlung, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1995).

Amelanchier ovalis MEDIK. — Mitteleuropäische Felsenbirne

Tennengau, Gaißau, Wieserhörndl, Felsband westlich Latschenalm, ca. 1420msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, St. Koloman, Südwand des kleinen Felskopfes am Steig zwischen Schlenken und Schmittenstein, ca. 1560msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Pongau, Werfen, Werfenweng, Wenger Au, am Weg zur Elmaualm, ca. 1210msm; 8545/2 (vid. WS, 1999).

Andromeda polifolia L. — Rosmarinheide

Tennengau, Abtenau, Moorrest am Eglsee-Südwestufer, ca. 730msm; 8446/1 (vid. WS, 2001).

Androsace lactea L. — Milchweißer Mannsschild, Milch-Mannsschild

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Felswand östlich Schiabfahrt unterhalb Schwaigmühlalm, ca. 1180msm; 8243/4 (vid. WS, 13.10.1989). — Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, Felswand westlich Reitsteig, ca. 1340msm; 8244/3 (vid. WS, 1989).

Anemone ranunculoides L. — Gelbes Windröschen

Flachgau, Eugendorf, Begleitgehölz am Kraiwiesbach etwa 300m nordwestlich

© Verlag Alexander Just: Dorfneuern - Salzburg - chesspi - download unter <https://www.chesspi.at>
des Gehöftes Pichl, ca. 500msm; 8145/1 (leg. CA, 23.04.2002). — Tennengau, Kuchl, Langbühel, Waldrand zwischen Doser und Hof, ca. 480msm; 8345/3 (vid. WS, 1993).

***Antennaria dioica* (L.) P. GAERTN. — Gewöhnliches Katzenpfötchen**

Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein, Almweide oberhalb Schlenksteinalm, ca. 1440msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

***Anthericum ramosum* L. — Ästige Graslilie**

Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Unterhang, Bachufer südlich Felmayeralm, ca. 780msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

***Anthriscus nitida* (WAHLENB.) HAZSL. — Glanz-Kerbel, Alpen-Kerbel**

Flachgau, Großgmain, Untersberg, westlicher Wandfuß eingangs zur Schoß, Hochstaudenflur, ca. 820msm; 8243/4 (vid. WS, 1990).

***Aquilegia atrata* W.D.J. KOCH — Schwarzviolette Akelei**

Flachgau, St. Gilgen, am Forstweg im Buchenwald nordwestlich oberhalb Ried, ca. 620msm; 8246/1 (vid. WS, 1994).

***Arabis alpina* L. s.str. — Alpen-Gänsekresse**

Flachgau, Ebenau, Hinterebenau, Schotterbank am westlichen Schwarzaubach-Ufer, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Arabis bellidifolia* CRANTZ ssp. *bellidifolia* (= *A. pumila* JACQ. ssp. *pumila*) — Gewöhnliche Zwerg-Gänsekresse, Gabelhaar-Zwerg-Gänsekresse**

Flachgau, Koppl, Guggenthal, Dolomitschutt am Gaisberg-Nordhang, ca. 990msm; 8144/4 (vid. WS, 1991). — Flachgau, Strobl, Rinnkogel, trockenes Bachbett am Steig, ca. 1430msm; 8346/2 (vid. WS, 1991).

***Arabis sagittata* (BERTOL.) DC. — Pfeilblättrige Gänsekresse**

Tennengau, Golling, Bluntautal, Schotterbank im Torrener Bach südwestlich Bluntaumühle, ca. 478msm; 8444/2 (leg. CE, 17.06.2005).

***Arctium minus* (HILL) BERNH. s.str. — Kleine Klette**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Haunsberg-Westhang, Straßenböschung oberhalb Haßberg, ca. 650msm; 8044/1 (vid. WS, 1997). — Pongau, Werfen, Wenger-Au, Forststraßenböschung am Hirschkogel-Nordosthang, ca. 1260msm; 8545/2 (vid. WS, 1997).

***Arctium nemorosum* LEJ. — Hain-Klette, Auen-Klette**

Salzburg-Stadt, Morzg, Forststraße im Eichertwald, ca. 435msm; 8244/1 (vid. WS, 1996).

***Arnica montana* L. — Echte Arnika**

Flachgau, Strobl, Viehweide oberhalb Laimeralm, ca. 920msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Asarum europaeum L. ssp. *caucasicum* (DUCHESNE) SOÓ — Kaukasus-Haselwurz

Flachgau, Elsbethen, Glasenbach, Vorderfager, Buchenwald oberhalb Glasenbachklamm, ca. 540msm; 8244/2 (vid. WS, 1999).

Asplenium scolopendrium L. (= *Phyllitis scolopendrium* (L.) NEWMAN) — Hirschzunge

Pinzgau, Unken, südlich Reit, Schluchtwald in breiter Felsschlucht am östlichen Saalachufer westlich vom Lenzenkogel, ca. 620msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990). — Tennengau, Hallein, Dürrnberg, schattige Felswand am Knappensteig, ca. 580msm; 8344/2 (vid. WS, 1991). — Tennengau, Kuchl, Strubau, Kertererbach-Schlucht, auf verfallener Stützmauer, ca. 680msm; 8345/3 (vid. WS, 17.10.1990). — Flachgau, Strobl, Weißenbachtal, Schluchtwald südlich Simonhütte oberhalb Forststraße, ca. 740msm; 8346/2 (vid. WS, 1994). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Blockwald südlich Ramsaualm, ca. 880msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Asplenium septentrionale (L.) HOFFM. — Nordischer Streifenfarn

Pinzgau, Hollersbach, Jochberg, Felsen in einem Feldgehölz südlich des Gehöftes Peilberg, ca. 820msm; 8740/1 (leg. CA, 12.07.2001).

Astragalus glycyphyllos L. — Süßer Tragant, Bärenschote

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Haunsberg-Westhang, bei Sohlschwelle am Waldbach oberhalb Gastein, ca. 520msm; 8043/4 (vid. WS, 1996). — Tennengau, Golling Oberscheffau, nördlich Lammeröfen, Gehölzrest an der Brücke über den Haselbach, ca. 560msm; 8445/2 (vid. WS, 17.10.1990).

Athamanta cretensis L. — Zottige Augenwurz

Flachgau, Strobl, Schuttflur am Ostabfall des Hohen Bergwerkskogels, ca. 1620msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Athyrium distentifolium TAUSCH ex OPIZ — Gebirgs-Frauenfarn

Pongau, Mühlbach am Hochkönig, Hochkeil-Gipfelhang, ca. 1770msm; 8544/4 (vid. WS, 1995).

Bartsia alpina L. — Europäischer Alpenhelm

Pinzgau, Leogang, Schwarzleo, große Niedermoore etwa 550m und 600m nordöstlich Rastboden im Fichtenforst, ca. 1070-1100msm; 8542/3 (leg. CE, 14.08.1997).

Bidens cernua L. — Nickender Zweizahn

Flachgau, Hof bei Salzburg, Fuschlseemoor, sumpfige Mulde in einer wieder bewirtschafteten Streuwiese (erstmalig 2003 wieder gemäht), etwa 300m nördlich Jagdhof, ca. 670msm; 8145/3 (vid. CE, 14.09.2004). — Pinzgau, Leogang, Tümpel etwa 150m südöstlich Grieslehen (etwa 2,6km östlich Leogang), ca. 750msm; 8542/4 (leg. CE, 09.09.1997). — Pongau, Bischofshofen, Winkl, Teich etwa 250m nordöstlich Unterwinkler, ca. 710msm; 8545/4 (vid. CE & M. Sigl, 30.08.1996).

***Blysmus compressus* (L.) PANZ. ex LINK — Zusammengedrückte Quellbinse**

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Feuchtwiese westlich der Glan und südlich der Autobahn, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Puch bei Hallein, Eberstein, Vernässung bei der Schönalm, ca. 850msm; 8244/4 (vid. WS, 1995). — Tennengau, St. Koloman, Feuchtwiese am Nordost-Ufer des Seewaldsees, ca. 1070msm; 8345/4 (vid. WS, 2001). — Lungau, Tweng, Niedermoor in der Twenger Au, ca. 1190msm; 8847/2 (leg. CA, 22.07.2000).

***Botrychium lunaria* (L.) SW. — Echte Mondraute, Mond-Rautenfarn**

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, am Steig zum Salzburger Hochthron, ca. 1840msm; 8244/3 (vid. WS, 1997).

***Brachypodium pinnatum* (L.) P. BEAUV. — Fieder-Zwenke**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Waldsaum oberhalb Haßberg, ca. 580msm; 8044/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Fuschl, Waldrand am Eibensee bach, nördlich der Bundesstraße, ca. 720msm; 8145/4 (vid. WS, August 1990). — Tennengau, Anif, Niederalp, Rif, Königssee Ache-Südufer, ca. 440msm; 8244/3 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Südwesthang, Waldschlag oberhalb Steig, ca. 930msm; 8346/2 (vid. WS, 1991).

***Bromus benekenii* (LANGE) TRIMEN — Einseitwendige Wald-Trespe**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Buchenwald oberhalb Haßberg, ca. 660msm; 8044/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Anif, Niederalp, Gutratberg, Waldweg zum Hohen Götschen, ca. 720msm; 8244/3 (vid. WS, 1997).

***Bromus ramosus* HUDS. s.str. — Allseitwendige Wald-Trespe**

Flachgau, Wals, Gois, Ahorn-Eschenwald am Steinerbach, ca. 450msm; 8243/2 (vid. WS, 1998). — Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Krüzersberg-Südhang, ca. 520msm; 8243/4 (vid. WS, 1998).

***Bromus tectorum* L. — Dach-Trespe**

Tennengau, Hallein, Geleise am Bahnhof Hallein, ca. 445msm; 8344/2 (leg. CE, 06.06.2003).

***Buddleja davidii* FRANCH. — Gewöhnlicher Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch**

Flachgau, Oberndorf, ruderal beim Lagerplatz am Lokalbahnhof Weitwörth-Nußdorf, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Elsbethen, ruderal in der Uferböschung des östlichen Salzachufers unterhalb dem Kraftwerk Urstein beim Flusskilometer 74,7, ca. 440msm; 8244/4 (vid. WS, 1999).

***Calamagrostis canescens* (WEBER) ROTH — Sumpf-Reitgras, Moor-Reitgras**

Flachgau, Seekirchen, verbuschte Streuwiesen und Hochstaudenfluren etwa 600m südöstlich Seeburg, westlich der Fischach, ca. 505msm; 8044/4 (leg. CE, 27.06.2005). — Flachgau, Neumarkt am Wallersee, Röhricht am Wallersee südlich Wierer, ca. 505msm; 8045/3 (vid. WS, 1991).

***Calamagrostis epigejos* (L.) ROTH — Land-Reitgras**

Tennengau, Gaißau, Waldschlag oberhalb der Straße zur Spielbergalm, ca. 1120msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, St. Koloman, Güterweg-Böschung unterhalb Kasbach-Gehöfte, ca. 750msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, Schlagfläche an der Schattau-Forststraße, ca. 970msm; 8447/1 (vid. WS, 1994).

***Calamagrostis villosa* (CHAIX) J.F. GMEL. — Wolliges Reitgras**

Flachgau, Strobl, Postalm, Gipfelhang des Braunedlkogels, ca. 1890msm; 8346/4 (vid. WS, 1995). — Pongau, Bischofshofen, Mühlbach am Hochkönig, Hochkeil-Nordhang, ca. 1720msm; 8544/4 (vid. WS, 1995).

***Callitriche palustris* agg. — Sumpf-Wasserstern**

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Hasenkopf, Waldtümpel bei „Goldener Kutsche,,, ca. 880msm; 8045/4 (vid. WS, 1992). — Tennengau, Abtenau, Osterhorn-Gruppe, Egelseehörndl, Lacke bei verfallener Alm oberhalb Egelseealm, ca. 1660msm; 8346/3 (vid. WS, 1995).

***Campanula glomerata* L. — Knäuel-Glockenblume**

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, extensive Mähwiese südlich Sommerholz, ca. 770msm; 8045/4 (vid. WS, 1992).

***Campanula scheuchzeri* VILL. — Scheuchzers Glockenblume**

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, Almweide bei der Moosgassneralm, ca. 1180msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

***Cardamine bulbifera* (L.) CRANTZ (= *Dentaria bulbifera* L.) — Zwiebel-Zahnwurz**

Flachgau, St. Gilgen, Falkenstein, Buchenwald oberhalb Wolfgang-Kapelle, ca. 720msm; 8246/1 (vid. WS, 1994).

***Cardamine trifolia* L. — Kleeblättriges Schaumkraut**

Tennengau, St. Koloman, Mischwald-Rest am Ostufer des Seewaldsees, ca. 1060msm; 8345/4 (vid. WS, 1998).

***Cardaria draba* (L.) DESV. — Pfeilkresse**

Tennengau, Hallein, Hammer, Gartenmauer beim Schloss Haunsberg, ca. 450msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

***Carex acuta* L. — Schlank-Segge, Spitz-Segge**

Flachgau, Seekirchen, Rest einer abgetragenen Streuwiese etwa 50m nördlich der Firma Frigologo, ca. 510msm; 8144/2 (vid. CA, 01.06.2002). — Pongau, Radstadt, *Iris sibirica*-Wiese ca. 250m südlich des Bahnhofes, unmittelbar nördlich des Lohbaches, ca. 860msm; 8646/1 (vid. CA, 26.05.2003).

***Carex acutiformis* EHRH. — Sumpf-Segge**

Flachgau, Eugendorf, Streuwiese etwa 500m südwestlich Knutzing, ca. 575msm;

8144/2 (vid. CA, 17.06.2003). — Flachgau, Koppl, Niedermoor etwa 300m südwestlich Gniglerbauern, ca. 650msm; 8144/4 (vid. CA, 15.06.1999). — Flachgau, Eugendorf/Kraiwiesen, Niedermoor im Wörlemoos etwa 370m südöstlich des Weilers Unzing, ca. 600msm; 8145/1 (leg. CA, 29.04.2002). — Pongau, Radstadt, *Iris sibirica*-Wiese ca. 250m südlich des Bahnhofes, unmittelbar nördlich des Lohbaches, ca. 860msm; 8646/1 (vid. CA, 26.05.2003).

***Carex alba* SCOP. — Weiße Segge**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Buchenwald nördlich Haßberg, ca. 640msm; 8044/1 (vid. WS, 1997).

***Carex brizoides* L. — Zittergras-Segge, Seegras**

Salzburg-Stadt, Leopoldskron-Moos, feuchte Mähwiese beim Maurerbauer, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 20.06.1990).

***Carex canescens* L. — Graue Segge**

Flachgau, Großmain, Wartberg, Schwarzerlenbestand westlich Meisterbauer, ca. 480msm; 8243/2 (leg. WS, 13.05.1986: SZU). — Tennengau, Adnet, Niedermoor etwa 150m östl. des Gehöftes Oberschnait, ca. 880msm; 8244/4 (leg. CA, 22.05.01).

***Carex capillaris* L. — Haarstielige Segge**

Flachgau, Elsbethen/Oberwinkl, magere Straßenböschung in Vorderfager, etwa 250m südwestlich Fagerreit, ca. 685msm; 8244/4 (leg. CA, 07.07.1998). — Tennengau, St. Koloman, Oberlangenberg, Niedermoore um den Seewaldsee, ca. 1080msm; 8345/4 (vid. CE, 21.06.1994). — Pongau, Abtenau/Schorn, Niedermoor nordwestlich Spießhof, ca. 885msm; 8446/1 (leg. CA, 08.06.1995). — Pinzgau, Leogang, Alpenrosenheide zwischen Asitzkopf und Geierkogel, ca. 1780msm; 8542/3 (leg. CE, 13.08.1997).

***Carex dioica* L. — Zweihäusige Segge**

Lungau, Tamsweg, Lessach, Lessachwinkel, Niedermoor östlich der Lessach, ca. 1230msm; 8748/4 (leg. M. Enzinger, 1999: SZU).

***Carex elata* ALL. — Steife Segge, Bult-Segge**

Flachgau, Eugendorf/Kraiwiesen, Streuwiese etwa 370m nördlich Kraimoos, ca. 620msm; 8145/1 (vid. CA, 22.05.2002). — Flachgau, Ebenau, Versumpungsfläche etwa 400m nördlich Pertill, ca. 660msm; 8244/2 (vid. CA, 29.05.2004). — Tennengau, Adnet, Streuwiese im Nordteil des Adneter Moores etwa 200m südwestlich der Adneter Kirche, ca. 460msm; 8344/2 (leg. CA, 20.05.1997).

***Carex elongata* L. — Walzen-Segge**

Flachgau, Eugendorf, an der Gemeindegrenze zu Koppl, Gehölz neben dem Alterbach, etwa 700m südöstlich des Gehöftes Edt, ca. 660msm; 8144/4 (vid. CA, 28.06.2005).

***Carex ericetorum* POLLICH — Heide-Segge**

Pinzgau, Saalfelden, Steinernes Meer, Hollermaißalm, ca. 1580msm; 8543/1 (leg. F. Eberlein, 1997: SZU).

Tennengau, St. Koloman, oberhalb Steig in der NW-Wand des Schmittensteins, ca. 1660msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

Carex flava L. s.str. — Echte Gelb-Segge, Große Gelb-Segge

Salzburg-Stadt, Saalachspitz, Schotterteich nordöstlich Schießstand, ca. 410msm; 8144/3 (vid. WS, 1998).

Carex frigida ALL. — Eis-Segge

Pinzgau, Leogang, Schwarzleo, Niedermoor auf der Spielbergalm, etwa 250m westnordwestlich Riederalpe, ca. 1450msm; 8541/4 (leg. CE, 08.07.1997).

Carex guestphalica (BOENN. EX RCHB.) BOENN. EX O. LANG (= *C. leersiana* RAUSCHERT, = *C. leersii* F.W. SCHULTZ) — Westfälische Segge, Vielblatt-Segge

Salzburg-Stadt, Rainberg-Südhang, Waldsaum oberhalb Sinnhubstraße, ca. 430msm; 8244/1 (leg. H.D. Gürtler, 1998: SZU). — Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Untersberg, am Weg zum alten Steinbruch westlich Großem Brunntal, ca. 660msm; 8243/4 (vid. WS, 1998).

Carex hostiana DC. — Saum-Segge

Flachgau, Großmain, Streuwiese westlich Freilichtmuseum, ca. 490msm; 8243/4 (vid. WS, 1996). — Salzburg-Stadt, Leopoldskron-Moos, frische Mähwiese am östlichen Glanufer nahe Kendlersiedlung, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1993). — Tennengau, Adnet, auf Niedermooren und Streuwiesen im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adnetter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004). — Pongau, Radstadt/Mandling, Streuwiese im Mandlinger Moor südlich des Bahnhofes, ca. 800msm, 8546/4 (vid. CA, 26.05.2003). — Pongau, Radstadt, *Iris sibirica*-Wiese ca. 250m südlich des Bahnhofes, unmittelbar nördlich des Lohbaches, ca. 860msm; 8646/1 (vid. CA, 26.05.2003). — Pongau, Radstadt, Niedermoor beim Schachenmoos etwa 250m nordwestlich Egger, ca. 1100msm; 8646/2 (vid. CA, 26.05.2003). — Pinzgau, Maishofen, Streuwiese südlich des Schlosses Prielau, ca. 750msm (vid. CA, 05.07.1997). — Pinzgau, Maishofen, Streuwiese im Lahntal Moos etwa 250m nordöstlich Neubrünnen, ca. 790msm; 8642/2 (vid. CA, 24.06.1997).

Carex limosa L. — Schlamm-Segge

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Feuchtwiesen-Rest nordöstlich Esterer, ca. 440msm; 8244/1 (vid. WS, 1993). — Pongau, lokal dominant in Niedermooren südlich des Dientener Sattels, ca. 1340msm; 8644/1 (vid. CE, 30.06.2003).

Carex montana L. — Berg-Segge

Flachgau, Strobl, oberhalb Ischler Ache, östlicher Waldsaum beim „Hölzl“, ca. 540msm; 8247/3 (vid. WS, 1997).

Carex ovalis GOOD. (= *C. leporina* auct. non L.) — Hasenfuß-Segge

Tennengau, Gaißau, feuchte Viehweide oberhalb der Straße zur Spielbergalm, ca.

© Verlag Alexander Jost, Dorfbeuren - Salzburg - Brüssel, download unter www.jost-verlag.at
960msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Breitenberg-Osthang, Almweide unterhalb Gipfel, ca. 1240msm; 8246/3 (vid. WS, 1994).

***Carex paniculata* L. — Rispen-Segge**

Tennengau, Adnet, Streuwiesen-Brache im sog. Santner Moos etwa 200m östlich Sommerau, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004). — Pinzgau, Saalbach, Spielbach, vernässte Mulde an der Straße, ca. 1220msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Carex pendula* HUDS. — Hänge-Segge**

Flachgau, Strobl, Weißbach, Rettenkogel-Unterhang, Fichtenforst unterhalb Moosgassneralm, ca. 910msm; 8247/3 (vid. WS, 1994).

***Carex pilulifera* L. — Pillen-Segge**

Flachgau, Wals, Fichtenforst am Walserberg westlich der Autobahn, ca. 480msm; 8243/2 (leg. WS, 24.05.1988: SZU). — Flachgau, Elsbethen/Oberwinkl, Niedermoor nordwestlich Loitham, nordöstlich Gasthof Mitteregg, ca. 700msm; 8244/2 (leg. CA, 26.06.1998). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorrest südöstlich des Schlosses Prielau, ca. 755msm; 8642/2 (leg. CA, 03.07.1997).

***Carex pulicaris* L. — Floh-Segge**

Tennengau, Puch bei Hallein, Böschung an der alten Wiestalstraße oberhalb Gimpl, ca. 740msm; 8244/4 (vid. WS, 1995).

***Carex randalpina* B. WALLN. — Inn-Segge**

Flachgau, Koppl/Heuberg, verschilftes Niedermoor etwa 270m südlich Stockerer, ca. 660msm; 8144/4 (leg. CA, 10.05.2001). — Flachgau, Eugendorf/Neuhofen, Streuwiesen-Brache etwa 500m nordöstlich des Gehöftes Kraimoos, ca. 580msm; 8145/1 (vid. CA, 20.06.2002). — Tennengau, Adnet, verbrachtes Hang-Niedermoor im Südteil des Adneter Moores, etwa 700m nordwestlich Harreis, ca. 480msm; 8344/2 (vid. CA, 12.06.2004). — Pinzgau, Niedernsill, Niedermoor mit *Iris sibirica* etwa 600m nordwestlich des Badesees Niedernsill, ca. 767msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002).

***Carex remota* L. — Winkel-Segge**

Flachgau, Großgmain, Freilichtmuseum, am Hintersee-Teich, ca. 490msm; 8243/2 (vid. WS, 1999).

***Carex umbrosa* HOST — Schatten-Segge**

Flachgau, St. Gilgen/Scharfling, am Rande einer Streuwiese südlich des Egelsees etwa 500m westlich Kienberg, ca. 480msm; 8246/1 (leg. CA, 17.05.1993).

***Carex viridula* MICHX. — Späte Gelb-Segge, Kleine Gelb-Segge**

Flachgau, Ebenau, Hinterebenau, Holzlagerplatz westlich Schwarzaubach, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Carlina vulgaris* L. s.str. — Gewöhnliche Golddistel**

Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, feuchte Böschung der Schattau-Forststraße, ca. 970msm; 8447/1 (vid. WS, 1994).

***Centaurea pseudophrygia* C.A. MEY. — Perücken-Flockenblume**

Tennengau, Hallein, Dürrnberg, Roßfeld-Osthang, Almweide südlich Truckentannalm, ca. 1240msm; 8344/4 (vid. WS, 1991).

***Centaurea scabiosa* L. ssp. *scabiosa* — Skabiosen-Flockenblume**

Tennengau, Adnet, Halbtrockenrasen ca. 550m westsüdwestlich des Gehöftes Oberkuhmann, ca. 480msm; 8244/4 (vid. CA, 15.06.2005).

***Centaureum erythraea* RAFN — Echtes Tausendgüldenkraut**

Flachgau, St. Gilgen, Buchberg-Südhang, am Sonnen-Rundwanderweg, ca. 700msm; 8246/1 (vid. WS, 1997).

***Centaureum pulchellum* (SW.) DRUCE — Kleines Tausendgüldenkraut**

Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, Schotterstraße westlich Lokalbahn, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Anthering, Antheringer Au, aufgelassene Schottergrube nördlich Jagdhaus, ca. 400msm; 8143/2 (vid. WS, 1997).

***Cephalanthera damasonium* (MILL.) DRUCE — Weißes Waldvögelein**

Salzburg-Stadt, Obergnigl, Waldsaum am Heuberg-Südhang oberhalb Straße zum Gasthof „Schöne Aussicht“, ca. 520msm; 8144/3 (vid. WS, 1996). — Salzburg-Stadt, Morzg, Morzger Hügel, Waldsaum an Forststraße westlich Montforterhof, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 2000).

***Cerastium alpinum* L. ssp. *alpinum* — Gewöhnliches Alpen-Hornkraut**

Pinzgau, Saalfelden, Steinernes Meer, Niederbrunnsulzen, ca. 2375msm; 8543/2 (leg. F. Eberlein, 1999: SZU).

***Cerastium semidecandrum* L. — Sand-Hornkraut**

Tennengau, Hallein, Geleise am Bahnhof Hallein, ca. 445msm; 8344/2 (vid. CE, 06.06.2003).

***Cerastium uniflorum* CLAIRV. — Einblütiges Hornkraut**

Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Rattensbachtal, alpine Rasen etwa 400m nördlich Lärchwand, ca. 2030msm; 8741/4 (leg. CE, 16.09.2003).

***Chaenorhinum minus* (L.) LANGE (= *Microrrhinum minus* (L.) FOURR.) — Kleiner Orant, Kleines Leinkraut, Gewöhnlicher Klaffmund**

Pongau, Dorfgastein, Klammstein, Straßenböschung an der alten Gasteinerstraße, ca. 800msm; 8744/1 (vid. WS, 2000).

***Chaerophyllum aureum* L. — Gold-Kälberkropf**

Flachgau, Eugendorf, Unzing, Waldrand am Wörlemoos, ca. 600msm; 8145/1 (vid. WS, 1991). — Tennengau, Gaißau, Waldrand unterhalb Ascher gegenüber der Abzweigung der Spielbergalm-Straße, ca. 710msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, St. Koloman, Seewaldsee, Wegrain unterhalb Auerhütte, ca. 1070msm; 8345/4 (vid. WS, 1998).

Chaerophyllum hirsutum L. ssp. *villarsii* (W.D.J. KOCH) BRIQ. (= *Ch. villarsii* W.D.J. KOCH) — Alpen-Kälberkropf

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, lichter Kiefernwald auf der Leonhardspitze, ca. 880msm; 8244/3 (vid. WS, 25.08.1989). — Tennengau, Gaißau, lichter Latschenbestand auf der Anzerberghöhe, ca. 1400msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, Adnet, Geschützter Landschaftsteil Adneter Moos, Ufergehölz am Spumbach etwa 500m südsüdwestlich der Kirche von Adnet, ca. 470msm; 8344/2 (leg. CE, 25.06.2004). — Flachgau, St. Gilgen, Almweide unterhalb Zinkeneck, ca. 1360msm; 8346/1 (vid. WS, 1991). — Flachgau, Strobl, Sparber, am Aufstieg bei der Eisenleiter, ca. 1480 msm; 8346/2 (leg. WS, 16.07.1983: SZU).

Chrysosplenium alternifolium L. — Wechselblättriges Milzkraut

Flachgau, Henndorf, Henndorfer Wald, vernässte Mulde nördlich Lichtentann, ca. 720msm; 8145/1 (vid. WS, 1997).

Cichorium intybus L. — Gewöhnliche Wegwarte

Flachgau, St. Gilgen, Straßenböschung westlich Brunn, ca. 550msm; 8246/1 (vid. WS, 1994). — Flachgau, Ebenau, Heiligenstein, trockener Wiesenrain unterhalb Roßbach, ca. 760msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Circaea alpina L. — Alpen-Hexenkraut

Flachgau, Hof, am Rande Gebüschsaum am Rande einer Streuwiesen-Brache etwa 370m nordnordwestlich des Jagdhofes, ca. 665msm; 8145/3 (leg. CA, 26.06.2002). — Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, Waldschlag am Reitsteig, ca. 940msm; 8244/3 (vid. WS, 2000). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Forststraße am Eibenberg-Nordhang, ca. 760msm; 8246/1 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Blockwald am Steig zur Laufenbergalm, ca. 820msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Circaea lutetiana L. — Gewöhnliches Hexenkraut, Wald-Hexenkraut

Flachgau, Faistenau, Hintersee, Forststraßenböschung gegen Schafbachalm, ca. 940msm; 8245/2 (vid. WS, 10.08.1990). — Flachgau, Strobl, Weißenbach, Buchenwald an der Laimeralm-Straße, ca. 600msm; 8246/4 (vid. WS, 1994).

Cirsium arvense (L.) SCOP. — Acker-Kratzdistel

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, Almweide der Moosgassneralm, ca. 1110msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

Cirsium eriophorum (L.) SCOP. — Wollköpfige Kratzdistel

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, Forststraßen-Böschung unterhalb Sonntagkaralm, ca. 1140msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

Cirsium palustre (L.) SCOP. — Sumpf-Kratzdistel

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, Almweide der Moosgassneralm, ca. 1110msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

***Cirsium rivulare* (JACQ.) ALL. — Bach-Kratzdistel**

Tennengau, Adnet, auf Niedermooren und Streuwiesen im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004). — Tennengau, Adnet/Heiligenstein, Hang-Niedermoor etwa 500m nördlich der Brücke über den Almbach, ca. 565msm; 8245/1 (vid. CA, 04.06.1999).

***Cirsium vulgare* (SAVI) TEN. — Gewöhnliche Kratzdistel**

Tennengau, Hallein, Kaltenhausen, Waldschlag nördlich Großen Barmstein, ca. 720msm; 8344/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Rettenkogel-Unterhang, Almweide nördlich Unterbergeralm, ca. 680msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

***Colchicum autumnale* L. — Herbst-Zeitlose**

Tennengau, Golling, Torren, Wiese östlich Tannhauser, ca. 480msm; 8444/2 (vid. WS, 1991).

***Corallorrhiza trifida* CHÂTEL. — Europäische Korallenwurz**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Buchenwald südlich Ramsaualm, ca. 1000msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Cornus sericea* L. — Weißer Hartriegel**

Flachgau, Elsbethen, Glaserbach, Klaus, Schatteck-Westhang, ca. 750msm; 8244/4 (vid. WS, 2002).

***Corydalis cava* (L.) SCHWEIGG. & KOERTE — Hohler Lerchensporn**

Flachgau, Faistenau, Hintersee, Gruberalm, ca. 1030msm; 8345/2 (vid. WS, 2000).

***Cotoneaster dielsianus* PRITZ. — Diels Zwergmispel**

Flachgau, Hof bei Salzburg, Hecke am Parkplatz für das Strandbad Hof, ca. 675msm; 8145/3 (vid. CE, 14.09.2003).

***Cotoneaster horizontalis* DECNE. — Fächer-Zwergmispel, Waagerechte Steinmispel**

Tennengau, Kuchl, Natura-2000-Gebiet Taugl-Gries, etwa 700m südöstlich der Kirche von Vigaun (am orographisch linken Ufer), Schneeheide-Kiefernwald (Erico-Pinetum sylvestris salicetosum eleagni), ca. 465msm; 8344/2 (leg. CE, 23.09.2003).

***Cotoneaster tomentosus* LINDL. — Filzige Zwergmispel, Filz-Steinmispel**

Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein-Südwand, ca. 1670msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990: SZU). — Pinzgau, Lofer, Weißbach, Kammerlingalm, an der Abzweigung des Steiges ins Kematental an der Forststraße zum Alpelbach, ca. 1250msm; 8442/4 (leg. F. Eberlein, 05.09.2004: SZU).

***Crepis alpestris* (JACQ.) TAUSCH — Alpen-Pippau**

Tennengau, Golling, Hagengebirge, Hintere Schlumalm, ca. 1690msm; 8444/3 (leg. F. Eberlein, 1995: SZU).

Tennengau, Adnet, auf Niedermooren und Streuwiesen im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004).

Crepis paludosa (L.) MOENCH — Sumpf-Pippau

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, feuchte Böschung der Forststraße
östlich Rotwand, ca. 1140msm; 8347/1 (vid. WS, 1994).

Crocus tommasinianus HERBERT — Tommasini-Krokus

Flachgau, Elsbethen, Auwald entlang der Salzach etwa 250m westlich Schloss Goldenstein (wahrscheinlich aus Gärten mit Erdmaterial ausgebracht), ca. 425msm; 8244/1 (vid. CE, 20.03.2003).

Crocus vernus (L.) HILL ssp. *albiflorus* (KIT.) ASCH. & GRAEBN. (= *C. albiflorus* KIT.) — Weißer Krokus

Tennengau, Vigaun, Rengerberg, Nigelkaralm, ca. 1420msm; 8345/1 (vid. WS, 01.04.1991). — Flachgau, Strobl, Braunedel-Kogel, Almweide bei der Einberg Alm, ca. 1190msm; 8346/4 (vid. WS, 1993).

Cuscuta europaea L. — Nessel-Seide, Nessel-Teufelszwirn

Tennengau, St. Koloman, Böschung des Güterweges zur Schlenksteinalm, ca. 1140msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Pinzgau, Leogang, vereinzelt am Rand des Ufergehölz an der Leoganger Ache zwischen Leogang und Hütten, ca. 800-810msm; 8542/3 und 8542/4 (leg. CE, 22.09.1997).

Cyclamen purpurascens MILL. — Wildes Alpenveilchen, Zyk lame

Flachgau, Strobl, Kammersbachtal, Buchenwald am Westhang des Hohen Plattenecks, ca. 1120msm; 8346/4 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Golling, Paß Lueg, Buchenwald ausgangs der Salzachöfen, ca. 490msm; 8445/1 (vid. WS, 1991).

Cyperus fuscus L. — Braunes Zypergras

Flachgau, Anthering, Antheringer Au, aufgelassene Schottergrube nördlich Jagdhaus, ca. 400msm; 8143/2 (vid. WS, 1997).

Cystopteris montana (LAM.) DESV. — Berg-Blasenfarn

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, feuchte Felsspaltenflur an der Steinernen Stiege am Reitsteig, ca. 1400msm; 8244/3 (leg. WS, 14.08.1990: SZU). — Lungau, Tweng, Lantschfeld, Quellflur nordwestlich der Postalm, ca. 1300msm; 8847/1 (leg. CA, 27.07.2000).

Dactylorhiza traunsteineri (SAUT. EX RCHB.) SOÓ s.str. — Traunsteiner's Kna-
benkraut, Traunsteiner-Fingerknabenkraut

Flachgau, Hof bei Salzburg, Fuschlseemoor, nur unregelmäßig gemähte Streuwiese etwa 600m nördlich Jagdhof, ca. 665msm; 8145/3 (vid. CE, 30.06.2004). — Tennengau, Abtenau, Rigaus, Flachmoor nordwestlich Hintersteinhäusl, 620msm; 8446/1 (vid. WS, 1995).

Danthonia decumbens (L.) DC. **ssp. decumbens** — Gewöhnlicher Dreizahn

Tennengau, Abtenau, Voglau, Hangkante oberhalb Aubachfall, ca. 610msm; 8445/2 (vid. WS, 1994). — Pinzgau, Maishofen, Streuwiese im Lahntal Moor etwa 250m nordöstlich Neubrünnen, ca. 790msm; 8642/2 (vid. CA, 24.06.1997).

Dianthus superbus L. **ssp. alpestris** ČELAK. — Alpen-Pracht-Nelke

Lungau, Tweng, Bachrand südsüdwestlich des Gehöftes Dengen, ca. 1200msm; 8847/2 (leg. CA, 22.07.2000). — Lungau, St. Margarethen, Rand eines Niedermoores etwa 1,3km südwestlich Esseralp, direkt an der Landesgrenze zu Kärnten, ca. 1770-1780msm; 8947/4 (leg. CE, 03.08.1998).

Digitalis grandiflora MILL. — Großblütiger Fingerhut

Flachgau, Fuschl am See, Eibensee-Gebiet, Buchenwald oberhalb der Forststraße vom Mariannenkopf zum Höllkar, ca. 1060msm; 8146/3 (vid. WS, 03.08.1990). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Schlagfläche unterhalb der Forststraße zwischen Almkogel und Höllkar, östlich des Steiges zur Obenauer Alm, ca. 1050msm; 8146/3 (vid. WS, 25.08.1990). — Tennengau, Puch bei Hallein, Waldrand oberhalb trockener Mähwiese nördlich Filind, ca. 480msm; 8244/4 (vid. WS, 1993). — Tennengau, Hallein, lichter Hainbuchen-Bestand im Steilhang westlich der Ruine Türnl, ca. 710msm; 8344/2 (vid. WS, 1998). — Tennengau, Golling, Oberscheffau, südlicher Uferhang des Haselgrabens nördlich der Lammeröfen, ca. 580msm; 8445/2 (vid. WS, 17.10.1990). — Tennengau, Oberscheffau, Tennengebirge, Forststraßenböschung unterhalb Rauhen Sommereck, ca. 820msm; 8445/2 (vid. WS, 1993).

Digitaria ischaemum (SCHREB. ex SCHWEIGG.) SCHREB. ex MÜHL. — Faden-Fingerhirse, Fadenhirse

Flachgau, Bürmoos, Geleise am Bahnhof der Lokalbahn, ca. 435msm; 8043/2 (leg. CE, 09.08.2003).

Dipsacus fullonum L. — Wilde Karde

Flachgau, Oberndorf, Straßenrand etwa 700m südöstlich Ziegelhaiden (östlich an der Straße Richtung Lamprechtshausen), ca. 420msm; 8043/2 (vid. CE, 18.06.2003). — Flachgau, Koppl, Waldrand etwa 300m nordöstlich der Kirche von Koppl, ca. 720msm; 8144/4 (vid. CE, CA & Th. Eberl, 10.06.2004).

Doronicum austriacum JACQ. — Österreichische Gemswurz

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel-Unterhang, Schlagfläche an der Forststraße zum Fahrnberg, ca. 800msm; 8247/3 (vid. WS, 1994). — Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel-Unterhang, Fichtenforst an der Forststraße zum Fahrnberg, ca. 1020msm; 8347/1 (vid. WS, 1994). — Pinzgau, Zell am See, Thumersbach, Fichtenforst am Ochsinger-Westhang, ca. 1530msm; 8643/3 (vid. WS, 1991).

Draba muralis L. — Mauer-Felsenblümchen

Salzburg-Stadt, Sam, Bahndamm südlich Autobahn, ca. 430msm; 8144/3 (leg. W. Hofbauer, 1999: SZU).

Flachgau, Wals-Siezenheim, Gois, Hochmoor-Rest südlich Autobahndreieck, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Adnet, am Fuße eines Hang-Niedermoores im südlichen Teil des Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 500m nordwestlich Harreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004). — Pinzgau, Leogang, Niedermoor etwa 500m nordwestlich Rastboden, ca. 1150msm; 8542/3 (leg. CE, 13.07.1997). — Pinzgau, Leogang, Pirzbichl, Niedermoor auf der Durchenalm, ca. 1570msm; 8542/4 (vid. CE, 17.07.1997).

Dryopteris affinis (LOWE) FRASER-JENK — Spreuschuppiger Wurmfarne, Falscher Wurmfarne

Flachgau, Schleedorf, Tiefsteinbachklamm, ca. 570msm; 8044/2 (vid. WS, 2001). — Flachgau, Koppl, Heuberg, Waldschlag unterhalb altem Forsthaus, ca. 720msm; 8144/4 (vid. WS, 2000). — Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, Fichtenforst im Fischbach-Quelltrichter, ca. 850msm; 8145/2 (vid. WS, 1999). — Flachgau, Elsbethen, Glaserbach, Vorderfager, Eschenbestand am Glaserbachklamm-Nordhang, ca. 550msm; 8244/2 (vid. WS, 1999). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Buchenwald am Nasenberg-Nordhang, ca. 610msm; 8246/1 (vid. WS, 2000). — Tennengau, Golling, Torren, östlich Gollinger Wasserfall, Mischwald beim Wasserschloss, ca. 520msm; 8344/4 (vid. WS, 2000). — Tennengau, Rußbach, Gamsfeld, Traunwandbach, ca. 1080msm; 8346/4 (vid. WS, 2001). — Tennengau, Golling, Torren, Fichten-Blockwald südlich St. Bartholomäus-Kapelle, ca. 500msm; 8444/2 (vid. WS, 2000).

Dryopteris carthusiana (VILL.) H.P. FUCHS — Gewöhnlicher Dornfarne, Dorn-Wurmfarne

Flachgau, Elixhausen, Ursprung, Fichtenforst östlich Hained, ca. 560msm; 8144/1 (vid. WS, 1996).

Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY — Breitblättriger Dornfarne, Dunkler Dornfarne

Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, Haunsberg, Fichtenforst oberhalb Pabing, ca. 480msm; 8043/4 (vid. WS, 1992). — Pongau, Schwarzach, Goldegg, Buchberg-Nordhang, Mischwald oberhalb Wenger Bach, ca. 870msm; 8644/3 (vid. WS, 2000). — Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Waldsaum oberhalb Straße, ca. 1050msm; 8641/2 (vid. WS, 2001).

Echium vulgare L. — Gewöhnlicher Natternkopf

Flachgau, Wals, ostseitiges Saalachufer bei Grünau, ca. 430msm; 8243/2 (vid. WS, 07.06.1990).

Eleocharis quinqueflora (HARTMANN) O. SCHWARZ — Armblütige Sumpfbirse

Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, mehrfach in einem Niedermoor nordwestlich bei Mooswirt und im Wasenmoos nordwestlich und nördlich Mooswirt, ca. 765-770msm; 8145/1 und 8145/2 (leg. CE, 26.05.2002). — Flachgau, Thalgau, Egg, Niedermoor im sog. „Stillen Tal“, etwa 700m südöstlich Kienberg, (SO des Weges), ca. 715msm; 8145/4 (leg. CE, 26.05.2002). — Pinzgau, Niedersill, Niedermoor

© Verlag Alexander Jost, Dornheim, Salzburg
etwa 600m nordwestlich des Badesees Niedersill, ca. 767msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002). — Lungau, Weißpriach, Niedermoorbereich am Zusammenfluss Weißpriachbach und Znachbach, etwa 2,3km südöstlich Ulnhütte, ca. 1275msm; 8747/4 (vid. CE, 22.07.2001). — Lungau, Lessach, Niedermoor etwa 500m nord-nordwestlich Winkelkapelle, ca. 1220msm; 8748/4 (leg. CE, 04.07.2001).

***Elymus caninus* (L.) L. (= *Agropyron caninum* (L.) BEAUV.)** — Hunds-Quecke

Pinzgau, Leogang, Leoganger Steinberge, Weg zum Brandlhorn, ca. 1870msm; 8542/2 (leg. F. Eberlein, 2001: SZU).

***Empetrum hermaphroditum* HAGERUP** — Zwitterige Krähenbeere

Flachgau, Großmain, Untersberg, Latschengebüsch oberhalb Klingeralm, ca. 1640msm; 8243/4 (vid. WS, 1993).

***Epilobium alsinifolium* VILL.** — Mierenblättriges Weidenröschen

Flachgau, Faistenau, Hintersee, Griebbach-Kessel, ca. 800msm; 8245/3 (vid. WS, 1992).

***Epilobium angustifolium* L.** — Schmalblättriges Weidenröschen, Waldschlag-Weidenröschen

Flachgau, Obertrum, Haunsberg, Waldschlag oberhalb Brandstätt, ca. 720msm; 8044/3 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Sommerholz, Forststraßen-Böschung nördlich Hasenkopf, ca. 870msm; 8045/4 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Bergheim, Feldgehölz westlich Plain-Kemating, ca. 470msm; 8144/3 (vid. WS, 1993). — Flachgau, Großmain, Waldschlag westlich Gasthof Wartberg, ca. 460msm; 8243/2 (vid. WS, 08.09.1989). — Tennengau, Gaißau, Waldlichtung oberhalb der Spielbergalm-Straße, ca. 1030msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

***Epilobium palustre* L.** — Sumpf-Weidenröschen

Flachgau, Großmain, Streuwiese bei Holzeck, ca. 480msm; 8243/2 (vid. WS, 1998).

***Epipactis atrorubens* (HOFFM.) BESSER** — Rotbraune Stendelwurz

Flachgau, St. Gilgen, Falkenstein, Waldlichtung nahe Scheffelblick, ca. 770msm; 8246/1 (vid. WS, 1994).

***Epipactis palustris* (L.) CRANTZ** — Sumpf-Stendelwurz

Flachgau, Eugendorf/Knutzing, Streuwiese etwa 320m südwestlich Moosmühle, ca. 580msm; 8144/2 (vid. CA, 09.06.2003). — Tennengau, Adnet, Niedermoor im südlichen Teil des Geschützten Landschaftsteils Adneter Moos etwa 550m nord-westlich Harreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004). — Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, feuchte Böschung der Schattauforststraße, ca. 970msm; 8447/1 (vid. WS, 1994).

***Equisetum fluviatile* L.** — Teich-Schachtelhalm

Flachgau, Bürmoos, Torfstich östlich Waha-See, ca. 440msm; 8043/2 (vid. CE, Juli 1993). — Flachgau, Wals, Walserberg, Wiesengraben nordöstlich des Walserberger Moores, ca. 490msm; 8243/2 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Großmain,

Untersberg-Nordhang, Hacklwald, vernässte Mulde im Fichtenforst östlich Buchegger, ca. 570msm; 8243/4 (vid. WS, 1996). — Lungau, St. Margarethen, mehrfach im Landschaftsschutzgebiet Saumoos (Hochmoor), ca. 1040msm; 8948/1 (vid. CE, Juli 1998).

Equisetum hyemale L. — Winter-Schachtelhalm

Tennengau, Golling, Auwaldrest am östlichen Salzachufer nördlich Bahnhof Golling, ca. 470msm; 8344/4 (vid. WS, 1991). — Flachgau, Strobl, Sparber-Untersberg, Waldbach am Steig nördlich Langeralm, ca. 700msm; 8346/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Golling, Torren, Auwaldrest am westlichen Salzachufer nördlich Torrener Bachmündung, ca. 470msm; 8444/2 (vid. WS, 1991).

Equisetum pratense EHRH. — Wiesen-Schachtelhalm

Pinzgau, Bruck-Fusch, Inneres Fuschertal, Feuchthang im Käfertal, ca. 1500msm; 8842/4 (leg. R. Krisai, 1999: SZU).

Equisetum sylvaticum L. — Wald-Schachtelhalm

Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Breitenberg-Westhang, Almweide unterhalb Gipfel, ca. 1240msm; 8246/3 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, Fichtenforst an der Schattau-Forststraße, ca. 970msm; 8447/1 (vid. WS, 1994).

Equisetum telmateia EHRH. — Riesen-Schachtelhalm

Tennengau, Gaißau, vernässte Hangmulde nördlich der Abzweigung der Spielbergalm-Straße, ca. 680msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

Equisetum variegatum SCHLEICH. ex WEBER & D. MOHR — Bunter Schachtelhalm

Tennengau, Golling, Torren, Auwaldrest am westlichen Salzachufer nördlich Torrener Bachmündung, ca. 470msm; 8444/2 (vid. WS, 1991). — Pinzgau, Maishofen, am Wegrand im Lahntalmoor nordöstlich Neubrünnen, ca. 760msm; 8642/2 (leg. CA, 13.07.1997).

Eragrostis minor HOST — Kleines Liebesgras

Flachgau, Bürmoos, Geleise am Bahnhof der Lokalbahn, ca. 435msm; 8043/2 (vid. CE, 09.08.2003).

Eriogon annuus (L.) PERS. *ssp. annuus* — Gewöhnlicher Einjähriger Feinstrahl, Eigentliches Weißes Berufkraut

Tennengau, Oberalm, Forststraßenböschung oberhalb Sulzenbach, ca. 500msm; 8344/2 (vid. WS, 04.10.1990). — Tennengau, Adnet, ruderal am Straßenrand der alten Straße zur Sulzenbachmühle, ca. 460msm; 8344/2 (vid. WS, Oktober 1990).

Eriogon glabratum BLUFF & FINGERH. — Kahles Berufkraut

Flachgau, Strobl, Nordosthang des Hohen Bergwerkskogels, ca. 1680msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Eriophorum angustifolium HONCK. — Schmalblättriges Wollgras

Tennengau, Adnet, Niedermoor im südlichen Teil des Geschützten Landschafts-

teils Adneter Moos etwa 550m nordwestlich Harreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorbereich im nördlichen Teil des Lahntaler Moores, ca. 760msm; 8642/2 (vid. CA, 10.06.1997).

***Eriophorum latifolium* HOPPE — Breitblättriges Wollgras**

Tennengau, Gaißau, vernässte Weide an der Straße zur Spielbergalm, ca. 960msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, Adnet, auf Niedermooren und Streuwiesen im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004). — Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Hangmoor oberhalb Straße, ca. 1250msm; 8541/4 (vid. WS, 2001). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorbereich im nördlichen Teil des Lahntaler Moores, ca. 760msm, 8642/2 (vid. CA, 10.06.1997). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorrest nördlich Schloss Prielau, ca. 755msm; 8642/4 (vid. CA, 22.06.1997).

***Erophila verna* (L.) DC. ssp. *verna* (= *Draba verna* L. ssp. *verna*) — Frühlings-Hungerblümchen**

Salzburg-Stadt, Nonntal, Parkplatz Freisaal, ca. 425msm; 8244/1 (vid. WS, 1998).

***Erucastrum gallicum* (WILLD.) O.E. SCHULZ — Französische Hundsrauke**

Tennengau, Vigaun, südliches Tauglufer oberhalb Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Abtenau, Voglau, Alpichl-Forschestraße, Felswand am Straßenrand, ca. 1100msm; 8345/4 (leg. F. Eberlein, 1997: SZU).

***Euonymus latifolia* (L.) MILL. — Breitblättriges Pfaffenhütchen**

Tennengau, Gaißau, Kesselwand-Boden, ca. 580msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

***Euphorbia stricta* L. — Steife Wolfsmilch**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, St. Pankraz, Straße zum Steinbruch, ca. 510msm; 8043/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Schlagfläche unterhalb der Forststraße zwischen Almkogel und Höllkar, ca. 1010msm; 8146/3 (leg. WS, 25.08.1990: SZU). — Flachgau, Strobl, Weißenbachtal, Böschung der Postalmstraße unterhalb Fellneralm, ca. 700msm; 8346/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Abtenau, Voglau, Aubach-Graben, ca. 880msm; 8346/3 (vid. WS, 1991).

***Euphorbia verrucosa* L. — Warzen-Wolfsmilch**

Tennengau, Vigaun, Taugl, Straßenböschung nördlich St. Koloman, ca. 780msm; 8345/1 (vid. WS, 1998).

***Euphrasia salisburgensis* FUNCK ex HOPPE — Salzburger Augentrost**

Tennengau, Vigaun, Kiefernbestand am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

Fallopia japonica (HOUTT.) RONSE DECR. — Japanischer Flügelknöterich, japanischer Staudenknöterich

Flachgau, Elsbethen, Glasenbach, Klaus, Waldschlag am Schatteck-Westhang, ca. 750msm; 8244/4 (vid. WS, 2002).

Festuca altissima ALL. — Wald-Schwingel

Flachgau, St. Gilgen, Plomberg, Fichtenforst beim Felssturz unterhalb Plombergstein, ca. 700msm; 8246/1 (vid. WS, 1997).

Festuca brevipila TRACEY (= *F. trachyphylla* (HACK.) KRAJINA) — Rauhblättriger Schaf-Schwingel, Rauhblatt-Schwingel

Tennengau, Puch, Salzach-Böschung unterhalb Kraftwerk Urstein, ca. 430msm; 8244/4 (leg. J.P. Gruber, 1993: SZU).

Festuca ovina L. s.str. — Eigentlicher Schaf-Schwingel

Flachgau, Neumarkt am Wallersee, Streuwiese nordöstlich Pragerfischer, ca. 510msm; 8045/3 (vid. WS, 1991).

Forsythia x intermedia ZAB. — Hybrid-Forsythie

Flachgau, Anthering, mehrfach am Waldrand östlich der Straße nach Oberndorf, ca. 400msm; 8043/4 und 8143/2 (vid. CE, 07.04.2003).

Fragaria moschata (DUCHESNE) WESTON — Zimt-Erdbeere

Tennengau, St. Koloman, Gehölz am Ostufer des Seewaldsees, ca. 1080msm; 8345/4 (vid. WS, 1998).

Gagea lutea (L.) KER. GAWL — Wald-Gelbstern

Flachgau, Faistenau, Hintersee, Gruberalm, ca. 1030msm; 8345/2 (vid. WS, 2000).

Galanthus nivalis L. — Kleines Schneeglöckchen

Tennengau, Hallein, adventiv in Auwaldrest am westlichen Salzachufer nahe der Stauwehr der Papierfabrik, ca. 450msm; 8344/2 (leg. B. Griehser, 1995: SZU).

Galeopsis tetrahit L. — Gewöhnlicher Hohlzahn, Dorn-Hohlzahn

Flachgau, Fuschl am See, ruderal am Parkplatz beim Eibenseebach nahe der Bundesstraße, ca. 700msm; 8145/4 (vid. WS, 03.08.1990). — Flachgau, Ebenau, Hinter-ebenau, ruderal an Forststraße östlich des Schwarzaubaches, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Gaißau, Wegrain oberhalb der Straße zur Spielbergalm, ca. 940msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

Galium palustre L. ssp. *palustre* — Sumpf-Labkraut

Flachgau, Koppl, Uferröhricht am Weiher östlich des Koppler Moores, ca. 760msm; 8144/4 (vid. WS, 1997).

Galium verum L. s.str. — Echtes Labkraut, Gelb-Labkraut

Tennengau, Adnet, Magerwiese etwa 120m südsüdöstlich des Gehöftes Niederhof, ca. 590msm; 8344/2 (vid. CA, 22.06.1994).

***Gentiana asclepiadea* L. — Schwalbenwurz-Enzian**

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Hasenkopf-Osthang, Fichtenforst oberhalb Forststraße, ca. 860msm; 8045/4 (vid. WS, 1992).

***Gentiana clusii* PERR. & SONG. — Stengelloser Kalk-Enzian, Kalk-Glocken-Enzian**

Tennengau, Adnet, Niedermoor im Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 500m südöstlich der Kirche, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 22.06.1994). — Flachgau, Strobl, Grat vom Hohen Bergwerkskogel zum Rettenkogel, ca. 1740msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Gentiana pannonica* SCOP. — Ungarischer Enzian, Ostalpen-Enzian**

Flachgau, Faistenau, Hintersee, ehemalige Almweide oberhalb der Schafbachalm, ca. 1120msm; 8245/4 (vid. WS, 10.08.1990).

***Gentiana utriculosa* L. — Schlauch-Enzian**

Tennengau, Golling, Bluntau, Schotterbank im Torrener Bach südwestlich Bluntau, ca. 478msm; 8444/2 (leg. CE, 17.06.2005).

***Gentianella aspera* (HEGETSCHW.) SKALICKÝ, CHRTEK & GILL — Rauher Fransenenzian, Rauher Kranzenzian**

Tennengau, Gaißau, Wieserhörndl-Südhang, Almweide, ca. 1560msm; 8245/3 (leg. WS, 31.08.1990: SZU).

***Gentianella ciliata* (L.) BORKH. (= *Gentianopsis ciliata* (L.) MA) — Gewöhnlicher Fransenenzian**

Tennengau, Gaißau, Wieserhörndl-Südhang, ca. 1540msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, Hallein, Bad Dürrenberg, Roßfeld-Osthang, Almweide südlich Truckentannalm, ca. 1220msm; 8344/4 (vid. WS, 1991). — Pongau, Werfen, Wenger-Au, am Weg zur Elmaualm, ca. 1420msm; 8545/2 (vid. WS, 1997).

***Geranium columbinum* L. — Tauben-Storchschnabel**

Pinzgau, Hollersbach, Jochberg, Feldgehölz südlich des Gehöftes Peilberg, ca. 820msm; 8740/1 (leg. CA, 02.07.2001).

***Geranium palustre* L. — Sumpf-Storchschnabel**

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Neufahrn Wald, Streuwiese südlich Pionierbrücke, ca. 650msm; 8045/4 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Ebenau, Weißbachufer oberhalb Einmündung in den Wiestalstausee, ca. 560msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Geranium phaeum* L. ssp. *phaeum* — Gewöhnlicher Brauner Storchschnabel**

Salzburg-Stadt, östlich Königswäldchen am Leopoldskroner Weiher, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1995).

Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, Pabing, vernässte Wiese nördlich „Erdbeer-
teich,,, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Neumarkt am Wallersee,
Neufahrn Wald, vernässte Mulde östlich Glemegggraben, ca. 650msm; 8045/4 (vid.
WS, 1997). — Flachgau, Wals, Gois, Walser Wiesen, vernässte Mulde am Salzweg,
ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1999). — Salzburg-Stadt, Leopoldskron-Moos, Ent-
wässerungsgraben beim Maurerbauern, ca. 425msm; 8244/1 (vid. WS, 1995).

Gnaphalium sylvaticum L. — Wald-Ruhrkraut

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Waldweg am Hasenkopf-Südhang, ca.
880msm; 8045/4 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Faistenau, Tiefbrunnau, Straßen-
böschung oberhalb der Forststraße Richtung Schafbachalm, ca. 940msm; 8245/2
(vid. WS, 10.08.1990).

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN — Eichenfarn

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, Fichtenwald unterhalb der „Steinernen
Stiege,,, ca. 1260msm; 8244/3 (vid. WS, August 1990). — Flachgau, Grödig, Für-
stenbrunn, Untersberg, lichter Fichtenforst westlich Schiabfahrt, ca. 580msm;
8244/3 (vid. WS, 07.09.1990). — Tennengau, Gaißau, Wieserhörndl, Fichtenforst
oberhalb Almweg zur Latschenalm, ca. 1130msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). —
Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Buchenwald am Nasenberg-Nordhang, ca.
610msm; 8246/1 (vid. WS, 2000). — Tennengau, Vigaun, St. Koloman, Buchen-
wald am Seewaldsee-Abfluss, ca. 1070msm; 8345/4 (vid. WS, 1998). — Flachgau,
Faistenau, Hintersee, Buchenwald oberhalb Wetzsteingraben, ca. 1340msm;
8346/1 (vid. WS, 1991). — Pinzgau, Saalbach, Westhang des Spielbergbaches,
Fichtenforst, ca. 1130msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

Gymnocarpium robertianum (HOFFM.) NEWMAN — Ruprechtsfarn, Ruprechts-
Eichenfarn

Salzburg-Stadt, Buchenwald am Hellbrunner Berg, ca. 480msm; 8244/1 (vid. WS,
2000). — Pinzgau, Mittersill/Paß Thurn, Hecke etwa 250m nordwestlich des Ge-
höftes Brennstein, ca. 1180msm; 8740/2 (leg. CA, 27.05.2001)

Gypsophila repens L. — Kriechendes Gipskraut

Tennengau, St. Koloman, NO-Wand des Schmittensteins oberhalb Steig, ca.
1670msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990: SZU).

Hammarbya paludosa (L.) KUNTZE — Weichwurz, Weichstendel

Pinzgau, Lend, Übergangsmoor 200m westlich Böndlsee, ca. 850msm; 8644/3
(vid. WS, 1997).

Hedera helix L. — Gewöhnlicher Efeu

Flachgau, Koppl, Guggenthal, Buchen-Tannenwald an der Gaisbergstraße, ca.
680msm; 8144/4 (vid. WS, 03.02.1991).

***Helianthemum nummularium* (L.) MILL. ssp. *obscurum* (ČELAK.) HOLUB (= *H. ovatum* (VIV.) DUNAL)** — Ovalblättriges Sonnenröschen, Trübgrünes Sonnenröschen

Tennengau, Rußbach, Gamsfeld, Traunwandalm, ca. 1310msm; 8346/4 (vid. WS, 2001).

***Helleborus niger* L.** — Schwarze Nieswurz, Christrose, Schneerose

Tennengau, Oberalm, Osthang des Oberalmer Berges, Buchenwald westlich Maurerbauer, ca. 560msm; 8244/4 (vid. WS, 04.11.1990). — Tennengau, Adnet, Riedl, Buchenwald oberhalb Landesstraße nach Adnet, ca. 500msm; 8244/4 (vid. WS, 1994). — Pinzgau, Unken, südlich Reit am östlichen Saalachufer auf Höhe Hallenstein, ca. 570msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990).

***Helleborus viridis* L.** — Grüne Nieswurz

Tennengau, Kuchl, Langbühel, Waldrand nördlich Doser, ca. 480msm; 8345/3 (vid. WS, 1993).

***Heracleum sphondylium* L. ssp. *elegans* (CRANTZ) SCHÜBL. & MARTENS** — Bergwiesen-Bärenklau

Flachgau, Strobl, Bleckwand, Buchenwald am Steig zur Bleckwandhütte, ca. 1280msm; 8346/2 (vid. WS, 1993).

***Hieracium amplexicaule* L.** — Stengelumfassendes Habichtskraut, Herzblatt-Habichtskraut

Pinzgau, Maishofen, Mitterhofen, Alpenrosengebüsch auf der Sausteigen, ca. 1640msm; 8642/2 (leg. CA, 06.08.1998).

***Hieracium aurantiacum* L.** — Orangerotes Habichtskraut

Pinzgau, Leogang, Alpenrosenheide zwischen Asitzkopf und Geierkogel, ca. 1780msm; 8542/3 (leg. CE, 13.08.1997).

***Hieracium pilosella* L.** — Kleines Habichtskraut, Mausohr-Habichtskraut

Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Rattensbachtal, alpine Rasen etwa 400m nördlich Lärchwand, ca. 2030msm; 8741/4 (leg. CE, 16.09.2003).

***Hieracium sabaudum* L.** — Savoyer Habichtskraut

Flachgau, Oberndorf, Salzachau nördlich Kläranlage, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1991). — Flachgau, Anthering, Salzachböschung oberhalb Siggerwiesen, ca. 400msm; 8144/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Gaißau, Mörtelbachbrücke bei der Abzweigung Spielbergstraße, ca. 680msm; 8245/3 (leg. WS, 31.08.1990: SZU). — Tennengau, Hallein, Waldsaum oberhalb der Straße nach Bad Dürrenberg bei der Abzweigung nach Kleinkirchenthal, ca. 560msm; 8344/2 (vid. WS, 1998).

***Hippocrepis comosa* L.** — Gewöhnlicher Hufeisenklee

Flachgau, St. Gilgen, Mozartsteig, trockener Waldsaum am Weg zum Hochlackenhof, ca. 780msm; 8246/1 (vid. WS, 1996). — Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Felswand eingangs der Zinkenbachklamm, ca. 570msm; 8246/3 (vid. WS, 1994).

Flachgau, St. Gilgen, Abersee, lichter Fichtenwald an der Breitenberg-Forststraße, ca. 1060msm; 8246/3 (vid. WS, 1994). — Flachgau, Strobl, Buchenwald im Kamersbach-Graben oberhalb Kaspernmahd, ca. 780msm; 8346/2 (vid. WS, 1991).

Huperzia selago (L.) BERNH. ex SCHRANK & MART. — Europäische Teufelsklaue,
Tannen-Bärlapp

Flachgau, Faistenau, Strubklamm, Metzgersteig, Buchenbestand unterhalb Hinterstein, ca. 700msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Hypericum hirsutum L. — Behaartes Johanniskraut

Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Unterhang, Almweide südlich Unterbergeralm, ca. 740msm; 8346/2 (vid. WS, 1994). — Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Zinkenbach, Böschung der Breitenberg-Forststraße, ca. 590msm; 8246/3 (vid. WS, 1994).

Hypericum humifusum L. — Niederliegendes Johanniskraut

Pinzgau, Hollersbach, Jochberg, Feldgehölz südlich des Gehöftes Peilberg, ca. 820msm; 8740/1 (leg. CA, 12.07.2001).

Hypericum montanum L. — Berg-Johanniskraut

Flachgau, St. Gilgen, Buchenwald am Zwölferhorn-Osthang, ca. 1000msm; 8246/3
(vid. WS, 1991).

Hypericum tetrapterum FR. — Geflügeltes Johanniskraut

Flachgau, Fuschlsee, Thalgau-Egg, Niedermoor etwa 400m südwestlich Hundsmarkt, ca. 665msm; 8145/4 (leg. CE, 23.06.2002). — Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Unterhang, Almweide südlich Unterbergeralm, ca. 740msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

Impatiens glandulifera ROYLE — Drüsiges Springkraut

Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, ruderal am Parkplatz von St. Pankraz am Haunsberg, ca. 500msm; 8043/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, gesamtes Gebiet der Weitwörther Au, ca. 395msm; 8043/4 (vid. I. Kurtz, August 2000). — Flachgau, Ebenau, Hinterebenau, Gehölz am westlichen Schwarzaubach-Ufer, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Impatiens parviflora DC. — Kleines Springkraut

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel-Unterhang, Waldschlag oberhalb Schienferalm, ca. 700msm; 8247/3 (vid. WS, 1994).

Inula salicina L. — Weidenblättriger Alant

Flachgau, Seekirchen, verbuschte Streuwiesen und Hochstaudenfluren etwa 600m südöstlich Seeburg, westlich der Fischach, ca. 505msm; 8044/4 (leg. CE, 27.06.2005).

Salzburg-Stadt, Heuberg-Südhang, mehrfach am Alter Bach westlich Gruberfeldsiedlung, ca. 570msm; 8144/4 (vid. WS, 1989). — Tennengau, Vigaun, Auwaldrest am nördlichen Tauglufer östlich der Autobahnbrücke, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1991). — Tennengau, Hallein, kleine Lichtung im Buchenwald am Steig zur Ruine Türnl, ca. 640msm; 8344/2 (vid. WS, 1998). — Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Unterhang, drei fruchtende Bäume bei der Felmayeralm, ca. 750msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

Juncus acutiflorus EHRH. ex HOFFM. — Spitzblütige Binse, Spitzblüten-Simse

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Streuwiese am Großmainberg-Nordhang, ca. 450msm; 8243/2 (vid. WS, 1992).

Juncus bufonius L. — Kröten-Binse, Kröten-Simse

Flachgau, Weitwörth, Haunsberg, Steinbruch bei St. Pankraz, ca. 500msm; 8043/4 (vid. WS, 1997).

Juncus conglomeratus L. — Knäuel-Binse, Knäuel-Simse

Flachgau, Wals, Walserberg, Entwässerungsgraben am Walserberger Moor, ca. 490msm; 8243/2 (vid. WS, 1994).

Juncus jacquinii L. — Gensen-Binse, Gensen-Simse

Pinzgau, Saalfelden, Steinernes Meer, Niederbrunnsulzen, ca. 2375msm; 8543/2 (leg. F. Eberlein, 1999: SZU).

Juniperus communis L. ssp. *communis* — Heide-Wacholder, Echter Wacholder

Tennengau, Abtenau, Voglau, Hangkante oberhalb Aubachfall, ca. 610msm; 8445/2 (vid. WS, 1994).

Koeleria pyramidata (LAM) P. BEAUV. ssp. *pyramidata* — Großes Schillergras, Gewöhnliche Wiesen-Kammschmiele

Salzburg-Stadt, Kapuzinerberg-Ostabfall bei der Aussichtskanzel nach Gnigl, ca. 540msm; 8144/3 (leg. WS, 12.07.1990: SZU). — Flachgau, Elsbethen, Gaisberg, Oberegg, westexponierte Viehweide nahe Gasthof Mitteregg, ca. 900msm; 8244/1 (vid. WS, 1996).

Laburnum anagyroides MEDIK. — Gewöhnlicher Goldregen

Flachgau, Mattsee, offener Wald am Schlossberg, ca. 525msm; 8044/2 (vid. CE, 21.09.2003).

Lamium montanum (PERS.) HOFFM. ex KABATH (= *Lamiastrum montanum* (PERS.) EHREND., = *Lamium galeobdolon* (L.) L. ssp. *montanum* (PERS.) HAYEK) — Berg-Goldnessel

Pinzgau, Lend, Klammpaß, Buchenwald unterhalb Klammwand, ca. 840msm; 8744/1 (vid. WS, 2000).

***Loiseleuria procumbens* (L.) DESV. — Alpenazalee, Gemsheide**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Gipfelbereich des Hohen Bergwerkskogels, auf Tangelhumus, ca. 1770msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Lonicera alpigena* L. — Alpen-Heckenkirsche**

Flachgau, Ebenau, Strubklamm, Metzgersteig, Mischwald oberhalb Roßbach, ca. 720msm; 8245/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Gaißau, Spielbergalm, Rest-Buchenbestand westlich „Schihütte“, ca. 1350msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

***Lonicera nigra* L. — Schwarze Heckenkirsche**

Flachgau, Ebenau, Strubklamm, Metzgersteig, Mischwald unterhalb Hinterstein, ca. 720msm; 8245/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, St. Koloman, Tauglboden, Strubklamm oberhalb Kasbach-Mündung, ca. 670msm; 8345/1 (vid. WS, 1998). — Tennengau, Adnet/Spumberg, Hecke nordöstlich Zillreith, ca. 1080msm; 8345/1 (leg. CA, 19.05.2001).

***Lunaria rediviva* L. — Ausdauerndes Silberblatt, Mondviole**

Pinzgau, Unken, südlich Reit, breite Felsschlucht am östlichen Saalachufer westlich vom Lenzenkogel, Schluchtwald, ca. 620msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Schluchtwald unterhalb Ramsaualm, ca. 780msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Luzula glabrata* (HOPPE) DESV. — Kahle Hainsimse**

Flachgau, Großgmain, Untersberg, Grünerlengebüsch unterhalb Vierkaser, ca. 1520msm; 8243/4 (vid. WS, 1995).

***Luzula luzulina* (VILL.) DALLA TORRE & SARNTH. — Gelbliche Hainsimse**

Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, Fichtenforst nördlich Jagdhaus bei Finkenschwandt, ca. 860msm; 8145/2 (leg. WS, 27.08.1978; SZU). — Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Mischwald oberhalb Straße, ca. 1140msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Luzula pilosa* (L.) WILLD. — Behaarte Hainsimse**

Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Mischwald oberhalb Straße, ca. 1140msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Lycopodiella inundata* (L.) HOLUB — Gewöhnlicher Sumpf-Bärlapp, Moorbärlapp**

Salzburg-Stadt, Hammerau, Hochmoor-Rest des Hammerauer Moores, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1996). — Pinzgau, Saalfelden, Pfaffenhofen, in der Haid, Schweiberg Moos, ca. 780msm; 8642/2 (vid. WS, 1997).

***Lycopodium annotinum* L. — Sprossender Bärlapp, Schlangen-Bärlapp**

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Buchenwald am Unterhang des Rettenkogels südlich Gallbach, ca. 620msm; 8247/3 (vid. WS, 1994).

Tennengau, Scheffau am Tennengebirge, Weitenau, Magerwiese etwa 200m südsüdwestlich Schönleiten, ca. 800msm; 8345/3 (leg. CE, 22.06.1994: SZU). — Pinzgau, Mittersill, Paß Thurn, Fichtenwald westlich Alpschwend, ca. 1120msm; 8740/1 (leg. CA, 21.07.1997). — Pinzgau, Krimml, Krimmler Achenal, südlich oberen Wasserfall, ca. 1540msm; 8839/1 (vid. WS, 1999).

Lycopus europaeus L. **ssp. europaeus** — Gewöhnlicher Ufer-Wolfstrapp, Ganz Gewöhnlicher Wolfsfuß

Flachgau, Eugendorf, Unzing, am Dammweg durch das Unzingermoos, ca. 600msm; 8145/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Moorgraben beim Urschlag-Moos, ca. 580msm; 8246/4 (vid. WS, 1997). — Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Niedermoor etwa 200m westlich Badensee Niedernsill, ca. 770msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002). — Pinzgau, Niedernsill, Niedermoor mit *Iris sibirica* etwa 600m nordwestlich des Badesees Niedernsill, ca. 767msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002).

Lycopus europaeus L. **ssp. mollis** (KERN.) SKALICKÝ — Weicher Ufer-Wolfstrapp, Weicher Gewöhnlicher Wolfsfuß

Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Steifseggensumpf etwa 250m südwestlich Badensee Niedernsill, ca. 770msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002).

Lysimachia punctata L. — Punktierter Gilbweiderich, Trauben-Gilbweiderich

Flachgau, Wals, Walserberg, nördlich Gasthof Wartberg, ca. 470msm; 8243/2 (vid. WS, 1991).

Malaxis monophyllos (L.) SW. — Einblättrige Weichorchis, Einblatt

Pongau, Werfen, Werfenweng, Wengerau, Almweide am Weg zur Elmaualm, ca. 1320msm; 8545/2 (vid. WS, 1999).

Malva moschata L. — Moschus-Malve

Lungau, Mariapfarr, Zankwarn, am Rande eines Tümpels westlich des Ortes Zankwarn, ca. 1170msm; 8848/4 (leg. CA, 10.07.2000).

Matteuccia struthiopteris (L.) TOD. — Europäischer Straußenfarn

Tennengau, Abtenau, Oberscheffau, Wallingwinkel, nördlich Lammerufer, ca. 540msm; 8445/2 (vid. WS, 2001).

Medicago falcata L. **s.str.** — Sichelklee, Sichel-Schneckenklee

Pinzgau, Saalfelden, Wegrain westlich Bundeserziehungsanstalt, ca. 800msm; 8543/3 (vid. WS, 1992).

Melampyrum pratense L. — Wiesen-Wachtelweizen

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Lauterbach, Buchen-Bestand oberhalb kleiner Kirche, ca. 520msm; 7944/3 (vid. WS, 1992). — Tennengau, Vigaun, Kiefernbestand am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

Pongau, Dorfgastein, Klammstein, Straßenböschung an der alten Gasteinerstraße, ca. 800msm; 8744/1 (vid. WS, 2000).

Mentha arvensis L. — Acker-Minze

Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, feuchte Mulde an der Schattau-Forststraße, ca. 1030msm; 8446/2 (vid. WS, 1994).

Mentha x verticillata L. s.str. — Quirl-Minze

Flachgau, Henndorf, Streuwiese am Wallerbach nordöstlich Kienberg, ca. 650msm; 8045/3 (vid. WS, 1997).

Milium effusum L. — Gewöhnliches Flattergras, Waldhirse

Flachgau, Henndorf, Henndorfer Wald, Waldsaum beim Schluchtwald nord-östlich Lichtentann, ca. 650msm; 8045/3 (vid. WS, 1997). — Tennengau, St. Koloman, Buchenwald im Tennerwinkel unterhalb Schmittenstein, ca. 1440msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990: SZU). — Flachgau, Faistenau, Hintersee, Buchenwald zwischen Holzeck und Königsberger Horn, ca. 1480msm; 8345/2 (vid. WS, 1991).

Moehringia ciliata (SCOP.) DALLA TORRE — Gewimperte Nabelmiere

Flachgau, Strobl, Rinnkogel, trockenes Bachbett am Steig, ca. 1430msm; 8346/2 (vid. WS, 1991). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Schöffaubach, Blockschutt östlich Ramsaualm, ca. 810msm; 8347/1 (vid. WS, 1995).

Myriophyllum spicatum L. — Ähriges Tausendblatt

Tennengau, Puch, Teich bei St. Jakob am Thurn, ca. 510msm; 8244/4 (vid. WS, 1995). — Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, größte verbliebene natürliche Wasserfläche im Geschützten Landschaftsteil Lucia Lacke, ca. 770msm; 8741/2 (leg. CE, 01.07.2002).

Neottia nidus-avis (L.) RICH. — Vogel-Nestwurz

Pinzgau, Lend, Klamm, Klammwand, Buchenwald oberhalb der alten Gasteiner Straße, ca. 840msm; 8744/1 (vid. WS, 2000).

Nuphar lutea (L.) SIBTH. & SM. — Gelbe Teichrose

Flachgau, Obertrumersee-Südufer, Staffl, Schwimmblattzone bzw. nahe dem Ufer beim Strandbad Oitner, ca. 503msm; 8044/3 (vid. CE, 01.06.2003). — Flachgau, Neumarkt, Teich bei Schloss Sighartstein, ca. 570msm; 8045/3 (vid. WS, 1992).

Odontites vulgaris MOENCH — Roter Zahntrost, Herbst-Zahntrost

Flachgau, Großmain, Untersberg-Nordhang, Forststraße zwischen Latschenwirt und Bruchhäusl, ca. 600msm; 8243/4 (vid. WS, 1994). — Salzburg-Stadt, Hammerau, ruderal am Südrand des Hammerauer Moores, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1996). — Tennengau, Puch, Urstein, Ruderalfläche im Augebiet etwa 300m westlich Prähausen, ca. 440msm; 8244/4 (leg. CA, 27.07.1999; Biotop wurde inzwischen durch Baumaßnahmen zerstört). — Flachgau, Strobl, Rinnkogel-Unterhang, Böschung am Almweg zur Unterbergeralm, ca. 700msm; 8346/2 (vid.

WS, 1994). — Pinzgau, Maishofen, zahlreich entlang von Gräben und Gehölzen im ehemaligen Mooregebiet nördlich bis westlich Schloss Prielau, ca. 750msm; 8642/2 (leg. CA, 18.07.1997).

***Oenothera biennis* L. s.str.** — Gewöhnliche Nachtkerze

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Haßberg, ca. 580msm; 8044/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Vigaun, ruderal am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

***Oenothera glazioviana* MICHELI s.str. (= *O. erythrosepala* BORBÁS)** — Rotkelchige Nachtkerze

Flachgau, Anthering, ruderal in der Salzachböschung beim Flusskilometer 55, ca. 400msm; 8143/2 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Salzburg/Stadt, Aigen, Rande einer Fettwiese nördlich der Gaisbergstraße, ca. 500msm; 8244/2 (leg. CA, 13.08.1999).

***Onobrychis viciifolia* SCOP.** — Futter-Esparsette

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Wiesenrain oberhalb Haßberg, ca. 580msm; 8044/1 (vid. WS, 1997).

***Ononis repens* L.** — Kriechende Hauhechel

Tennengau, Rußbach, Gamsfeld, Traunwandalm, ca. 1200msm; 8346/4 (vid. WS, 2001). — Tennengau, Abtenau, Wallingwinkel, Wegrain bei Dürn, ca. 600msm; 8445/2 (vid. WS, 2001).

***Ononis spinosa* L. s.str.** — Dornige Hauhechel

Flachgau, Strobl, Weide oberhalb Laimeral, ca. 840msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Orchis mascula* (L.) L.** — Stattliches Knabenkraut

Tennengau, St. Koloman, Tauglboden, Waldlichtung unterhalb Kasbach westlich Strubklamm, ca. 680msm; 8345/1 (vid. WS, 1998). — Tennengau, Abtenau, Seidegg, Magerwiesen am West- und Ostrand von Klausegg, ca. 900-920msm; 8346/3 (vid. CE, 01.06.1995). — Tennengau, Abtenau, Postalmgebiet, Niedermoor etwa 750m südlich Moosbergalm, ca. 1250msm; 8346/4 (vid. CE, 05.06.1995).

***Oreopteris limbosperma* (BELLARDI ex ALL.) HOLUB (= *Thelypteris limbosperma* (BELLARDI ex ALL.) H.P. FUCHS)** — Gewöhnlicher Bergfarn

Flachgau, Weitwörth, Gastein, Haunsberg-Westhang, Waldschlag südlich Hochberg, ca. 570msm; 8043/4 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Mattsee, Buchberg-Westhang, Waldschlag an Forststraße oberhalb Vogelhütte, ca. 660msm; 8044/2 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Neumarkt am Wallersee, Kolomannsberg, Neufahrn Wald, Fichtenforst südlich der Pionierbrücke, ca. 670msm; 8045/4 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Bergheim, Waldschlag nordwestlich Hintergitzen, ca. 470msm; 8144/1 (vid. WS, 2001). — Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, zwischen Luchsgraben und Fischbach, ca. 840msm; 8145/2 (vid. WS, 1999). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Waldschlag südlich Obenauer Alm, ca. 840msm; 8146/3 (vid. WS, 25.08.1990). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, Schlagfläche unterhalb der Forststraße zwischen Almkogel und Höllkar, ca. 1020msm; 8146/3 (vid. WS,

August 1990). — Flachgau, Grödig, St. Leonhard, Gutratberg, Waldsaum am Anstieg zur Köppelschneid, ca. 620msm; 8244/3 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Gaißau, Viehweide an der Straße zur Spielbergalm, ca. 950msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Flachgau, St. Gilgen, Buchberg-Südhang, Waldlichtung am Sonnen-Rundwanderweg, ca. 700msm; 8246/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Weißenbach, Waldsaum bei der Schmalnaueralm, ca. 670msm; 8247/3 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Adnet, Adnetter Riedl, Waldschlag unterhalb der Starkstromleitung nördlich Sulzenbachmühle, ca. 500msm; 8344/2 (vid. WS, Oktober 1990). — Pinzgau, Saalbach, Waldschlag am Pascherweg oberhalb des Spielbergbaches, ca. 1230msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Orobanche gracilis* SM. — Blutrote Sommerwurz, Kleine Sommerwurz**

Flachgau, Eugendorf, Streuwiese etwa 450m südöstlich des Gehöftes Edt, ca. 660msm; 8144/4 (vid. CA, 17.06.1999). — Tennengau, Adnet, Halbtrockenrasen etwa 550m westsüdwestlich des Gehöftes Oberkuhmann; ca. 480msm; 8244/4 (vid. CA, 15.06.2005).

***Orthilia secunda* (L.) HOUSE — Birngrün**

Flachgau, Koppl, Guggenthal, Fichtenforst westlich Bergsturz unterhalb Gaisbergstraße, ca. 580msm; 8144/4 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Hallein, Waldrand oberhalb Knappensteig nahe der Kapelle, ca. 600msm; 8344/2 (vid. WS, 1998). — Pinzgau, Lend, Klammpaß, Buchenwald unterhalb Klammwand, ca. 840msm; 8744/1 (vid. WS, 2000).

***Oxalis dillenii* JACQ. — Dillenius' Sauerklee**

Tennengau, Hallein, Geleise am Bahnhof Hallein, ca. 445msm; 8344/2 (leg. CE, 06.06.2003).

***Parthenocissus inserta* (KERN.) FRITSCH — Fünfblättriger Wilder Wein, Gewöhnliche Jungfernrebe**

Tennengau, Golling, Auwaldrest am westlichen Salzachufer südlich Aubauer, ca. 470msm; 8444/2 (vid. WS, 1991).

***Pedicularis recutita* L. — Gestutztes Läusekraut**

Flachgau, Strobl, Postalm, Sattel zwischen Scharfen und Braunedlkogel, ca. 1690msm; 8346/4 (vid. WS, 1995).

***Pedicularis rostratocapitata* CRANTZ — Geschnäbeltes Läusekraut, Kopf-Läusekraut**

Flachgau, Strobl, Rettenkogel-Nordhang, ca. 1700msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Persicaria minor* (HUDS.) OPIZ (= *Polygonum minus* HUDS.) — Kleiner Knöterich**

Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Niedermoor etwa 200m westlich Badensee Niedernsill, ca. 770msm; 8741/2 (leg. CE, 01.06.2002).

***Peucedanum cervaria* (L.) LAPEYR. — Hirschwurz, Hirsch-Haarstrang**

Salzburg-Stadt, Parsch, Kühberg oberh. Hiesl, ca. 690msm; 8144/4 (vid. WS, 1996)

***Peucedanum palustre* (L.) MOENCH — Sumpf-Haarstrang**

Flachgau, Koppl, Streuwiese östlich Willischwandt, ca. 720msm; 8145/3 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Streuwiese an der Ischler Ache, ca. 540msm; 8247/3 (vid. WS, 1995).

***Peucedanum ostruthium* (L.) KOCH — Meisterwurz**

Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel, Böschung der Forststraße östlich Rotwand, ca. 1130msm; 8347/1 (vid. WS, 1994). — Pinzgau, Maishofen, Atzing, entlang der Straße nach Stablberg am Waldrand, ca. 900msm; 8642/2 (leg. CA, 20.07.1997).

***Phalaris arundinacea* L. — Rohr-Glanzgras**

Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, Waldschlag an der Schattau-Forststraße, ca. 1020msm; 8446/2 (vid. WS, 1994).

***Phegopteris connectilis* (MICHX.) WATT — Gewöhnlicher Buchenfarn**

Flachgau, Nußdorf am Haunsberg, Lauterbach, Fichtenforst südlich Feichten, ca. 580msm; 7944/3 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Bergheim, Fichtenforst am Plainberg-Nordhang, ca. 500msm; 8144/3 (vid. WS, 1998). — Flachgau, Koppl, Fichtenforst im Zaunmoos östlich Willischwandt, ca. 720msm; 8145/3 (vid. WS, 1997). — Flachgau, St.Gilgen, Winkl, Mischwald südöstlich Aich, ca. 670msm; 8246/1 (vid. WS, 1994).

***Pimpinella saxifraga* L. — Kleine Bibernelle**

Tennengau, Puch, St. Jakob am Thurn, Mähwiese beim Sillergut, ca. 510msm; 8244/4 (leg. D. Ganglmaier, August 1989: SZU). — Flachgau, Strobl, Gschwendt, Waldwiese unterhalb Hundsleiten, ca. 600msm; 8246/4 (vid. WS, 1991). — Tennengau, Vigaun, Kiefernbestand am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Rußbach, Gamsfeld, Steig von der Angerkaralm zur Traunwandalm, ca. 1320msm; 8346/4 (vid. WS, 2001).

***Pinguicula alpina* L. — Alpen-Fettkraut**

Flachgau, Faistenau, Hintersee, Seeberghorn, überrieselte Felswand westlich Königsstatt, ca. 710msm; 8245/4 (vid. WS, 1999).

***Pinguicula vulgaris* L. — Gewöhnliches Fettkraut**

Flachgau, Wals, Gois, Walser Wiesen, Quellbereich des Moosbaches, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Adnet, am Fuße eines Hang-Niedermoores im südlichen Teil des Geschützten Landschaftsteils Adneter Moos etwa 500m nordwestlich Harreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004).

***Pinus sylvestris* L. — Wald-Kiefer, Rot-Föhre**

Pongau, Bad Gastein, Kötschachtal, Glaserer-Südwesthang, ca. 1380msm; 8845/3 (vid. WS, 1993).

© Verlag Alexander Jost, Dorfheim, 2003
Platanthera bifolia (L.) RICH. **ssp. bifolia** — Weiße Waldhyazinthe i.e.S.

Tennengau, Adnet, Niedermoor im Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 500m südöstlich der Kirche, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 22.06.1994).

Poa nemoralis L. — Hain-Rispengras

Tennengau, Hallein, an der Oberkante des Steilhanges westlich der Ruine Türnl, ca. 710msm; 8344/2 (vid. WS, 1998). — Tennengau, St. Koloman, Seewaldsee, Felswand oberhalb Wallinghütte, ca. 1170msm; 8345/4 (vid. WS, 1998).

Polygala amarella CRANTZ — Sumpf-Kreuzblümchen

Tennengau, Adnet, Niedermoor im Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 500m südöstlich der Kirche, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 22.06.1994).

Polystichum aculeatum (L.) ROTH — Gelappter Schildfarn

Flachgau, Faistenau, Strubklamm, Buchenwald am Jagdsteig oberhalb Metzgersteig, ca. 750msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Polystichum lonchitis (L.) ROTH — Lanzen-Schildfarn

Salzburg-Stadt, Gaisberg, Kalkschutt oberhalb Rundwanderweg westlich Zistelalm, ca. 1000msm; 8144/4 (vid. WS, 1992).

Portulaca oleracea L. **ssp. oleracea** — Europäischer Portulak i.e.S., Wilder Portulak

Flachgau, Bürmoos, Geleise am Bahnhof der Lokalbahn, ca. 435msm; 8043/2 (vid. CE, 09.08.2003).

Potamogeton alpinus BALB. — Alpen-Laichkraut

Lungau, St. Margarethen, kleiner Weiher etwa 150m südöstlich der Kapelle St. Augustin, östlich eines Baches, inmitten von zeitweise beweideten Fettwiesen, ca. 1070msm; 8948/3 (vid. CE, 17.08.1998).

Potamogeton berchtoldii FIEBER — Berchtolds Zwerg-Laichkraut, Berchtold-Laichkraut

Flachgau, Fuschl am See, Müllnerbach nördlich Feldberg, ca. 710msm; 8145/4 (vid. WS, 1999). — Tennengau, Puch, Urstein, Tümpel auf einer feuchten Ruderalfläche, etwa 200m ostnordöstlich des Kraftwerkes Urstein, ca. 440msm; 8244/4 (vid. CE, 25.07.1999; Biotop wurde inzwischen durch Baumaßnahmen zerstört).

Potamogeton natans L. — Schwimmendes Laichkraut

Lungau, St. Margarethen, Ostteil des Golfplatzes, nördlich des Landschaftsschutzgebietes Saumoos, ca. 1040msm; 8948/1 (vid. CE, 21.07.1998).

Potamogeton pectinatus L. **s.str.** — Kamm-Laichkraut

Flachgau, Mattsee, Weyerbucht, eutrophierter Bach, ca. 500msm; 8044/2 (leg. O. Stöhr, 23.09.1999; SZU).

***Potamogeton pusillus* L. — Gewöhnliches Zwerg-Laichkraut**

Flachgau, Faistenau, Wiesenbach in der Tiefbrunnau, ca. 750msm; 8245/2 (vid. WS, 2001). — Tennengau, Rußbach, Gamsfeld, unterhalb Traunwandalm, ca. 1230msm; 8346/4 (vid. WS, 2001).

***Potentilla caulescens* L. — Stengel-Fingerkraut, Kalkfelsen-Fingerkraut**

Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein-Südwand, ca. 1670msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990: SZU). — Tennengau, Abtenau, Osterhorn-Gruppe, Gipfelflur des Egelseehörndls, 1780msm; 8346/3 (vid. WS, 1995).

***Primula auricula* L. — Alpen-Aurikel**

Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Felswand eingangs der Zinkenbachklamm, ca. 570msm; 8246/3 (vid. WS, 1994). — Tennengau, St. Koloman, Oberlangenberg, Gitschenwand nordwestlich Seewaldsee, ca. 1500msm; 8345/4 (vid. CE, 23.06.1994). — Tennengau, Abtenau, Postalmgebiet, Felsbereiche am Schöberl (südwestlich Labenberg), ca. 1480msm; 8346/3 (vid. CE, 05.08.1995). — Tennengau, Abtenau, Postalmgebiet, Felsen am Braunedlkogel, ca. 1880msm; 8346/4 (vid. CE, 29.08.1995).

***Primula veris* L. — Wiesen-Schlüsselblume, Arznei-Schlüsselblume**

Flachgau, Strobl, steiler Wiesenhang bei Schottergrube zwischen Zinkenbach und Gschwendt, ca. 580msm; 8246/4 (vid. WS, 1996). — Tennengau, St. Koloman, Tauglboden, Waldwiese nördl. Strubklamm, ca. 720msm; 8345/1 (vid. WS, 1998).

***Primula veris* L. ssp. *veris* — Wiesen-Schlüsselblume**

Pinzgau, Maishofen/Atzing, Magerwiese unmittelbar östlich Gründlhof, ca. 805-860msm; 8642/2 (vid. CA, 30.05.1997).

***Pritzelago alpina* (L.) KUNTZE (= *Hutchinsia alpina* (L.) R. BR.) — Gemskresse**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Schöffaubach, Blockschutt östlich Ramsaualm, ca. 810msm; 8347/1 (vid. WS, 1995).

***Prunella grandiflora* (L.) SCHOLLER — Großblütige Braunelle**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Hoher Bergwerkskogel, Weide oberhalb Laufenbergalm, ca. 1320msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Prunus spinosa* L. s.str. — Gewöhnliche Schlehe, Schwarzdorn**

Tennengau, Golling, Oberscheffau, Wallingwinkl, Waldrand am nordseitigen Lammerufer unterhalb Dürn, ca. 560msm; 8445/2 (vid. WS, 17.10.1990).

***Pteridium aquilinum* (L.) KUHN — Gewöhnlicher Adlerfarn**

Pinzgau, Saalbach, Waldschlag am Osthang des Spielbergbaches, ca. 1250msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Pulicaria dysenterica* (L.) BERNH. — Ruhr-Flohkraut, Großes Flohkraut**

Flachgau, Strobl, Sparber-Unterhang, vernässte Mulde bei der Langeralm, ca. 720msm; 8346/2 (vid. WS, 1994). — Tennengau, Golling, Oberscheffau, Walling-

winkl, Viehweide am nordseitigen Lammerufer unterhalb Dürn, ca. 560msm; 8445/2 (vid. WS, 17.10.1990).

Pulsatilla alpina* (L.) DELARBRE ssp. *alpina — Alpen-Kuhschelle i.e.S., Nördliche Alpen-Küchenschelle

Flachgau, Großmain, Untersberg, Steig zwischen Klingeralm und Vierkaseralm, ca. 1520-1580msm; 8243/4 (vid. WS, 06.06.1989). — Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, Rattensbachtal, Hangbereich über einem Kalkfelsen etwa 400m nördlich Lärchwand, ca. 2030msm; 8741/4 (leg. CE, 14.09.2003).

***Pyrola minor* L.** — Kleines Wintergrün

Flachgau, Koppl, Koppler Moor, ca. 770msm; 8144/4 (vid. WS, 1997).

Pyrola rotundifolia* L. ssp. *rotundifolia — Rundblättriges Wintergrün i.e.S., Groß-Wintergrün

Tennengau, Adnet, Niedermoor im südlichen Teil des Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 550m nordwestlich Härreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004).

***Ranunculus aconitifolius* L.** — Eisenhutblättriger Hahnenfuß

Flachgau, Eugendorf, Streuwiese etwa 500m nördlich des Gehöftes Wang, ca. 575msm; 8144/2 (leg. CA, 23.04.2002).

***Ranunculus alpestris* L.** — Alpen-Hahnenfuß

Flachgau, Ebenau, Strubklamm südlich Metzgersteig, Dolomitrinne im Buchenwald oberhalb Roßbach, ca. 800msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Ranunculus flammula* L.** — Brennender Hahnenfuß

Flachgau, Wals, Walserberg, Mähwiese westlich Wartberg, ca. 470msm; 8243/2 (vid. WS, 1991). — Tennengau, St. Koloman, Oberlangenberg, Rohrmoos etwa 300m östlich Rohrmoosbauer, ca. 950msm; 8345/3 (vid. CE, 04.07.1994). — Tennengau, Abtenau, Seidegg, Niedermoore etwa 550m bzw. 850m südwestlich Huberhütte, ca. 1370-1380msm; 8346/1 (vid. CE, 01.07.1995). — Lungau, St. Margarethen, Niedermoor etwa 1,3km südwestlich Esseralp, direkt an der Landesgrenze zu Kärnten, ca. 1770-1780msm; 8947/4 (leg. CE, 03.08.1998). — Lungau, St. Margarethen, an einem Graben im Ostteil des Landschaftsschutzgebietes Saumoos (Hochmoor), ca. 1040msm, 8948/1 (leg. CE, 21.07.1998).

***Ranunculus nemorosus* DC.** — Gewöhnlicher Hain-Hahnenfuß, Wald-Hahnenfuß

Flachgau, Eugendorf, Streuwiese etwa 750m nordöstlich Freiling, ca. 600msm; 8144/2 (leg. CA, 06.05.2002).

Ranunculus trichophyllus* CHAIX ssp. *trichophyllus — Gewöhnlicher Haarblättriger Wasserhahnenfuß

Pongau, Bischofshofen, Winkl, Teich etwa 250m nordöstlich Unterwinkler, ca. 710msm; 8545/4 (leg. CE & M. Sigl, 30.08.1996).

Tennengau, St. Koloman, Böschung der Forststraße zur Schlenkensteinalm, ca. 1060msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

Rhamnus cathartica L. — Purgier-Kreuzdorn

Tennengau, Adnet, Adneter Moor, Schilfröhricht am Sulzenbach, ca. 460msm; 8344/2 (vid. WS, 04.10.1990). — Tennengau, Abtenau, Voglau, Hangkante oberhalb Aubachfall, ca. 610msm; 8445/2 (vid. WS, 1994).

Rhinanthus angustifolius C.C. GMEL. s.l. (= *Rh. serotinus* (SCHÖNH.) SCHINZ & THELL.) — Großer Klappertopf

Flachgau, Elsbethen, Glasenbach, Klaus, Streuwiese beim Eggelsee-Moor, ca. 700msm; 8244/4 (vid. WS, 1998). — Flachgau, Strobl, Feuchtwiese unterhalb Urschlag, ca. 560msm; 8246/4 (vid. WS, 1997).

Rhinanthus glacialis PERSONNAT — Grannen-Klappertopf

Tennengau, Vigaun, Kiefernbestand am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

Rhododendron hirsutum L. — Bewimperte Alpenrose

Flachgau, Faistenau, Strubklamm, Metzgersteig, ca. 720msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Rhodothamnus chamaecistus (L.) RCHB. — Ostalpine Zwerg-Alpenrose

Pinzgau, Unken, Reit, Reiter Alpe-Westabfall, Felswand am südseitigen Donnersbach-Ufer bei der Einmündung eines südlichen Zulaufs, ca. 660msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990). — Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein, oberhalb Steig in der NW-Wand, ca. 1660msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

Ribes alpinum L. — Alpen-Johannisbeere, Alpen-Ribisel

Tennengau, St. Koloman, Buchenwald unterhalb Steig zwischen Schlenken und Schmittenstein, ca. 1500msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990).

Ribes petraeum WULFEN — Felsen-Johannisbeere, Felsen-Ribisel

Pinzgau, Leogang, Schwarzleo, Latschengebüsch etwa 300m nordnordwestlich Scheltaualm, ca. 1700msm; 8541/4 (leg. CE, 28.08.1997).

Robinia pseudacacia L. — Gewöhnliche Scheinakazie, Robinie

Flachgau, Weitwörth, Haunsberg-Westhang, St. Pankraz, ca. 510msm; 8043/4 (vid. WS, 1997).

Rosa canina L. ssp. *canina* — Hunds-Rose

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Waldsaum am Osthang des Kleingmainberges, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1995).

Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, Fischbachufer östlich Finkenschwandt, ca. 770msm; 8145/2 (vid. WS, 1993).

***Rosa tomentosa* SM. — Filz-Rose**

Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, KG Lengdorf, Schluchtwald-artiger Mischwald am linken Ufer des Pölsenbaches, ca. 900msm; 8741/2 (leg. CE, 25.06.2002).

***Rubus caesius* L. — Kratzbeere, Auen-Brombeere**

Flachgau, Ebenau, Straßenböschung am Nordende des Wiestalstausees, ca. 560msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Rumex acetosella* L. ssp. *acetosella* — Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer, Gewöhnlicher Zwerg-Sauerampfer**

Salzburg-Stadt, Leopoldskron-Moos, Mähwiese östlich Glan nahe Gsengerweg, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1996).

***Rumex scutatus* L. — Schild-Ampfer, Schild-Sauerampfer**

Flachgau, Strobl, Postalm, Schuttflur am westlichen Hangfuß des Scharfen, ca. 1540msm; 8346/4 (vid. WS, 1995).

***Salix alba* L. — Silber-Weide**

Flachgau, Strobl, Ufergehölz an der Ischler Ache, ca. 510msm; 8247/3 (vid. WS, 1995).

***Salix appendiculata* VILL. — Großblättrige Weide**

Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach-Graben, Straßenböschung unterhalb Spielberghaus, ca. 1240msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

***Salix aurita* L. — Ohr-Weide**

Flachgau, Wals, Walserberg, Gehölz am Nordrand des Walserberg-Moores, ca. 490msm; 8243/2 (vid. WS, 1998). — Pinzgau, Maishofen, Hochmoorrest etwa 150m südöstlich Schloss Prielau, ca. 755msm; 8642/4 (vid. CA, 22.07.1997).

***Salix cinerea* L. ssp. *cinerea* — Grau-Weide, Asch-Weide**

Flachgau, Eugendorf, Unzing, Gehölz am Südrand des Unzinger Moores, ca. 600msm; 8145/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Adnet, am Rande von Niedermooren und Streuwiesen, sowie entlang von Gräben im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (vid. CA, 20.05.2004). — Tennengau, Abtenau, Gehölz am Eglsee-Südufer, ca. 730msm; 8446/1 (vid. WS, 2001). — Lungau, St. Margarethen, mehrfach im Landschaftsschutzgebiet Saumoos (Hochmoor), ca. 1040msm; 8948/1 (leg. CE, 21.07.1998).

***Salix daphnoides* VILL. — Reif-Weide**

Flachgau, Oberndorf, Auwaldrest an der Salzach westlich Maria Bühel, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Grödig, Untersberg-Unterhang, Steinbruch auf der Goslei, ca. 520msm; 8244/3 (vid. WS, 1994). — Flachgau,

Faistenau, Tiefbrunnau, Ufergehölz am Schafbach, ca. 790msm; 8245/2 (vid. WS, 10.08.1990). — Tennengau, Vigaun, Weidengebüsch am südlichen Tauglufer östlich Gasthof Tauglmaut, ca. 470msm; 8344/2 (vid. WS, 1994).

***Salix fragilis* L. — Bruch-Weide**

Flachgau, Großgmain, Ufergehölz am östlichen Weißbachufer nahe Tennisplatz, ca. 510msm; 8243/3 (leg. WS, 18.09.1987: SZU). — Tennengau, Golling, östliches Salzachufer, Auwaldrest nördlich Bahnhof Golling, ca. 470msm; 8344/4 (vid. WS, 1991).

***Salix glabra* SCOP. — Kahle Weide**

Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein-Südabfall, ca. 1620msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Tennengau, Rußbach, Paß Gschütt, Waldbach an der Schattau-forststraße, ca. 1020msm; 8446/2 (vid. WS, 1994).

***Salix hastata* L. — Spieß-Weide**

Pongau, Bad Gastein, Böckstein, Naßfeld, Moaralm, ca. 1630msm; 8944/3 (vid. WS, 1993).

***Salix myrsinifolia* SALISB. — Schwarzwerdende Weide**

Flachgau, Koppl, Niedermoor etwa 300m südwestlich Gniglerbauer, ca. 650msm; 8144/4 (vid. CA, 15.06.1999). — Flachgau, Eugendorf, Unzing, Bachufer-Gehölz am Südrand des Unzinger Moores, ca. 600msm; 8145/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Thalgaun, Egg, am Müllnerbach im „Stillen Tal“, ca. 690msm; 8145/4 (vid. WS, 1999). — Flachgau, Gois, Walser Wiesen, Feldgehölz östlich Wartberg, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Anif, Auwaldrest am westlichen Salzachufer nördlich Schloss Anif, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Strobl, Auwaldrest am Südufer der Ischler Ache, ca. 540msm; 8246/4 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Strobl, Ramsau, Schöffaubach, ca. 590msm; 8247/3 (vid. WS, 1995). — Tennengau, Adnet, entlang von Gräben und Bächen im gesamten Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos verbreitet, ca. 460msm; 8344/2 (leg. CA, 20.05.1996). — Flachgau, Kuchl, östliches Salzachufer, Weißbach südlich Heiligensteiner Au, ca. 460msm; 8344/4 (vid. WS, 1998). — Tennengau, St. Koloman, Ostufer des Seewaldsees, ca. 1060msm; 8345/4 (vid. WS, 1998). — Pongau, Bischofshofen, Mühlbach am Hochkönig, Hochkeil-Nordhang, ca. 1480msm; 8544/4 (vid. WS, 1995). — Pongau, Werfen, Werfenweng, Wenger Au, Weg zur Elmaualm, ca. 1410msm; 8545/2 (vid. WS, 1999).

***Salix retusa* L. — Stumpfblättrige Weide**

Flachgau, Großgmain, Untersberg, Felsblock am Hirschanger oberhalb Vierkaser-Alm, ca. 1720msm; 8243/4 (vid. WS, 1995).

***Salix triandra* L. ssp. *amygdalina* (L.) SCHÜBL. & MARTENS — Bereifte Mandel-Weide**

Lungau, Weißpriach, mehrfach in Ufergehölzen am Weißpriachbach zwischen Hinterweißpriach und Ulnhütte, ca. 1110-1300msm; 8747/4 und 8848/1 (vid. CE, 22.06.2002).

Flachgau, Elsbethen, Wegrain oberhalb St. Jakob am Thurn, ca. 520msm; 8244/4 (vid. WS, 1999). — Tennengau, Hallein, oberhalb der alten Dürnbergstraße, ca. 510msm; 8344/2 (vid. WS, 1998).

Salix waldsteiniana WILLD. — Bäumchen-Weide

Flachgau, Großmain, Untersberg, Latschengebüsch westlich Vierkaseralm, ca. 1570msm; 8243/4 (vid. WS, 11.08.1988). — Flachgau, Großmain, Untersberg, aufgelassene Almweide oberhalb Vierkaseralm, ca. 1640msm; 8243/4 (leg. WS, 13.09.1989: SZU). — Flachgau, Fürstenbrunn, Untersberg, Hochstaudenflur unterhalb Zeppezauer Haus, ca. 1620msm; 8244/3 (leg. WS, 01.09.1988: SZU). — Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, Latschengebüsch unterhalb Zeppezauer Haus, ca. 1600msm; 8244/3 (vid. WS, 13.09.1989). — Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, Hochstaudenflur unterhalb Oberer Rositten am Dopplersteig, ca. 1180msm; 8244/3 (vid. WS, 1999). — Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein-Südabfall, ca. 1620msm; 8345/1 (leg. WS, 24.08.1990: SZU). — Pinzgau, Krimml, Krimmler Achantal, Wirtsmoos nahe Söllnalm, ca. 1600msm; 8839/1 (leg. S. Krause, 1997: SZU).

Salvia pratensis L. — Wiesen-Salbei

Flachgau, Anthering, Acharting, trockener Wiesenrain am Würzenberg, ca. 520msm; 8044/3 (vid. WS, Mai 1990). — Flachgau, Anthering, Acharting, Straßenböschung am Achartinger Bach, ca. 440msm; 8144/1 (vid. WS, Mai 1990).

Salvia verticillata L. — Quirlblütiger Salbei

Flachgau, Thalgau, Thalgauberg, Straßenböschung unterhalb Scherntan, ca. 900msm; 8145/2 (vid. WS, 1993). — Tennengau, Adnet, Gaißau, Straßenböschung oberhalb Brücke über den Mörtlbach, ca. 630msm; 8245/3 (vid. WS, 1998).

Sambucus ebulus L. — Zwerg-Holunder

Flachgau, Weitwörth, Gastein, Haunsberg-Westhang, halbruderal an Forststraße südlich Hochberg, ca. 570msm; 8043/4 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Anthering, Haunsberg, ruderal an der Forststraße östlich Haunsberggipfel nach Adelsberg, ca. 760msm; 8044/3 (vid. WS, Mai 1990). — Flachgau, St. Gilgen, Hüttenstein, ruderal an der Forststraße südwestlich Almkopf, ca. 1080msm; 8146/3 (vid. WS, 25.08.1990). — Flachgau, Wals, Walserberg, Waldsaum nahe einer Streuwiese östlich Zollamt, ca. 460msm; 8243/2 (vid. WS, 1999). — Flachgau, Faistenau, Grünberg-Nordhang, ruderal an Forststraße oberhalb Roßbach, ca. 740msm; 8245/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, St. Gilgen, Buchberg-Südhang, Waldschlag am Sonnen-Rundwanderweg, ca. 700msm; 8246/1 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Weißenbach, Rettenkogel-Unterhang, Böschung der Forststraße zur Asenalm, ca. 720msm; 8247/3 (vid. WS, 1994).

Satureja montana L. — Winter-Bohnenkraut

Tennengau, Hallein, Geleise am Bahnhof Hallein, ca. 445msm; 8344/2 (leg. CE, 06.06.2003).

***Saxifraga aizoides* L. — Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech**

Flachgau, Faistenau, Grünberg-Nordhang, überrieselte Felswand oberhalb Roßbach, ca. 570msm; 8245/1 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Gaißau, nördlich Gipfelabbruch der Anzerberghöhe, ca. 1460msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Flachgau, St. Gilgen, Abersee, überrieselter Felsen eingangs Zinkenbachklamm, ca. 570msm; 8246/3 (vid. WS, 1994).

***Saxifraga aizoides* L. f. *crocea* (GAUD.) HAY — Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech**

Tennengau, Hallein, Gamp, Abtswald, Kiefernwand unterhalb Raspenhöhe, ca. 700msm; 8344/2 (leg. WS, 26.08.1988: SZU).

***Saxifraga burseriana* L. — Bursers Steinbrech**

Pongau, Werfen, Blühnbachtal, Bachschotter auf einer Schotterinsel südlich Schloss Blühnbach, ca. 760msm; 8544/2 (vid. WS, 17.09.1989).

***Saxifraga paniculata* MILL. — Rispen-Steinbrech**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Felsband oberhalb Laufenbergalm, ca. 1550msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Scabiosa lucida* VILL. — Glänzende Skabiose**

Tennengau, Hallein, Barmsteine, Hainbuchen-Bestand westlich Ruine Türnl, ca. 670msm; 8344/2 (vid. WS, 1998).

***Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA — Gewöhnliche Teichsimse, Grüne Teichbinse**

Salzburg-Stadt, Liefering, Wiese nördlich Badensee der „Salzach-Seen,,, ca. 410msm; 8144/3 (vid. WS, 1995). — Flachgau, Anif, Feuchtwiese nördlich Königsseeache, ca. 440msm; 8244/3 (leg. E. Rouschal, 1994: SZU).

***Schoenus ferrugineus* L. — Rostrottes Kopfried, Braune Knopfbins**

Salzburg-Stadt, Heuberg-Südhang, Streuwiese oberhalb Gruberfeldsiedlung, ca. 680msm; 8144/4 (vid. WS, 1993).

***Scrophularia umbrosa* DUMORT. ssp. *umbrosa* — Geflügelte Braunwurz i.e.S.**

Tennengau, Puch, Urstein, Ruderalfläche im Augebiet etwa 300m westlich Prähausen, ca. 440msm; 8244/4 (leg. CA, 27.07.1999; Biotop wurde inzwischen durch Baumaßnahmen zerstört).

***Scutellaria galericulata* L. — Sumpf-Helmkraut**

Lungau, St. Margarethen, mehrfach im Landschaftsschutzgebiet Saumoos (Hochmoor), ca. 1040msm; 8948/1 (leg. CE, 21.07.1998).

***Sedum album* L. — Weiße Fetthenne, Weiß-Mauerpfeffer**

Pongau, Werfen, Werfenweng, Wengerau, Almweide am Weg zur Elmaualm, ca. 1310msm; 8545/2 (vid. WS, 1999).

***Senecio aquaticus* HILL s.str.** — Wasser-Greiskraut
Flachgau, Wals, Gois, Walser Wiesen, ca. 440msm; 8243/2 (vid. WS, 1998).

Senecio jacobaea* L. ssp. *jacobaea — Gewöhnliches Jakobs-Greiskraut
Salzburg-Stadt, Leopoldskron, Almkanal-Böschung nordöstlich Schloss Leopoldskron, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1996). — Tennengau, Elsbethen, Magerwiesen etwa 250m nordöstlich des Gehöftes Hinterfeld, ca. 850–890msm; 8244/2 (leg. CA, 06.07.1998). — Tennengau, Golling, Viehweide nördlich St. Nikolaus am südlichen Schwarzbach-Ufer, ca. 480msm; 8344/4 (vid. WS, 1991). — Salzburg, Pinzgau, Niedernsill, KG Lengdorf, Hecke etwa 100m südlich Wiesberg (NW Gaisbichl), ca. 940msm; 8741/2 (vid. M. Sigl, 04.08.2001).

Serratula tinctoria* L. ssp. *tinctoria — Gewöhnliche Färber-Scharte
Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg-Unterhang, oberster Bereich der Langwiesen östlich Latschenwirt, ca. 620msm; 8243/4 (vid. WS, 1991).

***Setaria pumila* (POIR.) ROEM. & SCHULT.** — Fuchsrote Borstenhirse
Flachgau, Oberndorf, trockene Böschung der Salzachschleife unterhalb Straße zum Noppinger Bräu, ca. 395msm; 8043/4 (vid. WS, 1997).

***Silaum silaus* (L.) SCHINZ & THELL.** — Wiesensilge
Salzburg-Stadt, Leopoldskron-Moos, östliches Glanufer bei der Kendlersiedlung, ca. 430msm; 8244/1 (vid. WS, 1991).

***Silene nutans* L.** — Nickendes Leimkraut
Flachgau, Strobl, Ramsau, am Steig zum Hohen Bergwerkskogel oberhalb Laufenbergalm, ca. 1570msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Silene pusilla* WALDST. & KIT.** — Kleines Leimkraut, Kleiner Strahlensame
Flachgau, Strobl, Ramsau, Schöffaubach, Blockschutt östlich Ramsaualm, ca. 810msm; 8347/1 (vid. WS, 1995).

***Silene viscaria* (L.) BORKH. (= *Lychnis viscaria* L.)** — Pechnelke
Lungau, St. Margarethen, Magerwiese etwa 600m südwestlich St. Margarethen, ca. 1045msm; 8948/1 (leg. CE, 30.06.1998).

Silene vulgaris* (MOENCH) GARCKE ssp. *vulgaris — Taubenkropf-Leimkraut, Aufgeblasenes Leimkraut
Flachgau, Strobl, Ramsau, am Steig zum Hohen Bergwerkskogel oberhalb Laufenbergalm, ca. 1580msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Soldanella montana* WILLD.** — Berg-Alpenglöckchen, Wald-Soldanelle
Flachgau, Faistenau, Hintersee, westliches Gießbach-Ufer südlich Schröckgraben, ca. 750msm; 8245/3 (vid. WS, 1998).

© Verlag Alexander Kist-Dorffner, Graz
Solidago canadensis L. — Kanadische Goldrute
Download unter www.biologiezentrum.at

Tennengau, Gaißau, ruderal am Parkplatz anfangs der Spielbergalm-Straße, ca. 680msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

Sonchus arvensis L. ssp. *arvensis* — Gewöhnliche Acker-Gänsedistel

Flachgau, Oberndorf, Weitwörth, Maisacker östlich Grafengut, ca. 400msm; 8043/4 (vid. WS, 1997).

Sonchus asper (L.) HILL — Rauhe Gänsedistel, Dorn-Gänsedistel

Tennengau, Gaißau, am Steig zum Kesselwand-Wasserfall, ca. 630msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Tennengau, Golling, Oberscheffau, nördlich Lammeröfen, ruderal an der Straße nach Haselbach, ca. 560msm; 8445/2 (vid. WS, 17.10.1990).

Sorbus aucuparia L. — Eberesche, Vogelbeere

Flachgau, Strobl, Rettenkogel-Nordhang, ca. 1680msm; 8347/1 (vid. WS, 1998).

Stachys alpina L. — Alpen-Ziest

Tennengau, Gaißau, Viehweide an der Straße zur Spielbergalm, ca. 1060msm; 8245/3 (leg. WS, 31.08.1990: SZU). — Tennengau, Hallein, Bad Dürrnberg, Roßfeld-Osthang, Almweide südlich Truckentannalm, ca. 1240msm; 8344/4 (vid. WS, 1991).

Stachys palustris L. — Sumpf-Ziest

Pinzgau, Maishofen, Mitterhofen, Ufersaum am Offenbach, ca. 760msm; 8642/2 und 8643/1 (leg. CA, 04.07.1997).

Staphylea pinnata L. — Gewöhnliche Pimpernuß

Tennengau, Kuchl, Stockach, Waldlichtung am nördlichen Schrambach-Ufer, ca. 550msm; 8344/4 (vid. WS, 1998).

Stellaria alsine GRIMM — Bach-Sternmiere

Pinzgau, Zell am See, Nassgalle am Badhauskopf, ca. 1300msm; 8642/4 (leg. Th. Niederseer, 07.06.1988: SZU).

Stellaria aquatica (L.) SCOP. (= *Myosoton aquaticum* (L.) MOENCH) — Wasserdarm, Wassermiere

Flachgau, Henndorf/Hof, Streuwiese etwa 300m nordöstlich des Gehöftes Fuchshof, ca. 680msm; 8145/1 (leg. CA, 06.07.2000).

Stellaria nemorum L. ssp. *nemorum* — Gewöhnliche Hain-Sternmiere, Eigentliche Wald-Sternmiere

Flachgau, Seekirchen, Waldprechting, System von Entwässerungsgräben etwa 500m nordöstlich des Gehöftes Untertichaberg, ca. 560msm; 8044/4 (leg. CA, 08.07.1996). — Tennengau, Gaißau, Spielbergalm, Buchenwald-Rest westlich der Latschenalm, ca. 1350msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990).

***Streptopus amplexifolius* (L.) DC. — Stengelumfassender Knotenfuß**

Tennengau, St. Koloman, Latschengebüsch am Steig zwischen Schlenken und Schmittenstein, ca. 1520msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990). — Tennengau, St. Koloman, Waldsaum südöstlich Wilhelmskapelle, ca. 1010msm; 8345/3 (vid. WS, 1998). — Pinzgau, Saalbach, Waldschlag am Pascherweg oberhalb des Spielbergbaches, ca. 1210msm; 8541/4 (vid. WS, 2001). — Pinzgau, Zell am See, Thumersbach, Fichtenforst am Ochsinger-Westhang, ca. 1470msm; 8643/3 (vid. WS, 1991).

***Succisa pratensis* MOENCH — Gewöhnlicher Teufelsabbiß**

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg, oberhalb Steinbruch östlich Dopplersteig, ca. 520msm; 8244/3 (vid. WS, 1993). — Flachgau, Faistenau, Strubklamm, Waldrand östlich Werkschulheim, ca. 680msm; 8245/1 (vid. WS, 1992). — Flachgau, Strobl, Sparber-Unterhang, Streuwiese nördlich Stadlmannalm, ca. 690msm; 8346/2 (vid. WS, 1994).

***Tanacetum vulgare* L. — Rainfarn**

Tennengau, St. Koloman, ruderal am Straßenrand bei der Strubbachbrücke südlich Kasbach, ca. 680msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

***Taxus baccata* L. — Europäische Eibe**

Flachgau, Strobl, Auwaldrest am südlichen Ufer der Ischler Ache südlich Bürglstein, ca. 540msm; 8246/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, „Hölzl“, östlich Seethurn, Hangwald unterhalb Römerweg, ca. 540msm; 8247/3 (vid. WS, 1997). — Pinzgau, Unken, Reit, Reiter Alpe-Westabfall, mehrfach in tiefen Gräben im Einzugsbereich des Donnersbaches, ca. 650-750msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990). — Pinzgau, Lofer, Westabhänge des Lenzenkogels, ca. 660-740msm; 8342/3 (vid. WS, 13.11.1990). — Flachgau, Strobl, Kammersbachtal, Felsabbruch unterhalb Steig in die Wilde Kammer, ca. 1050msm; 8346/4 (vid. WS, 1994).

***Telekia speciosa* (SCHREB.) BAUMG. — Große Telekie**

Flachgau, Neumarkt am Wallersee, Wertheim, Neufahrn Wald, Forststraße im Glemeggraben, ca. 720msm; 8045/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Elsbethen/Glasenbach, Schwarzerberg-Westhang, Forststraße südlich Haslau, ca. 670msm; 8244/2 (vid. WS, 2000). — Pinzgau, Lofer, Weißbach, Hinterthal, unterhalb Almweg zur Kammerlingalm, ca. 1230msm; 8442/4 (vid. WS, 2000).

***Tephrosia helenitis* (L.) B. NORD. — Spatelblättriges Greiskraut, Alant-Aschenkraut**

Flachgau, Grödig, Glanegg, Untersberg-Unterhang, Langwiesen östlich Latschenwirt, ca. 620msm; 8243/4 (vid. WS, 1993).

***Teucrium chamaedrys* L. — Edel-Gamander**

Pinzgau, Saalfelden, trockenes Felsband oberhalb Einsiedelei, ca. 1040msm; 8543/3 (vid. WS, 1992).

***Teucrium montanum* L.** — Berg-Gamander
Flachgau, St. Gilgen, Falkenstein, Waldlichtung beim Scheffelblick, ca. 790msm;
8246/1 (vid. WS, 1994).

***Thalictrum lucidum* L.** — Glänzende Wiesenraute
Tennengau, Hallein, Au, Quellaustritt am Gutratberg westlich Ruine Gutrat, ca. 550msm; 8244/3 (vid. WS, 1997). — Tennengau, Puch, östliches Salzachufer unterhalb Kraftwerk Urstein, ca. 440msm; 8244/4 (vid. WS, 1994). — Flachgau, Ebenau, westliches Weißbach-Ufer vor dem Einfluss in den Wiestalstausee, ca. 560msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

***Thelypteris palustris* SCHOTT** — Gewöhnlicher Sumpffarn
Flachgau, Seekirchen, verbuschte Streuwiesen und Hochstaudenfluren etwa 600m südöstlich Seeburg, westlich der Fischach, ca. 505msm; 8044/4 (leg. CE, 27.06.2005). — Flachgau, Eugendorf, Niedermoor im Südteil des Wörlemooses etwa 700m nordöstlich Kraiwiesen, ca. 590msm; 8145/1 (leg. CE, 08.06.2002).

***Tofieldia calyculata* (L.) WAHLENB.** — Gewöhnliche Simsenlilie
Tennengau, Adnet, Niedermoor im südlichen Teil des Geschützten Landschaftsteil Adneter Moos etwa 550m nordwestlich Harreis, ca. 470msm; 8344/2 (vid. CA, 21.06.2004).

***Torilis japonica* (HOUTT.) DC.** — Gewöhnlicher Klettenkerbel, Wald-Borstdolde
Flachgau, Anthering, Acharting, Fürwag, Waldsaum unterhalb Rocherl, ca. 410msm; 8043/4 (vid. WS, 1997).

***Tozzia alpina* L.** — Alpenrachen
Tennengau, Golling, Bluntautal, Schotterbank im Torrener Bach südwestlich Bluntaumühle, ca. 478msm; 8444/2 (vid. CE & leg. B. Than, 17.06.2005; Privatherbar Than).

***Traunsteinera globosa* (L.) RCHB.** — Rote Kugelorchis, Kugelstendel
Tennengau, St. Koloman, Seewaldsee, Almweide westlich Auerhütte, ca. 1120msm; 8345/4 (vid. WS, 1996).

***Trichophorum alpinum* (L.) PERS.** — Alpen-Rasenbinse, Alpen-Haarbinse
Tennengau, Abtenau, Seidegg, Niedermoor etwa 850m südwestlich Huberhütte, ca. 1370-1380msm; 8346/1 (vid. CE, 01.07.1995). — Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Hangmoor oberhalb Straße, ca. 1250msm; 8541/4 (vid. WS, 2001). — Pinzgau, Leogang, Niedermoor etwa 500m westnordwestlich Rastboden, ca. 1270msm; 8542/3 (leg. CE, 17.09.1997). — Pinzgau, Leogang, Hochmoor etwa 650m südöstlich Asitzkopf in einer Alpenrosenheide, ca. 1730msm; 8642/1 (vid. CE, 31.07.1997). — Lungau, St. Margarethen, Übergangsmoore westlich und nordwestlich Meisnitzeralm im Fichtenforst, ca. 1640-1670msm; 8947/2 (vid. CE, 17.08.1998). — Lungau, St. Margarethen, mehrfach im Landschaftsschutzgebiet Saumoo, ca. 1040msm; 8948/1 (vid. CE, 21.07.1998).

Trichophorum cespitosum (L.) HARTM. ssp. *cespitosum* — Gewöhnliche Rasenbinse i.e.S., Rasen-Haarbinse

Pinzgau, Saalbach, Spielbergbach, Hangmoor oberhalb Straße, ca. 1250msm; 8541/4 (vid. WS, 2001).

Trifolium aureum POLLICH — Gold-Klee

Flachgau, Grödig, Fürstenbrunn, Holzeck-Südhang, kleine Lichtung an der Forststraße, ca. 560msm; 8243/4 (leg. WS, 21.08.1984: SZU). — Tennengau, Gaißau, Wegrain auf der Spielbergalm, ca. 1320msm; 8245/3 (leg. WS, 31.08.1990: SZU).

Trifolium medium L. — Mittlerer Klee, Zickzack-Klee

Tennengau, Hallein, Kleinkirchenthalweg, Waldsaum oberhalb Bach, ca. 580msm; 8344/2 (vid. WS, 1998).

Trifolium montanum L. — Berg-Klee

Tennengau, Krispl, Wegrain am Krispler Höhenweg, ca. 1030msm; 8245/3 (vid. WS, 1998).

Trifolium spadiceum L. — Moor-Klee

Lungau, Tamsweg, Lessach, Lessach-Winkel, Niedermoor östlich der Lessach, ca. 1230msm; 8748/4 (leg. M. Enzinger, 1999: SZU).

Triglochin palustre L. — Sumpf-Dreizack

Tennengau, Adnet/Wimberg, Niedermoor 80m nordnordwestlich des Gehöftes Schorn, westlich der Krispler Landesstraße, ca. 730msm; 8244/4 (vid. CA, 22.06.1994). — Flachgau, St. Gilgen, Abersee, Zinkenbach, Breitenberg-Unterhang, vernässte Mulde bei der Adamalm, ca. 670msm; 8246/3 (vid. WS, 1994). — Pinzgau, Maishofen, Hang-Niedermoor etwa 300m nordöstlich des Gehöftes Windischlehen, ca. 770msm; 8642/2 (leg. CA, 11.07.1997). — Pongau, Bischofshofen, Haidberg/Mitterberghütten, Rand eines Teiches nordöstlich des Gehöftes Holzlehen, ca. 715msm; 8645/1 (leg. CA, 04.07.1996).

Trisetum flavescens (L.) P BEAUV. — Wiesen-Goldhafer

Flachgau, Oberndorf, Wiesenrain westl. Vollern, ca. 420msm; 8043/1 (vid. WS, 1997).

Trollius europaeus L. — Europäische Trollblume

Flachgau, Strobl, Nordosthang des Hohen Bergwerkskogels, ca. 1640msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

Typha latifolia L. — Breitblättriger Rohrkolben

Flachgau, Ebenau, Hinterebenau, Holzlagerplatz am Schwarzaubach, ca. 565msm; 8245/1 (vid. WS, 1997).

Vaccinium myrtillus L. — Heidelbeere

Flachgau, Strobl, Nordostgrat des Hohen Bergwerkskogels, ca. 1760msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Vaccinium oxycoccos* L. s.str. — Gewöhnliche Moosbeere, Moor-Preiselbeere**

Tennengau, Abtenau, Moorrest am Eglsee-Südufer, ca. 730msm; 8446/1 (vid. WS, 2001).

***Vaccinium vitis-idaea* L. — Preiselbeere**

Flachgau, Strobl, Nordostgrat des Hohen Bergwerkskogels, ca. 1760msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Veratrum album* L. — Weißer Germer**

Flachgau, Strobl, Ramsau, Almweide bei der Laufenbergalm, ca. 1300msm; 8347/1 (vid. WS, 1997).

***Veratrum album* L. ssp. *album* — Weißer Germer i.e.S.**

Tennengau, Gaißau, Anzerberg, Almweide bei der Anzerberghöhe, ca. 1440msm; 8245/3 (vid. WS, 31.08.1990). — Flachgau, Faistenau, Hintersee, aufgelassene Almweide oberhalb der Schafbachalm, ca. 1100msm; 8245/4 (vid. WS, 10.08.1990). — Tennengau, St. Koloman, Schmittenstein, Almweide bei der Schlenksteinalm, ca. 1420msm; 8345/1 (vid. WS, 24.08.1990).

***Verbascum densiflorum* BERTOL. — Großblütige Königskerze**

Pinzgau, Dienten am Hochkönig, ruderal in Straßenböschung nahe Schottergrube östlich Birgkarhaus, ca. 1260msm; 8644/1 (vid. WS, 1996).

***Veronica anagallis-aquatica* L. — Blauer Wasser-Ehrenpreis, Ufer-Ehrenpreis**

Flachgau, Anif, Feuchtwiese nördlich Königsseeache, ca. 440msm; 8244/3 (leg. E. Rouschal, 1994: SZU).

***Veronica montana* L. — Berg-Ehrenpreis**

Flachgau, Bergheim, Schluchtwald am Plainberg-Nordhang, ca. 450msm; 8144/3 (vid. WS, 1996). — Flachgau, Faistenau, Hintersee, Buchenwald am Südosthang des Faistenauer Schafberges, ca. 1310msm; 8245/4 (vid. WS, 10.08.1990). — Tennengau, Hallein, Kaltenhausen, Waldweg am Nordhang des Hohen Götschen, ca. 800msm; 8344/1 (vid. WS, 1997).

***Veronica officinalis* L. — Wald-Ehrenpreis, Echter Ehrenpreis**

Flachgau, Neumarkt, Kolomannsberg, Sommerholz, Forststraßenböschung nördlich Hasenkopf, ca. 870msm; 8045/4 (vid. WS, 1992).

***Viburnum lantana* L. — Wolliger Schneeball**

Pongau, Werfen, Wenger-Au, Mischwald am Weg zur Elmau-Alm, ca. 1180msm; 8545/2 (vid. WS, 1997).

***Vicia sylvatica* L. — Wald-Wicke**

Flachgau, Faistenau, Tiefbrunnau, Buchenwald an der Südostflanke des Faistenauer Schafberges, ca. 1420msm; 8245/4 (vid. WS, 10.08.1990).

Flachgau, Strobl, Gschwendt, Langgassen, Auwald am östlichen Zinkenbachufer, ca. 555msm; 8246/4 (vid. WS, 1997). — Flachgau, Strobl, Seethurn, Buchenwald im „Hölzl“, ca. 550msm; 8247/3 (vid. WS, 1997).

Viola canina L. **ssp. montana** (L.) HARTM. — Berg-Veilchen, Berg-Hunds-Veilchen

Flachgau, Wals, Walserberg, Streuwiese südlich Zollamt Walserberg, ca. 470msm; 8243/2 (vid. WS, 1996).

Viola hirta L. — Rauhaariges Veilchen, Wiesen-veilchen

Tennengau, Vigaun, Rengerberg, trockene Mähwiese beim Reith-Bauern, ca. 1040msm; 8345/1 (vid. WS, 01.04.1991).

Viola riviniana RCHB. — Hain-veilchen

Salzburg-Stadt, Heuberg-Südhang, Waldrand unterhalb Sockerer-Bauern, ca. 700msm; 8144/4 (vid. WS, 1993). — Tennengau, St. Koloman, Tauglboden oberhalb Strubklamm, ca. 700msm; 8345/1 (vid. WS, 1998).

Viscum album L. **ssp. abietis** (WIESB.) JANCH (= *V. abietis* (WIESB.) FRITSCH) — Tannen-Mistel

Flachgau, Großmain, Untersberg, Buchen-Tannenwald südöstlich Latschenwirt, ca. 580msm; 8243/4 (vid. WS, 09.12.1990). — Flachgau, Großmain, Untersberg, Tannen-Bestand unterhalb der „Nagelwand“, ca. 700msm; 8243/4 (vid. WS, 1993).

Willemetia stipitata (JACQ.) DALLA TORRE (= *Calycocorsus stipitatus* (JACQ.) RAUSCHERT) — Gestielter Kronenlattich, Kronlattich

Flachgau, Großmain, Untersberg, Langwiesen, vernässte Mulde, ca. 620msm; 8243/4 (vid. WS, 1995).

3. Diskussion

Eine Diskussion zur Verbreitung der einzelnen Arten, wie in ähnlichen floristischen Publikationen (vgl. u.a. ARMING & EICHBERGER 1999, EICHBERGER 1995, EICHBERGER & ARMING 1996-2002, EICHBERGER et al. 2003-2006, PILSL et al. 2002, STÖHR et al. 2004, SCHRÖCK et al. 2004, STROBL 1988-2000) wird hier nicht vorgelegt, da es sich durchwegs lediglich um Ergänzungen zum Verbreitungsatlas von WITTMANN et al. (1987) handelt. Funde aus einigen dieser bei WITTMANN et al. (1987) fehlenden Quadranten wurden inzwischen publiziert. Wegen der genau vorhandenen Dokumentation werden in der vorliegenden Arbeit manche Fundorte aus solchen Quadranten jedoch nochmals angeführt, wenn sie bisher nicht bekannte Vorkommen beschreiben.

Mehrfach konnten ältere, bei WITTMANN et al. (1987) als vor 1899 verzeichnete Fundmeldungen erstmals wieder bestätigt werden, wie beispielsweise Vorkommen von *Cuscuta europaea* (8542/4), *Digitalis grandiflora* (8445/2), *Helle-*

borus niger (8244/4), *Rhamnus cathartica* (8344/2), *Salix waldsteiniana* (8243/4), *Taxus baccata* (8342/3) oder *Trifolium aureum* (8243/4) zeigen.

Manche der hier vorgestellten Funde sind mittlerweile als historisch zu betrachten: Eine feuchte Ruderalfläche nahe dem Kraftwerk Urstein in Puch (8244/4) wurde beispielsweise in den letzten Jahren in ein Gewerbegebiet umgewandelt und damit endgültig zerstört. Die Vorkommen von *Odontites vulgaris*, *Potamogeton berchtoldii* und *Scrophularia umbrosa* ssp. *umbrosa* dürften demnach erloschen sein.

4. Korrekturen zu Funden in früheren Arbeiten

Korrekturen der Autoren zu Funden aus einigen früheren Publikationen werden nachfolgend alphabetisch zusammengestellt (die jeweilige Publikation wird am Ende in Klammern angefügt).

Achillea collina Becker ex Rchb. — Hügel-Schafgarbe

Der Beleg aus St. Margarethen im Lungau wurde mittlerweile revidiert (Saukel, Wien, 12/2004: in litteris): es handelt sich um *Achillea pratensis* Saukel & Länger, die Rasige Schafgarbe, in Erstblüte (STÖHR et al. 2004).

Carex elongata L. — Walzen-Segge

Das Vorkommen in einem Grauweidengebüsch nördlich der Firma Frigologo in Seekirchen liegt im Quadranten 8144/2 (nicht in 8144/4; EICHBERGER et al. 2003).

Festuca amethystina L. — Amethyst-Schwingel

Die Funde im Buchweißbachtal stammen aus der Nähe des Windbachs (nicht des Wimbachs); der Quadrant 8543/1 bleibt unverändert (EICHBERGER & ARMING 2002).

Galium truniacum (Ronniger) Ronniger — Traunsee-Labkraut

Das belegte Vorkommen nahe der Drachenwand liegt bereits jenseits der Landesgrenze im Bundesland **Oberösterreich**; der Quadrant 8146/3 bleibt unverändert. Die Art wurde jedoch auch auf Salzburger Landesgebiet gesehen, allerdings nicht belegt (EICHBERGER & ARMING 2002).

Goodyera repens (L.) R. Br. — Kriechendes Netzblatt

Die Funde im Buchweißbachtal stammen aus der Nähe des **Windbachs** (nicht des Wimbachs); der Quadrant 8543/1 bleibt unverändert (EICHBERGER & ARMING 2002).

Das Vorkommen in der Nößlachwand westlich Vorderkrimmel liegt im Gemeindegebiet von **Wald** (nicht in Krimml); der Quadrant 8739/3 bleibt unverändert (EICHBERGER & ARMING 2002).

Iris sibirica L. — Sibirische Schwertlilie

Der Bestand am Hintersee lautet korrekt folgendermaßen: Flachgau, Faistenau, Streuwiese am **Nordufer** des Hintersees, etwa 250 m südlich des Forstamtes, ca. 690 msm; Quadrant **8245/1** (und nicht 8245/4; GRUBER 2004).

Pinus uncinata DC. **s.str.** — Haken-Kiefer, Spirke

Das Vorkommen in der Nößlachwand westlich Vorderkrimmel liegt im Gemeindegebiet von **Wald** (nicht in Krimml); der Quadrant 8739/3 bleibt unverändert (EICHBERGER & ARMING 2002).

Salix triandra L. **ssp. triandra** — Gewöhnliche Mandel-Weide

Der Nachweis in einem Ufergehölz am Wallerbach im Wengermoor (Gemeinde Köstendorf) liegt im Quadranten **8045/3** (nicht in 8045/1; EICHBERGER & ARMING 2002).

Scorzonera humulis L. — Niedrige Schwarzwurzel

Das Vorkommen in einem Niedermoor nordwestlich Ramsengut in Elsbethen/Oberwinkl liegt im Quadranten **8244/2** (nicht in 8244/4; EICHBERGER & ARMING 2002).

5. Dank

Die Verfasser danken allen bei den einzelnen Taxa genannten Sammlern bzw. für Fundortdaten: F. EBERLEIN, M. ENZINGER, D. GANGLMAIER (= D. LAUDERT), B. GRIEHSER, J.P. GRUBER, H.D. GÜRTLER, W. HOFBAUER, S. KRAUSE, R. KRISAI, Th. NIEDERSEER, E. ROUSCHAL, M. SIGL und O. STÖHR; Prof. Paul HEISELMAYER (Salzburg) für das Angebot, die vorliegende Arbeit kurzfristig in die Zeitschrift Sauteria aufzunehmen, sowie Mag. Irina KURTZ (Salzburg) für ihre Hilfe bei der Herstellung des Manuskripts und für Diskussion.

6. Literatur

- ADLER, A., OSWALD, K. & FISCHER, R. (Hrsg.), 1994: Exkursionsflora von Österreich. – Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Wien. 1180pp.
- ARMING, C. & EICHBERGER, CH., 1999: Bemerkenswerte Neufunde von Gefäßpflanzen im Zuge der Salzburger Biotopkartierung (1992-1996). — Sauteria 10. Verlag Alexander Just, Dorfbeuern, Salzburg, Brüssel. p. 189-200.

- EICHBERGER, CH., 1995: Floristische Beiträge aus dem Flachgau. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 135: 813-821.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C., 1996: Floristische Beiträge aus dem Tennengau. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 136: 377-388.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C., 1997: Floristische Beiträge aus Salzburg. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 137: 435-448.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C., 1999: Floristische Beiträge aus Salzburg, II. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 139: 363-376.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C., 2000: Floristische Beiträge aus Salzburg, III. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 140: 385-398.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C., 2002: Floristische Beiträge aus Salzburg, IV. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 142: 415-432.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C. & STROBL, W., 2003: Floristische Beiträge aus Salzburg, V. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 143: 421-434.
- EICHBERGER, CH. & ARMING, C. & STROBL, W., 2004: Floristische Beiträge aus Salzburg, VI. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 144: 433-452.
- EICHBERGER, CH., ARMING, C. & STROBL, W., 2005: Floristische Beiträge aus Salzburg, VII. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 145: 439-452.
- EICHBERGER, CH., ARMING, C. & STROBL, W., 2006: Floristische Beiträge aus Salzburg, IX. — Mitt. Ges. Salzb. Landesk. (MGSL) 146: im Druck.
- FISCHER, M.A., ADLER, W. & OSWALD, K., 2005: Exkursionsflora für Österreich, Lichtenstein und Südtirol. 2. verbesserte und erweiterte Aufl. — Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz. 1380pp.
- FITSCHEN, J., 1987: Gehölzflora. 8. Aufl. (MEYER, F.H., HECKER, U., HÖSLER, H.R. & SCHRÖDER, F.-G., Bearb.). — Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg, Wiesbaden. sine pag.
- GRUBER, J.P. (red.), 2004: Index Seminum 2004 collected from wild plants. — Unveröff. Manuskript, University of Salzburg, Departement of Organismic Biology, Study Group Botanical Garden. 87pp.
- HAEUPLER, H. & MUER, TH., 2000: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 759pp.
- NIKLFIELD, H., 1978: Grundfeldschlüssel zur Kartierung der Flora Mitteleuropas, südlicher Teil. — Unveröff. Manuskript, Wien. 22pp.
- NOWOTNY, G. & HINTERSTOISSER, H., 1994: Biotopkartierung Salzburg. Kartierungsanleitung. — Naturschutzbeiträge (ed.: Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung 13) 14/1994: 1-247.
- PILSL, P., WITTMANN, H. & NOWOTNY, G., 2002: Beiträge zur Flora des Bundeslandes Salzburg, III. — Linzer biol. Beitr. 34/1: 5-165.

- ROTHMALER, W. (Begr.), 2002: Exkursionsflora von Deutschland. Band 4: Gefäßpflanzen: Kritischer Band. — JÄGER, E.J. & WERNER, K. (eds.). Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin. 948pp.
- SCHRÖCK, CH., STÖHR, O., GEWOLF, S., EICHBERGER, CH., NOWOTNY, G., MAYR, A. & PILSL, P., 2004a: Beiträge zur Adventivflora von Salzburg I. — *Sauteria* 13. Verlag Alexander Just, Dorfbeuern/Salzburg: 221-337
- STÖHR, O., SCHRÖCK, CH., PILSL, P., GEWOLF, S., EICHBERGER, CH., NOWOTNY G., KAISER, R., KRISAI, R. & MAYR, A., 2004a: Beiträge zur indigenen Flora von Salzburg. — *Sauteria* 13. Verlag Alexander Just, Dorfbeuern/Salzburg: 15-114.
- STROBL, W., 1988: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, II. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 128: 415-424.
- STROBL, W., 1989: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, III. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 129: 427-431.
- STROBL, W., 1990: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, IV. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 130: 753-758.
- STROBL, W., 1991: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, V. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 131: 383-393.
- STROBL, W., 1992: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, VI. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 132: 523-534.
- STROBL, W., 1993: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, VII. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 133: 413-422.
- STROBL, W., 1994: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, VIII. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 134: 649-656.
- STROBL, W., 1995: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, IX. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 135: 803-812.
- STROBL, W., 1996: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, X. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 136: 367-376.
- STROBL, W., 1997: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, XI. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 137: 421-434.
- STROBL, W., 1998: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, XII. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 138: 579-589.
- STROBL, W., 1999: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, XIII. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 139: 353-362.
- STROBL, W., 2000: Bemerkenswerte Funde von Gefäßpflanzen im Bundesland Salzburg, XIV. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 140: 375-384.
- STROBL, W. & STÖHR, O., 2001: Floristisches aus dem Bundesland Salzburg. — *Mitt. Ges. Salzbg. Landesk. (MGSL)* 141: 387-406.
- WISSKIRCHEN, R. & HAEUPLER, H., 1998: Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. — Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 765pp.

WITTMANN, H., SIEBENBRUNNER, A., PILSL, P. & HEISELMAYER, P., 1987: Verbreitungsatlas der Salzburger Gefäßpflanzen. — Sauteria 2. Abakus Verlag, Salzburg. 403pp.

Adresse:

Mag. Dr. Christian EICHBERGER
Prof. Dr. Walter STROBL
Mag. Claudia ARMING
Paris-Lodron-Universität Salzburg
Fachbereich für Organismische Biologie
Arbeitsgruppe Ökologie und Diversität der Pflanzen
Hellbrunner Straße 34
A-5020 Salzburg

Email:

christian.eichberger@sbg.ac.at
walter.strobl@sbg.ac.at
claudia.arming@sbg.ac.at