

Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL)

Teil 4: Taxa beschrieben von D.F.L. von Schlechtendal

Uwe BRAUN & Anna-Katharina WITTIG

Zusammenfassung: BRAUN, U. & WITTIG, A.-K. 2003: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 4: Taxa beschrieben von D.F.L. von Schlechtendal. *Schlechtendalia* **10**: 15–65.

1.208 von D.F.L. von Schlechtendal beschriebene Arten und subspezifische Taxa werden aufgelistet und es wird angegeben, ob Typusmaterial der jeweiligen Sippen im Herbarium der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL) vorhanden ist oder nicht. Typusmaterial von 748 Taxa ist in HAL vorhanden. Bibliographische Daten, Details zu den Typuskollektionen und HAL-Inventarnummern werden angegeben. Eine Übersicht der HAL-Typen ist auch über eine Datenbank im Internet abrufbar (<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>).

Abstract: BRAUN, U. & WITTIG, A.-K. 2003: Type collections of the herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (HAL). Part 4: Taxa described by D.F.L. von Schlechtendal. *Schlechtendalia* **10**: 15–65.

1.208 species and subspecific taxa described by D.F.L. von Schlechtendal are listed, and it is noted if type specimens of the taxa concerned are deposited at the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle (HAL) or not. Type specimens of 748 taxa are preserved at HAL. Bibliographic data, details of the type collections and the HAL accession numbers are given. A survey of the type collections of HAL is also available from a database via internet (<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>).

Einleitung

D.F.L. von Schlechtendal (1794–1866) ist einer der bedeutendsten Botaniker Deutschlands des 19. Jahrhunderts, der etwa 1200 Arten und andere subspezifische Taxa beschrieben hat. Von 1819 bis 1833 war Schlechtendal am „Königlichen Herbarium zu Berlin“ tätig, das 1818 von H.F. Link gegründet worden war. 1833 wurde Schlechtendal zum Professor für Botanik und zum Direktor des Botanischen Gartens an der Universität Halle berufen (HEKLAU 1998), wo er bis zu seinem Ableben im Jahr 1866 aktiv war. Sein großes Herbarium von etwa 70.000 Kollektionen wurde später durch die Universität angekauft und stellt den wichtigsten Teil der historischen Sammlungen von HAL dar. Zahlreiche Typuskollektionen von Arten und anderen subspezifischen Taxa, die Schlechtendal beschrieben hatte, sind heute im Herbarium HAL deponiert, was besonders für Taxa gilt, die zwischen 1833 und 1866 veröffentlicht worden sind. Aber auch viele Typen von Taxa aus seiner Berliner Zeit zwischen 1819 und 1833 sind in Halle (HAL) vorhanden, da Schlechtendal eine Vielzahl von Dubletten des „Königlichen Herbariums zu Berlin“ erhalten hatte, die er nach Halle mitnehmen konnte.

Auf Grundlage eines alten Katalogs mit Namen aller Taxa, die Schlechtendal allein

oder mit anderen Botanikern zusammen beschrieben hatte, wurde eine systematische Suche nach Typuskollektionen dieser Sippen in HAL durchgeführt. Die Namen aller von Schlechtendal beschriebenen Arten, bibliografische Daten, Angaben zu den Typuskollektionen und die HAL-Inventarnummern wurden in eine Datenbank eingegeben, die auch über das Internet zugänglich sein wird („<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>” unter „Herbarium”). Subspezifische Taxa (Varietäten und Formen) wurden nur teilweise berücksichtigt. In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen in gedruckter Form vorgelegt. Es werden Details zu den jeweiligen Typen angegeben, falls sie vorhanden sind, oder es wird vermerkt, dass in HAL kein Typusmaterial deponiert ist („not at HAL”). Die Liste enthält die Namen von 1208 Taxa (1164 Arten und 44 Varietäten und Formen). Typen von 748 Taxa sind in HAL vorhanden.

Der genaue Status der jeweiligen Typen (Holo-, Iso-, Lecto-, Syntypus, etc.) wird nur angegeben, falls er bekannt ist und von einem Spezialisten oder Monographen geprüft worden ist. Sonst werden die Kollektionen nur allgemein „Typus” genannt. Weiterhin wird vermerkt, falls eine Kollektion (HAL-Nummer) aus mehreren Bögen besteht („2 sheets, 3 sheets, etc.“).

Die vorliegende Liste enthält auch alle schon früher veröffentlichten Angaben zu Typen von D.F.L. v. Schlechtendal aus Teillisten auf systematischer Grundlage (BRAUN 1998, 2000; HOFFMANN 1998, 2000; KESTING & HOFFMANN 2000). Anmerkungen in der Liste werden in Englisch gemacht.

Introduction

D.F.L. von Schlechtendal (1794–1866) is one of the most important German botanists of the 19th century. He described about 1.200 species and other subspecific taxa. Between 1819 and 1833, Schlechtendal worked at the “Royal Herbarium Berlin” which was founded in 1818 by H.F. Link. In 1833, he was appointed as a professor of botany and director of the botanical garden in the University Halle (HEKLAU 1998), where he worked up to his end in 1866. His large private herbarium with about 70.000 specimens was purchased by the University Halle. Schlechtendal’s herbarium is the most important part of the historic collections of HAL. Numerous type specimens of the species and subspecific taxa described by Schlechtendal are deposited at HAL, above all of those taxa introduced between 1833 and 1866. However, numerous types of taxa described between 1819 and 1833 in Berlin are also deposited at HAL, since Schlechtendal obtained a large number of duplicates from the “Royal Herbarium Berlin” which he transferred to Halle.

Based on an old catalogue with names of new species and other new taxa introduced by Schlechtendal alone or together with other botanists, a systematic search for types of these taxa deposited at HAL has recently been carried out. The names of all species, bibliographic data, details of the type collections and the HAL accession numbers have been put into a database of HAL types which is also accessible via internet (“<http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html>” under “Herbarium”). Subspecific taxa (varieties and formae) have been only partly taken into consideration. In this paper, a printed version of the results of these studies is given. It is either

noted that the type material of the taxon concerned is not deposited at HAL (“not at HAL”) or, if present, details to the type collection are given. This list contains names of 1208 taxa (1164 species and 44 varieties and formae). Types of 747 taxa are deposited at HAL.

The exact status of the particular types (holo-, iso-, lecto-, syntype, etc.) is only given as far as known, i.e., if the status has been proven by a specialist or monographer. Otherwise the general term “type” is used.

All data dealing with types of taxa introduced by D.F.L. v. Schlechtendal from previously published lists, based on particular systematic groups, are also included in the present comprehensive list (BRAUN 1998, 2000; HOFFMANN 1998, 2000; KESTING & HOFFMANN 2000). Notes in the list are given in English.

List of taxa

Abutilon ellipticum Schltld., Linnaea 11: 368, 1837. Not at HAL.

Abutilon erosum Schltld., Linnaea 11: 367, 1837. Mexico: ad Talpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98382.

Abutilon floribundum Schltld., Linnaea 11: 366, 1837. Mexico: ad Talpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98381.

Abutilon racemosum Schltld., Linnaea 11: 367, 1837. Mexico: ad Talpujahua, Keerl.
Typus: HAL 98380.

Acacia aurita Schltld., Linnaea 12: 572, 1838. Mexico: in rupestribus Malpays de Naulingo, reg. temp. calidioris, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 36642 (2 sheets).

Acacia callistemon Schltld., Linnaea 12: 568, 1838. Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 70149.

Acacia carbonaria Schltld., Linnaea 12: 571, 1838. Mexico: inter Veracruz et Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 41313.

Acacia cuspidata Schltld., Linnaea 12: 573, 1838. Not at HAL.

Acacia cyclophylla Schltld., Linnaea 20: 663, 1847. Australia: am steinigen Osthänge des Berglandes nach dem Murreyscrub. Kleiner Strauch, H. Behr, 1844/45.
Typus: HAL 41267.

Acacia diversifolia Schltld., Linnaea 12: 570, 1838. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 41283. Mexico: in sylvis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 41284.

Acacia elegans Schltld., Linnaea 12: 569, 1838. Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 41288.

Acacia glabrata Schltld., Linnaea 12: 569, 1838. Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. Typus: HAL 41236.

Acacia hirsuta Schltld., Linnaea 12: 572, 1838. Mexico: prope Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 41607 (2 Bögen).

Acacia humilis Schltld., Linnaea 12: 567, 1838. Mexico: prope Reglam in pratis, C. Ehrenberg, Sept./Oct. 1831–39. Holotypus: HAL 41176.

Acacia mammifera Schltld., Linnaea 12: 563, 1838. Mexico: Barranca de Acholoya, C. Ehrenberg, Nov. 1837. Typus: HAL 71840 (2 sheets).

- Acacia metrosiderifolia* Schltdl., Linnaea 12: 567, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 41078.
- Acacia platyacantha* Schltdl., Linnaea 12: 565, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 41036.
- Acacia pubescens* Schltdl., Linnaea 12: 565, 1838. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 98632 (2 sheets).
- Acacia pulverulenta* Schltdl., Linnaea 12: 571, 1838. Mexico: ad ripam fluminis Misantlensis prope San Antonio, regionis calidae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 21527 (3 sheets).
- Acacia retinodes* Schltdl., Linnaea 20: 664, 1847. Australia: H. Behr, Jan. 1844/45. Holotypus: HAL 41017.
- Acacia sphaerocephala* Schltdl. & Buché, Linnaea 5: 594, 1830. Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Lectotypus: HAL 40983. Mexico: in calidioribus prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 40984.
- Acacia stipellata* Schltdl., Linnaea 12: 574, 1838. Not at HAL.
- Acaena behriana* Schltdl., Linnaea 20: 660, 1847. Australia: Auf höher gelegenen Grasland häufig im Gebiet des Gawler river, H. Behr. Lectotypus: HAL 22041.
- Acaena microcephala* Schltdl., Linnaea 28: 463, 1856. Not at HAL.
- Acalypha rhombifolia* Schltdl., Linnaea 7: 382, 1832. Not at HAL.
- Acalypha schiedeana* Schltdl., Linnaea 7: 384, 1832. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 72241.
- Achetaria sprengelii* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 567, 1827. Not at HAL.
- Acrostichum vestitum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 605, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81876.
- Adelia barbinervis* Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 362, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98600 A/B (2 sheets).
- Adenandra brachyphylla* Schltdl., Linnaea 6: 199, 1831. Not at HAL.
- Adenandra uniflora* var. (α) *isophylla* Schltdl., Linnaea 6: 197, 1831. South Africa: steinige Gegenden der 3. Höhe auf der östlichen Seite des Tafelberges, C.F. Ecklon, Jan. 1823–28. Typus: HAL 30348.
- Aegiphila bachiata* Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 371, 1831. Mexico: prope Estero, F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97778 (2 sheets).
- Aeschynomene elegans* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 583, 1830. Mexico: in collibus apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98428. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 98429.
- Aeschynomene fascicularis* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 584, 1830. Mexico: inter la Laguna verde et Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98430.
- Agave polyanthoides* Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Not at HAL.
- Agathosma eckloniana* Schltdl., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.
- Agathosma erecta* var. *pilosa* Schltdl., Linnaea 6: 204, 1831. South Africa: Prom. bon. spei, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98627 A, B.
- Agathosma ericoides* Schltdl., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Uitenhagen, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon, Nov. 1825. Typus: HAL 98626 (2 Bögen).
- Agathosma gnidioides* Schltdl., Linnaea 6: 206, 1831. Not at HAL.

Agathosma joubertiana Schltldl., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.

Agathosma montana Schltldl., Linnaea 6: 207, 1831. Not at HAL.

Agathosma pilifera Schltldl., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Uitenhagen, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon. Typus: HAL 24851.

Agathosma sedifolia Schltldl., Linnaea 6: 206, 1831. Not at HAL.

Agathosma thymifolia Schltldl., Linnaea 6: 205, 1831. Not at HAL.

Agathosma minuta Schltldl., Linnaea 6: 206, 1831. South Africa: Karsrivier von de Bruin bis Potberg, C.L. Zeyher & C.F. Ecklon, 3–9 Oct. 1826. Typus: HAL 29905.

Alchemilla hirsuta (var.) ***alpestris*** Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 43471.

Alchemilla hirsuta (var.) ***campestris*** Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 43489.

Alchemilla venusta Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 573, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 43579.

Alchemilla vulcanica Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 573, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 43580.

Alectoroctonum ovatum Schltldl., Linnaea 19: 252, 1846. Mexico: in sepibus Papantlae; in sylvis prope Actopan, C.J.W. Schiede, Jan./Mar. 1829, Holotypus: HAL 71001 (2 sheets).

Alisma grandiflorum Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 152, 1827. Not at HAL.

Allocarpus sabaziioides Schltldl., Linnaea 9: 590, 1835. Mexico: prope San Miguel del Soldado et la Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 70344. This is the same sheet as for the type of *Sabazia sarmentosa* Less.

Alstroemeria gloriosa Schltldl. & Cham., Linnaea 6: 51, 1831. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45484.

Althaea kurdica Schltldl., Linnaea 17: 127, 1843. In faucibus regionum altiorum saxosarum montis Gara in Kurdistania, Th. Kotschy, Aug. 1841. Synypi: HAL 98608 (2 sheets), HAL 98407.

Alyssum imbricatum Schltldl. ex DC., Syst. 2: 308, 1821. Siberia, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 86107.

Amaranthus crassipes Schltldl., Linnaea 6: 757, 1831. Ad rivulus insulae St. Thomae, C. Ehrenberg, 1826–28. Holotypus: HAL 76208.

Ammannia catholica Cham. & Schltldl. (var.) ***philippensis*** Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 378, 1827. Tierra alta Luconiae, A. v. Chamisso, 17 Dec. 1817 ad 29 Jan. 1818. Typus: HAL 98155.

Ampelopsis pubescens Schltldl., Linnaea 10: 251, 1836. Mexico: Cerrania de Zoncuanla, conf. Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 71859.

Amphilophium molle Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 120, 1830. Mexico: in dumetis prope Vera-Cruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98437.

Anacyclus radiatus (var.) ***sulfureus*** Schltldl., [Ind. Sem. Hort. Hal., 1838], not seen, and Linnaea 13: Litt. 96, 1839. Not at HAL.

Anagallis filiformis Cham. & Schltldl., Linnaea 1: 225, 1826. Brazil: prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98444.

Anchietea sellowiana Cham. & Schltldl., Linnaea 2: 148, 1827. Not at HAL.

Andromeda eucalyptoides Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 518, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98591 (2 Sheets).

Andromeda meriifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 522, 1826. Not at HAL.

Andromeda nummularia Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 520, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98441.

Andromeda pulchra Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 521, 1826. Not at HAL.

Andromeda redowskii Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 517, 1826. In Asia (Siberia) boreali Redowskii. Typus: HAL 98442.

Androsace arctica Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 220, 1826. Not at HAL.

Anguria aculeolata Schltdl., Linnaea 24: 748, 1851. Not at HAL

Anguria affinis Schltdl., Linnaea 24: 760, 1851. Not at HAL.

Anguria arrabidae Schltdl., Linnaea 24: 736, 1851. Not at HAL.

Anguria dentata Schltdl., Linnaea 24: 713, 1851. Not at HAL.

Anguria gaudichaudiana Schltdl., Linnaea 24: 753, 1851. Not at HAL.

Anguria jacquiniana Schltdl., Linnaea 24: 709, 1851. Not at HAL.

Anguria kegeliana Schltdl., Linnaea 24: 776, 1851. Not at HAL.

Anguria kunthiana Schltdl., Linnaea 24: 762, 1851. Not at HAL.

Anguria laciniosa Schltdl., Linnaea 24: 755, 1851. Not at HAL.

Anguria leptantha Schltdl., Linnaea 24: 779, 1851. Not at HAL.

Anguria meyeniana Schltdl., Linnaea 24: 750, 1851. Not at HAL.

Anguria obtusiloba Schltdl., Linnaea 24: 744, 1851. Not at HAL.

Anguria ottoniana Schltdl., Linnaea 24: 758, 1851. Not at HAL.

Anguria plumieriana Schltdl., Linnaea 24: 709, 1851. Not at HAL.

Anguria polyphyllus Schltdl., Linnaea 24: 712, 1851. Not at HAL.

Anguria schomburgkiana Schltdl., Linnaea 24: 765, 1851. Not at HAL.

Anguria sellowiana Schltdl., Linnaea 24: 746, 1851. Not at HAL.

Anguria wagneriana Schltdl., Linnaea 24: 785, 1851. Not at HAL.

Annesorhiza capensis Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 399, 1826. South Africa: Promontorio bonae spei (ad latera montis tabularis, montis leonis et ad nemus Rondebosch ad Paerdebund), Mundt & Maire, 1815–31. Isotypus: HAL 98510.

Annona globiflora Schltdl., Linnaea 10: 235, 1835/36. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 76425.

Anoda pubescens Schltdl., Linnaea 11: 218, 1837. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98399.

Anotis lechleriana Schltdl., Linnaea 28: 488, 1856. Not at HAL.

Aphelandra deppeana Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 96, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, Sept. 1828. Typus: HAL 98541.

Aphelandra schiedeana Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 95, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98543. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98542.

Arabis drabaeformis Schltdl., Linnaea 28: 471, 1856. Chile: Cord. v. Ramco in galeros, W. Lechler, Dec. 1854. Typus: HAL 96245.

Arabis owaihiensis Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 17, 1826. USA (Hawaii): Sandwich Islands: in montibus insulae O-Wahu, A. v. Chamisso, 1816/17. Holotypus: HAL 85354.

- Aralia echinops*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 174, 1830. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 98470. Mexico: in sylvis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 97774 (2 sheets).
- Ardisia escallioides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 393, 1831. Mexico: Flore albo in sylvis Papantlae (florifera et fructifera), C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 897224.
- Ardisia melanostigma*** Schltdl., Linnaea 8: 526, 1833/34. Mexico: in sylvis inter San Salvador et Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 95759.
- Arenaria cerviana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 52, 1826. Not at HAL.
- Arenaria elegans*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 57, 1826. Ad Sinum St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98410.
- Arenaria laricina*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 57, 1826. Not at HAL.
- Arenaria leptophylla*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 233, 1830. Not at HAL.
- Arenaria redowskii*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 58, 1826. Not at HAL.
- Argyrophanes behrii*** Schltdl., Linnaea 20: 596, 1847. Australia: im Pine forest-Walde zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 91213.
- Asclepias oenotheroides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 123, 1830. Mexico: in arenosis prope Veracruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98551.
- Aspidium inaequale*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 23, 1825. Not at HAL.
- Aspidium nobile*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 610, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 61440 (2 sheets).
- Asplenium aspidioides*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 24, 1825. South Africa: Prom. bon. sp., Mundt & Maire. Typus: HAL 81874.
- Asplenium castaneum*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 611, 1830. Mexico: in monte Orizaba in Spelunca, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 81873.
- Asplenium lacerum*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 612, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81872 (2 sheets).
- Astephanus mucronatus*** Schltdl., Linnaea 8: 518, 1834. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 82965 (2 sheets).
- Aster behrii*** Schltdl., Linnaea 21: 446, 1848. Not at HAL.
- Asteriscium chilense*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 354, 1826. Chile: in arenosis siccis circa Talcaguano, A. v. Chamisso, Feb. 1816. Typus: HAL 26829.
- Atragene wenderothii*** Schltdl., Linnaea 11: 650, 1837. G.W.F. Wenderoth. Lectotypus: HAL 79942.
- Axanthes philippensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 193, 1829. Not at HAL.
- Baccharis lancifolia*** Schltdl., Linnaea 9: 266, 1834. Mexico: in regione Jalapensi, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98212.
- Badula mameicilla*** Schltdl., Linnaea 26: 671, 1855. Not at HAL.
- Baeckea ericoides*** Schltdl., Bot. Zeitung 4: 724, 1846. Sumatra, litus, F. Junghuhn. Holotypus: HAL 72108.
- Begonia heracleifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 603, 1830. Not HAL.
- Begonia nelumbiifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 604, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 39824.

Berberis schiedeana Schltdl., Bot. Zeitung 12: 654, 1854. Not at HAL.

Berzelia cordifolia Schltdl., Linnaea 6: 185/5, 1831. Not at HAL.

Berzelia intermedia Schltdl., Linnaea 6: 188, 1831. Not at HAL.

Berzelia rubra Schltdl., Linnaea 6: 189, 1831. Not at HAL.

Betula arguta Schltdl., Linnaea 7: 139, 1832. Not at HAL.

Beyrichia ocymoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 21, 1828. Brazil: Prov. Rio de Janeiro, C. Beyrich, Oct. Typus: HAL 98479.

Bignonia acutistipula Schltdl., Linnaea 26: 375, 1854. Not at HAL.

Bignonia patellifera Schltdl., Linnaea 8: 516, 1834. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98587 (2 sheets.).

Bignonia rugosa Schltdl., Linnaea 26: 656, 1855. Not at HAL.

Bignonia verrucifera Schltdl., Linnaea 26: 655, 1855. Not at HAL.

Blechnum confluens Schltdl., Linnaea 5: 613, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Typus: HAL 81871 (2 sheets).

Bolivaria integrifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 208, 1826. Brazil: prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97788 (2 sheets).

Bolivaria pinnatifida Schltdl., Linnaea 26: 474, 1855. Not at HAL.

Bolivaria trifida Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 209, 1826. Not at HAL.

Bonnaya brachycarpa Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 568, 1827. Not at HAL.

Borreria angustifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 330, 1828. Not at HAL.

Borreria aralioides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 339, 1828. Not at HAL.

Borreria asclepiadea Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 320, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98347.

Borreria brachystemonoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 314, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98348.

Borreria centhranthoides Cham. & Schltdl. (b) ***angustifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 329, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98349.

Borreria equisetoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 338, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, Nov. 1814–31. Typus: HAL 98351.

Borreria eryngioides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 316, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98352.

Borreria eupatorioides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 327, 1828. Not at HAL.

Borreria globularioides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 312, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98354.

Borreria kohautiana Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 311, 1828. Senegal: F. Kohaut & J. Schmidt, 5 Oct. 1822. Typus: HAL 98365.

Borreria laxa Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 337, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98355.

Borreria procera Schltdl., Linnaea 9: 593, 1835. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 98358.

Borreria saponariaefolia Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 325, 1828. Not at HAL.

Borreria satirejaefolia Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 313, 1828. Not at HAL.

Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 318, 1828. Not at HAL.

Borreria sideritis Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 321, 1828. Not at HAL.

- Borreria valerianoides** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 335, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98359.
- Borreria verbenoides** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 331, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 98356, 98357.
- Borreria virgata** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 324, 1828. Not at HAL.
- Bouvardia houtteana** Schltdl., Fl. Serres, Ser. 1, 10: 149, 1854–55. Cult. in horto van Houttei; Gandavensi, L. v. Houtte. Typus: HAL 24693.
- Bouvardia microphylla** Schltdl., Linnaea 26: 112, 1854. Mexico: C.J.W. Schiede. Typus: HAL 21736.
- Bouvardia myrtifolia** Schltdl., Linnaea 26: 121, 1854. Mexico: Hacienda de Cocoyotle, C.J.W. Schiede, Sept. Typus: HAL 21737.
- Bouvardia rosea** Schltdl., Linnaea 26: 116, 1854. Mexico: prope S. José del Oro, reg. frig., C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Syntypus: HAL 21738. Mexico: prope S. Francisco Jetecala, C.J.W. Schiede, Jun. Syntypus: HAL 21739. Mexico: C.J.W. Schiede. Lectotypus: HAL 21740.
- Bouvardia schiedeana** Schltdl., Linnaea 26: 123, 1854. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 24688.
- Bouvardia tenuiflora** Schltdl., Linnaea 26: 97, 1854. Cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal. Typus: HAL 24687.
- Bouvardia viminalis** Schltdl., Linnaea 26: 120, 1854. Mexico: C.J.W. Schiede. Holotypus: HAL 21741.
- Bouvardia viperalis** Schltdl., Linnaea 26: 114, 1854. Mexico: prope Jenancingo, C.J.W. Schiede, May 1835. Holotypus: HAL 21742.
- Bowlesia grandifolia** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 382, 1826. Not at HAL.
- Brandesia mexicana** Schltdl., Linnaea 7: 392, 1832. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98009. Mexico: in sylvaticis prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 97826.
- Brongniartia magnibracteata** Schltdl., Linnaea 12: 338, 1838. Mexico: in Barranca prope S. Bartolo, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98425.
- Brongniartia sericea** Schltdl., Linnaea 12: 336, 1838. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 098426.
- Brunia passerinoides** Schltdl., Linnaea 6: 190, 1831. South Africa: Caledon, C.L. Zeyher. Feb. Holotypus: HAL 22118.
- Bryonia convolvulifolia** Schltdl., Linnaea 26: 640, 1855. Not at HAL.
- Bubon aphyllus** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 389, 1826. Not at HAL.
- Buchlomimus lobelioides** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 589, 1827. Not at HAL.
- Buchnera amethystina** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 588, 1827. Not at HAL.
- Buchnera juncea** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 590, 1827. Not at HAL.
- Buchnera lavandulacea** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 589, 1827. Not at HAL.
- Buddleja brachiata** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 599, 1827. Not at HAL.
- Buddleja cuneata** Cham. & Schltdl., Linnaea 8: 17, 1833. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 95995.
- Buddleja decurrens** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 105, 1830. Mexico: San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 96004 (2 sheets).
- Buddleja elegans** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 594, 1827. Not at HAL.

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 596, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 95998.

Buddleja neemda (var.) ***philippensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 598, 1827. Not at HAL.

Buddleja sphaerantha Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 104, 1830. Mexico: Llanos de Porte, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 96003 (2 sheets).

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 597, 1837. Not at HAL.

Bumelia ferox Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 392, 1831. Mexico: prope Tecolutam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98443.

Bunchosia biocellata Schltdl., Linnaea 10: 241, 1836. Mexico. Syntypus: HAL 98387. Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98603 (2 sheets).

Bunchosia strigosa Schltdl., Linnaea 10: 242, 1836. Not at HAL.

Bupleurum brevicaule Schltdl., Linnaea 17: 124, 1843. Syria: in areis graminosis rupium prope Aleppo, Th. Kotschy. Holotypus: HAL 98514.

Bupleurum mundtii Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 384, 1826. Not at HAL.

Burneya forsteri Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 189, 1829. Not at HAL.

Burneya gaudichaudii Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 190, 1829. Not at HAL.

Caladenia behrii Schltdl., Linnaea 20: 569, 1847. Not at HAL.

Caladenia tentaculata Schltdl., Linnaea 20: 571, 1847. Not at HAL.

Calamus metzianus Schltdl., Linnaea 26: 727, 1854. Not at HAL.

Calandrinia micrantha Schltdl., Ind. Sem. Hort. Bot. Hal.: 9, 1838 and Linnaea 13: Litt.-Ber. 97, 1839. Not at HAL.

Calea zacatechichi Schltdl., Linnaea 9: 589, 1835 “1834”. Mexico: in collibus apricis pr. Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 42244. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 42246.

Calocephalus chrysanthos Schltdl., Linnaea 20: 592, 1847. Australia: vom Grubenland bei Bethanien, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 69484.

Caltha limbata Schltdl., Linnaea 27: 556, 1856. Not at HAL.

Calycothrix behriana Schltdl., Linnaea 20: 650, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, Nov. Holotypus: HAL 48919.

Calycothrix scabra (var.) ***minor*** Schltdl., Linnaea 20: 650, 1847. Australia: im Pine forest-Wald zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr. Holotypus: HAL 48918.

Camphoromyrtus behrii Schltdl., Linnaea 20: 651, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, 10 Jan. 1845. Holotypus: HAL 74924.

Canthium mundtianum Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 131, 1829. Not at HAL.

Canthium thunbergianum Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 130, 1829. Not at HAL.

Capraria saxifragaefolia Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 105, 1830. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1828. Typus: HAL 98480.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 21, 1826. Chile: Talcahuano, in diar. deest, E.F. Poeppig, 1827–29. Syntypi: HAL 84865, 84866.

Cardamine purpurea Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 20, 1826. Insulis St. Laurentii. Holotypus: HAL 85360.

Cardiopetalum calophyllum Schltdl., Linnaea 9: 328, 1834. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 59852.

- Carex incrassata*** Schltld., Linnaea 10: 119, 1835. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 63546.
- Carex sellowiana*** Schltld., Linnaea 10: 117, 1835. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–31. Holotypus: HAL 63547.
- Carex viridis*** Schltld. & Cham., Linnaea 6: 30, 1831. Mexico: F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 63548.
- Carolinea macrocarpa*** Schltld. & Cham., Linnaea 6: 423, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. Typus: HAL 98398.
- Cascarilla gavanensis*** Schltld., Linnaea 26: 730, 1855. Not at HAL.
- Casearia obovata*** Schltld., Linnaea 13: 434, 1839. Mexico: in sylvis prope la Hacienda de la Orduña, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 41943.
- Casearia parviflora*** (var.) ***microphyla*** Schltld., Linnaea 4: 90, 1829. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–28. Syntypus: HAL 41976.
- Cassia astroides*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 597, 1830. Mexico: Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 98432.
- Cassia cinerea*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 599, 1830. Mexico: inter Tecoluta et Villa Rica, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98433.
- Cassia kunthiana*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 598, 1830. Mexico: in collibus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98434. Mexico: prope el Estero, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98431.
- Cassia vogeliana*** Schltld., Linnaea 12: 342, 1838. Not at HAL.
- Cassytha dispar*** Schltld., Linnaea 20: 578, 1847. Australia: an sandigen Orten, H. Behr. Typus: HAL 42852.
- Cassytha pubescens*** Schltld., Linnaea 20: 577, 1847. Australia: an kalkig-sandigen Orten (sandplains) bei Benthaniën, H. Behr, Jan. Typus: HAL 42844.
- Castilleja arvensis*** Cham. & Schltld., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: prope Jalapam, rarius, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 96091. Mexico: inter segetes inter San Andres et Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 96090. Mexico: Parce prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 96089.
- Ceanothus glandulosus*** Schltld., Linnaea 15: 474, 1841. Mexico: prope las Trojes, C.J.W. Schiede, Oct. 1830. Typus: HAL 50708 (5 sheets).
- Celastrus polygamus*** Schltld., Linnaea 4: 87, 1829. Not at HAL.
- Celtis schiedeana*** Schltld., Linnaea 7: 140, 1832. Mexico: prope la Banderilla, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 97799 (2 sheets).
- Cephaelis beskeana*** Schltld., Linnaea 28: 533, 1856. Brazil: prov. Rio Janeiro: in arenosis montium prope Novo Friburgo, Beske. Typus: HAL 98314.
- Cephaelis humboldtiana*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 136, 1827. Not at HAL.
- Cephaelis nuda*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 135, 1829. Brazil: prov. Rio de Janeiro, F. Sellow, Aug. 1814–31. Typus: HAL 98313.
- Cephaelis polycephala*** Schltld., Linnaea 28: 532, 1856. Not at HAL.
- Cephaelis ruelliaefolia*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 134, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98312.
- Cephalanthus sarandi*** Cham. & Schltld., Linnaea 2: 611, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97791 (2 sheets).

Cerastium apricum Schltld., Linnaea 12: 208, 1838. Mexico: in graminosis apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May–Aug. Typus: HAL 98171.

Cerastium beeringianum Cham. & Schltld., Linnaea 1: 62, 1826. South Africa: ad Sinus bonae spei, A. v. Chamisso, 12 Aug. 1816. Typus: HAL 98404.

Cerastium furcatum Cham. & Schltld., Linnaea 1: 61, 1826. Inter plantas Redowskianus. Typus: HAL 98403.

Cerastium orithales Schltld., Linnaea 12: 209, 1838. Not at HAL.

Cerastium vulcanicum Schltld., Linnaea 12: 208, 1838. Mexico: in regiona subnivali montis Orizabae, C.J.W. Schiede, Sept. Typus: HAL 3868.

Cerasus brasiliensis Cham. & Schltld., Linnaea 2: 542, 1827. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98146.

Cestrum amictum Schltld., Linnaea 7: 64, 1832. Not at HAL.

Cestrum confertiflorum Schltld., Linnaea 19: 263, 1846. Mexico: Anganguco, C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Syntypus: HAL 75348. Mexico: Anganguco, C.J.W. Schiede, Oct. 1830. Syntypus: HAL 75349 (2 sheets).

Cestrum dumetorum Schltld., Linnaea 7: 61, 1832. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Syntypus: HAL 75354 (2 sheets). Mexico: Sao Pablo, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 75355.

Cestrum euanthes Schltld., Linnaea 7: 60, 1832. Not at HAL.

Cestrum fasciculatum (var.) ***gracile*** Schltld., Linnaea 19: 261, 1845. Mexico: prope el Banco, C. Ehrenberg. Jan. 1839. Typus: HAL 75344.

Cestrum hirtellum Schltld., Linnaea 7: 62, 1832. Mexico: Jalapa; prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 75237 (2 sheets).

Cestrum laevigatum Schltld., Linnaea 7: 58, 1832. Brazil: prope Rio de Janeiro, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75296.

Cestrum laevigatum Schltld. (b) ***pauperculum*** Schltld., Linnaea 7: 59, 1832. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75295.

Cestrum lancifolium Schltld., Linnaea 19: 267, 1846. Mexico: prope San Toro, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Typus: HAL 75362.

Cestrum multiflorum Schltld., Linnaea 7: 59, 1832. Not at HAL.

Cestrum oblongifolium Schltld., Linnaea 19: 266, 1846. Mexico: in Barranco, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Typus: HAL 75366.

Cestrum porphyroneuron Schltld., Linnaea 25: 199, 1852. Not at HAL.

Cestrum psychotrifolium Schltld., Linnaea 19: 265, 1846. Mexico: prope Anganguco, C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Typus: HAL 75363.

Cestrum vestioides Schltld., Linnaea 7: 65, 1832. Not at HAL.

Chaetogastra geitneriana Schltld., Linnaea 27: 523, 1856. Not at HAL.

Cheilanthes bergiana Schltld., Adumbr. pl. 1: 51, 1825. Not at HAL.

Cheiranthus asper Cham. & Schltld., Linnaea 1: 14, 1826. Not at HAL.

Cherleria dicranoides Cham. & Schltld., Linnaea 1: 63, 1826. Ad Sinum St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98411.

Chiococca phaenostemon Schltld., Linnaea 9: 594, 1835. Not at HAL

Chironia frutescens (a) ***hirsuta*** & (b) ***glabra*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 190, 1826. Not at HAL.

- Chomelia obtusa*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 185, 1829. Not at HAL.
- Chomelia pubescens*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 187, 1829. Not at HAL.
- Cibotium schiedeii*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 616, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 81870 (2 sheets).
- Cinchona lechleriana*** Schltdl., Linnaea 26: 728, 1855. Not at HAL.
- Cipura punctulata*** Schltdl., Linnaea 18: 410, 1845. Not at HAL.
- Cissus elliptica*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 221, 1830. Mexico: prope Veracruz in dumetis, C.J.W. Schiede, Jul. 1828, Isotypi: HAL 71905 (2 sheets) and HAL 71903.
- Citharexylum lucidum*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 97, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 65144. Mexico: Hacienda de la Laguna, Beske, Sept. 1828. Syntypus: HAL 65145.
- Cleome houtteana*** Schltdl., Linnaea 24: 669, 1851. Typus: HAL 98611-98613 (3 sheets). Three sheets ex herb. Schlechtendal without additional data. Types?
- Cliffortia filicaulis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 33, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: prope Tulbagh, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98623 (2 sheets).
- Cliffortia serpyllifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 34, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: ad Cango, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98147.
- Clitoria schiedeana*** Schltdl., Linnaea 12: 284, 1838. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 36864. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 34078 (2 sheets).
- Cluacena lhotzkiana*** Schltdl., Linnaea 8: 184, 1833. Not at HAL.
- Clusia hoffmannseggiana*** Schltdl., Linnaea 8: 185, 1833. Not at HAL.
- Clusia leucantha*** Schltdl., Linnaea 8: 186, 1833. Not at HAL.
- Clusia sellowiana*** Schltdl., Linnaea 8: 183, 1833. Not at HAL.
- Cnidium suffructicosum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 387, 1826. Not at HAL.
- Coccocypselum aureum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 139, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum campanuliflorum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 140, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum ciliatum*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 414, 1831. Not at HAL.
- Coccocypselum erythrocephalum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 145, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum nummulariifolium*** Schltdl., Linnaea 9: 599, 1835. Not at HAL.
- Coccocypselum ovatum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 141, 1829. Not at HAL.
- Coccocypselum pedunculare*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 142, 1829. Not at HAL.
- Cochlearia arctica*** Schltdl. in DC., Syst. 2: 367, 1821. Russia: Siberia: in arcticis ad Obum Sibirica, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 26702.
- Cochlearia siliquosa*** Schltdl., in DC., Syst. 2: 369, 1821. Russia: Siberia: in Unalaschkae locis saxosis, P.S. Pallas, 1768–1774. Typus: HAL 26767.
- Cochlearia spatulata*** Schltdl. in DC., Syst. 2: 369, 1821. Insula St. Georgii, A. v. Chamisso, Jun. 1817. Typus: HAL 26755.
- Coffea kaduana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 33, 1829. Not at HAL.
- Coffea luconiensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 32, 1829. Not at HAL.
- Coffea mariniana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 35, 1829. Not at HAL.
- Coffea obovata*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 412, 1831. Not at HAL.

- Cologania obovata* Schltdl., Linnaea 12: 287, 1838. Not at HAL.
- Colquhounia mollis* Schltdl., Linnaea 24: 681, 1851. Not at HAL.
- Ceanothus celtidifolius* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 602, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 21507 (3 sheets). Mexico: in sylvis Jalapae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 21506. [≡ *Colubrina celtidifolia* (Schldl. & Cham.) Schltdl., Linnaea 15: 471, 1841].
- Colubrina ehrenbergii* Schltdl., Linnaea 15: 469, 1841. Mexico: inter Amajaque et el Puente de Dios, C. Ehrenberg, Dec. 1838. Lectotypus: HAL 21746 (2 sheets). Mexico: inter las Ajuntas at las Verdosas, C. Ehrenberg, Jan. 1840. Syntypus: HAL 21747.
- Columnnea schiedeana* Schltdl., Linnaea 8: 249, 1833. Mexico: in arboribus vetustis Misantlam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 82525 (2 sheets). Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 82770.
- Commelina carnea* Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: Adn. 9, 1839. Not at HAL.
- Commelina intermedia* Schltdl., Linnaea 24: 655, 1851. Not at HAL.
- Commelina procurrens* Schltdl., Linnaea 24: 656, 1851. Not at HAL.
- Commelina rosea* Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1838. Not at HAL.
- Commelina variabilis* Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1838. Not at HAL.
- Conanthera albiflora* Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 50, 1831. Not at HAL.
- Condalia mexicana* Schltdl., Linnaea 15: 471, 1841. Mexico: prope Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. 1830. Syntypi: HAL 21743, 21744.
- Conospermum patens* Schltdl., Linnaea 20: 587, 1847. Australia: Adelaide, im Pine forest-Walde zwischen dem Gawler-Light-river, H. Behr. Typus: HAL 10365.
- Convolvulus ampelopsifolius* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 118, 1830. Mexico: in dumetis prope Veracruz, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98221.
- Convolvulus apocynoides* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 117, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, Sept./Oct. 1828. Typus: HAL 098217.
- Convolvulus frankeanus* Schltdl., Linnaea 9: 513, 1835. Brazil: prope Rio de Janeiro, comm. MR Frank. Typus: HAL 98085.
- Convolvulus lapathifolia* Schltdl., Linnaea 19: 736, 1847. Mexico: F.E. Leibold, no. 54, 1839–44. Typus: HAL 37707.
- Convolvulus melanostictus* Schltdl., Linnaea 6: 737, 1831. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–1828. Typus: HAL 37540.
- Convolvulus polyanthus* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 117, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 98218.
- Convolvulus tuba* Schltdl., Linnaea 6: 735, 1831. Antillen, St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826–1828. Typus: HAL 37520.
- Convolvulus variabilis* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 116, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 37741.
- Cordia ambigua* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 115, 1830. Mexico: in sepibus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 48905.
- Cornus grandis* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Not at HAL.
- Corydalis ambigua* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 558, 1826. Ad portum Petropauli Camtschatcae, P.S. Pallas, 1816. Typus: HAL 98614.
- Corydalis cracca* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 567, 1826. Not at HAL.
- Cotoneaster marginatus* Schltdl., Linnaea 27: 541, 1856. Cult. in Hort. Bot. Berol.

Lectotypus: HAL 11879.

Cotoneaster orbicularis Schltdl., Linnaea 27: 544, 1856. Arabice: Schohatt, in montis St. Catharinae praeruptis, W. Schimper, 19 May & 11 Aug. 1835. Typus: HAL 11880 (2 sheets).

Crotalaria bracteata Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 575, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98144.

Crotalaria bupleurifolia Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 575, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98143.

Croton conspurcatus Schltdl., Linnaea 7: 380, 1832. Mexico: in dumetis prope Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 70989 (2 sheets).

Croton draco Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 360, 1831. Mexico: in sylvaticis Papantlam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98599 (3 sheets).

Croton ehrenbergii Schltdl., Linnaea 19: 248, 1846. Mexico: prope Mineral del Monte in Cuesta blanca, alt. 8–9000 ped., C. Ehrenberg, 1831–39. Lectotypus: HAL 48874. Mexico: inter Actopan et Pachuca, C. Ehrenberg, 1831–40. Paratypus: HAL 48875. Mexico: inter Actopan et Izmiquilpan, C. Ehrenberg, Jan. 1840. Paratypus: HAL 48873.

Croton hypoleucus Schltdl., Linnaea 19: 246, 1846. Mexico: inter Zimapam et S. José del Oro, C.J.W. Schiede, Jun. Typus: HAL 98598 (2 sheets).

Croton repens Schltdl., Linnaea 19: 237, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 98379. Mexico: temperiertes Mexico, F.E. Leibold. Syntypi: HAL 98377, 98378

Croton repandus Schltdl., Linnaea 19: 237, 1846. Mexico: steile steinige Hänge im Berglande bei der Tonunda, F.E. Leibold. Typus: HAL 98376.

Croton soliman Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 361, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98597 (2 sheets).

Croton pseudochina Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 84, 1830. Mexico: prope Plan del Rio, Tierra caliente, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 48871.

Croton pseudochina Schltdl. & Cham. (var.) **minor** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 359, 1831. Mexico: inter Laguna Verde et Actopan, C.J.W. Schiede, 1828–29. Typus: HAL 48840 (2 sheets, lecto- and isoelectotype). Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Isoelectotypus: HAL 48879. Mexico: prope Plan del Rio, reg. calidae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Paratypus: HAL 48878.

Croton schiedeanus Schltdl., Linnaea 19: 243, 1846. Mexico: inter Nautlam et Misantlam, reg. calidae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 48877.

Croton sericeus Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 85, 1830. Mexico: Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 48872.

Croton sylvaticus Schltdl., Linnaea 19: 240, 1846. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Holotypus: HAL 48880.

Crusea brachyphylla Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 165, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 19579.

Cryptandra campanulata Schltdl., Linnaea 20: 639, 1847. Australia: vom steinigen Ostabhänge des Gebirges gegen den Murray-Scrub, H. Behr, Jul. 1844/45. Typus: HAL 98383.

Cryptandra leucophracta Schltdl., Linnaea 20: 640, 1847. Australia: auf der Sandplaine genannten sandig-kalkigen Gegend, H. Behr, Jan. 1844/45. Typus: HAL 98601 (2 sheets).

Cupaniopsis calaminthaefolia Schltdl., Linnaea 12: 274, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 16110.

Cupaniopsis calophylla Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 361, 1827. Not at HAL.

Cuphaea balsamona Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 363, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis: Estrella de Maxade, F. Sellow, Apr. 1823. Syntypus: HAL 16113.

Cuphaea calaminthaefolia Schltdl., Linnaea 12: 274, 1838. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 16107. Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 16108. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 16109.

Cuphaea ericoides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 366, 1827. Not at HAL.

Cuphaea glutinosa Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 369, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98166, 98368

Cuphaea ingrata Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 371, 1827. Brazil: Brasilia aequinoct., Sellow & Beyrich, 1814–31. Syntypus: HAL 98369. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98370.

Cuphaea ligustrina Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 359, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98371.

Cuphaea linarioides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 367, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98390.

Cuphaea lysimachioides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 374, 1827. Brazil: Brasilia aequinoct. ac. meridi (ex gr. Estrella das Tombas), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98391.

Cuphaea mimuloides Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 570, 1830. Mexico: in humidis prope Mesachica, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Holotypus: HAL 16104.

Cuphaea origanifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 373, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98392.

Cuphaea salicifolia Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 569, 1830. Mexico: ad rivulos et ripas fluminis Misanlensis prope Misanltam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Mar. 1829. Lectotypus: HAL 15204 (2 sheets). Mexico: ad rivulos prope Papantlam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Syntypus: HAL 16097.

Cuphaea thymoides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 368, 1827. Not at HAL.

Cuphaea tuberosa Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 372, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98393.

Curtia gentianoides Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 210, 1826. Not at HAL.

Cuscuta citricola Schltdl., Linnaea 22: 808, 1849. Not at HAL.

Cuscuta jalapensis Schltdl., Linnaea 8: 515, 1833. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98483.

Cyathea mexicana Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 616, 1830. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 75280. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Syntypus: HAL 81869 (2 sheets).

Cyathodes tameiameiae Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 539, 1826. Not at HAL.

Cybianthus parviflorus Schltdl., Linnaea 26: 672, 1855. Not at HAL.

Cynoglossum mexicanum Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 114, 1830. Mexico: in monte Macultepec, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 95748 (2 sheets).

Cyperus ciliatus Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 25, 1831. Mexico: inter St. Fe et Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 53220.

Cyperus fossarum Schltld., Linnaea 31: 316, 1861–62. Not at HAL.

Cyperus ischnos Schltld., Bot. Zeitung 7: 99, 1849. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 53189. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 53192.

Cyrtocarpa copalillo Schltld., Linnaea 16: 485, 1842. Not at HAL.

Dalea ehrenbergii Schltld., Linnaea 12: 290, 1838. Mexico: prope Grande, C. Ehrenberg. Typus: HAL 98418.

Dalea comosa Schltld., Linnaea 12: 289, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Cuesta blanca, C. Ehrenberg, Nov./Dec. 1841–40. Typus: HAL 80011.

Dalea laxiflora Schltld., Linnaea 12: 293, 1838. Not at HAL.

Dalea leucostoma Schltld., Linnaea 12: 294, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, Oct. Typus: HAL 98419.

Dalea pyramidalis Schltld., Linnaea 12: 290, 1838. Not at HAL.

Dalea thymoides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 580, 1830. Mexico: inter la Hacienda Tenestepeque et Hacienda Quantotolapa, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 98422.

Dalea uncifera Schltld. & Cham., Linnaea 5: 580, 1830. Mexico: in apricis prope Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Syntypus: HAL 98610 (2 sheets). Mexico: in patris inter Mesachica et Malipique, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 98421.

Dalea verbenacea Schltld. & Cham., Linnaea 5: 579, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98416.

Dalea verbenacea Schltld. & Cham. (var.) ***sericea*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 579, 1830, Mexico: prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98414. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98415.

Dampiera rosmarinifolia Schltld., Linnaea 20: 603, 1847. Australia: in Schrubgegenden, H. Behr, Oct./Nov. 1845. Typus: HAL 43163.

Davallia divaricata Schltld. & Cham., Linnaea 5: 617, 1830. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Typus: HAL 81868 (2 sheets).

Davilla sellowiana Schltld., Linnaea 8: 178, 1833. Not at HAL.

Davilla tintinnabulata Schltld., Linnaea 8: 178, 1833. Not at HAL.

Declieuxia herbacea Cham. & Schltld., Linnaea 4: 11, 1829. Not at HAL.

Deherainia nervosa Cham. & Schltld., Linnaea 1: 197, 1826. Not at HAL.

Deianira erubescens Cham. & Schltld., Linnaea 1: 196, 1826. Not at HAL.

Deianira pallescens Cham. & Schltld., Linnaea 1: 196, 1826. Not at HAL.

Deppea erythrorhiza Schltld. & Cham., Linnaea 5: 168, 1830. Mexico: in umbrosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Holotypus: HAL 64236 (2 sheets).

Deppea grandiflora Schltld., Linnaea 19: 748, 1847. Mexico: Mexico temperata, F.E. Leibold, 1839–44. Typus: HAL 64237.

Desmodium adhaesivum Schltld., Linnaea 12: 314, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Huasca, Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 51025.

Desmodium affine Schltld., Linnaea 12: 312, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 51030. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 51031.

Desmodium diversifolium Schltld., Linnaea 12: 313, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 51029.

Desmodium elegans Schltld., Linnaea 12: 320, 1838. Not at HAL.

Desmodium lupulinum Schltld., Linnaea 12: 317, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 51037.

Desmodium orbiculare Schltld., Linnaea 12: 311, 1838. Mexico: in solo calcareo ad aquas calidas prope Grande, Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typi: HAL 51039, 51040.

Desmodium plicatum Schltld. & Cham., Linnaea 5: 585, 1830. Mexico: in patris inter Misantlam et Colipam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 51034 (2 sheets).

Desmodium polystachyum Schltld., Linnaea 12: 321, 1838. Mexico: Hacienda de la Orduna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 51294 (2 sheets).

Desmodium prehensile Schltld., Linnaea 12: 315, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 51017.

Desmodium psilophyllum Schltld., Linnaea 12: 310, 1838. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 51036.

Desmodium retinens Schltld., Linnaea 12: 311, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 51035.

Desmodium sericophyllum Schltld., Linnaea 12: 317, 1838. Mexico: in sylvis prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 50828.

Desmodium strobilaceum Schltld., Linnaea 12: 316, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 51018.

Desmodium subsessile Schltld., Linnaea 12: 319, 1838. Mexico: prope Regla, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 50827.

Dichoglottis australis Schltld., Linnaea 20: 631, 1847. Australia: auf Sandboden bei Bethanien, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98405.

Dichorisandra marginata Schltld., Linnaea 26: 454, 1855. Not at HAL.

Dichromena radicans Schltld. & Cham., Linnaea 6: 28, 1831. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Holotypus: HAL 63549.

Dillwynia scabra Schltld., Linnaea 20: 666, 1847. Australia: in der Barossa-Range, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 52291.

Diodia anthospermoides Cham. & Schltld., Linnaea 3: 343, 1828. Not at HAL.

Diodia dasycephala Cham. & Schltld., Linnaea 3: 348, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98296

Diodia palustris Cham. & Schltld., Linnaea 3: 347, 1828. Not at HAL.

Diodia polymorpha Cham. & Schltld., Linnaea 3: 344, 1828. Not at HAL.

Dioscorea brachycarpa Schltld., Linnaea 17: 609, 1844. Mexico: Regla, C. Ehrenberg, Sept. 1835. Typus: HAL 62132.

Dioscorea convolvulacea Schltld. & Cham., Linnaea 6: 49, 1831. Mexico: prope Plan del Rio, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 62124.

Dioscorea deppei Schiede ex Schltld., Bot. Zeitung 1: 890, 1843. Mexico: in sylvis Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Synypus: HAL 62137 A (4 sheets). Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 62137 B (2 sheets).

Dioscorea grandifolia Schltld., Linnaea 17: 602, 1844. Mexico: in sylvis inter Acatlan et Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 62133. Mexico: in sylvis inter Acatlan et Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 62134.

- Dioscorea laxiflora*** Schltld., Linnaea 17: 606, 1844, non *D. laxiflora* Mart. ex Griseb., 1842 [= *Dioscorea remotiflora* Kunth], Mexico: in Barranca septentrionem versus a baleneis calidis ad Atotonilco el Grande, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62125 (2 sheets).
- Dioscorea nana*** Schltld., Linnaea 18: 112, 1844. Mexico: in planitie Toluca, reg. frigida, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62130, non *Dioscorea nana* Poepp.
- Dioscorea pallens*** Schltld., Linnaea 17: 610, 1844. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 62131.
- Dioscorea tenuiflora*** Schltld., Linnaea 17: 608, 1844. Mexico: locus natatis ignotus, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 62123.
- Diosma vulgaris*** Schltld., Linnaea 6: 200, 1831. South Africa: Prom. bon. spei, K.H. Bergius, 1815–17. Typus: HAL 90919.
- Dipterocalyx scaberrimus*** Schltld., Linnaea 26: 647, 1855. Not at HAL.
- Discocapnos mundtii*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 569, 1826. Not at HAL.
- Disoscorea deppei*** Schiede ex Schltld., Bot. Zeitung 1: 890, 1843. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1829. Typus: HAL 62137 C.
- Ditaxis lancifolia*** Schltld., Linnaea 26: 635, 1855. Not at HAL.
- Diuris behrii*** Schltld., Linnaea 20: 572, 1847. Not at HAL.
- Dodecatheon frigidum*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 222, 1826. Sinus St. Laurentii, A. v. Chamisso, 1816/17. Typus: HAL 98445.
- Dodonaea brasiliensis*** Schltld., Linnaea 18: 51, 1844. Brazil: in arenosis prope Ilheos, K.F.P. Martius, 1817–20. Syntypi: HAL 34072 (2 sheets), 36819.
- Dodonaea ehrenbergii*** Schltld., Linnaea 18: 52, 1844. S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828–31. Holotypus: HAL 36817.
- Dodonaea kohautiana*** Schltld., Linnaea 18: 52, 1844. Senegal: F.W. Sieber. Typus: HAL 36825.
- Dodonaea schiedeana*** Schltld., Linnaea 18: 49, 1844. Mexico: C.J.W. Schiede, Mar. 1828–36. Typus: HAL 34073 (2 sheets).
- Dolichos mexicanus*** Schltld., Linnaea 12: 329, 1838. Mexico: in dumetis Misantlae, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 75279.
- Dolichos rhynchosoides*** Schltld., Linnaea 27: 531, 1856. Not at HAL
- Doratolepis tetrachaeta*** Schltld., Linnaea 20: 593, 1847. Not at HAL.
- Draba henneana*** Schltld., Linnaea 10: 100, 1835. Labrador, E. Wenk. Holotypus: HAL 84109.
- Draba laevigata*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 25, 1826. Insulis St. Laurentii, A. v. Chamisso, Jun. 1817. Holotypus: HAL 84110.
- Drosera hilaris*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 548, 1826. Not at HAL.
- Drymaria gracilis*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Mexico: Jalapa, F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98420. [Cult. in Horto bot. Berol.].
- Drymaria grandiflora*** Schltld., Linnaea 12: 205, 1838. Not at HAL.
- Drymaria palustris*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Not at HAL.
- Drymaria ramosissima*** Schltld., Linnaea 12: 206, 1838. Mexico: Hegewisch; Mühlpfordt. Typus: HAL 98412.
- Drymaria villosa*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 232, 1830. Not at HAL.
- Echeveria bifida*** Schltld., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.

- Echeveria mucronata* Schltdl., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.
- Echveria pubescens* Schltdl., Linnaea 13: 411, 1839. Not at HAL.
- Echeveria racemosa* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 554, 1830. Not at HAL.
- Echiostachys chlorantha* Schltdl., Linnaea 26: 663, 1855. Not at HAL.
- Echites bignoniaeflora* Schltdl., Linnaea 26: 372, 1854. Not at HAL.
- Echites ehrenbergii* Schltdl., Linnaea 26: 666, 1855. San Domingo, C. Ehrenberg, 1828–31. Typus: HAL 83854.
- Elaeagnus alingaro* Schltdl. in DC., Prodr. 14: 615, 1857. Not at HAL.
- Elaeagnus arborea* var. (b) *dendroidea* Schltdl. in DC., Prodr. 14: 612, 1857 [= *Elaeagnus dendroidea* (Schltdl.) Schltdl., Linnaea 30: 362, 1859/60]. Herb. Schlechtendal (without locality, without collector). Typus: HAL 98200.
- Elaeagnus cumingii* Schltdl., Linnaea 30: 375, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus gaudichaudiana* Schltdl., in DC., Prodr. 14: 612, 1857. Small fragment (ex herb. de Candolle). Typus: HAL 98201.
- Elaeagnus kologa* Schltdl. in DC., Prodr. 14: 611, 1857. Collection without any additional data (ex herb. de Candolle?). Type: HAL 98202.
- Elaeagnus oxycarpa* Schltdl., Linnaea 30: 344, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus perrottetii* Schltdl., Linnaea 30: 375, 1859/60. Not at HAL.
- Elaeagnus thwaitesii* Schltdl. in DC., Prodr. 14: 611, 1857. Not at HAL.
- Elaeagnus wallichiana* Schltdl. in DC., Prodr. 14: 612, 1857. Not at HAL.
- Elaphrium bicolor* Willd. ex Schltdl., Linnaea 17: 625, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, 1835. Synypi: HAL 95927 (2 sheets), 95928 (2 sheets).
- Elaphrium cuneatum* Schltdl., Linnaea 17: 629, 1843. Mexico: prope Zamalitzahuaca, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1834/35. Typus: HAL 95929 (2 sheets).
- Elaphrium grandifolium* Schltdl., Linnaea 17: 249, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95936.
- Elaphrium lancifolium* Schltdl., Linnaea 17: 247, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Sept. 1835. Typus: HAL 95938.
- Elaphrium lancifolium* Schltdl. (var.) b, Linnaea 17: 247, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95937.
- Elaphrium ovalifolium* Schltdl., Linnaea 17: 248, 1843. Mexico: C.J.W. Schiede. Typus: HAL 95939.
- Elaphrium simplicifolium* Schltdl., Linnaea 16: 532, 1843. Mexico: in regione calida, C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Typus: HAL 95940.
- Elaterium ribiflorum* Schltdl., Linnaea 7: 388, 1832. Not at HAL.
- Elaterium trilobatum* Schltdl., Linnaea 26: 639, 1855. Not at HAL.
- Epilobium repens* Schltdl., Linnaea 12: 267, 1838. Mexico: ad radices montis Orizabae, ad aquaeductum prope el Palinque, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 3867.
- Equisetum myriochaetum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Mexico: in sylvaticis humidis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Feb. 1829. Typus: HAL 81867 (2 sheets).
- Eragrostis pilosa* (var.) *nutans* Schltdl., Linnaea 27: 478, 1856. Not at HAL.
- Eragrostis megastachya* (var.) *verrucosa* Schltdl., Linnaea 27: 477, 1856. Not at HAL.
- Eranthemum leuconeurum* Schltdl., Linnaea 27: 500, 1856. Not at HAL.

- Erigeron trifidus* Schltld., Linnaea 27: 518, 1856. Not at HAL.
- Erigeron solidaginoides* Schltld., Linnaea 25: 213, 1852. Not at HAL.
- Eryngium canaliculatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 338, 1826. Not at HAL.
- Eryngium ciliatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 349, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Cisplatina et Rio grande do Sul, in campis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25176.
- Eryngium deppeanum* Cham. & Schltld., Linnaea 5: 207, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Holotypus: HAL 25194 (2 sheets).
- Eryngium elegans* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 348, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo et Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25177.
- Eryngium eriophorum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 342, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25178.
- Eryngium floribundum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 345, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25180.
- Eryngium junceum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 341, 1826. Brazil: Brasilia aequinoct., F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25181.
- Eryngium luzulaefolium* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 340, 1826. Not at HAL.
- Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 336, 1826. Not at HAL.
- Eryngium pristis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 337, 1826. Not at HAL.
- Eryngium sanguisorba* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 339, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25186.
- Eryngium schiedeanum* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 206, 1830. Not at HAL.
- Eryngium serra* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 346, 1826. Not at HAL.
- Eryngium uncinatum* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 347, 1826. Not at HAL.
- Erythraea divaricata* Schltld., Bot. Zeitung 13: 920, 1855. Mexico: ad Huatusco, W. Schaffner. Holotypus: HAL 34834.
- Erythraea stricta* Schltld., Bot. Zeitung 13: 918, 1855. Mexico: prope Huatusco, W. Schaffner. Typus: HAL 34829.
- Erythraea tetramera* Schltld., Bot. Zeitung 13: 919, 1855. Mexico: Cuernavaca, W. Schaffner, Jul. 1853. Typus: HAL 84830.
- Escallonia chlorophylla* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 542, 1826. Not at HAL.
- Escallonia floribundus* (b) *montevidensis* Cham. & Schltld., Linnaea 1: 543, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98446.
- Escobedia laevis* Schltld. & Cham., Linnaea 5: 108, 1830. Mexico: in dumetis apricis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98534.
- Escobedia linearis* Schltld., Linnaea 8: 246, 1833. Mexico: in graminosis prope Hacienda de la Laguna, Jul. 1829. Typus: HAL 97783 (2 sheets).
- Esenbeckia choisyoides* Schltld., Linnaea 27: 529, 1856. Mexico: Jalacingo, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 98375. Mexico: frequentissima colitur hortis pagi S. Angel, Clavel, May 1831. Syntypus: HAL 98595 (2 sheets).
- Eucalyptus fabrorum* Schltld., Linnaea 20: 656, 1847. Australia: Montes Barossae, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 89676.
- Eucalyptus rostrata* Schltld., Linnaea 20: 655, 1847. Australia: Südaustralien, Montibus Barossae, H. Behr, 16 Mar. Holotypus: HAL 89675, nom. illeg., non *E. rostrata* Cav. 1797.

Eugenia macrocarpa Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 560, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 81698 (3 sheets).

Eugenia schiedeana Schltdl., Linnaea 13: 418, 1839. Not at HAL.

Euphorbia campestris Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 84, 1830. Mexico: in planitie inter Tlachichuca et Tepetitlan, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 71081.

Euphorbia lancifolia Schltdl., Linnaea 7: 143, 1832. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 43178.

Euphorbia scotanum Schltdl., Linnaea 19: 250, 1846. Not at HAL.

Euryanthe schiedeana Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 225, 1830. Not at HAL.

Eutaxia empetrifolia Schltdl., Linnaea 20: 667, 1847. Australia: an trockenen sandigen Orten bei Bethanien, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 52292.

Evolvulus albiflorus Schltdl., Linnaea 26: 654, 1855. Not at HAL.

Evolvulus cardiophyllus Schltdl., Linnaea 26: 653, 1855. Not at HAL.

Excoecaria riparia Schltdl., Linnaea 7: 386, 1832. Mexico: frutex monoicus ad ripas rivulorum prope Zoncuanla et Jalapa, C.J.W. Schiede, Jun./Jul. 1929. Typus: HAL 98100.

Exocarpus dasystachys Schltdl., Linnaea 20: 580, 1847. Australia: Südastralien, am Ufer des Murrey, H. Behr, May, ca. 1845. Typus: HAL 91221.

Exostemma formosum Cham. & Schltdl. (a) ***leprosum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 179, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97786 (2 sheets).

Exostemma formosum Cham. & Schltdl. (b) ***laeve*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 179, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 97787 (2 sheets).

Fedia orientalis Schltdl., Linnaea 17: 126, 1843. Syria: in lapidosis collinum pr. Aleppo, Th. Kotschy, 19 Apr. 1841. Typus: HAL 6940 (2 sheets).

Ferula angulata Schltdl., Linnaea 17: 125, 1843. Kurdistan: in hiabitus saxosis altiorum regionum m. Gara et Th. Kotschy, Pl. alepp. kurd. moss. 403. Ed. Hohenacker 1843, Th. Kotschy, 6 Aug. 1841/1843. Syntypus: HAL 36377 A/B (2 sheets).

Ferula angulata Schltdl., Linnaea 17: 125, 1843. Not at HAL.

Fragaria californica Schltdl. & Cham., Linnaea 2: 20, 1827. Not at HAL.

Fragaria mexicana Schltdl., Linnaea 13: 265, 1839. Mexico: in dumetis pr. San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 60500. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg. Syntypus: HAL 60502. Mexico: prope Jalapam, raro, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 60498. Mexico: prope Atotonilco el chico, C.J.W. Schiede, Jun. 1830 Syntypus: HAL 60499. Mexico: in umbrosis prope la Encarnacion, C.J.W. Schiede, Jun. 1830. Syntypus: HAL 60501.

Fragaria nilgerrensis Schltdl. ex J. Gray, Ann. Sci. Nat. Sér. IV, 8: 206, 1857. India orientalis (M. Nilagiri). In montibus Nilagiri (= Nilghiri) in colis: Nellamulli (= Nella Maully), fructus edulis. Sispara, F. Metz, Feb. 1854. Isolectotypus: HAL 81671.

Fragosa biloba Schltdl., Linnaea 28: 478, 1856. Ex herb. Lechler. Holotypus: HAL 26845.

Francisceae macrophylla Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 601, 1827. Not at HAL.

Francisceae pauciflora Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 600, 1827. Not at HAL.

Frankenia grandiflora Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 35, 1826. Not at HAL.

- Frankenia krebsii*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 1: 36, 1826. South Africa: Prom. bon. spei, F.L. Krebs, 1829. Typus: HAL 98413.
- Fraxinus schiedeana*** Schltdl. & Cham., *Linnaea* 6: 391, 1831. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, in calidioribus, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 64916.
- Friedlandia amoena*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 2: 350, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, ubi ad Chapada et Barbacenam, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98372.
- Friedlandia buxifolia*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 2: 351, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98373.
- Friedlandia hirtella*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 2: 352, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98635.
- Friedlandia hirsuta*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 2: 352, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98374.
- Friedlandia stachyoides*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 2: 353, 1827. Not at HAL.
- Fuirena hexachaeta*** Schltdl., *Linnaea* 19: 68, 1846. Mexico: in paludibus vallis Tolucensis prope la Ventilla, C.J.W. Schiede, Sept. 1830. Holotypus: HAL 63545.
- Fumaria lichtensteinii*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 1: 568, 1826. Not at HAL.
- Galactia brevistyla*** Schltdl., *Linnaea* 12: 288, 1838. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 71483.
- Galactia brevistyla*** Schltdl. (b) ***strigosa*** Schltdl., *Linnaea* 12: 289, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna., C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 71480.
- Galium cotinoides*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 3: 227, 1828. Chile: in vicinia portus Talcahuano ad sepes, A. v. Chamisso. Holotypus: HAL 43125.
- Galium humile*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 3: 226, 1828. Not at HAL.
- Galium jalapense*** Schltdl., *Linnaea* 9: 591, 1835. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 43116.
- Galium obstipum*** Schltdl. (f.) ***latifolium*** Schltdl., *Linnaea* 9: 592, 1835. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 91210.
- Galium obstipum*** Schltdl. (f.) ***angustifolia*** Schltdl., *Linnaea* 9: 592, 1835. Mexico: prope San Miguel del Soldado, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 43085.
- Galium jalapense*** Schltdl., *Linnaea* 9: 591, 1835. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 43115. Mexico: in sylvis umbrosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 43116.
- Gardenia ferox*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 4: 198, 1829. Not at HAL.
- Gardenia formosa*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 4: 200, 1829. Not at HAL.
- Gardenia schiedeana*** Schltdl., *Linnaea* 9: 601, 1835. Mexico: prope Actopan, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 98547.
- Gardenia sellowiana*** Cham. & Schltdl., *Linnaea* 4: 197, 1829. Not at HAL.
- Gaudichaudia albida*** Schltdl. & Cham., *Linnaea* 5: 217, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 74279.
- Gaultheria acuminata*** Schltdl. & Cham., *Linnaea* 5: 126, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 45637 (2 sheets).
- Gaultheria acuminata*** Schltdl. & Cham. (var.) ***lancifolia*** Schltdl., *Linnaea* 19: 741, 1847. Mexico: temperiertes Mexico, F.E. Leibold, n. 14, 1839–44. Holotypus: HAL 47335.

- Gaultheria ciliata*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 126, 1830. Mexico: in monte Orizaba cum Solano tuberoso, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Holotypus: HAL 28582.
- Gaultheria ferruginea*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 524, 1826. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Lectotypus: HAL 43326.
- Gaylussacia incana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 536, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia pinifoliae*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 536, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98451.
- Gaylussacia pseudo-gaultheria*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 535, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 98449, 98450
- Gaylussacia pseudo-vaccinium*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 530, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98448.
- Gaylussacia rhododendron*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 533, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia rugosa*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 534, 1826. Not at HAL.
- Gaylussacia salicifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 532, 1826. Not at HAL.
- Gentiana aleutica*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 175, 1826. Not at HAL.
- Gentiana stelleriana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 188, 1826. Not at HAL.
- Gentiana rurikiana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 176, 1826. Sinus Escholzii et Sinus Laurentii, A. v. Chamisso. Typus: HAL 83665.
- Geochorda cuneata*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 11, 1828. Not at HAL.
- Geranium schiedeanum*** Schltdl., Linnaea 10: 253, 1836. Mexico: pr. La Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 76344.
- Gerardia brachyphylla*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 15, 1828. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98536.
- Gerardia caesarea*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 17, 1828. Not at HAL.
- Gerardia communis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 12, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, Feb. 1814–31. Typus: HAL 98539.
- Gerardia dasyantha*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 104, 1830. Mexico: Tierra fria, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98535.
- Gerardia genistifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 15, 1828. Not at HAL.
- Gerardia gnidioides*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 16, 1828. Not at HAL.
- Gerardia linarioides*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 13, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98538.
- Gerontogea biflora*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 155, 1829. Not at HAL.
- Gerontogea deppeana*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 169, 1830. Mexico: San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 65134 (2 sheets).
- Gerontogea microtheca*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 169, 1830. Mexico: Barranca de Tioselo, in umbrosis, C.J.W. Schiede, Sept. Holotypus: HAL 65136.
- Gerontogea racemosa*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 154, 1829. Not at HAL.
- Gesneria deppeana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 5: 110, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 96235.
- Gladiolus boucheanus*** Schltdl., Linnaea 7: 488, 1832. Not at HAL.
- Glossostylis aspera*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 23, 1828. Not at HAL.
- Gongylocarpus rubricaulis*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 558, 1830. Mexico: circa Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98152.
- Gonolobus chloranthus*** Schltdl., Linnaea 8: 520, 1834. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede,

- de, May 1829. Typus: HAL 98552.
- Gonolobus fraternus*** Schltdl., Linnaea 8: 521, 1834. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98553.
- Gonolobus nigrescens*** Schltdl., Linnaea 8: 522, 1834. Mexico: in calidioribus circa Hacienda de la Lagnuna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98555.
- Gonolobus velutinus*** Schltdl., Linnaea 8: 521, 1834. Mexico: prope Loncuantla (Jalapa), C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 98554.
- Gonzalagunia dicocca*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 194, 1829. Not at HAL.
- Gonzalagunia parviflora*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 414, 1831. Not at HAL.
- Goodenia albiflora*** Schltdl., Linnaea 20: 599, 1847. Not at HAL
- Goodenia pinnatifida*** Schltdl., Linnaea 21: 459, 1848. Australia: H. Behr. Holotypus: HAL 18290.
- Goodenia primulacea*** Schltdl., Linnaea 20: 601, 1847. Australia: in sandigen Boden bei Bethanien und anderen Orten, H. Behr, 1847. Typus: HAL 18291.
- Grabowskia boerhaaviaefolia*** Schltdl., Linnaea 7: 72, 1832. Not at HAL.
- Grevillea behrii*** Schltdl., Linnaea 20: 585, 1847. Australia: Adelaide, im Walde Pine forest bei Gawlertown, H. Behr, Oct./Nov. 1844. Typus: HAL 40155.
- Grevillea lavandulacea*** Schltdl., Linnaea 20: 586, 1847. Australia: bei Adelaide im Walde Pine forest zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, 1844/45. Lectotypus: HAL 40153. Isolectotypus: HAL 40154.
- Guatteria candolleana*** Schltdl., Linnaea 9: 325, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98455 (?). Label without locality and collector.
- Guatteria hilariana*** Schltdl. (a) ***angustifolia*** Schltdl., Linnaea 9: 324, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 76469.
- Guatteria hilariana*** Schltdl. (b) ***latifolia*** Schltdl., Linnaea 9: 324, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Isotypus: HAL 76468.
- Guatteria martiana*** Schltdl., Linnaea 9: 326, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypi: HAL 76471 (only fruits), 76473 (only leaves).
- Guatteria pohliana*** Schltdl., Linnaea 9: 321, 1834. Not at HAL.
- Guatteria sellowiana*** Schltdl., Linnaea 9: 323, 1834. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76478.
- Guettarda viburnoides*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 182, 1828. Not at HAL.
- Guettarda uruquensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 183, 1829. Not at HAL.
- Gymnandra gmelinii*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 561, 1827, nom. superfl.
- Gymnandra pallasii*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 564, 1827, nom. superfl.
- Gymnandra stelleri*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 563, 1827, nom. superfl.
- Gymnogramma lotta*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 15, 1825. Not at HAL.
- Halgania strigosa*** Schltdl., Linnaea 20: 614, 1847. Australia: bei Bethanien auf sandigem Boden, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 40928.
- Halgania tuberculosa*** Schltdl., Linnaea 20: 615, 1847. Australia: bei Bethanien, niedriger Strauch, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 40960.
- Hampea integerrima*** Schltdl., Linnaea 11: 372, 1837. Mexico: prope Josocola, C.J.W. Schiede, May 1829. Lectotypus: HAL 18028. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 18139 (3 sheets).
- Hedera alaris*** Schltdl., Linnaea 9: 605, 1834. Not at HAL.

Hedyotis angustifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 153, 1829. Not at HAL.

Hedyotis serpyllacea Schltdl., Linnaea 9: 599, 1835. Mexico: inter la Joya et San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 65141.

Heeria elegans Schltdl., Linnaea 13: 432, 1839. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Holotypus: HAL 33208.

Heimia myrtifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 347, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 98157. Ex Hort. bot. Berol. 1827. Syntypus: HAL 98156.

Helichrysum erosum Schltdl., Linnaea 20: 595, 1847. Australia: H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98323.

Helipterum corymbiflorum Schltdl., Linnaea 21: 448, 1848. Australia: H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98324.

Herpestis chrysantha Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 577, 1827. Not at HAL.

Herpestis flagellaris Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 575, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98475.

Herpestis flagellaris Cham. & Schltdl. (b) ***veronicaefolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 575, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98476.

Herpestis lanigera Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 573, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98472.

Herpestis monosticta Schltdl., Linnaea 24: 695, 1851. Not at HAL.

Herpestis serpylloides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 574, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98473.

Herpestis tenella Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 576, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98477.

Herpestis tomentosa Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 106, 1830. Mexico: in arenosis prope Vera-Cruz, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jul. 1828/29. Typus: HAL 98478.

Heteromorpha arborescens Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 385, 1826. South Africa: in regionibus occidentalibus Promontorii bonae spei ad Gamka et Cango fluvios Aprili mense et in terra Auteniquarum Januario mense, Mundt & Maire. Typi: HAL 98488–98490.

Hibbertia glandulosa Schltdl., Linnaea 20: 636, 1847. Australia: Bethanien, Scrubgegend, H. Behr, Sept. Typus: HAL 28044.

Hillia brasiliensis Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 201, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98546.

Hirtella corymbosa Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 545, 1827. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98145.

Hirtella floribunda Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 548, 1827. Not at HAL.

Hisingera puberula Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 363, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 98607 (2 sheets).

Hoitzia nepetaefolia Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 385, 1831. Mexico: in pratis inter Misantlam et Colipam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 98484.

Horkelia californica Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 26, 1827. Not at HAL.

Hosta grandiflora Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 97, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98485.

Hydrocotyle asterias Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 361, 1826. Brazil: Brasilia tropica,

F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25147.

Hydrocotyle barbarossa Cham. & Schltld., Linnaea 1: 360, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle calliodus Cham. & Schltld., Linnaea 1: 371, 1826. South Africa: Prom. bon spei, montibus Tradouw, Mundt & Maire. Holotypus: HAL 97780 (2 sheets).

Hydrocotyle centella Cham. & Schltld., Linnaea 1: 375, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltld., Linnaea 1: 363, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltld., Linnaea 1: 364, 1826. Brazil: in provinciis Cisplatina et Rio grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Paratypus: HAL 25143.

Hydrocotyle mexicana Schltld. & Cham., Linnaea 5: 208, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 25141.

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltld., Linnaea 1: 358, 1826. Brazil: Brasilia meridionalis, provincia Cisplatina prope Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 25148.

Hydrocotyle montana Cham. & Schltld., Linnaea 1: 374, 1826. Not at HAL.

Hydrocotyle quinqueloba var. ***glabra*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 360, 1826. Brazil: Brasilia aequinoct., F. Sellow, 1814–31. Paratypus: HAL 25126.

Hydrocotyle vulgaris (var.) ***communis*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 356, 1826. Insula St. Catharina, A. v. Chamisso, Dec. 1815. Typus: HAL 25114.

Hydrotaenia ehrenbergii Schltld., Linnaea 18: 666, 1845. Not at HAL (description only based on living material).

Hymenophyllum jalapense Schltld. & Cham., Linnaea 5: 619, 1830. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1829. Typus: HAL 81866 (2 sheets).

Hymenophyllum millefolium Schltld. & Cham., Linnaea 5: 620, 1830. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jan. 1829. Typus: HAL 81864.

Hymenophyllum pulchellum Schltld. & Cham., Linnaea 5: 618, 1830. Mexico: ad rupes umbrosas prope Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1829. Typus: HAL 81863 (2 sheets).

Hyosycamus pinnatifidus Schltld., Linnaea 17: 127, 1843. Syria: in agris pr. Aleppum, raro, Th. Kotschy, 29 Apr. 1841. Typus: HAL 71958.

Hypericum anagaloides Cham. & Schltld., Linnaea 3: 127, 1828. Not at HAL.

Hypericum caespitosum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 126, 1828. Chile: in Chile austr. montos. graminos. Talcahuano ad Antuco, E.F. Poeppig, Dec. 1827–29. Typus: HAL 14490.

Hypericum campestre Cham. & Schltld., Linnaea 3: 122, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, ad fluvium Rio Negro aliisque pluribus locis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 14522, 14523.

Hypericum caprifoliatum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 125, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 14527.

Hypericum collinum Cham. & Schltld., Linnaea 5: 219, 1830. Mexico: prope Jalapam, Serro colorado, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828/29. Syntypi: HAL 14513–14515.

Hypericum myrianthum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 123, 1828. Brazil: Brasilia

meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typi: HAL 14757–14759.

Hypericum pratense Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 218, 1830. Mexico: in humidis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 96345.

Hypericum philonotis Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 219, 1830. Mexico: in humidis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 33807.

Hypericum tamariscinum Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 124, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in provincia Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 15024.

Hypopterygium astringens Schltdl., Linnaea 17: 635, 1843 (≡ ***Juliania adstringens*** Schltdl., l.c.: 636). Not at HAL.

Hypoxis vaginata Schltdl., Linnaea 20: 568, 1847. Not at HAL.

Hyptis lilacina Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 101, 1830. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98583.

Hyptis procumbens Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 101, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna in umbrosis, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98584.

Ichthyosma wehdemanni Schltdl., Linnaea 2: 671, 1827. Not at HAL.

Icica copal Schltdl., Linnaea 5: 601, 1830. Mexico: Misantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. Typus: HAL 98633 (3 sheets).

Indigofera acutifolia Schltdl., Linnaea 12: 282, 1838. Mexico: ad aquas calidas pr. Grande, C. Ehrenberg, 1831–39. Holotypus: HAL 65293.

Indigofera hippocrepioides Schltdl., Linnaea 12: 283, 1838. Mexico: Atotonilco el Chico, C. Ehrenberg, 1831–39. Holotypus: HAL 65294.

Indigofera lotoides Schltdl., Linnaea 12: 282, 1838, nom. illeg. [= ***Indigofera ehrenbergiana*** Steud.]. Mexico: Mineral del Monte ad pedem rupis Aquilae, C. Ehrenberg, Sept./Oct. 1831–39. Holotypus: HAL 65295.

Indigofera ornithopodioides Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 577, 1830. Mexico: in graminosis prope Vera-Cruz, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Holotypus: HAL 65289.

Inga canescens Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 592, 1830. Mexico: inter Marantial et Puente del Rey, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 41004.

Inga cognata Schltdl., Linnaea 12: 560, 1838. Mexico: inter Colipam et littora maris, reg. calid., C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Holotypus: HAL 71728 (2 sheets).

Inga flexuosa Schltdl., Linnaea 12: 559, 1838. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98634 (3 sheets).

Inga jinicuil Schltdl., Linnaea 12: 559, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98630 (2 sheets). Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98631 (2 sheets).

Inga leptoloba Schltdl., Linnaea 12: 560, 1838. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98629 (3 sheets).

Inga pennatula Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 593, 1830. Mexico: in apricis Jalapam et in calidioribus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug./Sept. 1828. Typus: HAL 64955 (2 sheets).

Ionidium lobelioides Schltdl., Linnaea 12: 203, 1838. Not at HAL.

Ipomoea funis Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 118, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam atque in dumetis prope San Andres, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 98219 (2 sheets).

Isochilus majos Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 60, 1831. Mexico: in arboribus Jalapam,

- F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 79366 (2 sheets).
- Isolepis multicaulis*** Schltdl., Linnaea 20: 562, 1847. Australia: auf Torfboden in einem felsigen Thal der Barossa Range, H. Behr, 1844/45. Holotypus: HAL 63543.
- Ixodia alata*** Schltdl., Linnaea 20: 593, 1847. Australia: steile steinige Hänge im Berglande bei der Tonunda, H. Behr, Nov./Dec. 1844/45. Typus: HAL 98098.
- Ixophorus schiedeana*** Schltdl., Linnaea 31: 421, 1861. Not at HAL.
- Jaltomata edulis*** Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal: 7, 1838 [= ***Saracha jaltomata*** Schltdl.], Germany: cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal, ca. 1838. Typus: HAL 33675 (cultivated, seeds from Mexico).
- Jasminum dianthifolium*** Van Houtte ex Schltdl., Linnaea 27: 513, 1856. Not at HAL.
- Juncus radicans*** Schltdl., Linnaea 18: 442, 1845. Mexico: ad rivulos Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypi: HAL 64679 (3 Bögen), 71562. Mexico: in aquis lentis fluentibus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71563. Mexico: Jalacingo, C.J.W. Schiede, Nov. 1828. Typus: HAL 70988.
- Juniperus flaccida*** Schltdl., Linnaea 12: 495, 1838. Not at HAL.
- Juniperus mexicana*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 77, 1830. Not at HAL.
- Juniperus tetragona*** Schltdl., Linnaea 12: 495, 1838. Not at HAL.
- Jussieua persicariaefolia*** Schltdl., Linnaea 12: 271, 1838. Mexico: in humidis umbrosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 69536.
- Justicia aurea*** Schltdl., Linnaea 7: 393, 1832. Not at HAL.
- Justicia callistachya*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 370, 1831. Not at HAL.
- Justicia fulvicoma*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 369, 1831. Mexico: in dumetis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 71937.
- Justicia haematoides*** Schltdl., Linnaea 7: 394, 1832. Not at HAL.
- Justicia heterophylla*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 95, 1830. Mexico: Serro colorado, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 71938.
- Justicia spicigera*** Schltdl., Linnaea 7: 395, 1832. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 98439.
- Kadua acuminata*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 163, 1828. Not at HAL.
- Kadua affinis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 164, 1829. Not at HAL.
- Kadua cookiana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 158, 1829. In Insula O-Waihi, Karakaoa, A. v. Chamisso, 1815–18. Typus: HAL 76737.
- Kadua cordata*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 160, 1829. Not at HAL.
- Kadua menziesiana*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 160, 1829. Not at HAL.
- Kadua romanzoffiensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 162, 1829. Insula coralligena Romanzoffii, A. v. Chamisso, 1815–18. Typus: HAL 76410.
- Kardanoglyphos nana*** Schltdl., Linnaea 28: 472, 1856. Peru: Agapata, W. Lechler, Aug. 1854. Holotypus: HAL 85363.
- Karwinskia affinis*** Schltdl., Linnaea 15: 460, 1841. Mexico: in solo calcareo aridissimo a balneis calidis pr. Grande boream versus, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 50608.
- Karwinskia mollis*** Schltdl., Linnaea 15: 461, 1841. Mexico: Barranca de Sta. Maria, in reg. temp., C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Typus: HAL 21792 (4 sheets).
- Karwinskia sessilifolia*** Schltdl., Linnaea 15: 461, 1841. Mexico: ad Haciendam de S.

Gabriel, C.J.W. Schiede, Nov. 1836. Typus: HAL 50607 (3 sheets).

Karwinskia subcordata Schltdl., Linnaea 15: 462, 1841. Mexico: inter Izmiquilpan et Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. Typus: HAL 50602 (3 sheets).

Klugia azurea Schltdl., Linnaea 8: 248, 1833. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98436.

Kohautia senegalensis Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 156, 1829. Not at HAL.

Lacis foeniculacea Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 42, 1831. Not at HAL.

Lamourouxia cordata Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: inter Tenestepeque et Quantotolapa, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 98537.

Lasiocephalus ovatus Schltdl., Mag. Ges. Nat. Freunde Berlin 8: 309, 1814. Not at HAL.

Lasiocephalus lingulatus Schltdl., Mag. Ges. Nat. Freunde Berlin 8: 309, 1814. Not at HAL.

Laurus longipes Schltdl., Linnaea 7: 390, 1832. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97803.

Leiphaimos parasitica Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 387, 1831. Mexico: in arbore putrido sylvae Papantlensis, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 42202.

Lepidium owaihiense Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 32, 1826. USA (Hawaii): in insulis Sandwich, O-Wahu, A. v. Chamisso, 1816. Holotypus: HAL 84102.

Leptospermum myrsinoides Schltdl., Linnaea 20: 653, 1847. Australia: zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 89664.

Licania humilis Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 549, 1827. Not at HAL.

Licania turiuva Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 550, 1827. Not at HAL.

Lichtensteinia lacera Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 395, 1826. South Africa: Prom. bon. spei. Typus: HAL 97779 (3 sheets).

Lichtensteinia pyrethrifolia Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 397, 1826. Not at HAL.

Lichtensteinia trifida Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 396, 1826. Not at HAL.

Ligusticum gmelini Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 391, 1826. Insula Chamissonis, A. v. Chamisso, Aug. 1816. Typus: HAL 98529.

Linostachys padifolia Schltdl., Linnaea 19: 235, 1846. [= *Acalypha schlechtendaliana* Muell.-Arg.]. Not at HAL

Linosyris mexicana Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 9, 1839 and Linnaea 14: Litt.-Ber. 128, 1840. Not at HAL

Linum schiedeanum Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 234, 1830. Mexico: loci diversi specimen mixtum, C.J.W. Schiede, 1828/29. Syntypus: HAL 71002 (2 sheets).

Linum tenellum Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 235, 1830. Mexico: prope Jalapam in sylvaticis, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71003. Mexico: in graminosis et dumetis apricis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 70984.

Lippia myriocephala Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 98, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Oct. 1828. Typus: HAL 98261.

Lisianthus nigrescens Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 388, 1831. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Holotypus: HAL 22070.

Lisianthus pedunculatus Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 199, 1826. Brazil: in regionibus inferioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 21500.

Lisianthus saponarioides Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 389, 1831. Mexico: ad margines sylvarum Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Holotypus: HAL 22068.

- Isoypus: HAL 22069.
- Lisianthus speciosus** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 198, 1826. Brazil: in regionibus inferioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 22052.
- Lobelia grandidentatus** Schltld., Linnaea 9: 262, 1834. Not at HAL.
- Lobopogon ericoides** Schltld., Linnaea 20: 620, 1847. Not at HAL.
- Loasa rhoeadifolia** Schltld., Linnaea 14: 382, 1841. Not at HAL.
- Logania linifolia** Schltld., Linnaea 20: 605, 1847. Australia: an felsigen Stellen, H. Behr. Typus: HAL 69877.
- Lopezia albiflora** Schltld., Linnaea 24: 696, 1851. Not at HAL.
- Lopezia trichota** Schltld., Linnaea 12: 273, 1838. Mexico: Mineral del Monte, Cuesta blanca in porphyriticis, C. Ehrenberg, Aug. 1836. Typus: HAL 28104.
- Loranthus buxifolius** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 207, 1828. Chile: circa Talcaguano, A. v. Chamisso, 1816. Typus: HAL 98586.
- Loranthus deppeanus** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: in arboribus parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 97773 (2 sheets).
- Loranthus elegans** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 209, 1828. South Africa: Prom. bon. spei, F.L. Krebs, 1829. Typus: HAL 98469.
- Loranthus flagellaris** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 213, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98468.
- Loranthus formosus** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 211, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98467.
- Loranthus oleaefolius** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 209, 1828. Not at HAL.
- Loranthus philippensis** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 204, 1828. Philippines: Tierra alta Luconiae, A. v. Chamisso, 1817/18. Typus: HAL 98466.
- Loranthus podopterus** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 218, 1828. Not at HAL.
- Loranthus quercicola** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 173, 1830. Mexico: in ramis Quercuum aliarumque arborum parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98465.
- Loranthus radicans** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 217, 1828. Not at HAL.
- Loranthus retusus** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 215, 1828. Not at HAL.
- Loranthus salicifolius** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 216, 1828. Not at HAL.
- Loranthus schiedeana** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede. Typus: HAL 98456 (2 sheets).
- Loranthus thyrsiflorus** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 214, 1828. Not at HAL.
- Lotus coccineus** Schltld., Linnaea 21: 452, 1848. Australia: auf sandigen Äckern bei Bethanien, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 69717.
- Loudonia behrii** Schltld., Linnaea 20: 648, 1847. Australia: auf unfruchtbarem Sandboden, gesellschaftlich, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 98153.
- Lupinus campestris** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 589, 1830. Mexico: in los Llanos inter Perote et Tlachichuca, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 5–6 Sept. 1828. Typus: HAL 33811.
- Lupinus ehrenbergii** Schltld., Linnaea 12: 334, 1839. Mexico: Mineral del Monte (Real del Monte), C. Ehrenberg, 1831–1839. Typus: HAL 33812.
- Lupinus leptophyllus** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 589, 1830. Mexico: inter Tlachichuca et Tepetitlan, in Llanos, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 6. Sept. 1828.

Typus: HAL 33813.

Lupinus uncinatus Schltdl., Linnaea 12: 333, 1838. Mexico: Mineral del Monte (Real del Monte), C. Ehrenberg, 1831–1839. Typus: HAL 33817.

Lupinus vaginatus Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 590, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 7–9 Sept. 1828. Typus: HAL 3881 (2 sheets).

Lychnis pulchra Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 234, 1830. Not at HAL.

Lycium cestroides Schltdl., Linnaea 7: 70, 1832. Not at HAL.

Lycium ciliatum Schltdl., Linnaea 7: 69, 1832. Not at HAL.

Lycopodium nitens Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Mexico: in arboribus vetustis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1829. Typus: HAL 81862.

Lycopodium pithyoides Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 623, 1830. Not at HAL.

Lycopodium rubrum Cham. & Schltdl., Linnaea 8: 389, 1833. Brazil: F. Sellow, Nov. 1831. Typus: HAL 81861.

Lycopodium pumilum Schltdl., Adumbr. pl. 1: 6, 1825, nom. superfl.

Lyncea hispida Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 109, 1830. Mexico: in sylvaticis prope Hacienda de la Laguna, Sept. 1828. Typus: HAL 97784 (2 sheets).

Lythrum puniceifolium Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 356, 1827. Not at HAL.

Machaerophorus matthioides Schltdl., Linnaea 28: 469, 1856. Peru: in rupestr. Cord. de Tuno, W. Lechler, May 1854. Holotypus: HAL 85367.

Machaonia spinosa Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 2, 1829. Not at HAL.

Magnolia schiedeana Schltdl., Bot. Zeitung 22: 144, 1864. Not at HAL.

Malaxis majanthemifolia Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 59, 1831. Not at HAL.

Malva behriana Schltdl., Linnaea 20: 633, 1847. Australia: im Thale des Murray-Flusses, H. Behr, Jul. 1844/45. Typus: HAL 98406.

Malva geranioides Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 226, 1830. Mexico: Llanos de Porte, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 43666.

Malva ribifolia Schltdl., Linnaea 11: 351, 1837. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1831–39. Typus: HAL 43664.

Malvaviscus sepium Schltdl., Linnaea 5: 227, 1830. Mexico: in sepibus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 98400.

Manettia ciliata Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 176, 1829. Not at HAL.

Manettia fimbriata Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 173, 1829. Not at HAL.

Manettia glabra Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 169, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98544.

Manettia gracilis Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 169, 1829. Not at HAL.

Manettia pseudodiodia Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 174, 1829. Not at HAL.

Manettia pubescens Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 170, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98545.

Manettia villosa Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 172, 1829. Not at HAL.

Margaranthus solanacea Schltdl., Index Sem. Hort. Hal.: 8, 1838 and Linnaea 13: Litt.-Ber. 99, 1839. Germany: cult. in Horto Botanico Halensi, D.F.L. v. Schlechtendal, 1838. Typus: HAL 33693 [e seminis in Mexico locis calidioribus, coll. C. Ehrenberg].

Mariscus bracteosus Schltdl., Linnaea 25: 164, 1852. Not at HAL.

Mariscus schaffnerianus Schltdl., Linnaea 26: 379, 1854. Not at HAL.

Martynia triloba Schltld. & Cham., Linnaea 5: 121, 1830. Mexico: prope Veracruz, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1828. Typus: HAL 43262.

Melaleuca curvifolia Schltld., Linnaea 20: 654, 1847. Australia: am Lightriver, H. Behr, Feb. 1844/45. Typus: HAL 98163.

Melanthium bergii Schltld., Linnaea 1: 83, 1826. Not at HAL.

Melanthium marginatum Schltld., Linnaea 1: 84, 1826. Not at HAL.

Melastoma anisochitron Schltld., Linnaea 13: 427, 1839. Not at HAL.

Melastoma cornoides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 563, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828 and Apr. 1829. Typus: HAL 65112.

Melastoma glaberrimum Schltld., Linnaea 13: 421, 1839. Mexico: inter Tioselo et Jicochimalco vel in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May/Aug. 1829–36. Typus: HAL 65110 (2 sheets).

Melastoma glaucocarpum Schltld., Linnaea 13: 421, 1839. Not at HAL.

Melastoma globuliflorum Schltld. & Cham., Linnaea 5: 564, 1830. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, 5 Aug. 1828–36. Typus: HAL 65105 (2 sheets).

Melastoma laxiflorum Schltld., Linnaea 13: 426, 1839. Not at HAL.

Melastoma lineatum Schltld., Linnaea 13: 423, 1839. Not at HAL.

Melastoma petiolare Schltld. & Cham., Linnaea 5: 562, 1830. Not at HAL.

Melastoma scorpioides Schltld., Linnaea 5: 564, 1830. Not at HAL.

Melastoma sylvaticum Schltld., Linnaea 13: 422, 1839. Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1828/29. Typus: HAL 65109.

Metastelma suaveolens Schltld., Linnaea 26: 667, 1855. Not at HAL.

Meyenia corymbosa Schltld., Linnaea 8: 252, 1833. Mexico: prope Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 75351.

Meyenia fasciculata Schltld., Linnaea 8: 251, 1833. C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 75356 (2 sheets).

Microtis frutetorum Schltld., Linnaea 20: 568, 1847. Not at HAL.

Millingtonia alba Schltld., Linnaea 16: 395, 1842. Not at HAL.

Mimosa pumila Schltld., Linnaea 12: 557, 1838. Mexico: in solo calcareo ad Reglam occid. versus, C. Ehrenberg, 1836. Holotypus: HAL 64731.

Mimosa racemosa Schltld., Linnaea 12: 557, 1838. Not at HAL.

Mimosa tricephala Schltld. & Cham., Linnaea 5: 591, 1830. Mexico: inter Laguna Verde et Actopan, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Holotypus: HAL 64977.

Misanteca capitata Schltld. & Cham., Linnaea 6: 367, 1831. Mexico: in sylvis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, 1828/29. Typus: HAL 98333.

Mitracarpum humboldtianum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 358, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98320.

Mitracarpum sellowianum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 361, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo et Rio Grande do Sul, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98318.

Mitracarpum torresianum Cham. & Schltld., Linnaea 3: 360, 1828. In Insula Guajan ex insulis Marianis, A. v. Chamisso, Nov. 1817. Typus: HAL 98316.

Mitrospora wagneriana Schltld., Linnaea 26: 129, 1854. Not at HAL.

Monnina angustifolia Schltld., Linnaea 14: 380, 1840. Not at HAL.

- Monnina euonymoides*** Schltdl., Linnaea 14: 380, 1840. Not at HAL.
- Monnina sylvatica*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 231, 1830. Mexico: in sylvis Jalapae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. Typus: HAL 98386.
- Moronobea globulifera*** Schltdl., Linnaea 8: 190, 1833. Not at HAL.
- Moronobea montana*** Schltdl., Linnaea 8: 189, 1833. Not at HAL.
- Myoporum punctulatum*** Schltdl., Linnaea 20: 613, 1847. Not at HAL.
- Myosotis hispida*** Schltdl., Linnaea 31: 338, 1861. Not at HAL.
- Myrcia aromatica*** Schltdl., Linnaea 13: 415, 1839. Not at HAL.
- Myrcia rufidula*** Schltdl., Linnaea 13: 416, 1839. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 89813 (3 sheets).
- Myrsine myricoides*** Schltdl., Linnaea 8: 525, 1833/34. Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 89723 (5 sheets).
- Myrtus capuli*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 561, 1830. [*Eugenia capuli* a *micrantha* Berg]. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 79362.
- Myrtus tabasco*** Willd. ex Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 559, 1830. Not at HAL.
- Myrtus trunciflora*** Schltdl., Linnaea 5: 561, 1830. Mexico: inter Mesachica et Mapilque, Dec. 1828 et Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 89744/1+2 (2 sheets).
- Nasturtium impatiens*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 212, 1830. Mexico: in spelunca regionis subnivalis montis Orizabae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 996.
- Nasturtium orizabae*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 212, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Typus: HAL 11429.
- Nertera alsinoides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 413, 1831. Mexico: Cuesta grande de Jalacingo, reg. temp., C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Typus: HAL 69875.
- Nicolsonia villosa*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 584, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 51032.
- Nicotiana mexicana*** Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal., 1840 and Linnaea 15: Litt.-Ber. 95, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834–40. Typus: HAL 98482.
- Niphogeton andicola*** Schltdl., Linnaea 28: 481, 1856. Peru: Agapata ad limites niv. atern. summ. Cordillier., W. Lechler, Jun. 1854. Typus: HAL 26884.
- Nortenia thouarsii*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 18, 1828. Not at HAL.
- Oenothera cuprea*** Schltdl., Linnaea 12: 269, 1838. Mexico: in prato elatiore montis Orizabae cum Veratro frigido, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 43418.
- Oenothera littoralis*** Schltdl., Linnaea 12: 268, 1838. Mexico: ad litora maris arenosa inter Tecolutam et Nautlam, C.J.W. Schiede (non C. Ehrenberg), Feb. 1829. Typus: HAL 43355.
- Okenia hypogaea*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 92, 1830. Not at HAL.
- Opercularia scabrída*** Schltdl., Linnaea 20: 604, 1847. Australia: an steinigén Orten in Scrubgegenden, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 98342.
- Ophioglossum bergianum*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 10, 1825. Not at HAL.
- Ophioglossum moluccanum*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. Not at HAL.
- Ophioglossum capense*** Schltdl. (a) ***regulare*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. [= *Ophioglossum regulare* (Schltdl.) C. Christ]. Not at HAL.
- Ophioglossum capense*** Schltdl. (b) ***nudicaule*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 9, 1825. South Africa: Cap. bon. sp., Mundt & Maire. Typus: HAL 81860.

- Opismenus gracilis*** Schltld., Linnaea 24: 649, 1851. Not at HAL.
- Orchis latifolia*** (var.) ***beeringeriana*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 26, 1828. Kamtschatka, A. v. Chamisso. Typus: HAL 63527.
- Oreas involucrata*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 30, 1826. Unalaschka Aleutorum, A. v. Chamisso, 1816–17. Lectotypus: HAL 84097.
- Orobanche rossica*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 132, 1828. Not at HAL.
- Oxalis acuminata*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 224, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98149. Mexico: F. Deppe & C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98150.
- Oxalis ehrenbergii*** Schltld. in Otto & Dietr., Allgem. Gartenzeitung 6: 313, 1838. Not at HAL.
- Oxalis herpestica*** Schltld., Linnaea 27: 525, 1855. Not at HAL.
- Palicourea blanchetiana*** Schltld., Linnaea 28: 531, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypi: HAL 98305–98306.
- Palicourea breviflora*** Schltld., Linnaea 28: 530, 1856. Brazil: Bueck. Typus: HAL 98307.
- Palicourea divaricata*** Schltld., Linnaea 28: 529, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1825–56. Typus: HAL 98308.
- Palicourea fastigiata*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 16, 1829. Not at HAL.
- Palicourea nicotianaefolia*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 18, 1829. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98300.
- Palicourea tetraphylla*** Cham. & Schltld., Linnaea 4: 17, 1829. Not at HAL.
- Palicourea velutina*** Schltld., Linnaea 28: 528, 1856. Brazil: Blanchet, no. 3240, J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypus: HAL 98309. Brazil: Blanchet, no. 3768, J.S. Blanchet, 1828–56. Syntypus: HAL 98310.
- Panax macrocarpus*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 404, 1826. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98435.
- Panax vinosus*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 403, 1828. Not at HAL.
- Panicum bipustulatum*** Schltld., Linnaea 26: 135, 1854. Not at HAL.
- Panicum oliganthum*** Schltld., Linnaea 26: 137, 1854. Not at HAL.
- Panicum zenkowskii*** Rupr. ex Schltld., Linnaea 27: 477, 1856. Not at HAL.
- Parnassia kotzebuei*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 549, 1826. Not at HAL.
- Paronychia polycnemoides*** Schltld., Linnaea 13: 407, 1839. Not at HAL.
- Paspalum campestre*** Schltld., Linnaea 26: 131, 1854. Not at HAL.
- Paspalum gracilis*** Schltld., Linnaea 26: 134, 1854. Not at HAL.
- Paspalum savannarum*** Schltld., Linnaea 26: 132, 1854. Not at HAL.
- Paspalum wagneriana*** Schltld., Linnaea 26: 133, 1854. Not at HAL.
- Paspalum lividum*** Trin. ex Schltld., Linnaea 26: 383, 1852. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 4839.
- Passiflora acerifolia*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 89, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 47803.
- Passiflora sexocellata*** Schltld., Linnaea 27: 521, 1856. Not at HAL.
- Passiflora sicyoides*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 88, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47795 (2 sheets).
- Paullinia clavigera*** Schltld., Linnaea 10: 239, 1836. Not at HAL.
- Paullinia costata*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 216, 1830. Not at HAL.
- Pavonia lanceolata*** Schltld., Linnaea 11: 356, 1837. Mexico: Cuesta grande de

- Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98401.
- Pavonia rosea*** Schltdl., Linnaea 11: 355, 1837. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98606 (2 sheets).
- Pedicularis orizabae*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 103, 1830. Mexico: in monte Orizaba, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 56871.
- Pedilanthus calcaratus*** Schltdl., Linnaea 19: 255, 1846. Not at HAL.
- Pedilanthus cymbiferus*** Schltdl., Linnaea 19: 253, 1847. Mexico: tropisches Mexico, F.E. Leibold, 1839. Typus: HAL 81732.
- Pentataphrus behrii*** Schltdl., Linnaea 20: 618, 1847. Australia: an sandigen und steinigen Orten, H. Behr, Aug. 1845. Typus: HAL 60107.
- Peperomia asarifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 75, 1830. Mexico: ad rupes humidias, C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98182.
- Peperomia dendrophila*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 74, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 98179. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98180. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 98181.
- Peperomia deppeana*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 75, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98183.
- Perilomia cordifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 374, 1831. Mexico: in sylvis umbrosis Misantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Mar. 1828/29. Typus: HAL 98256.
- Perilomia fruticosa*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 102, 1830. Mexico: Jalapae in dumetis, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828/29. Typus: HAL 98257.
- Persea amplexicaulis*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 90, 1830. Mexico: Serro colorado. Typus: HAL 98198.
- Persea drymifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 365, 1831. Mexico: Papantla, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 97802.
- Peucedanum virgatum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 392, 1826. South Africa: in Promontorii bonae spei montibus Tradouw, Mundt & Maire, 1815-31. Typus: HAL 97781 (2 sheets).
- Phaseolus anisotrichus*** Schltdl., Linnaea 12: 326, 1838. Mexico: ad Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 55313. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus: HAL 55314. Mexico: prope Papantlam, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Syntypus: HAL 55315.
- Phaseolus glaber*** Schltdl., Linnaea 12: 327, 1838. Mexico: in dumetis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 54633. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 54634.
- Phaseolus obvallatus*** Schltdl., Linnaea 12: 328, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1831-39. Lectotypus: HAL 55316.
- Phaseolus parviflorus*** Schltdl., Linnaea 12: 325, 1838. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, 1834-36. Typus: HAL 64946.
- Phaseolus schiedeanus*** Schltdl., Linnaea 12: 323, 1838. Mexico: in graminosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Syntypus: HAL 64947 (2 sheets). Mexico: in versuris prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 64948.
- Philadelphus affinis*** Schltdl., Linnaea 13: 419, 1839. Mexico: Barranca de la Haci-

- enda del Carmen, C. Ehrenberg, Aug. 1837. Typus: HAL 98151.
- Philadelphus mexicanus*** Schltdl., Linnaea 13: 418, 1839. Mexico: colitur Jalapae et in sepibus sponte quasi crescit, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 98628 (2 sheets).
- Physalis glutinosa*** Schltdl., Linnaea 19: 310, 1846. Mexico: distr. Mineral del Monte, Cuesta blanca. In humosa terra inter rupes porphyriticas ferratas, C. Ehrenberg, Jul. 1836. Typus: HAL 42219 (2 sheets).
- Physalis maurelloides*** Schltdl., Linnaea 27: 508, 1856. Not at HAL.
- Physalis nicandroides*** Schltdl., Linnaea 19: 311, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 42228. Mexico: pr. Reglam, C. Ehrenberg, Sept. 1835. Syntypus: HAL 42229.
- Physalis viscosa* (b) *sinuato-dentata*** Schltdl., Linnaea 19: 309, 1846. Mexico: C. Ehrenberg. Typus: HAL 42235.
- Pilea peplidifolia*** Schltdl., Linnaea 27: 496, 1856. '*Pilea muscosa* hort., ex patre', 1832. Syntypus: HAL 98190. Brazil: Mart., Herb. Fl. Bras. 952. Syntypus: HAL 98189. Mexico: Papantla et prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. Syntypus: HAL 98188.
- Pimelea behrii*** Schltdl., Linnaea 20: 583, 1847. Australia: zwischen dem Gawler- und Lightriver, H. Behr, Dec. 1844. Typus: HAL 39386.
- Pimelea dichotoma*** Schltdl., Linnaea 20: 581, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (sandplains), bei Benthaniën, H. Behr, Nov. 1844. Typus: HAL 36762.
- Pimelea myrtifolia*** Schltdl., Linnaea 20: 582, 1847. Australia: an sandigen Orten, H. Behr, 1844/45. Typus: HAL 39383.
- Pimelea preisii*** Schltdl., Linnaea 20: 581, 1847, nom. illeg [= *P. schlechtendaliana* Meisner]. Australia: auf Sandboden, H. Behr, Oct./Nov. 1844. Typus: HAL 39385.
- Pimelea viminea*** Schltdl., Linnaea 20: 583, 1847. Australia: auf kalkig-sandigem Boden (sandplains), bei Benthaniën, H. Behr, Jan. 1845. Typus: HAL 39384.
- Pinguicula caudata*** Schltdl., Linnaea 7: 393, 1832. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 73476.
- Pinguicula lilacina*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 94, 1830. Mexico: in umbrosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 42200.
- Pinus ayacahuite*** C. Ehrenberg ex Schltdl., Linnaea 12: 492, 1838. Not at HAL.
- Pinus leiophylla*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: inter Cruz blanca et Jalacingo, reg. frig., C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 64903.
- Pinus patula*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: inter Cruz blanca et Jalacingo et Halpays de la Joya, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1828. Lectotypus: HAL 33087 (1/4). Isolectotypi: HAL 33087 (2/4-4/4).
- Pinus teocote*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 76, 1830. Mexico: ad radices et in adscensu montis Orizabae, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Typus: HAL 64906.
- Piper dendrophila*** Schltdl., Linnaea 7: 138, 1832. Not at HAL.
- Piper melastomoides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 74, 1830. Mexico: in sylvis umbrosis prope Jalapam, Aug. 1828. Syntypus: HAL 97797 (2 sheets). Mexico: Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 97798 (2 sheets).
- Piper schiedeana*** Schltdl., Linnaea 7: 138, 1832. Not at HAL.
- Piper tiliaefolium*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 352, 1831. Mexico: in sylvis Misantlae, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 97796 (3 sheets).

- Pitcairnia kegeliana* Schltdl., Linnaea 24: 664, 1851. Not at HAL.
- Plantago camtschatica* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 165, 1826. Not at HAL.
- Plantago caricea* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 171, 1826. Not at HAL.
- Plantago macrocarpa* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 166, 1826. Not at HAL.
- Plantago princeps* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 167, 1826. Not at HAL.
- Plantago truncata* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 170, 1826. Not at HAL.
- Plantago tumida* Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 168, 1826. Not at HAL.
- Plumeria xanthostoma* Schltdl., Linnaea 8: 523, 1834. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 83850.
- Poa nemoralis* (var.) *depauperata* Schltdl., Linnaea 24: 651, 1851. Not at HAL.
- Polycarpaea cuspidata* Schltdl., Linnaea 13: 408, 1839. Not at HAL.
- Polygala pulchella* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 230, 1830. Not at HAL.
- Polygala strigulosa* Schltdl., Linnaea 14: 160, 1840. Not at HAL.
- Polygonum adenophyllum* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 48, 1828. South Africa: Cape, Mundt & Maire, 1815–31. Typus: HAL 98304.
- Polygonum aviculare* (var.) *montevidense* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 50, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in littore prope Montevideo, F. Sellow, 1814–20. Typus: HAL 53997.
- Polygonum diospyrifolium* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 47, 1828. Brazil: in Brasiliae tropicae, provincia Rio de Janeiro in palustribus prope Novum Friburgicum, H.K. Beyrich, Jan. 1822/23. Typus: HAL 98321.
- Polygonum meisnerianum* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 40, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53995.
- Polygonum paronychia* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 51, 1828. USA: California, San Francisco, A. v. Chamisso, 1816. Typus: HAL 98322.
- Polygonum stypticum* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 53, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, in arenosis humidusculis ad fluvium Rio Negro, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53996.
- Polygonum virgatum* Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 45, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–28. Typus: HAL 53998.
- Polypodium bergianum* Schltdl., Adumbr. pl. 1: 20, 1825. Not at HAL.
- Polypodium fallax* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 609, 1830. Mexico: in truncis arborum Misantlae, regionis subcalidae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Feb. 1829. Typus: HAL 81858.
- Polypodium fraternum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 608, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81855 (2 sheets).
- Polypodium furfuraceum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: ad truncos arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81856 (2 sheets).
- Polypodium plebejum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: in truncis arborum prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 81853 (2 sheets).
- Polypodium puperulum* Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 607, 1830. Mexico: C.J.W. Schiede & F. Deppe, 1828. Typus: HAL 81852.
- Potamogeton americanus* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 226, 1827. Not at HAL.
- Potamogeton denticulatus* Mohl ex Schltdl., Bot. Zeitung 14: 783, 1856. Not at HAL.

- Potamogeton gaudichaudii* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 197, 1827. Not at HAL.
Potamogeton intermedius Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 221, 1827. Not at HAL.
Potamogeton mascarensis Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 228, 1827. Not at HAL.
Potamogeton nuttallii Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 226, 1827. Not at HAL.
Potamogeton owaihiensis Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 228, 1827. Not at HAL.
Potamogeton occidentalis Sieber ex Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 224, 1827. Martini-
que: Sieber, Fl. martin. 275, Sieber. Isolectotypus: HAL 63363
Potamogeton pensylvanicus Willd. ex Schltdl., Linnaea 2: 227, 1827. Not at HAL.
Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 184, 1827. Brazil: Brasilia
aequinotialis, F. Sellow, 1814–28. Isolectotypus: HAL 63528.
Potamogeton proteus Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 197, 1827, nom. superfl.
Potamogeton syriacus Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 227, 1827. Not at HAL.
Potamogeton thunbergii Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 221, 1827. South Africa: Prom.
b. spei, Hartebeestkraal prope Brackri, Mundt & Maire. Lectotypus: HAL 63539.
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 175, 1827. Not at HAL.
Potentilla ehrenbergiana Schltdl., Linnaea 13: 261, 1839. Mexico: Mineral del Monte,
Huajalote, C. Ehrenberg, 1831–40. Typus: HAL 98624 (2 sheets).
Potentilla elegans Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 22, 1827. Ex plantis Redowskianis
Kamtschaticis, A. v. Chamisso, 7 Aug. 1816/17. Typus: HAL 98246.
Potentilla fusca Schltdl., Linnaea 13: 262, 1839. Mexico: in pratis alpestribus Cumbre
de las papas, C.J.W. Schiede, Jun. 1831. Typus: HAL 98159.
Potentilla hiemalis Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 572, 1830. Mexico: Cruz blanca,
C.J.W. Schiede & F. Deppe. Typus: HAL 98148.
Potentilla nivea (var.) *lapponica* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 21, 1827. Not at HAL.
Potentilla nivea (var.) *vulgaris* Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 21, 1827. Not at HAL.
Pothos podophyllus Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 22, 1831. Mexico: in sylvis umbrosis
prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1829. Holotypus:
HAL 79368 (2 sheets).
Prostanthera behriana Schltdl., Linnaea 20: 610, 1847. Australia: im felsigen
Querthale der Tonunda, H. Behr, Nov. Holotypus: HAL 29918.
Prunus laurifolius Schltdl., Linnaea 13: 91 et 404, 1839. Mexico: Cuesta grande de
Chiconquiaco, regionis temperatae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 60495.
Mexico: sine loc., C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 60494 (3 sheets).
Prunus samydoides Schltdl., Linnaea 13: 92 et 404, 1839. Mexico: Cerrania de
Zoncoantla, confinio Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 60496
(2 sheets). Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus:
HAL 60497 (2 sheets).
Psoralea australasica Schltdl., Linnaea 20: 668, 1847. Australia: überall bei Bethanien,
meist am Wasser, H. Behr, Dec. Holotypus: HAL 42501.
Psychotria ciliolata Schltdl., Linnaea 28: 519, 1856. Brazil: G.W. Freyreiss & F.
Sellow, 1815–18. Typus: HAL 76160.
Psychotria costato-venosa Schltdl., Linnaea 28: 497, 1856. Not at HAL.
Psychotria cujabensis Schltdl., Linnaea 28: 507, 1856. Brazil: Prov. Matto-Grosso
prope Cujaba, J. Lhotsky, 1830–32. Typus: HAL 75848.
Psychotria cuspidata (var.) *freireisiana* Schltdl., Linnaea 28: 507, 1854. Brazil: G.W.

- Freyreiss & F. Sellow, 1815–18. Typus: HAL 76144.
- Psychotria grandiflora*** Schltdl., Linnaea 9: 595, 1835. Mexico: Jalapa prope la Laguna, C.J.W. Schiede, May/Aug. 1829. Typus: HAL 76151.
- Psychotria formosa*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 24, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75289.
- Psychotria jambosoides*** Schltdl., Linnaea 28: 518, 1856. Brazil: G.W. Freyreiss & F. Sellow, 1815–18. Typus: HAL 75854.
- Psychotria justicioides*** Schltdl., Linnaea 9: 596, 1835. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 75852.
- Psychotria leiocarpa*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 23, 1829. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76155.
- Psychotria lhotzkyana*** Schltdl., Linnaea 28: 505, 1856. Brazil: in sylva Crocovado, H.K. Beyrich, 1830–32. Typus: HAL 76130.
- Psychotria neurotricha*** Schltdl., Linnaea 28: 520, 1856. E.F. Poeppig, no. 1353. Typus: HAL 75851.
- Psychotria nitidula*** Schltdl., Linnaea 4: 25, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 75853.
- Psychotria nonatelioides*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 26, 1829. Not at HAL.
- Psychotria philippensis*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 21, 1829. Not at HAL.
- Psychotria pubigera*** Schltdl., Linnaea 28: 514, 1856. Not at HAL.
- Psychotria syringaefflora*** Schltdl., Linnaea 28: 516, 1856. Brazil: J.S. Blanchet, 1828–56. Typus: HAL 75850.
- Psychotria urophylla*** Schltdl., Linnaea 28: 522, 1856. E.F. Poeppig, no. 1578. Typus: HAL 75849.
- Pteris pulchra*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 614, 1830. Mexico: inter Misantlam et Colipam, regionis subcalidae, C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 81851 (3 sheets).
- Ptilotus erubescens*** Schltdl., Linnaea 20: 575, 1847. Australia: auf trockenen Hügeln bei Gawlerstown, H. Behr, Oct. 1844/45. Typus: HAL 98187.
- Pyrus sambucifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 36, 1827. Russia: Kamtschatka ad portum St. Petri et Pauli (Expedition Lüttk.). Typus: HAL 98162.
- Quercus calophylla*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5, 1830. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 60349.
- Quercus germana*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 78, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Holotypus: HAL 60343.
- Quercus leucifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5, 1830. Not at HAL.
- Quercus oleoides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 79, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Holotypus: HAL 60354.
- Quercus polymorpha*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 78, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Holotypus: HAL 60344.
- Ranunculus aquatilis*** var. ***capillaceus*** Schltdl., in DC., Prodr. 1: 26, 1824. USA, Alaska, Unalaschka, 1817, A. v. Chamisso. Typus: HAL 98417.
- Ranunculus cicutarius*** Schltdl., Animad. Ran. 1: 25, 1814. Not at HAL.
- Ranunculus eschscholzii*** Schltdl., Animad. Ran. 2: 16, 1820. Not at HAL.
- Ranunculus chamissonis*** Schltdl., Animad. Ran. 1: 12, 1819. In sinu St. Laurentii, A. v. Chamisso. Typus: HAL 63558.
- Ranunculus halophilus*** Schltdl., Animad. Ran. 1: 23, 1819. Russia: Siberia, Pallas.

Typus: HAL 63559.

Ranunculus hookeri Schltld., Linnaea 5: 210, 425. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 63556.

Ranunculus hornemanni Schltld., Animad. Ran. 2: 36, 1820. Not at HAL.

Ranunculus lechleri Schltld., Linnaea 27: 557, 1856. Not at HAL.

Ranunculus litoralis Schltld., in Lechl., Berberid. Amer. austral.: 54, 1857 (nom. illeg.).

Chile: Valdivia, W. Lechler, Pl. chil. Ed. R.F. Hohenacker. Syntypus: HAL 63575.

Ranunculus llaveanus Schltld., Linnaea 10: 233, 1835/36. Not at HAL.

Ranunculus pallasii Schltld., Animad. Ran. 1: 15, 1819. In sinu Eschscholzii et insula St. Georgii, A. v. Chamisso. Holotypus: HAL 63560.

Ranunculus pedatifidus Schltld., Animad. Ran. 2: 18, 1820. In sinu St. Laurentii, A. v.

Chamisso. Lectotypus: HAL 61971, nom. illeg., homonym of *R. pedatifidus* Sm. 1815.

Redowskia sophiaefolia Cham. & Schltld., Linnaea 1: 33, 1826. Russia: Asia boreali orientali, Kamtschatka, Redowskii, 1816. Syntypus: HAL 84106.

Rhamnus capreaefolia Schltld., Linnaea 15: 464, 1841. Mexico: in saxosis Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Lectotypus: HAL 21748 (2 sheets). Mexico: in sylvis Jalapensibus, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 21523 (2 sheets).

Rhamnus mucronata Schltld., Linnaea 15: 465, 1841. Mexico: prope Anganguess, reg. frig. (Michoacan, Anganguess, 30 km N of Zitácuaro), C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Lectotypus: HAL 21798 (4 sheets). Mexico: prope Chantla, reg. frig., C.J.W. Schiede, Nov. 1835. Syntypus: HAL 21797 (2 sheets).

Rhexia deppeana Schltld. & Cham., Linnaea 5: 566, 1830. Not at HAL.

Rhexia floribunda Schltld., Linnaea 13: 43, 1839. Not at HAL.

Rhexia grandifolia Schltld., Linnaea 13: 429, 1839. Not at HAL.

Rhexia inaequilateralis Schltld. & Cham., Linnaea 5: 567, 1830. Not at HAL.

Rhexia parvifolia Schltld., Linnaea 13: 428, 1839. Not at HAL.

Rhexia rufipilis Schltld., Linnaea 13: 430, 1830 [= ***Rhexia schiedeana*** (var.) ***macrantha*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 566, 1830]. Not at HAL.

Rhexia scabriuscula Schltld., Linnaea 13: 43, 1839. Not at HAL.

Rhexia schiedeana Schltld. & Cham., Linnaea 5: 565, 1830. Not at HAL.

Rhus crenatifolia Schltld., Linnaea 16: 483, 1842. Not at HAL.

Rhus schiedeana Schltld., Linnaea 16: 480, 1842. Not at HAL.

Rhus schmidelioides Schltld., Linnaea 16: 482, 1842. Not at HAL.

Rhus terebinthifolia Schltld. & Cham., Linnaea 5: 600, 1830. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jan. 1829. Typus: HAL 79259.

Rhynchospora adulta Schltld., Bot. Zeitung 7: 166, 1849. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Holotypus: HAL 79376 (2 sheets).

Rhynchosia erythrinoides Schltld. & Cham., Linnaea 5: 587, 1830. Mexico: inter Misantlam et Nantlam in sylvis, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98589 (2 sheets).

Rhynchosia grandiflora Schltld. & Cham., Linnaea 5: 588, 1830. Mexico: in apricis prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98590 (2 sheets).

Rhynchospora laevis Schltld., Linnaea 25: 166, 1852. Not at HAL.

Richardsonia grandiflora Cham. & Schltld., Linnaea 3: 351, 1828. Brazil: Brasilia

meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98298.

Richardsonia humistrata Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 353, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, prov. Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98299.

Richardsonia stellaris Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 352, 1828. Not at HAL.

Robinia acuminata Schltdl., Linnaea 12: 306, 1838. Mexico: prope Mapilque, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 47637 (2 sheets).

Robinia ehrenbergii Schltdl., Linnaea 12: 303, 1838. Mexico: nördlich der heißen Bäder bei Grande, Kalkboden, C. Ehrenberg, Jul. 1831–39. Typus: HAL 71864 (2 sheets).

Robinia melanocarpa Schltdl., Linnaea 12: 305, 1838. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 71866.

Robinia schiedeana Schltdl., Linnaea 12: 306, 1838. Mexico: inter Vera-Cruz et Santa Fe, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Typus: HAL 27985.

Rollinia emarginata Schltdl., Linnaea 9: 318, 1834. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Isolectotypus: HAL 76440.

Rollinia laurifolia Schltdl., Linnaea 9: 319, 1834. Not at HAL.

Rollinia rugulosa Schltdl., Linnaea 9: 316, 1834. Not at HAL.

Rollinia salicifolia Schltdl., Linnaea 9: 317, 1834. Brazil: in Brasilia australiori, F. Sellow, 1814–31. Lectotypus: HAL 76442. Isolectotypus: HAL 76443.

Rotala mexicana Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 567, 1830. Mexico: in aquis fluentibus prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Oct. 1828. Typus: HAL 98154.

Rubia ephedroides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 231, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 46683.

Rubia equisetoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 232, 1828. Not at HAL.

Rubia indecora Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 229, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctialis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98344.

Rubia relbun Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 229, 1828. Not at HAL.

Rubia valantoides Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 231, 1828. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98345.

Rubia vilis Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 230, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98350.

Rubus adenotrichos Schltdl., Linnaea 13: 267, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 60490 (3 sheets).

Rubus dumetorum Schltdl., Linnaea 13: 267, 1839, nom. illeg. (≡ ***Rubus schiedeanus*** Steud. 1841). Mexico: in dumetis Jalapae, May 1829, C.J.W. Schiede. Holotypus: HAL 60485

Rubus fagifolius Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 571, 1830. Mexico: in dumetis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 60479 (3 sheets).

Rubus fastigiatus (var.) ***bergii*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 16, 1827. Not at HAL.

Rubus humifusus Schltdl., Linnaea 13: 270, 1839, nom. illeg. [≡ ***Rubus humistratus*** Steud. 1841]. Mexico: prope San Miguel, Jun. 1829, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 60488. Mexico: in dumetis pricis et graminosis Jalapae, May 1829, C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 60489 (2 sheets).

Rubus imperialis Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 13, 1827. Not at HAL.

Rubus mundtii Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 18, 1827. South Africa: Prom. bon. spei: prope Hanglip, Mundt & Maire, Jul. 1815–31. Typus: HAL 98161.

Rubus occidentalis (b) ***incisus*** Schltld., Linnaea 13: 271, 1828. Mexico: prope Lerma, C.J.W. Schiede, Sept. 1830. Typus: HAL 60484.

Rubus sapidus Schltld., Linnaea 13: 269, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae frequens, C.J.W. Schiede, May 1829. Syntypus: HAL 60482 (2 sheets). Mexico: prope Reglam, C. Ehrenberg, 1835. Syntypus: HAL 60483.

Rubus sapidus Schltld. (f.) ***abnormis*** Schltld., Linnaea 13: 269, 1839. Mexico: in dumetis Jalapae quam inter Jalapam et del Molino de Pedreguera, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 60481.

Rubus sellowii Cham. & Schltld., Linnaea 2: 15, 1827. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98247.

Rubus tagallus Cham. & Schltld., Linnaea 2: 9, 1827. Not at HAL.

Rubus trichomallus Schltld., Linnaea 19: 268, 1846. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 60486 (2 sheets).

Rubus ursinus Cham. & Schltld., Linnaea 2: 11, 1827. Not at HAL.

Rubus vitifolius Cham. & Schltld., Linnaea 2: 10, 1827. Not at HAL.

Ruehssia purpurea Schltld., Linnaea 26: 669, 1855. Not at HAL.

Ruellia jussieuoides Schltld. & Cham., Linnaea 6: 370, 1831. Mexico: ad ripas fluminis Misantlensis prope Misantlam, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98540.

Ruellia lacustris Schltld. & Cham., Linnaea 5: 96, 1830. Mexico: in Laguna de Jalapa, Sep. 1828. Typus: HAL 97785.

Ruellia rivularis Schltld., Linnaea 7: 396, 1832. Not at HAL.

Russelia alata Cham. & Schltld., Linnaea 3: 3, 1828. Brazil: in Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 71747.

Russelia equisetiformis Schltld. & Cham., Linnaea 6: 377, 1831. Mexico: in apricioribus Papantlae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 97776 (2 sheets).

Russelia syringiaefolia Schltld. & Cham., Linnaea 6: 376, 1831. Mexico: Papantla, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 97775.

Sabbatia australis Cham. & Schltld., Linnaea 1: 194, 1826. Brazil: prov. Cisplantina (Montevideo), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 76411.

Sabicea grisea Cham. & Schltld., Linnaea 4: 192, 1829. Not at HAL.

Sagittaria chilensis Cham. & Schltld., Linnaea 2: 155, 1827. In reg. Chilensi. Typus: HAL 63585.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltld., Linnaea 2: 156, 1827. Brazil: in Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 63582.

Salix microphylla Schltld. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Mexico: ad ripam arenosam fluminis Tecolutensis prope San Pablo, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Lectotypus: HAL 69741 (2 sheets).

Salvia affinis Schltld. & Cham., Linnaea 5: 99, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 98245.

Sambucus australis Cham. & Schltld., Linnaea 3: 140, 1828. Not at HAL.

Sambucus bipinnatus Schltld. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Mexico: in sepibus Jalapae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Topotypus: HAL 98549. Mexico: in sepibus Jalapae, C. de Hoffmannsegg, May 1829. Topotypus: HAL 98550.

Sanicula liberta Cham. & Schltld., Linnaea 1: 353, 1826. Not at HAL.

- Saponaria dioica** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 38, 1826. Not at HAL.
- Saurauja kegeliana** Schltdl., Bot. Zeitung 11: 694, 1853. Not at HAL.
- Saurauja leucocarpa** Schltdl., Linnaea 10: 249, 1836. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1829. Typus: HAL 22008 (4 sheets).
- Schweiggera mexicana** Schltdl., Linnaea 12: 204, 1838. Not at HAL.
- Scleria brekiana** Schltdl., Bot. Zeitung 3: 491, 1845. Not at HAL.
- Scleria bulbosa** Schltdl., Bot. Zeitung 3: 495, 1845. Schimper iter Abyssinicum 327. 3 Oct. 1837. Typus: HAL 82174, nom. illeg.
- Scleria melaleuca** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 29, 1831. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 79367 B (2 sheets). Suriname: Weigelt, 1827. Syntypus: HAL 79367 A.
- Scleria melicoides** Schltdl., Linnaea 26: 127, 1854. Not at HAL.
- Scleria palmifolia** Hoffmegg. ex Schltdl., Bot. Zeitung 3: 492, 1845. Brazil: C. de Hoffmansegg. Typus: HAL 82169.
- Scleria praealta** Salzm. ex Schltdl., Bot. Zeitung 3: 461, 1845. Brazil: Bahia, P. Salzmann, 1827–1830. Typus: HAL 82044.
- Scleria scabriuscula** Schltdl., Linnaea 20: 544, 1847. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 64838.
- Scleria schiedeana** Schltdl., Bot. Zeitung 3: 489, 1845. Mexico: Barranca de Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 64837.
- Scoparia annua** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 375, 1831. Not at HAL.
- Scoparia ericacea** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 604, 1827. Not at HAL.
- Scoparia flava** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 603, 1827. Not at HAL.
- Scoparia plebeja** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 605, 1827. Not at HAL.
- Scutellaria dumetorum** Schltdl., Linnaea 7: 400, 1832. Mexico: in dumetis inter San Miguel del Soldado et la Joya, Jun. 1829. Typus: HAL 98355.
- Sebaea capitata** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 193, 1826. Not at HAL.
- Sebaea crassulaefolia** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 193, 1826. Not at HAL.
- Sebaea sulphurea** Schltdl., Linnaea 1: 192, 1826. Not at HAL.
- Securidaca sylvestris** Schltdl., Linnaea 14: 381, 1840. Not at HAL.
- Sedum stephani** Schltdl., Linnaea 6: 549, 1831. Kamtschatka, P.S. Pallas. Typus: HAL 98636 [ex herb. Willdenow].
- Selliera herpystica** Schltdl., Linnaea 20: 598, 1847. Australia: auf torfigem im Winter überschwemmten Boden an dem Gawlerriver bei Bethanien, H. Behr, Feb. 1844/45. Typus: HAL 98334.
- Serjania cambessedeanae** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 214, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. Typus: HAL 98602 (2 sheets).
- Serjania cardiospermoides** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 418, 1831. Mexico: Papantla, C.J.W. Schiede, Dec. 1828. Typus: HAL 61457 (2 sheets).
- Serjania monogyna** Hoffmegg. ex Schltdl., Linnaea 18: 39, 1844. Brazil: Parà, F.W. Sieber pro C. de Hoffmannsegg, 1801–07. Typus: HAL 90517. Notes: p. 39 in Linnaea 18 is wrongly printed as p. “55”.
- Serjania moritziana** Schltdl., Linnaea 18: 44, 1844. Columbia, K. Moritz, 1835–37, 1840–66. Typus: HAL 92764. Notes: p. 44 in Linnaea 18 is wrongly printed as p. “60”.
- Serjania regnellii** Schltdl., Linnaea 18: 57, 1844. Brazil: Prov. Minas Geraes, A.F.

- Regnell, 1841–74. Holotypus: HAL 64975.
- Setaria dasyura*** Schltldl., Linnaea 26: 463, 1855. Not at HAL.
- Sicydium schiedeanum*** Schltldl., Linnaea 7: 388, 1832. Not at HAL.
- Sida acuminata*** (var.) ***macrophylla*** Schltldl., Linnaea 3: 268, 1828. Insula St. Thomas, C. Ehrenberg, 1827–1828. Typus: HAL 36723.
- Sida collina*** Schltldl., Linnaea 11: 364, 1837. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 36722. Mexico: Hacienda de la Laguna, in collibus apricis, C.J.W. Schiede, Sept. 1828. Syntypus: HAL 36721.
- Sida costata*** Schltldl., Linnaea 11: 365, 1837. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 34056 (2 sheets).
- Sida tristis*** Schltldl., Linnaea 3: 271, 1828. Not at HAL.
- Sida venusta*** Schltldl., Linnaea 11: 365, 1837. Mexico: ad Tlalpujahua, Keerl. Holotypus: HAL 37332.
- Sieversia rotundifolia*** Schltldl. & Cham., Linnaea 2: 4, 1827. Not at HAL.
- Sisyrinchium scabrum*** Schltldl. & Cham., Linnaea 6: 57, 1831. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 55575.
- Smilax acutifolia*** Schltldl., Linnaea 18: 449, 1845. Mexico: prope el Banco, C. Ehrenberg, Jan. 1839. Syntypus: HAL 71861 (2 sheets). Mexico: prope Anganguenco, reg. frig., C.J.W. Schiede, Nov. 1829. Syntypus: HAL 71906.
- Smilax discolor*** Schltldl., Linnaea 18: 454, 1845. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, May 1829. Typus: HAL 71860 (2 sheets).
- Smilax glaucocarpus*** Schltldl., Linnaea 18: 450, 1845. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, May. Syntypus: HAL 63540. Mexico: in tierra fria ad Hacienda del Carmen, C. Ehrenberg, Aug. Syntypus: HAL 63541.
- Smilax medica*** Schltldl. & Cham., Linnaea 6: 47, 1831. Mexico: in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Holotypus: HAL 79372 (2 sheets).
- Smilax jalapensis*** Schltldl., Linnaea 18: 451, 1845. Mexico: in dumetis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Synypi: HAL 71862 (2 sheets), 71909 and three additional sheets without number.
- Smilax platycentron*** Schltldl., Linnaea 18: 452, 1845. Mexico: in dumetis sylvisque Jalapae, C.J.W. Schiede, May/Jun. 1829. Typus: HAL 79369 (2 sheets).
- Smilax platycentron*** Schltldl. (a) ***emarginata*** Schltldl., Linnaea 18: 452, 1845. Mexico: Puente de Dios, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 79370 (2 sheets).
- Smilax platycentron*** Schltldl. (b) ***hastata*** Schltldl., Linnaea 18: 452, 1845. Mexico: Puente de Dios, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 79371 (2 sheets).
- Solanum aligerum*** Schltldl., Linnaea 19: 301, 1846. Not at HAL.
- Solanum chrysotrichum*** Schltldl., Linnaea 19: 304, 1846. Not at HAL.
- Solanum diversifolium*** Schltldl., Linnaea 19: 297, 1846. Not at HAL.
- Solanum geminiflorum*** Schltldl. & Cham., Linnaea 5: 112, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam, Aug. Typus: HAL 95992 [as ***geminifolium***, corr. Schltldl., Linnaea 8: 255, 1833].
- Solanum hydrophilum*** Schltldl., Linnaea 8: 254, 1833. Not at HAL.
- Solanum maglia*** Schltldl., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.
- Solanum nigrum*** Schltldl., Linnaea 19: 286, 1846. Not at HAL.
- Solanum nilagiricum*** Schltldl., Linnaea 26: 484, 1855. Not at HAL.
- Solanum pedunculare*** Schltldl., Linnaea 19: 305, 1846. Not at HAL.

Solanum renggeri Schltdl., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.

Solanum schiedeanum Schltdl., Linnaea 19: 295, 1847. Mexico: in Monte Mascultepec pr. Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1823–33. Typus: HAL 95.

Solanum sideroxyloides Schltdl., Linnaea 8: 253, 1833. Not at HAL.

Solanum somniculentum Kze. ex Schltdl., Linnaea 19: 306, 1846. Mexico: prope Zimapan, C.J.W. Schiede, Jun. 1823–33. Typus: HAL 70816.

Solanum stephanodes Schltdl., Linnaea 19: 291, 1846. Not at HAL.

Solanum stoloniferum Schltdl. & Buché, Verh. Vereins Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 9: 317, 1833. Mexico: montis Orizabae; Laguna de Huetulaca, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Isolectotypus: HAL 7698.

Solanum triferum Schltdl., Hort. Hal. 1: 6, 1841. Not at HAL.

Solanum vellereum Schltdl., Linnaea 19: 302, 1846. Not at HAL.

Solanum verrucosum Schltdl., Index Sem. Hort. Hal.: 10, 1839 and Hort. Hal. 1: 3, 1841. Mexico: ad vias in muris, per sylvas pr. Mineral Real del Monte frequ., C. Ehrenberg, Jul.–Sept. vel cult. in Hort. Bot. Hal. Lectotypus: HAL 70736.

Sonchus capensis Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 7, 1850 and Ann. Sci. Nat. Bot. 14: 342, 1850; Linnaea 24: 211, 1851. Not at HAL.

Sonchus hypochaeroides Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal. 7, 1850 and Ann. Sci. Nat. Bot. 14: 343, 1850; Linnaea 24: 212, 1851. Not at HAL.

Spermacoce riparia Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 355, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, ad ripam fluvii Rio Negro (Rincon de Gallinas), F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98360.

Sphaerotheca scoparioides Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 606, 1827. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98474.

Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 203, 1826. Not at HAL.

Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 203, 1826. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69905.

Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 200, 1826. Brazil: Montevideo, F. Sellow, 1814–31. Syntypus: HAL 69878.

Spigelia laurina Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 204, 1826. Not at HAL.

Spigelia olfersiana Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 206, 1826. Not at HAL.

Spigelia scabra Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 202, 1826. Brazil: in provincia Cisplatina, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69906.

Spigelia sellowiana Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 205, 1826. Brazil: crescit in regionibus interioribus, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 69907.

Stachys agraria Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 100, 1830. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47321.

Stachys boraginoides Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 100, 1830. Mexico: in umbrosis monte Macultepec et versus San Andres, fl. Jalapensis, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 47315.

Stachys schiedeanae Schltdl., Linnaea 7: 398, 1832. Mexico: prope San Miguel del Soldado et la Joya, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 47317.

Stackhousia gunniana Schltdl. in Schuch., Linnaea 26: 18, 1854. [*Stackhousia gunii* Schltdl. non Hook f. 1844]. Australia: auf dem Graslande, H. Behr, Sept. 1845/46. Holotypus: HAL 49070.

- Staelia thymoides*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 364, 1828. Brazil: Basilia meridionalis, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98315.
- Stellaria crispa*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 51, 1826. Ex Insula Unalaschka, A. v. Chamisso, 1817. Typus: HAL 98409.
- Stellaria marginata*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 50, 1826. Ad sinum Schischmareff (an ad sinum St. Laurentii), A. v. Chamisso, 31 Jul. 1816. Typus: HAL 98408.
- Stemodia ehrenbergiana*** Schltld., Ind. Sem. Hort. Hal. 1: 169, 1842. Not at HAL.
- Stemodia hypptoides*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 8, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, 1815–28. Typus: HAL 60225.
- Stemodia philippensis*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 5, 1828. Not at HAL.
- Stemodia stricta*** Cham. & Schltld., Linnaea 3: 10, 1828. Not at HAL.
- Stevia conferta*** (b) ***puberula*** (forma) ***capitata*** Schltld., Hort. Hal. 2: 16, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept. ad Nov. Lectotypus: HAL 32736.
- Stevia conferta*** (b) ***puberula*** (forma) ***corymbosa*** Schltld., Hort. Hal. 2: 16, 1841. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept. ad Nov. Lectotypus: HAL 32734.
- Stevia conferta*** (b) ***puberula*** (forma) ***ramosa*** Schltld., Hort. Hal. 2: 16, 1841. Mexico: Zetete Xonotla, C.J.W. Schiede. Lectotypus: HAL 32740.
- Stevia dissoluta*** Schltld., Hort. Hal. 2: 16, 1841. Mexico: inter las Trojes et Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede. Typus: HAL 327449 (11 sheets).
- Stevia ehrenbergiana*** Schltld., Linnaea 16: 370, 1842. Mexico: Mineral del Monte, C. Ehrenberg, Sept.–Oct. 1834–40. Typus: HAL 72113.
- Stevia glandulifera*** Schltld., Ind. Sem. Hort. Bot. Hal.: 19, 1839. Linnaea 14: Litt.-Ber. 129, 1840 and Hort. Hal. 2: 15, 1841. Aut Mexico, leg. C. Ehrenberg vel C.J.W. Schiede, aut cult. in Hort. Bot. Halensis. Lectotypus: HAL 20972. Syntypi: HAL 98714–98718, 98720.
- Stevia leucantha*** Schltld., Hort. Hal. 2: 16, 1841. Mexico: C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 72114.
- Stevia pyrolaeifolia*** Schltld., Linnaea 16: 326, 1842. Mexico: in monte Kankandó, C. Ehrenberg. Typi: HAL 32743, 91218.
- Stevia verticillata*** Schltld., Linnaea 16: 372, 1842. Brazil: in provincia Rio de Janeiro prope Novo Friburgo in planitie. Typus: HAL 32758.
- Swertia perennis*** (b) ***alternifolia*** Cham. & Schltld., Linnaea 1: 189, 1826. Not at HAL.
- Symplocos schiedeana*** Schltld., Linnaea 8: 527, 1833. Mexico: inter Tioselo, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98594.
- Tagetes schiedeana*** Schltld., Linnaea 9: 271, 1834. Mexico: im graminosis prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98094.
- Tamonea scabra*** Schltld. & Cham., Linnaea 5: 99, 1830. Mexico: Hacienda de la Laguna, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Oct. 1828/29. Syntypus: HAL 98486. Mexico: Puente del Rey, C.J.W. Schiede, Jul. 1828. Syntypus: HAL 98487.
- Tamonea scabra*** Schltld. & Cham. (var.) ***minor*** Schltld. & Cham., Linnaea 6: 373, 1831. Mexico: ad littora maris arenosa prope Laguna salada reg. calid., F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. 1828/29. Typus: HAL 98481.
- Tauschia nudicaulis*** Schltld., Linnaea 9: 607, 1835. Mexico: A: inter las Vigas et Perote, C.J.W. Schiede & F. Deppe. B: in locis tenui gramine vestitis inter la Joya

- et San Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Typus: HAL 66180 A, B (2 sheets).
- Taxus globosa*** Schltdl., Linnaea 12: 496, 1838. Not at HAL.
- Tephrosia schiedeana*** Schltdl., Linnaea 12: 299, 1838. Mexico: in praeruptis in Barranca de Tioselo prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98588 (3 sheets).
- Tephrosia vicioides*** Schltdl., Linnaea 12: 297, 1838. Mexico: prope Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 98609 (2 sheets).
- Ternstroemia sylvatica*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 220, 1830. Mexico: in sylvaticis inter Jalapam et San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Lectotypus/Isolectotypus: HAL 60004 (2 sheets). Mexico: San Miguel del Saldado, C.J.W. Schiede, Nov. 1828. Syntypus: HAL 60005.
- Tetracera fagifolia*** Schltdl., Linnaea 8: 174, 1833. Brazil: prov. Parà, C. de Hoffmansegg. Isotypus: HAL 16530.
- Tetracera sellowiana*** Schltdl., Linnaea 8: 175, 1833. Not at HAL.
- Tetrachyron manicatum*** Schltdl., Linnaea 19: 744, 1847. Not at HAL.
- Tetramerium latifolium*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 30, 1829. Not at HAL.
- Tetramerium montevidense*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 29, 1829. Not at HAL.
- Tetramerium stipulaceum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 4: 31, 1829. Not at HAL.
- Tetrapteris schiedeana*** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 218, 1830. Mexico: in sylvis prope Jalapam in arboribus scandens, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 74280. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Sept. 1828. Syntypus: HAL 74281.
- Teucrium trifidum*** Schltdl., Linnaea 20: 609, 1847. Australia: auf sandigem Boden, H. Behr, Nov. 1844/45. Typus: HAL 42538.
- Tilia mexicana*** Schltdl., Linnaea 11: 377, 1837. Mexico: Cuesta grande de Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 42250.
- Tillandsia aloides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45464 (2 sheets).
- Tillandsia apicroides*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 55, 1831. Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam (err. "in graminosis"), C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45619 (2 sheets).
- Tillandsia brachycaulos*** Schltdl., Linnaea 18: 422, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Typus: HAL 45602.
- Tillandsia caespitosa*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831. Mexico: Jalapa, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45603.
- Tillandsia circinnata*** Schltdl., Linnaea 18: 430, 1845. Mexico: in arboribus Misantlae, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Syntypus: HAL 45627. Mexico: Hacienda de la Laguna, in arboribus, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Syntypus: HAL 45628.
- Tillandsia erubescens*** Schltdl., Linnaea 18: 427, 1845. Mexico: S. Angel, S. Bastolo, C.J.W. Schiede, 1828–33. Typus: HAL 45608.
- Tillandsia filifolia*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 53, 1831. Not at HAL.
- Tillandsia grandis*** Schltdl., Linnaea 18: 424, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna in praeruptis, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 45629.
- Tillandsia leiboldiana*** Schltdl., Linnaea 18: 414, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Syntypus: HAL 45625. Mexico: in barrancos,

- F.E. Leibold. Syntypus: HAL 45630.
- Tillandsia limbata*** Schltdl., Linnaea 18: 419, 1845. Mexico: Hacienda de la Laguna, in arboribus, C.J.W. Schiede, Aug. 1829. Typus: HAL 45626 (3 sheets)
- Tillandsia paniculata*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831, nom. illeg. (non *Tillandsia paniculata* L., 1762). Mexico: in arboribus parasitica prope Jalapam, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Typus: HAL 45631 (2 sheets).
- Tillandsia punctulata*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 53, 1831. Mexico: Jalapa in arboribus, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Nov. 1828. Typus: HAL 45635 (2 sheets).
- Tillandsia tricolor*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 54, 1831. Mexico: Jalapa in arboribus parasitica, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 45632 A. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 45632 B.
- Tillandsia variabilis*** Schltdl., Linnaea 18: 418, 1845. Mexico: in arboribus prope Papantlan, C.J.W. Schiede, Jan. 1829. Typus: HAL 45636 (2 sheets).
- Tillandsia variegata*** Schltdl., Linnaea 18: 429, 1845. Mexico: in arboribus Jalapae, C.J.W. Schiede, Apr. 1829. Typus: HAL 45637.
- Torenia hirta*** Cham. & Schltdl., Linnaea 2: 571, 1827. Not at HAL.
- Tovomita calyptrata*** Schltdl., Linnaea 8: 187, 1833. Not at HAL.
- Tradescantia gonatandra*** Schltdl., Linnaea 24: 659, 1851. Not at HAL.
- Trichomanes melanotrichum*** Schltdl., Adumbr. pl. 1: 56, 1832. South Africa: Prom. bon. spei, ad Plettenbergbay, Mundt & Maire, 1815. Typus: HAL 37269.
- Trichomanes schaffneri*** Schltdl., Linnaea 26: 368, 1854. Not at HAL.
- Trigynaea oblongifolia*** Schltdl., Linnaea 9: 329, 1834. Brazil: Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1815–31. Typus: HAL 59853 (fragment of the holotype from B).
- Triopteris sericea*** Schltdl., Linnaea 10: 243, 1836. Mexico: Malpays de Naulingo, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Typus: HAL 98388.
- Triplaris laurifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 55, 1828. Brazil: Brasilia tropica, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98197.
- Triplaris salicifolia*** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 56, 1828. Brazil: Brasilia meridionalis, F. Sellow, Feb. 1814–31. Typus: HAL 97801 (2 sheets).
- Tropaeolum fintelmanni*** Wagner ex Schltdl., Allgem. Gartenzeitung 18: 105, 1850. Not at HAL.
- Trophis ramon*** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 357, 1831. Mexico: Misantla, C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 97800 (2 sheets).
- Turraea graciliflora*** Schltdl., Linnaea 25: 216, 1852. Not at HAL.
- Umbilicus mexicanus*** Schltdl., Linnaea 13: 409, 1839. Not at HAL.
- Urvillea affinis*** Schltdl., Linnaea 18: 38, 1844. Brazil: prov. Rio de Janeiro, in montibus ad Novo Friburgo, Oct. Typus: HAL 92765.
- Vaccinium leucanthum*** Schltdl., Linnaea 8: 524, 1845. Mexico: prope Chiconquiaco, C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Syntypus: HAL 98447. Mexico: infra S. Salvador, C.J.W. Schiede, Jun. 1829. Syntypus: HAL 98593.
- Vaccinium salicinum*** Cham. & Schltdl., Linnaea 1: 525, 1826. Not at HAL.
- Valeriana armeriaefolia*** Schltdl., Linnaea 28: 485, 1856. Peru: San Antonio, in rupibus umbrosis Cordiller. W. Lechler, Apr. 1854. Typus: HAL 8881.
- Valeriana cephalantha*** Schltdl., Linnaea 28: 483, 1856. Peru: Tabina, W. Lechler,

- Jul. 1854. Typus: HAL 5436.
- Valeriana chamaedryfolia** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 129, 1829. Brazil: F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 5445.
- Veratrum caricifolium** Schltdl., Ind. Sem. Hort. Hal.: 8, 1838. Mexico: in montibus calcareis prope los Banos de Grande, C. Ehrenberg, Oct. 1837. Typus: HAL 64680 (4 sheets).
- Veratrum frigidum** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 46, 1831. Mexico: in regione alpestris montis Orizabae, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Sept. 1829. Holotypus: HAL 79374 (2 sheets).
- Veratrum officinale** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 45, 1831. Mexico: in Barranco de Tioselo prope la Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, Jul. 1829. Holotypus: HAL 79373 (2 sheets).
- Vernonia leiboldiana** Schltdl., Linnaea 9: 742, 1835. Not at HAL.
- Vesicaria polyantha** Schltdl., Bot. Zeitung 11: 620, 1853. Not at HAL.
- Viburnum microcarpum** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 171, 1830. Mexico: prope Jalapam et inter Jalapam et San Miguel del Soldado, C.J.W. Schiede, Aug. 1826. Typus: HAL 98548.
- Viola ciliata** Schltdl., Linnaea 12: 202, 1838. Mexico: in graminosis Jalapae, C.J.W. Schiede, May 1829. Lectotypus: HAL 71512. Isolectotypus: HAL 71513. Mexico: in graminosis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Syntypus: HAL 71511.
- Viola reticulata** Schltdl., Linnaea 12: 201, 1838. Not at HAL.
- Viscum falcatum** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 172, 1830. Mexico: in arboribus parasiticus prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98471.
- Vismia decipiens** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 116, 1828. Not at HAL.
- Vismia decipiens** Cham. & Schltdl. (var.) **pyrifolia** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 116, 1828. Brazil: Brasilia aequinoctiali, F. Sellow, 1814–31. Typus: HAL 98394.
- Vismia magnoliaefolia** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 118, 1828. Not at HAL.
- Vismia mexicana** Schltdl., Linnaea 10: 245, 1836. Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Jul. 1829. Syntypus: HAL 98604 (3 sheets). Mexico: C.J.W. Schiede. Syntypus: HAL 98389.
- Vismia parviflora** Cham. & Schltdl., Linnaea 3: 119, 1828. Not at HAL.
- Weinmannia intermedia** Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 555, 1830. Mexico: in sylvaticis prope San Andres, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Aug. 1828. Syntypus: HAL 82844. Mexico: Cuesta grande inter Jalacingo et Huitamalco, C.J.W. Schiede & F. Deppe, Dec. 1828. Syntypus: HAL 82845.
- Wenderothia discolor** Schltdl., Linnaea 12: 330, 1838. Mexico: prope Jalapam, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 97754.
- Wigandia macrophylla** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 382, 1831. Mexico: prope Sepillo ad flumen Tecolutense, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Feb. 1829. Typus: HAL 97777 (2 sheets).
- Wimmeria concolor** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 428, 1831. Mexico: prope Colipam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Mar. 1829. Typus: HAL 98384.
- Wimmeria discolor** Schltdl. & Cham., Linnaea 6: 428, 1831. Mexico: in sylvis apricioribus Papantlae arborescens, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Jan. Typus: HAL 98385.

Wurmbea truncata Schldtl., Linnaea 1: 93, 1826. Not at HAL.

Xanthoxylum (Zanthoxylum) melanostictum Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 231, 1830.

Mexico: prope San Andres, C.J.W. Schiede, Aug. 1828. Typus: HAL 98596 (2 sheets).

Xylopia parvifolia Schldtl., Linnaea 9: 327, 1834. Not at HAL.

Zornia laevis Schldtl. & Cham., Linnaea 5: 582, 1830. Mexico: in collibus apricis prope Jalapam, F. Deppe & C.J.W. Schiede, Aug. 1828/29. Typus: HAL 98427.

Danksagung:

Die Autoren danken Herrn H. Bensch für die Einrichtung der Datenbank. Ebenso danken wir Frau S. Richter für ihre Hilfe bei der Eingabe der Daten und Frau K. Schubert für ihre Unterstützung des gesamten Projektes.

Literature:

BRAUN, U. 1998: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 1: Pteridophyta und Gymnospermae. Schlechtendalia 1: 15–18.

BRAUN, U. 2000: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 2: Myrtaceae. Schlechtendalia 5: 1–10.

HEKLAU, H. 1998: Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal (1794–1866). Schlechtendalia 1: 11–14.

HOFFMANN, M.H. 1998: Type specimens of the Ranunculaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Schlechtendalia 1: 19–22.

HOFFMANN, M.H. 2000: Type specimens of the Brassicaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Schlechtendalia 4: 35–40.

KESTING, S. & HOFFMANN, M.H. 2000: Type specimens of the Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae, Loganiaceae and Menyanthaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Schlechtendalia 5: 11–17.

Anschriften der Verfasser:

Dr. U. Braun & A.-K. Wittig, Martin-Luther-Universität, FB. Biologie, Institut für Geobotanik und Botanischer Garten, Neuwerk 21, D-06099 Halle/Saale, BR Deutschland.
(braun@botanik.uni-halle.de)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schlechtendalia](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Braun Uwe, Wittig Anna-Katharina

Artikel/Article: [Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg \(HAL\) Teil 4: Taxa beschrieben von D.F.L. von Schlechtendal 15-65](#)