

Nachträge
 zu der
Macrolepidopterenfauna
 der
Grafschaft Wernigerode
 von H. Fischer.

- Melitaea Cinxia* L. z. h. in einzelnen Jahren 6 am Pieperberge. R. —5 an niederen Pfl.
- Pterogon Proserpina* Pall. (Oenolterae Esp.) 1887. 8. fand Prof. Rüdorff eine ziemlich erwachsene Raupe im unteren Breiten Thal, die aber vor der Verpuppung eingegangen.
- Setina Roscida* Esp. s. 7. R. 5—6. an Erdflechten.
- Lithosia Unita* Hb. in 1887 öfter gefunden und auch gezogen.
- Lasiocampa Tremulifolia* Hb. auch an der Harburg gefunden.
- Panthea Coenobita* Esp. in derselben Gegend, wie p. 17 der Beiträge No. 20 erwähnt, fand sich die R. erwachsen und zur Verpuppung reif.
- Plusia Interrogationis* L. Beiträge p. 26 No. 202 mit J? bezeichnet, Ende 7. 1887 in Hasserode von Prof. Rüdorff am Licht gefangen.
- Chariclea Umbra* Hufn. (Marginata F.) Beiträge p. 26 No. 208. Die Raupe findet sich zahlreich 7—8 an *Ononis spinosa* am Horstberg, an der Langen Hecke, überhaupt wohl überall, wo die Futterpflanze wächst.
- Erastria Argentula* Hb. s. s. 6. am Pieperberg bei Hasserode. R. im Samen von Gras.
- Agrophila Trabealis* Sc. (Sulphurea Schiff.) Beiträge p. 27 No. 214. Auch die var. mit weissem Untergrund kommt öfter vor.
- Aventia Flexula* Schiff. s. s. 8. 1887 erbeutete ich am Köder zwei schöne Exemplare. R. 4—5 an Kiefern- u. Tannenflechten.
- Herminia Derivalis* Hb. h. 6—7 an der Harburg.
- Pechipogon Bacbalis* Cl. n. s. 6 am Braunen Kohl.
- Scoria Lineata* Sc. (Dealbata L.) z. s. im Wolfsholz.

- Ortholita Moeniata* Sc. fand sich 1887. 8 auch ziemlich zahlreich am Ziegelberg. Beiträge p. 33 No. 114.
- Cidaria Munitata* Hb. in mehreren Exempl. am Eichberg gefangen.
- Cidaria Tophaccata* Hb. s. s. 7 am Lindenberg ein Exemplar gefangen.
- Cidaria Picata* Hb. s. 6—7 an verschiedenen Orten gefangen.
- Cidaria Cuculata* Hufn. gewiss s. s. 6. R. 7—9 an Labkraut häufiger.
- Cidari Ricata* Hb. s. 5—6. R. 9 an Labkraut.
- Cidaria Lugubrata* Hb. Beiträge p. 36 No. 165. Zweite Generation 8, meist kleiner.
- Cidaria Decolorata* Hb. s. 6. R. 7—9 in den Kapseln der Lichtnelke, bes. im Mühlenthal, doch immer nur einzeln.
- Eupithecia Venosata* Fabr. s. 5—6. R. 7—8 in den Kapseln der *Silene inflata*, bes. im Hasseröder Thal.
- Eupithecia Subfulvata* Hw. n. s. 6—7. R. im Herbst an Schafgarbenblüten an einzelnen Stellen zahlreich.
- Eupithecia Minutata* Gn. 7 in einem Exemplar im Bollhasenthal gefangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [2_1887](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer H.

Artikel/Article: [Nachträge zu der Macrolepidopterenfauna der Grafschaft Wernigerode 74-75](#)