

# Beiträge zur Kenntniss der oberitalienischen Molluskenfauna.

Von Dr. R. Schröder, (Naumburg a/S.)

## II.

Viva la chiocciola  
Viva una bestia,  
Che unisce il merito  
Alla modestia.

Im vorigen Hefte sind die meisten derjenigen Sammelergebnisse abgehandelt worden, welche Arten angehören, die auch in Deutschland leben. Ich hatte beabsichtigt, auch die in Deutschland nicht vorkommenden Funde eingehend zu bearbeiten, musste aber leider darauf verzichten, weil meine wenigen Mussestunden gänzlich mit häuslichen Interessen ausgefüllt wurden. Wenn ich trotzdem hier wenigstens die Sammelliste veröffentliche, mit Hinzufügung weniger Bemerkungen, so hoffe ich dabei, dass manches nicht ohne Interesse sein wird. Sollte ich mich irgendwo geirrt haben, so werde ich für Aufklärungen sehr dankbar sein.

Dass ich auch Riva am Gardasee (circa 50 m über der Adria) als Fundort mit aufführe, obwohl es noch innerhalb der schwarzgelben Grenzpfähle liegt, dürfte wohl vom unpolitischen tiergeographischen Standpunkte aus erklärlich erscheinen. Dagegen sollen die in Bozen u. Cortina d'Ampezzo gelegentlich aufgefundenen Arten nur anhangsweise aufgezählt werden.

## Gastropoda.

### A. Inoperculata.

Stylommatophora.

a. Vitrinidae.

#### I. *Hyalina* Albers.

*Euhyalina* Albers.

#### 1) *Euhyalina cellaria* Müller.

Ausser in Gargnano (siehe voriges Heft!) auch bei Riva in Felsspalten an der herrlichen Ponalestrasse.

- 2) ***Euhyalina Villae* Mortillet.**  
In Longarone und Gargnano (s. vor. Heft!)
- 3) ***Euhyalina Draparnaldi* Beck.**  
In Bellagio (s. vor. Heft!)
- 4) ***Euhyalina nitens* Mich.**  
In Longarone (s. vor. Heft!)

## II. Zonites Montfort.

- 5) ***Zonites gemonensis* Fér.**  
In Longarone, im Mulm unter einer Hecke. Trotz eifrigen Suchens gelang es mir nicht, auch nur ein lebendes Exemplar zu finden; die toten dagegen waren zahlreich und wenigstens zum Teil gut erhalten.

### b. Helicidae.

## III. Patula Held.

Discus Fitzinger.

- 6) ***Discus rotundatus* Müll.**  
in Pieve di Cadore und in Bellagio (s. vor. Heft!)

## IV. Helix Linné.

### α) Anchistoma Ad.

Gonostoma Held.

- 7) ***Gonostoma angigyra* Jan.**  
In Bellagio in Mauerritzen in ziemlicher Anzahl lebend gefunden.
- 8) ***Gonostoma obvoluta* Müll.**  
In Longarone (s. vor. Heft!)

### β) Fruticicola Held.

Trichia Hartmann.

- 9) ***Trichia filicina* Ad. Schm.**  
In Pieve di Cadore in einigen Exemplaren lebend gefunden, im Walde am Festungsberg.

## Monacha Hartmann.

- 10) ***Monacha lurida* Zgler.**  
In Pieve di Cadore mit voriger.  
Ich weiche hier vom Kobeltschen Kataloge, dessen Einteilung dieser Liste zu Grunde liegt, ab und folge Clessin, die Mollusken-Fauna Österreich-Ungarns und der Schweiz, pag. 136.

## Carthusiana Kobelt.

11) **Carthusiana carthusiana** Müller.

An Heckensträuchern, auch an Mauern und Felsen in Gargnano, Salò, Bellagio und besonders zahlreich in Riva.

## Eulota Hartmann.

12) **Eulota fruticum** Müller.

In Riva, Longarone, Salò, Pieve di Cadore (s. vor. Heft!)

13) **Eulota strigella** Drap.

In Chiavenna, Longarone, und Pive di Cadore (s. vor. Heft!)

γ) **Campylaea** Beck.14) **Campylaea planospira** Lam.

Im Piavethal von Longarone bis Perarolo häufig an Felsen; auch im Val di Zoldo.

15) **Campylaea planospira** var. **Kobeltiana** Paull.

Im Val di Zoldo ein Stück.

16) **Campylaea Preslii** var. **nisoria** Rossm.

An Felsen im Val di Zoldo nicht selten; in Pieve di Cadore zwei Stücke. An einer sehr feuchten Stelle in Val di Zoldo eine prachtvolle *mutatio albina*.

17) **Campylaea cingulata** Stud.

Bei Riva an den Seiten der Ponalestrasse.

18) **Campylaea cingulata** var. **bizona** Rossm.

Bei Riva in der Varoneschlucht

19) **Campylaea cingulata** var. **colubrina** Gr. et Jan.

Bei Riva an der Ponalestrasse, mit dem Typus zusammenlebend.

δ) **Tachea** Leach.20) **Tachea nemoralis** Linné.

In Riva, Longarone, Salò, Pieve di Cadore und Bellagio (s. vor. Heft.)

21) **Tachea hortensis** Müller.

In Salò (s. vor. Heft.)

ε) **Pomatia** Leach.22) **Pomatia aspersa** Müller.

In Venedig auf dem Lido zahlreich. Sie werden dort auch zum Essen feilgeboten, zugleich mit *Helix pisana*.

23) **Pomatia pomatia** Linné.

In Riva und in Lagarone (s. vor. Heft.)

An der schon bei Nro. 16 erwähnten Stelle des Val di Zoldo eine schöne *mutatio albina*.

24) ***Pomatia lucorum* Müller.**

In Gargnano, jedoch trotz allen Suchens nur ein Stück.

25) ***Pomatia cincta* Müller.**

In Riva, nur ein Stück.

ζ) ***Xerophila* Held.**

*Euparypha* Hartmann.

26) ***Euparypha pisana* Müller.**

In Venedig auf dem Lido zahlreich.

*Candidula* Kob.

27) ***Candidula candidula* Studer.**

In Longarone (s. vor. Heft!)

**V. *Buliminus* Ehrbg.**

*Zebrina* Held.

28) ***Zebrina detrita* Müll.**

In Riva und Umgegend, in Felsenritzen, nicht selten.

29) ***Zebrina detrita* var. *radiata* Brug.**

Mit dem Typus zusammenlebend und häufiger als derselbe.

**VI. *Pupa* Draparnaud.**

α) *Torquilla* Studer.

30) ***Torquilla frumentum* Drap.**

In Pieve di Cadore, Longarone und Gargnano (s. vor. Heft!)

31) ***Torquilla frumentum* var. *cylindracea* Zglr.**

In Gargnano (s. vor. Heft!)

32) ***Torquilla frumentum* var. *curta* Kstr.**

In Longarone (s. vor. Heft!).

33) ***Torquilla frumentum* var. *elongata* Rossm.**

In Riva, Gargnano und Longarone (s. vor. Heft!)

34) ***Torquilla frumentum* var. *castanea* Gredl.**

In Gargnano ein Stück (s. vor. Heft!)

Vom Typus sowie von der var. *elongata* wurden in Gargnano je zwei Stück der *mutatio albina* gefunden.

35) ***Torquilla megacheilos* var. *avenoides* Westerl.**

In Gargnano nicht selten, mit voriger zusammenlebend.

36) ***Torquilla avenacea* Brug.**

Im Piavethal von Longarone bis Pieve di Cadore, häufig an Felsen.

- 37) ***Torquilla avenacea var. hordeum*** Studer.  
Bei Pieve di Cadore an Felsen.
- 38) ***Torquilla avenacea var. megacheiloides*** Böttg.  
In Bellagio an Mauern häufig.

β) ***Orcula*** Held.

- 39) ***Orcula doliothum*** Brug.  
In Longarone (s. v. Heft!)

γ) ***Pagodina*** Stabile.

- 40) ***Pagodina pagodula*** Desm.  
In Longarone an Graswurzeln, im Mulm unter Hecken,  
mit *Zonites acies* gefunden.

δ) ***Columella*** Westerlund.

- 41) ***Columella edentula*** Drap.  
In Chiavenna, an einem Felsen an der Strasse. Nur  
1 Exemplar.

**VII. *Balea*** Prideaux.

- 42) ***Balea fragilis*** Drap.  
In Chiavenna, mit *Pupa edentula*, wenig Stücke.

**VIII. *Clausilia*** Draparnaud.

α) ***Clausiliastra*** von Möllendorff.

- 43) ***Clausiliastra laminata*** Mont.  
In Longarone (s. vor. Heft!)
- 44) ***Clausiliastra laminata var. virescens*** A. Schm.  
In Pieve di Cadore (s. vor. Heft!)

β) ***Delima*** Böttger.

- 45) ***Delima itala*** von Martens  
An Felsen in Chiavenna, Riva, Gargnano und auch in  
Longarone. Letzterer Fundort ist bemerkenswert, da  
Clessin in seiner Molluskenfauna von Oesterreich-Ungarn  
und der Schweiz pag. 356. mitteilt, dass *Clausilia itala*  
in Südtirol das Etschthal nach Osten hin nicht über-  
schreitet.
- 46) ***Delima itala var. Braunii*** Charp.  
Bei Pieve di Cadore nicht selten.
- 47) ***Delima itala var. ornata***. Böttger.  
In Bellagio an Mauern sehr häufig.

$\gamma$ ) **Pirostoma** von Möllendorf.

- 48)
- Pirostoma dubia***
- Drap.

Bei Riva ein Stück.

- 49)
- Pirostoma plicatula***
- Drap.

Bei Bellagio, Gargnano (ein Stück), Longarone, Pieve di Cadore.

- 50)
- Pirostoma plicatula***
- Megerle.

Bei Riva.

**B. Operculata.**

Pneumonopoma.

**IX. Cyclostoma** Drap.

- 51)
- Cyclostoma elegans***
- Müller.

Bei Riva, Gargnano, Salò, Venezia (s. vor. Heft!)

**X. Pomatias** Studer.

- 52)
- Pomatias Philippianum***
- Gredl.

Bei Longarone und Pieve di Cadore, an Felsen.

- 53)
- Pomatias septemspirale***
- Raz.

Im Piavethal von Longarone bis Pieve di Cadore an Felsen.  
 Es lassen sich noch Formen unter meinem Material unterscheiden, doch bin ich bisher nicht im Stande gewesen, bestimmte Arten darin zu erkennen.

---

# A n h a n g.

## A.

Bei Bozen habe ich noch aufgenommen:

- 1) ***Helix (Campylaea) cingulata*** Studer.  
Am Calvarienberge häufig.
- 2) ***Helix (Tachea) nemoralis*** Linné.  
Mit voriger lebend.

## B.

Bei Cortina d'Ampezzo habe ich gesammelt:

- 1) ***Helix (Campylaea) planospira*** Lam.  
An Felsen und in Spalten.
  - 2) ***Helix (Campylaea) Prestii*** Schmidt.  
Mit voriger, aber zahlreicher.
  - 3) ***Helix (Pamatia) pomatia*** Linné.  
Überall in den Thälern.
  - 4) ***Pupa (Torquilla) arenacea*** Brug.  
Nur drei Stück an Felsen.
  - 5) ***Clausilia (Delima) Stentzii*** Rossmässler.  
Sehr häufig an Felsen.
  - 6) ***Clausilia (Pirostoma) dubia*** Drap.  
Selten, an Felsen.
  - 7) ***Clausilia (Pirostoma) dubia var. gracilior***  
Clessin (l. c. pag. 433).  
Selten.
  - 8) ***Clausilia (Pirostoma) plicatula var. superflua*** Megerle.  
Selten an Felsen.
  - 9) ***Clausilia (Pirostoma) ventricosa*** Drap.  
Nur zwei Stück am Fusse eines Felsens gefunden.
-

# **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [5\\_1890](#)

Autor(en)/Author(s): Schröder Richard

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der oberitalienischen Molluskenfauna 37-43](#)