Verzeichniss
der
wichtigeren im August und September 1879 im Kreise Strasburg gefundenen Pflanzen.

Dicotyledoneae.

Thalictrum angustifolium L. V_3Z_2, z. B. Wäldchen bei Tomken, Insel im Choyno-See.
Batrachium aquatile L. V_3Z_4. z. B. in der Braniza.
B. fluitans, Z_4 in der Drewenz.
Ranunculus lingua L. Z_4 Karraschbrücke. Z_3 Wiesen am kl. Gurznoer See.
Cimicifuga foetida Z. Wald zwischen Bachott- und Ostrow-See.
Turritis glabra L. in Früchten, Wald bei Gurzno.
Cardamine pratensis L. mit sehr schöner Knospenbildung an der Blattbasis im Moor am Wletsch-See.
Viola epipsila Ledeb. (Früchte) im Wäldchen bei Tomken Z.
Drosera rotundifolia L. Nur im Moor am Wletsch-See Z_2, und im Moor südlich von Piassetzno-See Z_4.
Polygala vulgaris L. V_4Z. z. B. Leszno-Kamschatka, Wiese bei Konojad.
Dianthus Carthusianorum. V_5Z_2.
„ *deltoides.* V_1Z_3. (z. B. Drewenzwiesen.)
„ *arenarius L. selatior.* Wald nördlich vom Zbiczno-See. (Z.)
„ *superbus L.* Wiesen am Gurznoer See Z_4 und sonst V_2Z_3.
Saponaria officinalis. V_2Z_3. Z. B. b. O.-F. Ruda.
Spergula arvensis L. V_4Z_4.
Stellaria Holostea L. (Blätter) z. B. żimny zdroje bei Gurzno.
Radiola linoides Gmel. Bartnitzka-Dlugimost Z_3.
Malva Alcea L. V_4Z_2. Birkeneck nördlich, bei Ruda, bei Karbowo, am Zbiczno-See.
Hypericum tetrapterum Fr. Guttowo Z_4.
„ *humifusum L.* Feld bei Dlugimost Z_4.
Geranium sanguineum L. bei Wilhelmsberg Z_2.
Impatiens Noli tangere L. Wald am kl. Gurznoer See Z_2, Wald dei Karbowo Z_3.
Evonymus europaea L. Wälder von Karbowo.
„ *verrucosa Scop.* V_5Z_2.
Genista tinctoria V_5Z_2 in jedem Walde.
Anthyllis vulneraria L. Insel im Choyno-See Z_3.
Trifolium rubens L. Gremenzer See, Ostufer.
„ *arvense L.* V_5Z_4.
„ *agrarium L.* V_5Z_3

Trifolium procumbens Gremenzer See, Ostufer. Z_2.
Astragalus glyciphyllos L. V_5Z.
Vicia cassubica L. am Sossno-See. Z_3
„ *tenuifolia Rth.* Wilhelmsberg.
„ *silvatica L.* Gurzno, żimny zdroje Z_3.
Lathyrus pratensis L. Wald am Wletsch-See, bei Wilhelmsberg, Wiesen bei Ruda, Z_3.
„ *silvester L.* O.-F. Wilhelmsberg, U.-F. Strasburg. Z_3.
Rubus suberectus Anders. Wäldchen vor Tomken, Z_2.
„ *plicatus W. et N.* Drewenz-Wiesen; Ruda-Gurzno.
„ *caesius L.* V_5Z_3.
„ *Idaeus L.* Guttowo-Ruda; am Ostrow-See. V_4Z_3.
Potentilla procumbens Sibth. Tengowitz-Kaluga, dicht vor Kaluga. Z_4V.
„ *verna L.* Gremenzer See, Ostufer.
Sanguisorba officinalis L. Drewenz-Wiesen von Karbowo. Z_5.
Agrimonia odorata Mill. Margarethenhof-Karbowo. Z.
Rosa cuspidata Christ. am Bachott-See, am Wletsch-See. Z.
Circaea Lutetiana L. Gurzno, żimny zdroje. Z_2.
„ *alpina L.* ibid. Z_4.
„ *intermedia Ehrh.* ibid. Z.
Hippuris vulgaris L. Lautenburger See. Z.
Callitriche spec. Bach. bei Wilhelmsberg Z_3.
Sedum maximum L. V_4 Z_3.
Saxifraga Hirculus L. Wiesen bei Ruda. Z_2.
Sanicula europaea L. Gurzno, żimny zdroje und sonst, Wald am Bachott-See. Z_3.
Sium angustifolium L. Wiesen bei Ruda. Z_3.
Chaerophyllum aromaticum L. Ufer des Lautenburger Sees, bei der Oberförsterei Z_3.
Thysselinum palustre. V_5 Z_2.
Asperula odorata L. Gurzno, żimny zdroje. Z_3.
Inula salicina L. Schonung am Bachott-See. Z_3.
Filago arvensis Fr. V_4 Z_3. z. B. am Bachott-See.
„ *minima Fr.* ibid.
Artemisia Absinthium L. In der Nähe der Dörfer überall Z_3.
Achillea cartilaginea Ledeb. An der Drewenz. Z_4.
Anthemis Cotula L. Wiesen am kl. Gurznoer See. Z_2.
Senecio paludosus L. Drewenz etwas oberhalb Strasburg. Z_3.
Cirsium acaule All. var. caulescens. Wald bei Dlugimost. Z_3.
Serratula tinctoria L. V_4 Z_2.
Scorzonera humilis L. nördlich vom Zbiczno See. Z_2.
Crepis tectorum L. b. integrifolia. Guttowo-Ruda. Z_4.
Hieracium floribundum W. et Grab. Wiese bei Mileszewo Z_3, Wiesen bei Ruda Z_2.
Campanula Trachelium. V_4 Z_2. z. B. Gurzno, żimny zdroje.
Pirola secunda L. Früchte V_4 Z_3 z. B. bei Wilhelmsberg.

Monotropa Hypopitys L. V_4 Z_2. Wald am Czichen-See, bei Ruda, bei Gurzno etc.
Lappula Myosotis Mnch. wüste Stelle am Zbiczno-See Z.
Verbascum phlomoides L. Ueber die andern Arten vorherrschend. V_5 Z_2.
Veronica spicata L. V_5 Z_4.
„ *longifolia L.* Drewenzufer bei Karbowo, U. F. Kaluga an der Drewenz.
Pedicularis palustris L. Torfbrüche vor Tomken Z_2. Wiesen bei Ruda Z.
Salvia pratensis L. am Zbiczno-See Z_4.
Calamintha Acinos L. V_4 Z_3.
Verbena officinalis L. am Zbiczno-See, Pokrzidowo, im Dorf Z_3.
Utricularia vulgaris L. Gräben am Gr. Lesznoer See, Z_4; Gräben am Zwosno-See mit Blüten Z_3. Daneben auch eine kleinere, wahrscheinlich *minor*, ohne Blüten.
Trientalis europaea L. in allen Wäldern Z_4.
Lysimachia thyrsiflora L. Guttowo-Ruda an der Braniza, Insel im Choyno-See.
Primula officinalis Jacq. am Zbiczno-See Z_5.
Rumex conglomeratus Murr. var.? Wald am Wletsch-See.
„ *maritimus L.* in jedem Torfbruch Z_5.
Polygonum mite V_3 Z_3 z. B. an der Karraschbrücke.
„ *Hydropiper L.* Brinsker Fluss bei Guttowo Z_4.
„ *dumetorum L.* Karbowoer Drewenzwiesen V_4 Z_2.
Asarum europaeum L. in allen Wäldern mehr oder weniger zerstreut, namentlich in der Nähe der Seen oft beobachtet.
Ulmus campestris L. var. suberosa Insel im Choyno-See.
Quercus pedunculata Ehrh. f. subintegrifolia östlich von Wilhelmsberg.
Salix pentandra L. V_3Z_3. Insel im Choyno-See, bei Wilhelmsberg und sonst.
„ *fragilis L.* V_3Z_3.
„ *triandra L.* in schmal- und breitblättrigen Formen an den Ufern der Drewenz Z_4.
„ *purpurea* Z. B. Insel im Choyno-See, auch sonst V_4.
„ *nigricans Z. Sm.* Insel im Choyno-See.
„ *cinerea L.* V_4Z_2.
„ *livida Whlnbg.* Drewenzufer jenseits Kaluga.
„ *Schraderiana W. (bicolor hort.)* ibid.
„ *repens L.* V_5 Z_3.
„ „ *var. fusca Sm.* Wilhelmsberg.
„ „ „ *argentea* Insel in Choyno-See.
„ *nigricans* + *repens var. argentea* ibid.
„ *Caprea L.* V_4Z_2.
„ *aurita* L. V_5Z_3.
Betula pubescens Ehrh. von der U.-F. Tengowitz Z_3.

Monocotyledoneae.

Triglochin palustre L. V_5Z_2.

Potamogeton fluitans Roth. in der Drewenz Z_4.

„ *rufescens Schrad.* in der Braniza nicht weit von Barnitzka Z_3 ohne Schwimmblätter und ohne Früchte.

„ *lucens L.* Lautenburger See Z_4.

„ *perfoliatus L.* in der Drewenz, im Lautenburger See etc.

„ *crispus L.* Mit *rufescens* an demselben Standort.

„ *compressus.* See bei Dlugimost Z_4.

„ *obtusifolius M. u. K.* Gräben am Gr. Lesznoer See mit Früchten, Z_4.

„ *pusillus L.* See bei Dlugimost Z_4.

„ *pectinatus L.* Lautenburger See Z_3.

Najas major All. Ausser im Niskebrodnoer See auch in kleinen Teichen neben der Drewenz unterhalb Strasburg.

Lemna trisulca N. Die gewöhnlichste Art in Torfsümpfen und Gräben V_5Z_5.

Calla palustris L. am Zbiczno-See Z_4.

Platanthera bifolia Rchb. am Zbiczno-See und sonst.

Epipactis palustris Crtz. Insel im Choyno-See Z_4. (*Cypripedium Calceolus L.* angeblich bei Gurzno.)

Paris quadrifola L. Gaidi-Ostrow-See Z_3.

Lilium Martagon L. Schonungen am Ostrow-See.

Anthericum ramosum L. am Zbiczno-See Z_3.

Juncus alpinus Vill. Insel im Choyno-See Z_4 und auch sonst V_4Z_{2-3}, z. B. am Wletsch-See.

Blysmus compressus Panz. am Leczno-See Z_3.

Carex remota L. Gurzno żimny zdroje Z_3. (Für Carexarten war es schon zu spät, weil sie fast alle die Früchte verloren hatten.)

Glyceria plicata Fr. durchaus häufiger als *Gl. fluitans R. Br.*

Festuca gigantea Vill. Wald in der Nähe des Ostrow-Sees Z_3.

Bromus secalinus L. Gaidi-Ostrow-See Z_4.

Cryptogamae.

Lycopodium annotinum L. Czichen-See, Westufer; am Czarni-Brinsker See; Gurzno, żimny zdroje.

Aspidium Dryopteris in jedem Walde V_5Z_2.

Hylocomium splendens Br. eur. Wälder von Karbowo. V_4Z_5.

Hypnum cordifolium Hedw. var. angustifolium. Wäldchen vor Tomken.

„ *Schreberi Willd.* am Niskebrodnoer See, Moor w. v. Wletsch-See.

„ *Crista castrensis L.* Brüche im Wald, östlich von Tengowitz. U.-F.

„ *filicinum L.* Gurzno, żimny zdroje.

„ *fluitans Hedw.* Bach bei Wilhelmsberg.

Hypnum cupressiforme L. am Wletsch-See. Gurzno, ż. zd.
Brachythecium rivulare Br. eur. Gurzno, ż. zd.
Eurynchium striatum Br. eur. Gurzno, ż. zd.
Climacium dendroides Mohr., Brüche bei Tengowitz, Wäldchen vor Tomken. Konojader Bruch.
Thuidium recognitum Schimp. (Hedw.?) Gurzno, ż. zd.
Fontinalis antipyretica L. v. lastifolia Milde. Lautenburger See.
Polytrichum juniperinum L. Drewenzufer bei Kaluga.
„ *strictum Menz.* Wald am Niskebrodnoer See.
Anlacomnium palustre Schwgr. Gurzno, ż. zd. Wäldchen bei Tomken.
Mnium punctatum Hedw. Wletsch-See, Gurzno, ż. zd.
„ *affine Bland.* Gurzno, ż. zdr.
„ *undulatum Hedw.* Gurzno, ż. zdr.
Webera nutans Hedw. Konojader Brüche.
„ *cruda Schreb.* Gurzno, ż. zdr.
Funaria hygrometrica Hedw. Gurzno, ż. zdr.
Ceratodon purpureus Brid. Drewenzufer bei Kaluga.
Dicranodontium longirostre Br. eur. Drewenzufer bei Kaluga.
Dicranum palustre Br. et Schr. Wletsch-See.
„ *scoparium Hedw.* Wletsch-See, Wald am Niskebrodnoer See.
„ „ *var. recurvatum Schimp.* Wäldchen bei Tomken.
„ *flagellare Hedw.* Brüche im Walde östl. v. Tengowitz.
Dicranella heteromalla Schimp. z. B. Schonung nördl. v. Ruda.
Sphagnum cymbifolium Dill. Moor sw. v. Wletsch-See.
„ *acutifolium Ehrh. f. typica.* Moor sw. v. Wletsch-See.
„ *cuspidatum Ehrh. v. laxifolium C. Müll.* ibid.
„ *recurvum P. B.* Brüche im Walde östl v. Tengowitz.
Marchantia polymorpha. V_5Z_5.
Plagiochila asplenioides N. a. E. Gurzno ż, zdr.
Ptilidium ciliare N. a. E. Moor sw. v. Wletsch- See.
Pellia epiphylla N. a. E. Moor sw. v. Wletsch-See, Gurzno, ż. dr.
Fegatella conica Cord. Gurzno ż. zdr.

---

9. Hr. Lehrer Lützow-Oliva erstattet über seine Excursionen um Oliva und um Wahlendorf, Kreis Neustadt, folgenden Bericht:

Aus der Umgegend von Oliva wurden zur Vertheilung vorgelegt: *Botrychium Lunaria* Sw., *B. simplex Hitchcock, B. simplex var. compositum Lasch, B. Matricariae Spr., Ophioglossum vulgatum L., Glaux maritima L., Pinguicula vulgaris L,* (Vom Ostseestrande zwischen Glettkau und Zoppot, sogen. Haide.) *Trollius europaeus L.* (Wiesen bei Freudenthal und Espenkrug.) *Bupleurum longifolium L. Pleurospermum austriacum* Hoffm. (Walde bei Freudenthal.) *Pulsatilla pratensis Mill. Goodyera repens R. Br.* (Carlsberg). *Falcaria vulgaris Bernh.* (Schulacker-

Oliva), *Cephalanthera Xiphophyllum Rchb.* (Kgl. Forst Oliva), *Scabiosa ochroleuca L.* (Seestrand bei Zoppot) *Scabiosa Columbaria L.* (Oliva) (Herr Prof. Dr. Ascherson-Berlin bemerkt zu den beiden letztgenannten Pflanzen, dass das Vorkommen derselben in einer Gegend befremdend ist, da beide Pflanzen gewöhnlich einander ausschliessen). *Mimulus moschatus,* eine bekannte Topfpflanze, wurde von Herrn Pfarrer em. Schumann-hier in einem Sumpfe bei Oliva bemerkt; nach näherer Untersuchung des Standortes stellte sich heraus, dass diese Pflanze auch weiter in Gräben eine meist häufige Verbreitung hatte und in vollster Ueppigkeit wuchs und blühte. Möglicherweise ist sie aus dem Zimmer durch Wiesendünger dorthin gekommen, was aber vor langer Zeit geschehen sein müsste, da, wie die näheren Erkundigungen ergaben, seit ca. 8 Jahren sicher keine Erde etc. als Düngung auf diese sumpfige Stelle der Wiese gebracht worden ist, selbst vor dieser Zeit lässt sich dieses kaum annehmen; oder sie mag durch irgend einen Zufall dorthin gerathen sein und schon seit langer Zeit dort wuchern. Dass sie während des Winters nicht ausfriert, ist wohl dem Umstande zuzuschreiben, dass auf der quelligen Wiese die Temperatur nicht tief herabsinkt. In diesem Sommer konnte man wieder das beste Gedeihen derselben bemerken, und wird eine weitere Beobachtung an Ort und Stelle über das fernere Gedeihen der Pflanze das Nähere zeigen. Auf eine Mittheilung hierüber an Prof. Dr. Ascherson-Berlin erwidert derselbe, dass *Mimulus moschatus* recht merkwürdig ist, es ist der zweite Fall dieser Art; der erste: Plattenbruch bei Altenhausen, Provinz Sachsen, Professor Ascherson schon 1867 von Maas in loco gezeigt: in einer Pfütze eines Steinbruchs eine ganze Menge.

Ferner *Luzula angustifolia Grcke* (Espenkrug hinter Oliva); von einer Tour nach Neufahrwasser: *Reseda Luteola L., Reseda lutea L., Coronopus Ruellii All. Diplotaxis muralis DC* u. *D. tenuifolia DC.*

Von der Excursion Wahlendorf Kr. Neustadt:

Lycopodium clavatum L., Lyc. Selago L., Lyc. annotinum L. (letzte beide fast immer zusammen). *Lyc. inundatum L.* an und in Torfbrüchen ziemlich häufig. *Lyc. complanatum L.* seltener, dagegen *Lyc. Chamaecyparissius A. Br.* auf hochgelegenen, kaltgründigen Haiden recht häufig. Es war mir der Umstand neu, dass letztere Pflanze Neigung hat, in Kreisen sich auszubreiten. Auf einer Fläche von ca. 2 ha. zählte ich 5 solcher fast cirkelrunder Kreise von 40—70 m. Durchmesser, deren Peripherie, 1—2 m. breit, von dichtem Rasen dieser Pflanze gebildet wurde, während nach aussen und innen dieser Kreise nur einige Ausläufer vorkamen. Auf einer andern umgepflügten Haidefläche konnte man an den weisslichen, von der Luft ausgeblichenen Wurzeln diese Kreise schon aus einiger Entfernung wahrnehmen. *Lyc. Cham.* ist bisher in unserer Provinz sehr selten gefunden. — Aus den zahlreichen Seen jener Gegend: *Cladium Mariscus R. Br.* (Westende des weissen Sees.) *Litorella lacustris L., Lobelia Dortmanna L., Isoëtes lacustris L.* und im Wooksee daselbst sogar *Isoëtes echinospora Dur.* Letztere fand ich in diesem See bereits im

Juli 1878, hielt sie indess für eine etwas abweichende Form von *I. lac.*, bis Herr Prof. Caspary-Königsberg etwa 14 Tage später bei Gelegenheit seiner Untersuchung der Seen im Carthauser und Neustädter Kreise, die im Wooksee vorkommende *Isoëtes* als *I. echinospora Dur.* neu für unsere Provinz, feststellte.

Aus dem vorigen Jahre (1879) habe ich

einen zweiten Standort von *Isoëtes echinospora Dur.* in Westpreussen zu verzeichnen. (vergl. Bot. V. d. Prov. Brandenburg) Jahrgang XXI. 1879. Abhandlung S. 171.

Am 2. August jenes Jahres fand ich im Karpionkisee bei Wahlendorf Kr. Neustadt eine *Isoëtes*, welche auf den ersten Blick grosse Aehnlichkeit mit der 1877 im Wooksee aufgefundenen *Isoëtes ech.* hatte, sich von dieser indess durch ein lebhafteres Grün, selbst in getrocknetem Zustande, durch bedeutend dickere Formen (in ähnlicher Weise, wie die kurzblättrigen Formen der *Isoëtes lac.* von der Normalform), durch mehr sichelförmige Blätter und dadurch, dass sie nicht gesellig wie jene vorkommt, unterscheidet; in dieser Hinsicht weicht sie mehr von der *Isoëtes lac.* ab, als die *Isoëtes ech.* des Wooksees. Herr Prof. Ascherson-Berlin, dem ich Exemplare übermittelte, und auch Herr Dr. von Klinggraeff halten sie indess für zu dieser Art gehörig, und mögen die Unterschiede von der Beschaffenheit des Seegrundes, welcher an der Fundstelle im Karpionkisee aus feinem, weissem Sande besteht, während der Sand auf dem Grunde des Wooksees an dem Standorte von *I. ech.* stark mit Torf gemischt ist, herrühren. Die Pflanze findet sich in der Südecke des Karpionkisees in einer Tiefe von 1—2 Fuss in Begleitung von *Isoëtes lacustris*, welche bedeutend tiefer in den See geht, *Litorella lacustris*, *Lobelia Dortmanna*, *Juncus supinus Mnch.*, *Nuphar luteum Sm.* Sie scheint auf eine verhältnissmässig kleine Stelle beschränkt zu sein, da Prof. Caspary-Königsberg, der den Karpionkisee am 8. August 1877 untersuchte, in seinem Bericht (vergl. Verhandl. des preuss. bot. V. Jahrg. 1877) zwar eine Reihe von Pflanzen, aber nicht *I. ech.* aus diesem See erwähnt hat. — Ferner *Erica Tetralix L.* an Torfbrüchen, auf torfigen Haiden zml. häufig; *Carlina acaulis L* auf steinigen Haiden und Anhöhen; *Galium boreale L*, *Potentilla norwegica L* (Dorfstrasse und Ufer des Dorfsees.) *Hypericum humifusum L* (auf Brachen sehr häufig); *Gypsophila fastigiata L* (auf sonnigen Hügeln in Schonungen); *Scirpus setaceus* (sandige Ufer der Seen.)

10. Eine Reihe verschiedenster, höchst interessanter Gegenstände berührte Herr Rittergutsbesitzer Treichel-Hoch-Paleschken. Ueber dieselben verweisen wir auf die im Anhange abgedruckten „botanischen Notizen."

11. Herr Schultze hatte Pflanzen aus dem Carthauser Kreise zur Vertheilung geschickt. Den Bericht über seine im Carthauser Kreise veranstalteten botanischen Exkursionen s. später.

Ein Brief von Hrn. Apotheker Ludwig-Christburg, worin jener Bericht erstattet über eine Reihe in der Umgebung von Christburg vorkommender Pflanzen, kam leider erst nach Schluss der Versammlung in die Hände des Vorstandes.

12. Herr Gymnasial-Oberlehrer Barthel, der leider durch einen schweren Trauerfall in seiner Familie am Erscheinen in der Versammlung verhindert war, sandte nachfolgende Pflanzen aus der Umgegend von Neustadt zur Vertheilung:

Seltener vorkommende Pflanzen.

1. *Hippuris vulgaris* an zwei Stellen a. St. zahlreich.
2. *Veronica montana* am Garnierberge.
3. *Pinguicula vulgaris* 2 Stell. häufig gegenüber Schmechau auf einer Torfwiese.
4. *Circaea lutetiana* u. *alpina*, letzteres häufiger.
5. Sämmtliche bekannten *Lysimachia*-Arten.
6. Von *Campanula*-Arten auch *C. latifolia*, *glomerata* u. *Cervicaria*.
7. *Gentiana campestris*, Kedronthal, am St. häufig.
8. Von den Veilchenarten auch *V. mirabilis*.
9. *Hydrocotyle vulgaris* häufig.
10. *Drosera rotundifolia* u. *longifolia*, letztere seltener.
11. *Erica Tetralix* 1 Stelle im Kedronthale a. St. nicht häufig.
12. Sämmtliche *Vaccinium*-Arten.
13. Sämmtliche *Polygonum*-Arten.
14. *Paris quadrifolia* Kedronthal.
15. *Arctostaphylus uva ursi* zahlreich in Schonungen.
16. Unter den *Potentilla*-Arten auch *P. norwegica*.
17. *Ranunculus*-Arten auch *divaricatus*, *aquatilis* u. *R. cassubicus*, Kedronthal.
18. *Anemone vernalis*. Auf beiden Bergzügen.
19. *Stachys*-Arten *annua* u. *arvensis*.
20. *Corydalis fabacea* an mehreren Stellen.
21. *Vicia lathyroides*, *cassubica*.
22. *Mercurialis perennis* u. *annua*, ersteres zahlreich.
23. *Empetrum nigrum*.

Um $^1/_2$ 2 Uhr endete die Versammlung; um 2 Uhr begann ein heiteres, durch vielfache Toaste gewürztes, gemeinschaftliches Mittagessen. Um 4 Uhr — mittlerweile war das Wetter, wenn auch kalt, doch klar geworden — wanderte die Gesellschaft über die reizenden Partien des Himmelfahrtsberges, vorüber an den weithin bekannten wunderbaren Eichen, aus deren Umarmung eine Buche entsprossen, nach dem Schützengarten, wo noch ein paar Stunden in geselliger Weise fröhlich verbracht wurden.

Viele Theilnehmer rief die Pflicht am nächsten Morgen schon zu ihren Berufsgeschäften zurück, während andere noch den Vormittag zu einer Exkursion in das pflanzenreiche Kedronthal benutzten.*) Wir alle aber schieden befriedigt und dankerfüllt aus dem schönen Neustadt, mit einem „Auf Wiedersehn in Elbing!“

---

* Ueber eine solche berichtet Herr Dr. v. Klinggräff in folgendem:

Durch die interessante Gegend angezogen, blieb ich nach unserer Pfingstversammlung noch einen Tag in Neustadt, um einige Bekanntschaft mit ihrer

Flora zu machen. Viel war bei der noch so wenig entwickelten Vegetation natürlich nicht zu erwarten, doch ward ich durch manche Eigenthümlichkeit überrascht, z. B. durch das gänzliche Fehlen der sonst so allgemeinen Ajuga reptans, das auch Caspary bemerkt, während die anderwärts so seltene Ajuga pyramidalis hier sehr häufig war. Ferner durch das zahlreiche Auftreten von Ribes rubrum im Kedron-Thal; anderwärts habe ich diesen Strauch nur immer ganz vereinzelt angetroffen, so dass ich ihn als nur zufällig verschleppt hätte ansehen mögen. Als neu für die Neustädter Flora glaube ich die von mir auf den Kedron-Wiesen gefundenen *Polygala amara* ansehen zu können, wenigstens finde ich sie von Herweg nicht angeführt. In der Nähe dieser Pflanze erfreute ich mich auch an dem Anblick des schönen *Ranunculus cassubicus*, der im Innern der Provinz sehr selten und in den meisten Gegenden wohl ganz fehlt.

Eine reiche Beute hätten bei längerem Verweilen sicher die Moose geliefert. Die schönen Bergwälder, Gewässer und Brüche beherbergen deren gewiss eine grosse Zahl, und wenn ein dort weilender Botaniker sich ihrer Erforschung widmen wollte, so könnte ich ihn einer lohnenden Erndte versichern. Zahlreich fand ich in den Wäldern das Unterholz mit *Antitrichia curtipendula* bedeckt; im Kedron-Bache fluthete an Erlenwurzeln *Hypnum napaeum Limpricht*, *Rhynchostegium rusciforme var. prolixum Br. eur.*, beide neu für die Provinz und *Fontinalis gracilis* Lindbg., letztere auch an grossen Steinen in der Rheda. Schön fructifizirend fand ich Jungermannia *crenulata*, *Blepharostoma trichophylla*, *Scapania curta*, *Bryum turbinatum* und *pallens*. *Webera annotina* und *cruda*.

Nur ungern trennte ich mich von der schönen Gegend, hoffe sie aber vielleicht künftig in Hinsicht ihrer Kryptogamenflora noch gründlicher zu erforschen; für die Feststellung ihrer Phanerogamenflora ist wohl hinreichend gesorgt.

v. Klinggraeff.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig

Jahr/Year: 1880-1881

Band/Volume: NF_5_1-2

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Verzeichniss der wichtigeren im August und September 1879 im Kreise Strasburg gefundenen Pflanzen. 312-320