

# Sitzungsberichte

der

mathematisch-naturwissenschaftlichen  
Abteilung

der

**Bayerischen Akademie der Wissenschaften**

zu München

---

1924. Heft II


Juli- bis Dezembersitzung

---

München 1924

Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

in Kommission des G. Franz'schen Verlags (J. Roth)



## Bemerkung zu der Note: Über die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} |P_n(x)|^1$ .

Von **O. Volk** in Kaunas (Litauen).

Vorgelegt von F. Lindemann in der Sitzung am 13. Dezember 1924.

Der Beweis der Divergenz der Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} |P_n(x)|$ , den ich unter Anwendung der Heineschen Formeln für Kugelfunktionen mit Hilfe eines Satzes von Fatou erbrachte<sup>2)</sup>, läßt sich leicht ohne Anwendung dieses Satzes erbringen<sup>3)</sup>.

Wenn nämlich  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(nx+a)|}{\sqrt{n}}$  konvergent wäre, so müßte auch  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(nx+a)}{\sqrt{n}}$  konvergent sein; nun ist:

$$\frac{\cos^2(nx+a)}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2\sqrt{n}} + \frac{\cos 2(nx+a)}{2\sqrt{n}};$$

es müßte also, da  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$  divergent ist, auch  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(nx+a)}{\sqrt{n}}$  divergent sein, was aber für kein  $x$  in  $0 < x < \pi$  der Fall ist. Also ist unsere Annahme ein Widerspruch und die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(nx+a)|}{\sqrt{n}}$$

divergiert. Somit ist auch  $\sum_{n=0}^{\infty} |P_n(x)|$  divergent.

1) Vgl. diese Berichte, Jahrgang 1922, S. 35—38.

2) Aus dem Fatouschen Satze folgt die Divergenz nur für kein zusammenhängendes Intervall; der Fatousche Satz ist nicht ganz korrekt angeführt.

3) Darauf wurde ich fast gleichzeitig von Herrn Prof. Knopp in Königsberg und den Herren Szegö und Schur in Berlin aufmerksam gemacht.

Der Beweis läßt sich aber am einfachsten ohne die Heineschen Formeln direkt in folgender, mir von Herrn Prof. Dr. L. Fejér in Budapest mitgeteilten Weise führen.

Wäre die Reihe für ein bestimmtes  $\vartheta$  ( $x = \cos \vartheta$  gesetzt) konvergent, also:

$$\sum_{n=0}^{\infty} |P_n(\cos \vartheta)| = c,$$

so wäre, da:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2\cos\vartheta z+z^2}} = \frac{1}{\sqrt{(e^{-i\vartheta}-z)(e^{i\vartheta}-z)}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \vartheta) \cdot z^n, \quad (|z| < 1),$$

für  $z = r e^{i\vartheta}$ :

$$\frac{1}{\sqrt{1-r}\sqrt{1-r e^{2i\vartheta}}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} |P_n(\cos \vartheta)| r^n \leq c, \quad (r < 1),$$

also:

$$\frac{1}{\sqrt{1-r}\sqrt{1-r e^{2i\vartheta}}} < c,$$

oder:

$$\frac{1}{\sqrt{1-r}} < 2c,$$

was aber offenbar nicht für jedes  $r < 1$  stattfindet.

Es wäre also die Erzeugungsfunktion

$$\frac{1}{\sqrt{1-2\cos\vartheta z+z^2}}$$

für  $|z| \leq 1$  beschränkt, was aber offenbar nicht stattfindet<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Ein ähnlicher, aber etwas komplizierter Beweis, der von der Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} P_n^2(x) \leq \sum_{n=0}^{\infty} |P_n(x)|$  (wegen  $|P_n(x)| \leq 1$ ) ausgeht, wurde mir von Herrn Szegő mitgeteilt. Herr Szegő gibt auch den asymptotischen Wert der Summe  $\sum_{n=0}^N |P_n(x)|$  ( $-1 \leq x < 1$ ) für große Werte von  $N$  an, und zeigt, daß ist:  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^N |P_n(x)| = \frac{2^{\frac{3}{2}}}{\pi^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , wenn  $\vartheta$  ( $x = \cos \vartheta$ ) mit  $\pi$  inkommensurabel ist; eine ähnliche Formel gilt für die anderen  $x$ .

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [1924](#)

Autor(en)/Author(s): Volk Otto

Artikel/Article: [Über die Reihe \[Unendlichkeitszeichen\] \[Summenzeichen\]  \$n=0\$   \$P\_n\(x\)\$ . Bemerkung zu der Note 195-196](#)