

hat, bestimmt das Buch für Schüler, also für Anfänger in der Coleopterologie. Er nimmt mit Recht an, „dass es in jeder Klasse einige Schüler geben wird, die, wenn sie im Pflanzenbestimmen einige Fertigkeit erlangt haben, nur angeregt zu werden brauchen, um für sich allein das Bestimmen der Käfer mit Lust und Liebe zu betreiben.“

Die Anordnung der Familien, Gattungen und Arten folgt, von Unwesentlichem abgesehen, Seidlitz' Fauna Baltica (1891). Den Bestimmungstabellen gehen einige Fingerzeige für das Fangen, Tödten und Aufbewahren der Käfer voraus. Das Büchlein enthält zwei hübsch gezeichnete Tafeln, welche in einfachen Umrisszeichnungen die vorkommenden Fachausdrücke klarmachen. Die saubere Ausstattung, der korrekte Druck und der mässige Preis lassen das Buch für genannten Zweck als recht empfehlenswerth erscheinen.

K. Manger.

Am 21. II 96 entwickelte sich bei mir nach 4wöchentlicher normaler Zimmerbehandlung ein grosses normal scharf und schön gezeichnetes ♂ von *Smerinth. tiliae*, jedoch ist das Thier mit einer genauen Linie (durch Kopf, Thorax und Hinterleib gehend) rechts und links vollständig *farbig getrennt* gezeichnet. Rechts das am häufigsten vorkommende grüne *tiliae* ♂, die rechte Hälfte von Kopf, Thorax und Leib ebenfalls grün. Links *ab. brunea*, ebenfalls Kopf, Thorax und Hinterleib sammt Ober- und Unterflügel. Die Puppe ist ausgegraben, nicht im Zimmer erzogen worden. Es wäre interessant zu hören ob eine solche Beobachtung schon gemacht wurde. Theodor Angele.

Briefkasten der Redaktion.

Herrn G. H. in C. Bis April 1896 ist bezahlt, d. h. 1 Mk. mehr, also sind bis April 1897 noch 7 Mk. zu entrichten.

Herrn K. F. in B. Danke verbindlichst für das Uebersandte.

Herrn F. H. in L. Es freut mich zu hören, dass Sie mit Ihrer Zucht ein so gutes Resultat erzielt haben. Den Aufsätzen sehe ich mit Vergnügen entgegen.

Herrn W. O. in B. Sie werden die Puppen zu feucht gehalten haben; es genügt vollständig, wenn Sie dieselben alle 3—4 Wochen mässig mit der Brause spritzen. Was das Inserat anbetrifft, so würde ich Ihnen rathen, damit noch 4 Wochen zu warten.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn F. Wickham ging als Geschenk ein:
The Coleoptera of Canada.

XIV. The Meloidae of Ontario and Quebec.

Der Empfang wird dankend bestätigt

M. Rühl.

Domizilwechsel.

Herr Dr. von Seidlitz wehnt nun in München, Schellingstr. 70.

Herr Frank Bromilow in Bournemouth, „Grianan“, Princess Road.

Dem freundlichen Vorschlag betreffs Schriftenaustausch mit der Wiener entomolog. Zeitung wurde mit Vergnügen entsprochen.
M. Rühl.

Anzeigen.

Bedeutend ermässigte Preise.

Nur vorjährige Entwicklungsstadien von Käfern, sehr gut präparirt, voll, weiss und fest, in starkem Spiritus. Preise in Pfenuigen. Puppen-(Nymphen) P, Larven-L. 100 L. *Melolontha vulgaris* à 25, 200 L. gross und klein à 10 und 5, 30 halb fertige Käfer à 30, 200 P. *Rhizotrogus solstitialis* 7, 50 L. à 7, 30 halb fertige Käfer à 10, 30 P. *Anomala Frischii* à 8, 150 P. *Phyllop. horticola* à 7, 100 L. gr. u. kl. *Cetonia metallica* à 7, 50 P. à 15, 30 *Cocons* à 25, 100 P. *Ergates faber* 9—10 cm. lang à 25, 30 L. gr. u. kl. bis 10 cm. à 20, *Prionus coriarius* 10 P. à 12, von *Rhagium* 200 L. gr. u. kl. à 7 u. 5, 100 L. *Aromia moschata* à 10, 30 P. *Buprestis mariana* à 30, 200 L. gr. u. kl. bis 9 cm. lang à 10 u. 5, 50 L. *Dytiscus marginalis* à 7, 50 Eier *Dytiscus latissimus* 5, 10 P. *Acilius sulcatus* à 10, 40 L. *Dorcus parallelepipedus* à 10, 200 L. *Spond. buprestoides* gr. u. kl. à 7 u. 5, 15 P. *Elater sanguineus*, à 10, 250 P. *Elateriden*, *Corymbites* und *Agriotes* à 5, 20 P. *Hyl. abietis* à 8, 30 L. *Pissodes pini* à 15, 30 L. *Pyrochroa coccinea* à 15, 30 L. *Sirex gigas* à 15, 1 halb fert. Wespe 20, 30 P. von gr. roth. *Leptura* à 15, nicht genau bestimmte L. von *Zabrus gibbus*, *Aphodius fossor*, *Chrysomeliden* und viele andere unbestimmte gr. u. kl. Bei Abnahme von je 100 gemischt à Stück 2—3 Pfg., auch seltene darunter. Viele schöne, lehrreiche Frassstücke, einige Puppenwiegen von *Ergates faber*, *Buprest. mariana*, *Rüssel- und Borkenkäfer* von 3 Mk. ab. *Blindschleichen*, *Molche*, *Eidechsen*, *höckrige Kröten*, *Maulwurfs- und schwarze Grillen*, *Schrecken*, *Tausendfüsse*, grössere *Waldspinnen*, 3 *Ameisenlöwen*, *Nepa cinerea*, *Notonecta glauca*, *Rhantra linearis*, *Apus cancriformis*, 50 gr. L. *Necrodes littoralis* à 15, gut erkennbare Embryonen von Reh und Hirsch, 1 Fliege von *Oestrus ovis*, L. von *Oestrus bovis* (*cervus*) grosse Vorräthe von westpr. Käfern, rein, frisch, ungenadelt aus Spiritus, *Ergates faber* gr. à 30, auch ♂, kl. à 20, 300 *Procrustes coriarius* à 7, solche mit erkennbaren Rippen à 10, 300 *Megad. marginalis* à 7, 300 *Carabus violaceus*, 300 *arvensis* in vielen Varietäten, 300 *nemoralis*, je 100 à 2, einzelne 3, 300 *hortensis*, 100 *granulatus* à 4 und 3, 50 *glabratus* 4, *convexus* 6, 10 *Sphodr. leucopht.* à 15, 15 *Brosicus cephalotes* à 6, 10 *Bleth. multipunctata* à 10, 5 *Chlaenius sulcicollis* à 50, 5 *tristis* à 10. (Fortsetz. folgt) von Mülverstedt, Rosenberg, W.-Preussen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Briefkasten der Redaktion. 182](#)