

Societas entomologica.

„Societas Entomologica“ gegründet 1886 von Fritz Rühl, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausgezeichneter Fachmänner.

Journal de la Société entomologique internationale.

Organ für den internationalen Entomologenverein.

Organ for the International-Entomological Society.

Toutes les correspondances devront être adressées aux héritiers de Mr. Fritz Rühl à Zurich-Hottingen. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Alle Zuschriften an den Verein sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich-Hottingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins werden freundlichst ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

All letters for the Society are to be directed to Mr. Fritz Rühl's inheritors at Zürich-Hottingen. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. = 5 R. = 8 Mk. — Die Mitglieder geniessen das Recht, alle an Entomologie Bezug nehmenden Annoncen einmal kostenfrei zu inseriren. Wiederholungen des gleichen Inserates werden mit 10 Cts. = 8 Pfg. per 4 mal gespaltene Petitzeile berechnet. — Für Nichtmitglieder beträgt der Insertionspreis per 4 mal gespaltene Petitzeile 25 Cts. = 20 Pfg. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.). — Mit und nach dem 1. Oktober eintretende neue Mitglieder bezahlen, unter portofreiem Nachbezug der Nummern des Winterhalbjahres nur die Hälfte des Jahresbeitrages.

Neuere Beobachtungen über die Käferfauna der Bucovina.¹⁾

Von Constantin v. Hormuzaki.

(Schluss.)

Carabidae.

Agonum gracilipes Duft. Czernowitz; im April und Mai 1894 und 1895 unter morschen Holz- und Rindenstücken, in schattigen Gebüsch, sehr häufig.

Clibanarius dorsalis Pont. Czernowitz, an gleichen Stellen, bis Ende Juni, besonders in diesem Jahre (1895) gemein.

Pterostichus (Argutor) *diligens* Sturm, Dorna²⁾ auf Torfmooren im Thale des gleichnamigen Flusses.

Pt. hungaricus Dej. Czernowitz im Frühling an feuchten schattigen Stellen, unter morschem Holz nicht selten. (Ungarn, Siebenbürgen).³⁾

Pt. Fendeli Dej. Dorna, im Mai und Juni, auf Bergwiesen und im Thale des Dornaflusses (Banat, Siebenbürgen).

¹⁾ Diese Aufzählung enthält auch die von mir im Jahre 1895 aufgefundenen, für die Bukovina neuen Arten

²⁾ Eine genaue Beschreibung der klimatischen Regionen und Standorte innerhalb der Bukovina ist in den von mir veröffentlichten „Untersuchungen“ über die Lepidopterenfauna der Bukovina, 1894 (R. Friedländer & Sohn, Berlin) enthalten.

³⁾ Unter den bukoviner Käfern fällt (ebenso wie bei den Pflanzen) das Vorkommen von lokalen, ferner von mediterranen, südrussischen sowie andererseits alpin-borealen Arten viel mehr auf, als unter den Lepidopteren, ganz besonders bei den ungeflügelten Formen (Carabus, Meloë, Dorcadien, viele Curculioniden etc.) Daher füge ich den Arten, deren Verbreitung in der Bukovina von diesem Gesichtspunkte ein gewisses Interesse beanspruchen kann, die Angabe des bisher bekannten Vaterlandes (nach dem Catal. Col. Europe et Caucasi von Reitter III. Aufl.), bei.

Abax striola F. Czernowitz; ein Exemplar unter Steinen am Cecinaberge. Diese Art gehört bei uns, ebenso wie *A. ovalis* Duft zu den grössten Seltenheiten, im Gegensatz zu Westeuropa.

Amara communis Panz. Czernowitz, auf Grasplätzen etc., häufig.

Harpalus rubripes Duft. Dorna auf torfigen Wiesen.

H. luteicornis Duft. Dorna und Czernowitz, selten.

Dytiscidae.

Agabus biguttatus Oliv. Czernowitz, in stehenden Gewässern überall häufig (Südeuropa).

A. bipustulatus L. Czernowitz, ebenso.

A. chalconotus Panz. Czernowitz, in kleinen Teichen am Cicina, selten.

Rantus conspersus Gyll. Czernowitz; Crasna: in stehenden Wasseransammlungen des Seretzelsbaches, häufig: Juni-August.

Hydactilus transversalis Pontopp. Czernowitz; ein Stück in einem Teiche am Cicina.

Staphylinidae.

Dinaraea angustula Gyll. Czernowitz, Ende Mai in morschen Holzstücken.

Aloconota gregaria Er. Czernowitz, unter morscher Baumrinde, an feuchten Stellen etc., im Mai.

Bolitochara bella Märk. Czernowitz, Anfang Mai an feuchten morschen Holzstücken, häufig.

Emus hirtus L. Czernowitz, auf Hutweiden, selten.

Ocyopus nitens Schrank. Czernowitz; Ende Mai unter morschen Brettern.

Philonthus immundus Gyll. Czernowitz, Anfang Mai.

Scopaeus minimus Er. Czernowitz und Crasna, an Bachufern.

Micropeplidae.

Micropeplus porcatus Payk. Czernowitz, im März und April in feuchtem, modernem Holze mit *Euplectus Karsteni*, *Trimium brevicorne* u. a.

Silphidae.

Aclypaea undata Müll. Dorna, auf Wiesen nicht selten, Anfang Juni.

Ptomophagus ruthenus Reitter). Die von Herrn Reitter unter diesem Namen beschriebene neue Art erhielt derselbe, nach brieflicher Mittheilung, aus der Bukovina, ohne nähere Fundortangabe. Sonst noch nirgends beobachtet; auch ich konnte die Art bisher noch nicht auffinden.

Anisotomidae.

Agathidium laevigatum Er. Czernowitz; ein Stück am 22. Mai an frisch gefälltem Holze.

Trichopterygidae.

Trichopteryx intermedia Gillm. Czernowitz; Anfang April unter abgefallenem Laube.

Tr. fascicularis Herbst. Czernowitz, ebenso.

Endomychidae.

Mycetaea hirta Marsh. Czernowitz; 9. April ein Stück unter abgefallenem Laube.

Nitidulidae.

Meligethes obscurus Er. Czernowitz, im März unter Laub.

Cryptarcha strigata F. Czernowitz, Ende August an getrockneten Apfelschnitten (Köderkränzen).

Histeridae.

Hololepta plana Füssly. Czernowitz, vereinzelt im Mai.

Platysoma compressum Herbst. Czernowitz, ein Stück, 22. Mai, an Baumrinde.

Onthophilus striatus Forst. Czernowitz, Anfang April unter Laub.

Scarabaeidae.

Aphodius var. *nigripes* F. Czernowitz, häufiger als die Stammform *lurida* F.

(*Rhizotrogus pilicollis* Krym), in den Entom. Nachr. 1888 von mir als bei Czernowitz gefunden erwähnt, kommt hier nicht vor. Die betreffenden Stücke sind *Rh. assimilis* Herbst.

Anomala vitis F. Ein einfarbig grünes Stück bei Czernowitz im Juni erbeutet; scheint hier sehr selten zu sein, (*Oxythyrea cinctella* Schaum), bisher ebenfalls nicht in der Bukovina constatirt; die unter diesem Namen angeführte Art ist bloß eine variirende *O. stictica* L.

Buprestidae.

Agilus mendax Mannerh. Czernowitz, an Sträuchern im Juni selten.

Elateridae.

Elater balteatus L. Dorna, auf Wiesen im Juni.

E. nigrinus Payk. Dorna, ebenso.

E. nigerrimus Lac. Dorna, ebenso.

Corymbites szaealandicus Müll. Die Stammform in Crasna vereinzelt im Juni; bei Dorna sehr häufig, ebenso auch var. *assimilis* Gyll.

Cor. aeneus var. *coeruleus* Schilsky. Czernowitz; ein Stück am Cecinaberger.

Cantharidae.

Lampyrus noctiluca L. Die Thiere, welche ich früher in Anzahl in Crasna sammelte, und für Larven und ♂ dieser Art hielt, sind nach Dr. Reitter Larven von *Phosphaenus hemipterus* Goeze. Sie sind oberseits schwarz und besitzen am Hinterleibsende zwei Leuchtkörper, welche im Dunkeln einen ebenso hellen Schimmer verbreiten, wie dies bei den Lampyrisarten der Fall ist.

Von *Lampyrus noctiluca* L. fand ich hingegen ein ♂. Anfang Juli 1894 in Crasna, wo die Art also jedenfalls äusserst selten ist. Bei Czernowitz scheint sie ganz zu fehlen.

Phosphaenus hemipterus Goeze. Crasna wie oben.

Cantharis (*Telephorus*) *pellucida* F. Czernowitz, im Mai und Juni höchst gemein; in den früheren Verzeichnissen bloß übersehen.

C. assimilis Payk. var. *montana* Stierl. Dorna, auf torfigen Wiesen.

Malthesodes trifurcatus Kiesw. Czernowitz, im Mai in Gebüschen. Sonst in den Alpen, somit abermals ein Beweis des Vorkommens von Gebirgsbewohnern in unserem Tieflande.

Alleculidae.

Gonodera (*Cistela* F.) *murina* L. Dorna, ein Exemplar auf den Torfmooren im Thale des Dornaflusses.

Meloidae.

Meloë decorus Brandt. Bei Czernowitz im April gemein, und hier die häufigste Art dieser Gattung. Früher (Ent. Nachr. 1888) als *Meloë scabrisculus* Brandt angeführt, was somit zu streichen wäre.

M. cicatricosus Leach. Czernowitz, vereinzelt auf Grasplätzen im April (Südeuropa).

Oedemeridae.

Nacertes fulvicollis Scop. Crasna, auf Wiesen im Juli nicht selten.

Curculionidae.

Otiorrhynchus fuscipes Ol. var. *fagi* Gyll. Dorna, auf Torfmooren im gleichnamigen Thale, Mai, Juni (Gebirge Mitteleuropas).

O. paucillus Rosh. Dorna, ein Stück mit der vorigen Art (Frankreich, Tirol, Schweiz, Siebenbürgen, also ebenfalls mehr im Gebirge).

Polydorus sericeus Schall. Czernowitz; ein Stück am Cecinaberge.

Omas Hanaki Friv. Czernowitz, 1894, besonders aber 1895 im Frühling. Mai bis Mitte Juni häufig, und zwar an der Unterseite morscher, feuchter Holzstücke, die an tief schattigen Stellen an der Erde lagen, zuweilen sehr zahlreich nebeneinander (Ungarn, Siebenbürgen).

Thylacites pilosus F. Czernowitz, am Cecina ein Exemplar im Mai.

Tanyecmus palliatus F. Czernowitz, mehrere Stücke am Cecina.

Cleonus nigrosuturatus Goeze. Czernowitz, auf Grasplätzen einzeln und selten.

Cl. alternans Herbst. Czernowitz, am Cecina im Juni, nicht selten.

Lixus cylindricus F. Czernowitz, auf Wiesen, selten im Mai.

L. myagri Oliv. Czernowitz, wie der vorige.

L. algerus L. Czernowitz, Cecina, mehrere Stücke.

L. elongatus Goeze Czernowitz, am Cecina, 1 Stück im Juni.

Larinus turbinatus Gyll. Crasna, auf Wiesen im Juli und August (Südeuropa: auch bei Dulcești in Rumänien fand ich die Art Ende September 1895).

L. sturnus Schall. Ueberall verbreitet, bis in's Hochgebirge; Czernowitz, Crasna, Dorna etc.

L. jaceae F. nicht bei Czernowitz, wie ich in den Ent. Nachr. 1888 angab, wohl aber in Crasna, auf Wiesen, selten.

L. planus F. Czernowitz, auf Wiesen am Cecina.

Plinthus (Neoplinthus Bedel) *tigratus* Rossi, var. *porcatus* Pnz. Czernowitz unter Steinen am Cecinaberge.

Hypera cornata Boh. Dorna, auf torfigen Wiesen im Juni.

H. murina F. Czernowitz, im Frühling an Mauern etc.

Doryctonus longimanus Forst var. *ventralis* Steph. Czernowitz im März unter abgefallenem Laube, gleichzeitig mit *D. Dejeani* Faust (*costirostris* Gyll.).

D. salicis Walton, Crasna (August) und Dorna (Juni) an Weidenstämmen.

Dryophthorus lymexylon F. Crasna, ein Stück im Juni an einer Mauer.

Ceuthorrhynchus assimilis Payk. Czernowitz, im März unter abgefallenem Laube.

Limnobaris T. album L. Dorna, auf Torfmooren. *Sphenophorus stralopunctatus* Goeze. Czernowitz, am Cecina nicht selten.

Balaninus peltatus Boh. Czernowitz, ein Stück am Cecina.

Anthribidae.

Tropideres niveirostris F. Czernowitz, 9. Mai 1895, ein Stück am gefälltem Holze.

Scolytidae.

Tomicus amittinus Eichh. Dorna, in Fichtenwäldern (Gebirge Mittel- und Südeuropas).

Cerambycidae.

Rhagium indagator F. Czernowitz, in Laubwäldern am Cecina, mehrere Stücke.

Gaurotes virginea L. Die Form mit schwarzbraunem Halsschild, var. *nigricollis* Bielz (Seidlitz Fauna transsylv. Seite 836) ebenso zahlreich als die typische, auf subalpinen Wiesen um Dorna etc.

Pidonia lurida F. var. *Ganglbaueri* Ormay. erhielt ich in einem Stücke aus Lopuschna (in der montanen Region der Karpathen, am Serethflusse gelegen). Gebirge Mitteleuropas.

Exocentrus Stierlini Ganglb. Czernowitz, im Mai und Juni an gefälltem Holze etc. (Oesterreich, Mähren).

Chrysomelidae.

Crioceris lilii Scop. Czernowitz, gemein; bisher übersehen.

Coptocephala scopolina L. Czernowitz und Crasna, an Sträuchern; selten.

Chrysomela rufa Duft. Dorna, auf Bergwiesen im Juni.

Phytodecta viminalis L. var. *Baaderi* Pnz. Dorna, häufig im Mai und Juni an Weidenbüschen.

Ph. linneana Schrk. Dorna, mit der Vorigen aber selten; nur in der Form var. *nigricollis* Westh.

Melasoma cupreum F. Dorna, auf Weidenbüschen im Juni sehr zahlreich.

Lachmaea crataegi Forst. Czernowitz, 11. Mai an Spiräenblüthen ein Stück mit schwarzbraunen, rothbraun gerandeten Flügeldecken.

Gallerucella xanthomelaena Schrk. Czernowitz, 9. Mai, an jungen Ulmen ein Stück.

Cassida canaliculata Laich. Czernowitz, am Cecina auf Wiesen im Juni, selten.

C. vibex L. v. *pannonica* Suffr. Czernowitz, mit der Stammart häufig.

Coccinellidae.

Scymnus suturalis Thnb. Dorna, auf torfigen Wiesen, im Juni.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Hormuzaki Konstantin (=Constantin) Freiherr von

Artikel/Article: [Neuere Beobachtungen über die Käferfauna der Bucovina. 17-19](#)