

Societas entomologica.

375

„Societas Entomologica“ gegründet 1886 von Fritz Rühl fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausgezeichneten Fachmänner.

Journal de la Société entomologique internationale.

Toutes les correspondances devront être adressées aux héritiers de Mr. Fritz Rühl à Zurich-Hottingen. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. = 5 fl. = 8 Mk. — Die Mitglieder genießen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen kostenfrei zu inserieren. Wiederholungen des gleichen Inserates werden mit 10 Cts. = 8 Pfennig, per 4 mal gespaltene Pettzeile berechnet. — Für Nichtmitglieder beträgt der Inseratspreis per 4 mal gespaltene Pettzeile 25 Pts. = 20 Pfg. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.). — Mit und nach dem 1. Oktober eintretende neue Mitglieder bezahlen, unter porto freiem Nachbezug der Nummern des Winterhalbjahres nur die Hälfte des Jahresbeitrages.

Organ für den internationalen Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich-Hottingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins werden freundlichst ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr. Fritz Rühl's Inheritors at Zürich-Hottingen. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

Notes sur la chasse aux Lépidoptères en Sardaigne.

La Sardaigne est pauvre en insectes, pauvreté rachetée par quelques espèces et variétés spéciales, je ne m'occuperai que de celles-ci et des espèces méridionales qui valent la peine d'être mentionnées.

Le *Papilio hospiton* aujourd'hui localisé dans le sud de la Sardaigne paraît en avril, on trouve les premières chenilles sur la fêrle à la fin de mai, elles atteignent tout leur développement en 12 ou 15 jours, pour celles que l'on élève il est important de disposer les caisses de manière à ce que les chrysalides puissent en être enlevées restant suspendues sur leurs supports naturels, afin d'éviter nombre d'avortements lors de l'éclosion.

Anthocharis tagis var. *insularis* bien que se rencontrant un peu partout il n'est pas commun, on le prend au bord de mer en avril, en mai sur les coteaux à 500 ou 600 mètres d'altitude et en juin dans les montagnes.

Rhodocera cleopatra est une espèce assez commune en mai et juin, suivant l'alt. partout où se trouve l'arbuste dont la chenille se nourrit.

Charaxes jasius je crois que sa grande rareté dans un pays où l'arbusier, de la feuille duquel se nourrit la chenille est commun, doit être attribué aux incendies qui périodiquement dévastent d'immenses extensions de broussailles.

Vanessa urticae var. *Jchnusa* rare dans les plaines, plus commun sur les montagnes intermédiaires, la chenille vit en avril autour des mûrs

des bergeries sur l'ortie corse (*Urtica corsica*), l'insecte se prend sur les fleurs en mai et juin.

Vanessa Jo var. *sardoa*, cette variété qu'en 1854 Mr. le Dr. Staudinger trouvait en nombre à 20 kilomètres de Sassari se trouve aujourd'hui très rarement, reléguée dans les montagnes du centre de l'île, conséquence du déboisement général, la chenille vit en mai sur les orties, l'éclosion a lieu fin juin.

Argynnis elisa et *paphia* se trouvent rarement fin juin et en juillet dans les localités de la montagne où il reste encore quelques vestiges de forêts, de 700 à 1000 mètres d'altitude.

Satyrus circe en juillet dans l'intérieur de l'île, sur les fleurs de chardon, à l'altitude de 600 à 1000 mètres.

S. Semele var. *aristueus* mêmes localités et époque que le précédent, dans les chemins pierreux, sur les mûrs, les roches et après les troncs des arbres, au moment de la forte chaleur.

Je n'ai pas rencontré en Sard. *S. neomiris* qui n'est pas rare en Corse.

Pararge megera var. *tigellus* se trouve sur les pierres et les roches en avril et mai au bord de la mer, mai et juin sur les montagnes secondaires et en juin et juillet sur les montagnes plus élevées, on le reprend en septembre dans les plaines.

Epinephela nurag montagnes secondaires du centre jusqu'à 1000 m. et plus d'alt., on ne le trouve plus non loin de Sassari à 300 ou 400 m d'alt. où je l'ai capturé en 1877.

Epinephela Ida dans les broussailles et le long des chemins bordés de buissons, en juin et juillet suivant l'altitude.

Cocconympha corinna de 200 à 1500 m. d'alt., mais en bas juin et commencement juillet suivant l'alt., une seconde éclosion a lieu au mois de juillet à Sassari.

Une jolie var. de *var. lyllus* que l'on prend à 1000 m. d'alt. sur le serpolet en fleurs mérite d'être signalée.

Syrichthus sao var. therapne se trouve rarement au printemps en compagnie de nombreux *malvae* sur les mauves.

Deilephila Dahlia la chenille vit sur plusieurs espèces d'euphorbe, du 25 mai au 15 juillet suivant l'alt., l'éclosion de l'insecte a lieu en août et septembre, la seconde apparition des chenilles du 15 septembre aux premiers froids, l'éclosion de ceux-ci a lieu au printemps suivant.

Zygaena corsica se prend sur des plantes basses dans les terrains incultes et pierreux de la plaine fin mai, à 700 ou 800 m. d'alt. fin juin.

Zygacna Sardoia P. Mabille pris 2 types au commencement de mai 1891 sur une plage, il a été retrouvé sur un îlot au sud de la Sardaigne par un Belge, moi je n'ai pu la reprendre.

Je crois avoir nommé tous les Rhopalocères et Sphinges spéciaux, indiqués en Sardaigne et même ceux communs à la Sard. et la Corse, pour les Bombyx, Noctuelles et Géomètres il n'en sera pas ainsi pour des raisons que j'expliquerai ci-après.

Ocnogina corsica, la chenille vit sur les orties le long des murs au premier printemps l'insecte éclos au mois de mars suivant.

Je cite des Noctuelles *Agrotis arenicola* que j'ai pu obtenir après de nombreuses tentatives d'élevages infructueuses, la chenille se trouve au printemps dans les salles de diner au bord de la mer, l'insecte éclos en septembre.

Hypena lividalis tout l'automne à Sassari sur pariétaire, à l'ombre des murs.

Des Géomètres valent la peine d'être signalées.

Eubolia assimilaria sur genêt corse en fleurs au premier printemps.

Cidaria bistrigata en juin dans les montagnes au milieu des fougères, des ronces et autres plantes touffues.

Cidaria cupressata et *rivata* en juin à la montagne.

Eupithecia oxycedrata au bord de la mer en avril, sur le genévrier oxycedre.

Les habitants du pays sont tellement superstitieux ils ont une telle peur des revenants que s'ils voyaient à distance une lanterne se promener la nuit, ils ne manqueraient pas de décharger leurs fusils sur cette lumière errante et qui la porte avant de se sauver, c'est ce qui m'a empêché de faire des choses de nuit et peut-être des découvertes, pour le peu que j'ai chassé à la miellée avec le sugaring de Mr. Alfred Wailly, qui est très bon, j'ai pris entre autres *Mania maura*, *Grammodes algira*, *Coxocampa ephialtes*, *Catocala dilecta*, *promissa*, *conversa* et quantité de vulgarités; mais si cela m'est possible, j'irai l'an prochain dans une propriété réservée pour y faire ce genre de chasse.

Ayant les espèces sous la main je ne m'occupe pas d'accouplements pour en élever les produits; mais comme il serait intéressant de savoir si la loi de nature qui règle la création des sexes chez les vertébrés leur est applicable, je m'en occuperai lorsque j'aurai un moment disponible, on n'aurait plus ainsi comme dans la majeure partie des cas 2 mâles pour une femelle.

Eigentümliche Variationen von *Calymnia Trapezina*.

Von A. Linde

Diese eigentümlichen Variationen wurden von mir am 16. und 29. Juli alten Stiles dieses Jahres auf dem Gute Worontsewo gefangen, das sechs Werst von Moskau liegt und schöne Laubwäldungen besitzt.

Ueberhaupt fing ich in diesem Jahre, an mit Bier und Honig getränkten Schwämmen, in grosser Anzahl *Calymnia trapezina*, die unter sich auffallend variiren. Ueber der Stammform, wie sie bei Kaiser und Hofmann beschrieben, habe ich ganz einfarbige (lederfarben) ohne die sonst vorkommenden schwärzlichen Atome. Die meisten Exemplare sind heller oder dunkler gezeichnet, bald rötlicher, bald grauer, einige mit sehr schwachem, andere dagegen mit sehr dunklem Mittelschatten.

Die eine erbeutete Variation ist aber so abweichend von der Stammform, dass ich zuerst glaubte einen andern Schmetterling gefangen zu haben, und nur nach sorgfältiger Prüfung erkannte ich darin eine *Calymnia trapezina*. Die Grundfarbe ist lehmgrau, dicht schwarz bestäubt, das Mittelfeld tiefschwarz, so dass von den Makeln jegliche Spur fehlt. Ausser-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Notes sur la chasse aux Lépidoptères en Sardaigne. 129-130](#)