

## Neue Raubwanzen.

Vorläufige Diagnosen von G. Breddin, Berlin.

**Pristhesancus aurantiacus** n. spec. — ♂. Von den verwandten Arten durch den merklich kürzeren Kopf und das kürzere 1. Fühlerglied zu unterscheiden. Kopf etwa so lang als das hintere Pronotumfeld, hinter den Augen ziemlich plump. Fühlerglied 1 ein wenig kürzer als das Halsschild und das halbe Schildchen zusammen. Hinterfeld des Pronotums gewölbt (vorn ohne flachen Längseindruck); Hinterecke stumpfwinklig, mit ausitzendem stark abgeschnürten, fast kugeligem Knöpfchen. Hintere Seitenränder des Halsschildes nicht 2-förmig, neben den Hinterecken nur ganz flach und unendlich gebuchtet. Erhebungen des Vorderpronotums stark, nach der Spitze zu allmählich verdickt. Tuberkel des Schildchens kurz zylindrisch, etwa so lang als dick. — Hell orangefarben. Hinterleib schwarz, lebhaft grün-metallisch schimmernd. Die Genitalsegmente weiss-gelb. Länge 20, mit Halbd. 21½ mm. — Holländ. Neu-Guinea (Hattan).

**Pristhesancus modestus** n. spec. — ♂. Körper schmal. Kopf so lang als das Pronotum. 1 Fühlerglied so lang wie Kopf, Pronotum und das halbe Schildchen zusammen. Erhebungen des Vorderpronotums kurz (viel kürzer als die zylindrische Erhebung des Schildchens) und schwach, konisch, mit dünner, leicht vornüber gekrümmter Spitze. Hinterfeld des Halsschildes vorn in der Mitte mit flachem Längseindruck; Hinterecken stumpfwinklig mit wenig verdickter, querer, nicht abgeschnürter Spitze. Hintere Ausenränder fast gerade. — Trübe ockergelblich. Membran, Clavus und die Corümecke schwärzlich; die Endhälfte der Hinter- und Mittelschenkel, die Vorderschienen, der Kopf hinter den Augen oben und Schnabelglied 2 und 3 pechbraun. Oberseite des Kopfes vor den Augen und die Vorderschenkel (bis auf das Basaldrittel) pechschwarz. Das Vorderende und die ganze Unterseite des Kopfes, nebst dem 1. Schnabelglied weisslich-gelb. Das Vorderfeld des Halsschildes, nebst den Seiten der Vorder- und Mittelbrust und den Hüften verwaschen pechbraun. Mittel- und Hinterschienen leicht geschwärzt. Randflecke des Bauches schwärzlich. Fühler pechbraun; Glied 1 rostbraun, die schmale Basis und das Endfünftel, sowie Glied 2 gegen Ende hin schwarzbraun. Länge (mit Halbd.) 16 mm. — Deutsch Neu-Guinea.

## Anzeigen.

## Brasilianische Insekten.

Nachverzichnete brasilianische Schmetterlinge, alle diesjährig ex larva in grösserer Anzahl gezogen, versende zu ¼ Katalogpreisen nach Dr. O. Staudingers Liste von 1896—1897. Bei Bestellung von 10 Mark an franko, jedoch nur gegen Voreinsendung des Betrages in deutschen Reichsmarkschelinen.

*Pieris elodia*, *Catopsilia philea* L., *Catopsilia menippe*, *Danaus* var. *eryppus* Cr., *Mechanites lysimnia* Fab., *Ceratinia euryanassa* Feld., *Heterosais edessa* Hewitt., *Eucides dianasa* Hüb., *Eresia lamsdorfi* God., *Hypanartia lethe* Fab., *Pyraemia myrina* var. *incar.*, *Anartia amalthea* L., *Peridromia amphinome*, *Cathonephele penithia*, *Epiphile oreia* Hüb., *Callicore eliuda* Guén., *Catagramma pygas*, *Gynaecia dirca* L., *Smyrna bloomfieldia* Fab., *Chlorippe kallina* Strg., *Chlorippe vaenna* God., *Chlorippe seraphina* Hüb., *Anaea morpheus* Strg., *Protopogon druryi*, *Siderone ide* Hüb., *Zaretus strigosus*, *Morpho epistrophis* Hüb., *Bassolis astyra* God., *Opsiphanes crameri* Feld., *Dynastor darius* Fab., *Caligo eurylochus* Cr., *Choerocampa chiron* Drury, *Choerocampa ceratonioides*, *Philampelus anchemolus*, *Philampelus labruscae*, *Philampelus linei* Grote, *Pachilia ficus* L., *Dilophonota ello*, *Protoparce rustica* Walk., *Protoparce cingulata* Fab., *Hyperchiria illustris* Walk., *Hyperchiria euryopa* Walk., *Hyperchiria melanops* Walk., *Thysania zenobia* Cr.

Ausserdem bringe noch meine Coleopteren-Centurien à 10 Mark inklusive Porto und Packung in Erinnerung.

J. P. Schmalz, Joinville, Estado St. Catharina, Brazil.

*Nyctalaemon metaurus*; diese prächtig metallgrüne, kupferrot schillernde Uranide gebe zu 3 Mk. per Stück Ia. in Düten ab. Ferner: Eur. *crossida* 1 Mk., Pap. *macleanus* p. 2.50, *Delias mysis* ♂ 1.50, ♀ 2.50, *Delias nigra* ♂ 0.75, ♀ 1.20 Mk.

W. Niepelt, Zirlau b. Freiburg i. Schl.

Recht kräftige ächte Dalmatiner pyri Puppen à Mk. 2 per Dutzend, Sat. *caecigena* (vom Valebit) schlüpft schon im September Mk. 7 per Dutzend. Ferner: Erst geschlüpfte genadelte, ungespannte hera var. *magna* per Dutzend 2 Mk.

A. Spada, Zara (Dalmatien).

Convulvuli und atropos Puppen!  
Ach. atropos 50 Pfg. Falter spannw. 70 Stück  
Sph. convulvuli 25 " " " " 32  
Sat. pavonia Dutzend 1.20 Mk., Stück 12 Pfg.  
Sat. spini " 2.20 " " 20  
Thais polyxena " 1.— " " 10  
Thais cassandra " 2.50 " " 25

Porto und Packung extra.

Ubaldo Dittrich, Vorgartenstr. 209, Mezz. 9, Wien II 8.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Breddin Gustavo

Artikel/Article: [Neue Raubwanzen. 76](#)