

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Hmsl, Linz.

(Fortsetzung.)

95. *aptata* Hb. Juni und Juli. Schoberstein (Hmsl); Herndl, Klaus, Georgenberg (Hauder); Steyr und an der Euns aufwärts (Gross); Weyer (Metzger).
ab. *suplata* Frr. Selten unter der Stammart (Hauder); Dambach, in den Alpen verbreitet (Gross).
96. *olivata* Bkh. Juli, August. Die Raupe überwintert und lebt bis Mai auf Galium, auch auf Fraxinus. Im Innkreis, am Schiltberg (Hmsl); Kremstal (Hauder); um Steyr und in den Alpen nicht selten (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster (Pfeiffer); Umgebung von Wels im Juni selten (Brittinger).
97. *viridaria* F. Juni und Juli. Raupe bis Mai an Galium, Lamium, Rumex. Schiltberg, Diessenleithen (Hmsl); im Kremstal meist selten (Hauder); im Gebirge häufiger als im Flachlande (Gross); Weyer (Metzger); Umgebung von Wels (Brittinger).
98. *turbata* Hb. Auf den Voralpen und höheren Gebirgen im Mai und Juni (Gross).
99. *kollariaria* Hs. Mai und Juni. Falkenmauer (Hauder); Reichraming, Rechgraben, Radmer (Gross). Umgebung vom Attersee.
100. *austriacaria* Hs. Im Spitzenbach, selten (Gross).
101. *aqueata* Hb. Mai bis Juli. Raupe nach der Überwinterung bis Mai an Rubia, Cichorium. Gradenalm (Hauder); in den Alpen sehr verbreitet und nicht selten bis zu 1400 m und höher (Gross); am 12. Juni im Ennstale (Metzger).
102. *salicata* Hb. In zwei Generationen im Mai und wieder im Juli und August. Raupe im Juni und im Herbst an Galium. Am elektr. Licht in Linz (Hmsl); an der Krems und Gradenalm (Hauder); im Gebirge verbreitet (Gross); Weyer (Metzger).
v. *ablutaria* B. Schoberstein (Gross); Weyer (Metzger).
103. *fluctuata* L. In zwei Generationen vom Mai bis August. Raupe im Juni und Herbst an Cardamine und anderen niederen Pflanzen. Nirgends selten.
104. *didymata* L. Juni bis August. Raupe im April, Mai, auch im Juli auf Vaccinium, Lathyrus, Anemone, Anthriscus, Cerastium. Im ganzen Gebiete.
105. *cambria* Curt. Im Juli (Gross).
106. *vespertina* Bkh. Juli, August. Die Raupe im Mai und Juni auf Taraxacum, Prunus. Im ganzen Gebiete verbreitet.
107. *incursata* Hb. Im Juni und Juli am Schoberstein (Gross).
108. *montanata* Schiff. Vom Mai bis August. Raupe überwintert, lebt bis Mai an Rumex, Primula, Geum. Nirgends selten.
109. *suffumata* Hb. April und Mai. Raupe im Juni und Juli an Galium. An der Krems, Herndl, Hirschwaldstein (Hauder); Steyr und im Gebirge nicht häufig (Gross); Pestleithen (Pfeiffer); um Micheldorf selten (Brittinger).
110. *quadrifasciaria* Cl. In zwei Generationen vom Mai bis August. Raupe im April und Juli an Lamium, Primula, Taraxacum, Plantago. Elektr. Licht Linz, Innkreis (Hmsl); Kremstal, meist selten (Hauder); um Steyr nicht häufig (Gross); ein Weibchen am 14. Juni in Weyer (Metzger); Dändlleithen im August (Pfeiffer); Steyr, Gramastetten, Wels im Juni und September (Brittinger).
111. *ferrugata* Cl. Mai, Juni und zweite Generation im August, September. Die Raupe im Juli und im Spätherbst an Daucus, Taraxacum, Alsine, Galium, Asperula und Glechoma hederacea. Nirgends selten.
- ab. *spadicearia* Bkh. Haselgraben, Buchenau etc., in der Umgebung von Linz häufiger als die Stammform (Hmsl); im Kremstal (Hauder).
112. *unidentaria* Hw. Mai, Juni. Raupe im Juli, August. Pöstlingberg, Buchenau (Hmsl); Kremstal (Hauder).
113. *pomoeraria* Ev. April, Mai. Raupe vom Juli bis September an Impatiens noli tangere. Umgebung von Linz (Hmsl); im Gebirge häufiger als in der Ebene (Gross); Kremstal, Gradenalm (Hauder).
gen. aest. *aestiva* Fuchs. Im August bei Linz (Hmsl).
114. *designata* Rott. Im Mai und im August. Raupe im Juni und Juli, dann wieder im Herbst an niederen Pflanzen, auch an Brassica. Bis auf die Vorberge verbreitet, in Gärten nicht selten (Hauder); im Flachlande vereinzelt, im Gebirge verbreitet (Gross); im Gebirge übrigens nur in einer Generation; Weyer (Metzger); Umgebung von Linz (Brittinger).
115. *fluviata* Hb. Ein Exemplar im November und ein Exemplar im April (Gross); Umgebung von Wels in den Sommermonaten (Brittinger).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Himsl Ferdinand

Artikel/Article: [Die Geometriden Oberösterreichs 84](#)