© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

723. Die Schmetterlinge des Lavanttales und der beiden Alpen Kor- und Saualpe. XII. Nachtrag von G. Höfner.
724. Über die Anzahl der Augen auf der Unterseite der Hinterflügel von Epinephele jurtina L. von Prof. P. Bachmetjew.
725. Einmal etwas Nicht-Carabologisches von Paul Born.
726. Zur Variabilität der Flügellänge von Aporia crataegi L. in Sofia (Bulgarien) von P. Bachmetjew.
727. Die Flügellänge von Erebia euryale Esp. 1903 in Sofia von P. Bachmetjew.
728. The Metamorphoses of Aegialites by H. F. Wickham.
729. Die Häutungen der Raupen von Caligula japonica Butler von Friedrich Grusz, jun.
730. Neue und seltene Schmetterlinge der mecklenburgischen Fauna von H. Schröder.
731. Carabus monilis Fabr. und seine Formen von Paul Born.
732. Carabus auronitens Fabr. und punctatoauratus Germ. von Paul Born.
733. Neue Prepona-Formen von H. Fruhstorfer.
734. Caligo eurilochus pallidus nov. subspec. von H. Fruhstorfer.
735. Über die Veränderlichkeit der Anzahl der Augen bei Epinephele jurtina L. in Sofia von Prof. P. Bachmetjew.
736. Zur Frage über die Parthenogenese der männlichen Exemplare des Schmetterlings Epinephele jurtina L. von Prof. P. Bachmetjew.
737. Die Flügellänge von Erebia euryale Esp. 1903 in Sofia von Prof. P. Bachmetjew.
738. Die Flügellänge von Epinephele jurtina L. 1903 in Sofia von Prof. P. Bachmetjew.
739. Ein neuer Ornithoptera. Troides oblongomaculatus hanno nov. subspec. von H. Fruhstorfer.
740. Ein neuer Parnassius. Parnassius delphius dolabella nov. subspec. von H. Fruhstorfer.
741. 33. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde in Österreich ob der Enns zu Linz von Ferd. Himsl.
742. Die Noctuiden der Umgebung von Liestal von J. Seiler.
743. Der Unterschied zwischen Drohnen, welche von der befruchteten und unbefruchteten Königin stammen, vom Standpunkt der analytisch-statistischen Methode aus von Prof. P. Bachmetjew.
744. Ein Versuch, Dierzdzon mit Dickel zu versöhnen von Prof. P. Bachmetjew.
745. Zwei interessante Carabensendungen von Österreich-Ungarn von Paul Born.
746. Die Caraben der Käferfauna der Balkanhalbinsel von Victor Apfelbeck 1904 von Paul Born.
747. Carabus Ullrichi Germ. und italicus Dej. von Paul Born.

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Himsl, Linz.

(Fortsetzung.)

132. picata Hb. Juni und Juli. Kirchdorf, Kremsursprung (Hauder).

133. alaudaria Frr. Mai bis Juli. Die Raupe von Ende Juli an Atrengane alpina. Almkogel, Spitzenbach, Gesäuse (Gross); Hinterstoder, Ennstal (Hauder).

134. albicillata L. Mai bis Juli. Raupe an Rubus vom August an. Im ganzen Gebiete nicht selten.

135. procellata F. Mai bis Juli. Die Raupe im August und September auf Clematis vitalba. In der Umgebung von Linz nicht häufig, im Innkreis selten, Schoberstein (Himsl); im Kremstal auch in höheren Lagen nicht selten (Hauder); im Flachlande und im Gebirge Ende April bis August gemein (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster (Pfeiffer); Linz, Wels, Steyr im Mai selten (Brittinger).

136. lugubrata Stgr. Mai und Juni. Raupe im Juli und Oktober an Epilobium montanum und angustifolium. Ein Exemplar oberhalb Krehleiten, ein zweites auf dem Wege zur Gradenalm (Hauder); Damberg und Schoberstein, vereinzelt (Gross).

137. hastata L. Im Mai und Juni. Die Raupe vom Juli bis September auf Betula. Pöstlingberg, Pfenningberg, ziemlich selten (Himsl); Buchenhain, Georgenhain, Herndl, Gradenalm (Hauder). Um Steyr in Wäldern, nicht gerade häufig (Gross); Kremsmünster (Pfeiffer); Wels, Linz, nicht selten (Brittinger).

v. subhastata Nolck. Juni, Juli. Raupe bis September an Salix, Vaccinium uliginosum. Selten in höheren Lagen (Hauder); Warscheneck (Gross).

138. tristata L. Vom Mai bis August in zwei Generationen. Raupe im Juni und Herbst an Galium. Schiltenberg, Pöstlingberg (Himsl); Kremstal, nicht selten (Hauder); im Flachlande sehr selten, dagegen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

im Gebirge sehr häufig, (Gross); Weyer, im Juli (Metzger); Steyr, Wels, Gramastetten, nicht selten (Brittinger).

139. luctuata Hb. Im Mai, Juni und in zweiter Generation im August. Die Raupe im Juli, und wieder im Herbste an Galium. Schiltenberg, Welser-Haide (Himsl); Kremstal, nicht selten, (Hauder); Weyer (Metzger); um Steyr einzeln, auch im Gebirge nicht häufig, die zweite Generation erheblich grösser (Gross).

140. molluginata Hb. Juli. Raupe im Herbste an Galium. Am Kaibling (Hauder); in zwei Generationen, Mai, Juni und sodann im August im Flachlande und in den Alpen, Schoberstein, nicht selten (Gross).

141. affinitata Stph. Im Mai. Raupe vom Juli bis Herbst an Lychnis. Pöstlingberg (Himsl).

v. turbaria Stph. Kremsursprung (Hauder); bis 1300 m, Pechgraben (Gross).

142. alchemillata L. In zwei Generationen im Mai, Juni, sodann August, September. Die Raupe lebt an Lamium, Stachys, Galeopsis. Am elektr. Licht in Linz, (Himsl, Felkl); Kirchdorf selten, Gradenalm (Hauder); Weyer (Metzger); einzeln im Flachlande und im Gebirge (Gross); Kremsmünster (Pfeiffer); Wels, Steyr, Gramastetten (Brittinger).

143. hydrata Tr. Juni. Die Raupe im August an Silene nutans. Im Gesäuse (Gross); Weyer (Gross und Metzger).

144. minorata Tr. Juni, August. Die Raupe im September an Euphrasia Im Kremstal nicht selten (Hauder); Hartlgraben, Schoberstein (Gross); Weyer (Metzger).

145. adaequata Bkh. Vom Mai bis Juli. Raupe August und September an Euphrasia officinalis. Im ganzen Gebiete, nicht selten.

146. albulata Schiff. Mai bis Juli. Die Raupe im August und September an Alectorolophus. Im ganzen Gebiete.

147. testaceata Don. Vom Mai bis Juli. Die Raupe lebt im August und September auf Alnus, Corylus. Pöstlingberg (Himsl); Altpernstein, Herndl (Hauder); um Steyr in Auen vereinzelt, in Alpentälern häufiger (Gross).

148. blomeri Curt. Juni, bis August. Raupe im September auf Ulmus montana, Hippocastanea? Kremsursprung (Hauder; Garstner-Allee bei Steyr (Gross).

149. obliterata Hufn. Vom Mai bis Juli. Raupe im Herbste an Alnus und Betula. Im ganzen Gebiete verbreitet.

150. luteata Schiff. Mai und Juni. Raupe im Herbste auf Alnus. Gleichfalls im ganzen Gebiete verbreitet.

151 bilineata L. Von Ende Mai bis Ende August in zwei Generationen. Raupe den Sommer über und wieder im Herbst an Rumex, Taraxacum, Potentilla, Ononis. Gemein.

ab. testaceolata Stgr. Einmal unter der Stammform am Wege vom Pöstlingberg nach Buchenau. (Himsl)

152. sordiata F. Vom Juli bis August. Die Raupe bis April an Alnus, Salix caprea, Vaccinium. Im ganzen Gebiete.

ab. fusco-undata Don. Unter der Stammform nicht selten

ab. infuscata Stgr. Unter der Stammform, seltener als Vorige.

153. autumnalis Ström. In zwei Generationen im Mai, Juni, dann Juli und August. Die Raupe lebt im Juni und im Herbst an Alnus. Im ganzen Gebiete.

154. ruberata Frr. Mai. In wenigen Stücken in Spitzenbach (Gross).

155. capitata H. S In zwei Generationen vom Mai bis August. Raupe im Juni und Herbst an Impatiens noli tangere. Linz (Himsl) Kirchdorf (Hauder); um Steyr und im Gebirge nicht besonders selten (Gross).

156. silaceata Hb. Erste Generation im Mai, zweite im Juli. Raupe im Juni und im Herbste an Epilobium, Impatiens noli tangere. Kremstal selten (Hauder); im Flachlande und Gebirge nicht besonders selten (Gross); Weyer (Metzger); Kremsmünster (Pfeiffer); am elekt. Licht in Linz. (Himsl).

(Fortsetzung folgt.)

Briefkasten der Redaktion.

Herrn **F. H.** in **L.** Kommt noch Fortsetzung, resp. ein Nachtrag?

Herrn **W. H.** in **P.** Verschaffen Sie sich die Zeitschrift Psyche Vol. 9. Da finden Sie was Sie suchen.

Herrn **K. H.** in **A.** Erwarte die Sendung binnen 14 Tagen.

Herrn **J. R.** in **D.** Manuskript mit Dank erhalten.

M. Rühl.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Himsl Ferdinand

Artikel/Article: Die Geometriden Oberösterreichs 99-100