

2. Wie die Vorige; aber Humeralmond, Median- und Apical-Makel zu einem breiten Randsaume zusammengefloßen. (Var. *Berthouneani* Bleuse in litt.).

Meine 7 Exemplare erhielt ich von Herrn René Oberthür, ich nenne sie daher:

var. Oberthüri Beuthin.

Acidalia immutata L. var. syriacata Neubgr.

von Wilhelm Neuburger, Berlin.

Mein langjähriger Sammler in Syrien schickte mir mit anderen meist sehr wertvollen Heteroceren, die er im Libanon gesammelt hatte, auch eine Form der *Acidalia immutata* L., die ich als neu bezeichnen muss und für die ich die Benennung var. *syriacata* wähle, da sie auf Syrien beschränkt zu sein scheint. Färbung bräunlich, (hell rehfarben), kleiner als die Stammform, ungefähr von der Grösse der *Acidalia emutaria* Hb., die Wellenlinien gut ausgeprägt, besonders markant die doppelte breite Wellenlinie (Binde) vor dem Saume, ebenso die Saumlinie scharf erkennbar, Fransen, Körper und Fühler von der Grundfarbe sich nicht abhebend. Unterseite gleichmässig hell rehfarbig mit etwas seidigem Glanz, Vorderflügel auf der Unterseite nicht dunkler als die Hinterflügel, während dies bei der Stammform öfter vorkommt. Habitat Syria septentr. Libani montes.

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Himsel, Linz.

(Fortsetzung.)

190. *cauchyata* Dup. Im Mai und Juni. Raupe im Herbst auf den untersten Blättern von *Solidago*. Kremstal, sehr selten (Hauder); Steyr (Gross); Weyer (Metzger).

191. *satyrata* Hb. Mai und Juni. Raupe im August und September an *Clematis*, *Scabiosa*. Im ganzen Gebiete.

192. *succenturiata* L. Zog nach Angabe des Hr. Hauder, Hr. Mitterberger aus Raupen vom Schoberstein.

v. *subfulvata* Hw. Anfang Juni an einer Gartenlaterne in Kirchdorf (Hauder).

193. *scabiosata* Bkh. Mai und Juni. Raupe im August und September an *Euphrasia* und *Hypericum*. Im ganzen Gebiete.

ab. *aequistrigaria* Stgr. Georgenberg, Hørndl, Kremsursprung, meist selten (Hauder).

194. *imputata* Hb. Vom Mai bis Juli. Raupe im August und September an *Campanula rotundifolia* von Hr. Gross bei Steyr; Kremstal selten (Hauder) um Steyr und im Gebirge verbreitet (Gross).

195. *scriptaria* H. S. Im Juni und Juli. Um Weyer (Gross und Metzger).

196. *plumbeolata* Hw. Mai und Juni. Raupe im Juli und August an *Melampyrum*. Im Gebiete nicht selten.

197. *immutata* Z. Im Mai mehrmals bei Kirchdorf und Michldorf (Hauder). Bei Wendbach von Hr. Mittenberger.

198. *isogrammaria* H. S. Juni und Juli. Um Steyr und Weyer (Gross und Metzger).

199. *tenuiata* Hb. Juni und Juli. Kremstal nicht selten. Hauder zog sie in Anzahl aus Kätzchen von *Salix caprea*, die er im April eintrug.

200. *nanata* Hb. Auf den benachbarten Höhen des Pöstlingberges (A. Nafock).

201. *innotata* Hufn. Im April und Mai in erster Generation, dann wieder im August, die Raupe auf *Artemisia*. Kirchdorf, Michldorf (Hauder); vereinzelt um Steyr (Gross). Letzterer fand die Raupe an Salat im Mai, Entwicklung im Juli.

202. *abbreviata* Sthp. Einmal Mitte April an der Krems (Hauder); Ende Mai ein Falter am Licht. (Gross).

203. *exiguata* Hb. Mai. Raupe im September an *Alnus*, *Berberis*, *Prunus*. Kremstal (Hauder); Steyr. Weyr (Gross und Metzger).

204. *laceata* Hb. Vom April bis Juni. Die Raupe im September an *Abies*, *Pinus*. Kremstal und um Steyr (Hauder, Gross).

205. *sobriata* Hb. Im August. Raupe im Mai, Juni auf *Juniperus*. Herndl, Altpernstein (Hauder); Steyr nicht häufig (Gross).

27. *Chloroclystis* Hb.

206. *coronata* Hb. Kirchdorf (Hauder); Attersee (Burgstaller).

207. *rectangulata* L. Juli, August. Raupe auf *Prunus*, *Pirus*. Im ganzen Gebiete nicht selten.

ab. *subaerata* Hb.

ab. *cydoniata* Bkh.

ab. *nigrosericata* Hw.

unter der Stammform mehr oder weniger häufig.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Neuburger Wilhelm

Artikel/Article: [Acidalia immutata L. var. syriacata Neubgr. 115](#)