© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. Wie die Vorige; aber Humeralmond, Median- und Apical-Makel zu einem breiten Randsaume zusammengeflossen: (Var. Berthouneani Bleuse in litt.).

Meine 7 Exemplare erhielt ich von Herrn René Oberthür, ich nenne sie daher:

var. Oberthüri Beuthin.

Acidalia immutata L. var. syriacata Neubgr.

von Wilhelm Neuburger, Berlin.

Mein langjähriger Sammler in Syrien schickte mir mit anderen meist sehr wertvollen Heteroceren, die er im Libanon gesammelt hatte, auch eine Form der Acidalia immutata L., die ich als neu bezeichnen muss und für die ich die Benennung var. syriacata wähle, da sie auf Syrien beschränkt zu sein scheint. Färbung bräunlich, (hell rehfarben), kleiner als die Stammform, ungefähr von der Grösse der Acidalia emutaria Hb., die Wellenlinien gut ausgeprägt, besonders markant die doppelte breite Wellenlinie (Binde) vor dem Saume, ebenso die Saumlinie scharf erkennbar, Fransen, Körper und Fühler von der Grundfarbe sich nicht abhebend. Unterseite gleichmässig hell rehfarbig mit etwas seidigem Glanz, Vorderflügel auf der Unterseite nicht dunkler als die Hinterflügel, während dies bei der Stammform öfter vorkommt. Habitat Syria septentr. Libani montes.

Die Geometriden Oberösterreichs

von Ferd. Himsl, Linz.

(Fortsetzung.)

190. cauchyata Dup. Im Mai und Juni. Raupe im Herbste auf den untersten Blättern von Solidago. Kremstal, sehr selten (Hauder); Steyr (Gross); Weyer (Metzger).

191. satyrata Hb. Mai und Juni. Raupe im August und September an Clematis, Scabiosa. Im ganzen Gebiete.

192. succenturiata L. Zog nach Angabe des Hr. Hauder, Hr. Mitterberger aus Raupen vom Schoberstein.

v. subfulvata Hw. Anfang Juni an einer Gartenlaterne in Kirchdorf (Hauder).

193. scabiosata Bkh. Mai und Juni. Raupe im August und September an Euphrasia und Hypericum. Im ganzen Gebiete.

ab. aequistrigaria Stgr. Georgenberg, Herndl, Kremsursprung, meist selten (Hauder).

194. impurata Hb. Vom Mai bis Juli. Raupe im August und September an Campanula rotundifolis von Hr. Gross bei Steyr; Kremstal selten (Hauder) um Steyr und im Gebirge verbreitet (Gross).

195. scriptaria H. S. Im Juni und Juli Um Weyer (Gross und Metzger).

196. plumbeolata Hw. Mai und Juni. Raupe im Juli und August an Melampyrum. Im Gebiete nicht selten.

197. immundata Z. Im Mai mehrmals bei Kirchdorf und Michldorf (Hauder). Bei Wendbach von Hr. Mittenberger.

198. isogrammaria H. S. Juni und Juli. Um Steyr und Weyer (Gross und Metzger).

199. tenuiata Hb. Juni und Juli. Kremstal nicht selten. Hauder zog sie in Anzahl aus Kätzchen von Salix caprea, die er im April eintrug.

200. nanata Hb. Auf den benachbarten Höhen des Pöstlingberges (A. Naufock).

201. innotata Hufn. Im April und Mai in erster Generation, dann wieder im August, die Raupe auf Artemisia. Kirchdorf, Michldorf (Hauder); vereinzelt um Steyr (Gross). Letzterer fand die Raupe an Salat im Mai, Entwickelung im Juli.

202. abbreviata Stph. Einmal Mitte April an der Krems (Hauder); Ende Mai ein Falter am Licht. (Gross).

203. exiguata Hb. Mai. Raupe im September an Alnus, Berberis, Prunus. Kremstal (Hauder); Steyr, Weyr (Gross und Metzger).

204. laceata Hb. Vom April bis Juni. Die Raupe im September an Abies, Pinus. Kremstal und um Steyr (Hauder, Gross).

205. sobrinata Hb. Im August. Raupe im Mai, Juni auf Juniperus. Herndl, Altpernstein (Hauder); Steyr nicht häufig (Gross).

27. Chlorochystis Hb.

206. coronata Hb. Kirchdorf (Hauder); Attersee (Burgstaller).

207 rectangulata L. Juli, August. Raupe auf Prunus, Pirus. Im ganzen Gebiete nicht selten.

ab. subaerata Hb.

ab. cydoniata Bkh.

ab nigrosericeata Hw.

unter der Stammform mehr oder weniger häufig.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Neuburger Wilhelm

Artikel/Article: Acidalia immutata L. var. syriacata Neubgr. 115