

# Societas entomologica.

„Societas Entomologica“ gegründet 1886 von *Fritz Rühl*, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausgezeichneter Fachmänner, erscheint monatlich zweimal im Kommissionsverlage von *Felix L. Dames*, Steglitz-Berlin.

Journal de la Société entomologique internationale.

Toute la correspondance scientifique et les contributions originales doivent être envoyées aux héritiers de *M. Fritz Rühl* à Zurich V. Pour toutes les autres communications, annonces, cotisations &c. s'adresser à *M. Felix L. Dames* à Steglitz-Berlin.

Organ für den internationalen Entomologen-Verein.

Alle wissenschaftlichen Mitteilungen und Originalbeiträge sind an Herrn *Fritz Rühl's Erben* in *Zürich V* zu richten. Alle geschäftlichen Mitteilungen, Inserate, Zahlungen etc. sind an *Felix L. Dames*, Steglitz-Berlin einzusenden.

Journal of the International Entomological Society.

Any scientific correspondence and original contributions to be addressed to *Mr. Fritz Rühl's Heirs*, *Zurich V*. All other communications, insertions, payments &c. to be sent to *Mr. Felix L. Dames*, *Steglitz-Berlin*.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 8 Mark = 8 Shillings = 10 Francs = 10 Kronen ö. W. — Durch den Buchhandel bezogen 10 Mark. — Das Vereinsblatt erscheint zweimal im Monat (am 1. und 15.). — Insertionspreis für die 2-gespaltene Pettzeile oder deren Raum 20 Pfg. — Mitglieder haben in jedem Jahre 125 Zeilen frei für Inserate entomologischen Inhalts, Mehrzeilen werden mit 15 Pf. berechnet.

57.64 Aphodiidae

## Neue exotische Aphodiiiden des Deutschen Entomologischen National-Museums in Berlin.

Von *Adolf Schmidt*, Berlin.

(Schluss.)

### 8. *Saprosites falcatus* n. sp.

Schwarz, zuweilen mit rötlichem Schein, parallelseitig, konvex. Kopf sehr gebogen, vorn und seitlich rot, fein punktiert, hinten etwas deutlicher, Clypeus ausgebuchtet. Thorax ziemlich gleichmässig mit grossen und kleinen Punkten besetzt, die grösseren hinter dem Vorderrande fehlend, Vorder- und Hinterrand von derselben Breite, nur in der Mitte etwas rundlich erweitert. Hinterwinkel deutlich abgestutzt und gleichmässig schwachbögig ausgehöhlt, die Seitenrandung erlischt hinter den Hinterwinkeln. Schildchen länglich, unpunktiert. Flügeldecken mit kleinem Schulterzahn, stark punktiert-gestreift, die Punkte die Ränder der Zwischenräume stark angreifend, diese ungefähr so breit als die Streifen, schwach gewölbt, einzeln und fein punktiert. Unterseite rötlich, Beine etwas heller, Fühlerkeule mehr gelbrot. Metasternalplatte mit vereinzelt feinen Punkten, in der Mitte mit deutlicher Längslinie. Der obere Enddorn der Hinterschienen ist etwas gebogen, doppelt so lang als der untere, er überragt das 1. Tarsenglied, dieses etwas länger als die 2 folgenden Glieder. Vordertibien mit 3 kleinen Zähnen am Aussenrande, die beiden unteren sind mehr genähert.

3 mm. Madagaskar.

Die Art gleicht in Form und Grösse *Sapros. japonicus* Waterh., doch unterscheidet sie sich leicht von ihm durch die ausgebogten Hinterwinkel, ungerandete Basis und schmalere Zwischenräume.

### 9. *Euparia rauca* n. sp.

Schwarz, wenig glänzend, mässig gewölbt. Kopf sehr breit und kurz, fein längsrundlich ge-

strichelt, Mitte stumpfbeulig, Wangen vom Seitenrande nicht abgesetzt, letzterer nach vorn fast geradlinig verschmälert, mit dem wenig ausgegardeten Clypeus ein kleines, stumpfes Zählchen bildend. Thorax quer, Vorderwinkel breit abgerundet, Seiten nicht sehr breit bis  $\frac{3}{4}$  der Länge verflacht, dann schräg sich der Rand nach der Basis zu ab, deshalb der Hinterrand bedeutend schmaler als der jederseits gebuchtete Vorderrand, Seiten und die gerundete Basis sind gerandet; Oberfläche sehr dicht und sehr deutlich tief punktiert, nach vorn zu etwas feiner, die Ränder der Punkte sind glänzend, in der Mitte vor dem Schildchen mit wenig tiefer, nach vorn verflachter Längsfurche. Schildchen länglich-dreieckig, mit wenigen groben Punkten. Flügeldecken so breit als die Basis des Halsschildes, an der Schulter mit deutlichen, schräg nach aussen und vorn gerichtetem Zahn, sie sind punktiert-gestreift, Zwischenräume in der Mitte gekielt, ihre Oberfläche ist durch Querpunkte zerrissen und in Tuberkeln aufgelöst, jederseits neben dem Rande steht je eine Reihe rundlicher Tuberkeln, der Kiel ist mehr in längliche aufgelöst, die an den seitlichen Zwischenräumen deutlicher sind. Unterseite und Schenkel deutlich punktiert und wie Thorax und Flügeldecken kurz behaart. Metasternalplatte mit schmaler Längsfurche, die sich vorn und hinten grubchenartig vertieft. Hintertibien schwach gebogen, mit gleichen Borsten am Endrande und sehr ungleichen Enddornen, der obere ist kürzer als das 1. Tarsenglied, dieses so lang als der übrige Fuss und etwas verdickt.

4 mm. Madagaskar.

Die Skulptur der Flügeldecken erinnert an *Physemus*, durch den gezahnten Clypeus, die Behaarung und raue Oberfläche kommt die Art *Euparia ovalipennis* Har. nahe, doch ist sie viel kleiner als diese. (54, 67.8, 68.2, .7, .8, 69)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Schmidt Adolf

Artikel/Article: [Neue exotische Aphodiinen des Deutschen Entomologischen National-Museums in Berlin. 57](#)