

Societas entomologica.

Faltern
a mein
Copula
weiss,

„Societas entomologica“ gegründet 1886 von Fritz Rühl, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und ausgezeichneter Fachmänner, erscheint monatlich zweimal bei Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H. in Stuttgart.

Journal de la Société entomologique internationale.

Toute la correspondance scientifique et les contributions originales doivent être envoyées aux héritiers de M. Fritz Rühl à Zurich V. Pour toutes les autres communications, annonces, cotisations &c. s'adresser à M. Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., à Stuttgart.

Organ für den internationalen Entomologen-Verein.

Alle wissenschaftlichen Mitteilungen und Originalbeiträge sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich V zu richten. Alle geschäftlichen Mitteilungen, Inserate etc. sind an Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart einzusenden.

Journal of the International Entomological Society.

Any scientific correspondence and original contributions to be addressed to Mr. Fritz Rühl's heirs in Zurich V. All other communications, insertions &c. to be sent to Mr. Fritz Lehmanns Verlag, G. m. b. H., Stuttgart.

Tant que les journaux „Societas entomologica“ et „Entomologische Zeitschrift“ sont publiés ensembles, on n'acceptera plus d'abonnements à la seule „Societas entomologica“. Le prix annuel des deux recueils est de M. 6.— avec un supplément de port pour l'étranger à raison de M. 2.50. Le journal de la société paraît bimensuellement.

Solange die Societas entomologica und die Entomologische Zeitschrift gemeinsam herausgegeben werden, ist die Soc. entom. allein nicht beziehbar. Jahrespreis beider Zeitschriften M. 6.— Portozuschlag fürs Ausland M. 2.50. Das Vereinsblatt erscheint zweimal im Monat.

As long as the Societas entomologica — the Entomologische Zeitschrift are published together, the former journal will not be supplied alone. The price for the two journals together is M. 6.— per annum, with a supplement for foreign postage of M. 2.50 for subscriptions received from abroad. The journal of the society will appear fortnightly.

57. 98 Belenogaster (66. 99)

Belenogaster Tessmanni nov. spez.

(Hymenoptera, Vespidae soc.)

Von Dr. A. v. Schullhess Reehberg, Zürich.

Mittelgross, schlank, einfarbig dunkelbraun, Hinterleibsstiel und Schildchen rostrot, Gesicht ebenso mit Ausnahme je eines lehmgelben Fleckes zwischen Fühleransatz und Auge, der die untere Hälfte der Augenausrandung ausfüllt (s. Var.). Das ganze Tier von kurzem goldig-schimmerndem Tomente und ausserdem von langen schwarzen aufrechtstehenden Haaren dicht besetzt, besonders an der Unterseite der Schenkel und am Bauche. Kopf so breit wie der Thorax. Wangen so lang wie das 2. Geiseliglied, Kopfschild des ♀ wenig länger als breit, spitzig, normal. Fühler oben dunkelbraun, auf der Unterseite rostrot; Fühlerglieder 4—6 deutlich länger als breit. Zwischenraum zwischen den einzelnen Nebenaugen so gross oder grösser als diese selbst. Aufrechtstehende dunkle Behaarung des Thorax besonders lang auf Schildchen, Hinterschildchen und Mittelsegment. Flügel gleichmässig leicht gebräunt, violett-goldig schimmernd. Beine kräftig. Sämtliche Hüften, Schenkel und Schienen besonders auf der Unterseite mit langen unregelmässigen, schwarzen Haaren dicht besetzt. Hinterleib schmal, schlank; 1. Abdominalsegment so lang wie der Thorax; 2. Segment ziemlich lange gestielt, nach rückwärts wenig und allmählich erweitert. Bauchseite des Abdomens braun, mit steifen schwarzen Haaren dicht besetzt. — Grösse: 21 mm.

Var. ♀: Gesicht ohne gelbe Färbung. Kleiner Fleck hinter dem Flügelansatz, ein schmaler Streifen am Vorderrande des Hinterschildchens, sowie je ein linsenförmiger Längsfleck seitlich unten am Mittelsegment lehmgelb. Grösse: 14 mm.

♂ dem ♀ ähnlich, jedoch grösser und kräftiger; Kopfschild annähernd rechteckig, höher als breit. Mittelvorsprung zweihöckerig, unter das Niveau zurückgebogen, ähnlich wie bei *B. clypeatus* oder *indicus* var. *claripennis*. Fühlergeissel schlank, Fühlerglied 4—6 auf der Unterseite mit linienförmigen, kaum vorspringenden Fühlerschwien (Tyloiden). Endglied

schwarz, zylindrisch, leicht gebogen, gegen das Ende verjüngt, auf der Oberseite mit schwarzen Borsten besetzt. Grösse 24 mm.

Spanisch Guinea (leg. Tessmann), Uelleborg, Benitogebiet 1 ♂, 15.—31. I. 1907; Alcu Benitogebiet 1 ♀, 1.—15. VIII. 1906; Spanisch Guinea Hinterland, Nkolontangan 1 ♀ var. 14. II. 1907 (Museum Berlin).

Die neue Art wird zu Ehren ihres Entdeckers Herrn G. Tessmann benannt.

B. Tessmanni steht durch die Form des Kopfschildes und die Behaarung der Schenkel *B. clypeatus* und *indicus* var. *claripennis* nahe, unterscheidet sich aber von diesen beiden Arten durch die Form des letzten Fühlergliedes, sowie die schwächere, schlankere Statur und die Färbung; die Behaarung der Schenkel ist ähnlich derjenigen bei *Indicus* var. *claripennis*. Das Weibchen gleicht jedenfalls sehr dem mir unbekanntem *B. Leonhardii*, Buysson; doch ist bei *Tessmanni* die Behaarung der Unterseite der Schenkel keineswegs sammetartig, sondern lang und sehr unregelmässig; auch stammt *Leonhardii* aus Uganda (Ostafrika), während *Tessmanni* Westafrika bewohnt. Das ♂ von *Leonhardii* ist noch unbekannt. In Bezug auf Körperform erinnert *B. Tessmanni* an *turbulentus* Kohl, der dieselbe Gegend bewohnt, doch ist bei *turbulentus* der Thorax entschieden schlanker, und der Zwischenraum zwischen den Nebenaugen ist bei dieser Art kleiner als diese selbst, bei *Tessmanni* aber eher grösser.

57. 89 Agriades (4)

The Rivieran Races of *Agriades coridon*, Poda

by J. W. Tutt, I. E. S.

(Concluded from p. 44).

The underside of the ♀ is, as in the ♂, exceedingly strongly marked; the marginal spots, outside the ocellated row, stand out especially strongly; the red wedge-shaped spots are, as in the ♂, exceedingly large and bright, and the red spots are also conspicuous on the forewings; the colouring of the underside is something like that of the Engadine specimens, but the hind-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Schulthess Rechberg.Schindler Johannes Anton von

Artikel/Article: [Belenogaster Tessmanni nov. spez. 45](#)