

57. 88 Deilephila

Deilephila-Aberrationen.

Wie oft werden *D. euphorbiae*-Falter gezogen und immer finden sich neue Farbenspiele unter diesen Tieren. Es sind auch namhafte Naturforscher in die Öffentlichkeit getreten und haben diese Seltenheiten eingehend beschrieben. So befindet sich in Tring-Museum ein sehr aberratives ♂, welches in der Revision of the Lep. Fam. *Sphingidae* von Rothschild-Jordan als ab. *restricta* beschrieben ist (Nov. Zool. 1903. 9. 1, Suppl. 720). Im XXI. Jahrg. der Ent. Zeitschrift, Stuttgart, S. 224 bespricht Herr R. Loquay einen Falter, dem der Kostalfleck nahe der Spitze vollständig fehlt (Vorderflügel). Diese Art wird in Rühl (Großschmetterlinge 1899, S. 81) und in der Insektenbörse 1903, S. 13 unter Nr. 3 und 4 von Stichel erwähnt. Herr Mayer-Graz berichtet im XXI. Jahrg. E. Z. Stuttgart, S. 155 über eine merkwürdige Aberration, bei welcher die Grundfarbe der Vorderflügel kräftiges Ockergelb aufweist, und benennt diese Seltenheit forma *mediofasciata*. In der Gubener Zeitschrift Nr. 46, 2. Jahrg. erwähnt Stichel im Leitbericht aus den Mitteilungen des entomol. Vereins „Polyxena“ in Wien Nr. 8, 1908 eine von Rebel kurz beschriebene Art als ab. *cuspidata*. Hier ist das schwarze Submarginalband der Hinterflügel zu einer Zickzacklinie umgewandelt. Dann beschreibt Oskar Schultz †, Hertwigswaldau, 4 Aberrationen. 1. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist terrakottabrun ohne jeden Stich ins Olivenfarbene, das ♀ heißt ab. *perfulva*. 2. Bei diesem Stück ist der grüne Kostalfleck im Vorderflügel nur noch kaum angedeutet, das Tier ist ab. *demaculata* benannt. 3. Ab. *subvittata* heißt ein Stück, bei dem die grüne Schrägbinde im Distalfelde der Vorderflügel verkürzt auftritt und erreicht nicht die Spitze. 4. Ab. *latefasciata* benannt bildet das Gegenstück zur ab. *helioscopiae* Selys. Während bei der letzteren die schwarze Distalbinde der Hinterflügel völlig verschwindet, tritt sie bei ab. *latefasciata* nach innen zu auffallend verbreitert auf (veröffentlicht Gubener Ent. Zeitschrift 5. Jahrg. Nr. 26, 23. Sept. 1911, S. 184). Dann beschreibt noch A. Closs, Berlin-Friedenau in Nr. 36, S. 275 derselben Zeitschrift ein ♂ als ab. *grisea*; bei diesem Stück sind die Vorderflügel ganz grau übergossen.

Wenn ich nun diese in den Zeitschriften bekanntgegebenen Arten nochmals erwähnt habe, so bemerke ich dazu, daß ich alle diese Aberrationen und Varietäten schon gezüchtet habe. Ich habe sogar ganz besondere Abweichungen erzielt, aber nicht beschrieben, weil ich kein Freund der schon sehr irreführenden Nomenklatur in unserer sehr verzweigten Wissenschaft bin. Nur 1 Stück habe ich beschrieben in der 1. Beilage zu Nr. 42 der Gubener Zeitschrift. Der Falter vereinigt in sich 2 Formen; auf der Ober- und Unterseite der Vorderflügel gleicht er vollkommen der ab. *rubescens* Garb. (Sitzungsbericht Akad. Wien 1892, S. 917) und auf der Oberseite der Hinterflügel der ab. *lafitolei* Th. Miegl. Ich habe das Stück ab. *Oberthüri* benannt zu Ehren meines Freundes, und es befindet sich in dessen Sammlung. Jetzt wo ich diese Zeilen schreibe, befinden sich 18 sehr aber-

native Exemplare auf dem Spannbrett. Es würden also, der Nomenklatur folgend, so viele neue Arten entstehen. Denn was die Hybridenzüchter durch mühsame Zucht erzielten, habe ich durch Form *fur* erreicht. Es sind Stücke dabei, bei denen man sich fragen muß, ob man einen *euphorbiae*-Falter vor sich habe oder ob es ein Hybrid sein könne. Wären die Unkosten für die Farbentafeln nicht so hoch, so würde ich ein kleines Werk herausgeben, sie einfach in der wissenschaftl. Zeitschrift abzubilden, halte ich nicht für vorteilhaft, da doch die Farbenpracht zur Geltung kommen sollte. Franz Bandermann, Halle-Saale.

57: 16. 9: 57

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.

III.

(Fortsetzung.)

Ceratophyllus	columbae	Columba livia
—	fasciatus	Arvicola savii
—	—	Canis lagopus
—	—	Cricetus frumentarius
—	—	Crossarchus fasciatus
—	—	Microtus agrestis
—	—	Mus rattus
—	—	Mus silvaticus
—	—	Mustella foina
—	—	Mustela putorius
—	—	Myoxos glis
—	—	— nitela
—	—	Pitymys subterraneus
—	gallinae	Gallus domestica
—	—	Gallus gallus
—	—	Mus rattus
—	—	— silvaticus
—	—	Parus major
—	—	Vesperugo noctula
—	gallinulae	Turdus merula
—	hirundinis	Hirundo urbica
—	—	Mus rattus
—	laverani	Eliomys sardus
—	londiniensis	Mus musculus
—	melis	Vulpes vulpes
—	mustelae	Mus rattus
—	—	Mustela vulgaris
—	penicilliger	Microtus agrestis
—	rossittensis	Corvus cornix
—	sciurorum	Microtus agrestis
—	—	Vulpes vulpes
—	styx	Clivicola riparia
—	malensis	Parus cristatus
—	vagabundus	Falco rusticolus
—	walkeri	Microtus amphibius
—	—	— glareosus
—	—	Mus musculus
—	—	— rattus
—	—	Mustela erminea
—	—	— vulgaris
—	—	Sorex vulgaris

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Bandermann Franz

Artikel/Article: [Deilephila-Aberrationen. 72](#)