

Societas entomologica.

Organ für den internationalen Entomologen-Verein.

Journal de la Société entomologique internationale.

Journal of the International Entomological Society.

„Vereinigt mit Entomologischer Rundschau und Insektenbörse.“

Gegründet 1886 von Fritz Rühl, fortgeführt von seinen Erben unter Mitwirkung bedeutender Entomologen und hervorragender Fachleute.

Toute la correspondance scientifique et les contributions originales sont à envoyer aux Héritiers de Mr. Fritz Rühl à Zurich V. Pour toutes les autres communications, paiements etc. s'adresser à Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Alle wissenschaftlichen Mitteilungen und Originalbeiträge sind an Herrn Fritz Rühl's Erben in Zürich V zu richten, geschäftliche Mitteilungen, Zahlungen etc. dagegen direkt an den Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Any scientific correspondence and original contributions to be addressed to Mr. Fritz Rühl's Heirs in Zürich V. All other communications, payments etc. to be sent to Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart, Poststr. 7.

Die *Societas entomologica* erscheint gemeinsam mit der Entomologischen Rundschau und der Insektenbörse. Abonnementspreis der 3 vereinigten Zeitschriften Mk. 1.50 vierteljährlich bei postfreier Zusendung innerhalb Deutschland und Oesterreich, fürs Ausland Portozuschlag — 50 Pfennig vierteljährlich. Erfüllungsort beiderseits Stuttgart.

57: 16. 9: 57

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.

III.

(Fortsetzung.)

Habronyx gigas	Lasiocampa otus
— heros	Bombyx pini
— —	Deilephila galii
Hadronotus carinatifrons	Anasa tristis
Helcon ruspator	Acanthocinus aedilis
— —	Strangalia 4-fasciata
Hemiteles areator	Polychrosis botrana
— artiges	Agroeca proxima
— —	Melanophora subteranea
— fulvipes	Lymantria dispar
— gymini	Gyrinus natator
— pedestris	Cryptocephalus duodecim-punctatus
— persector	Gyrinus natator
— pulchellus	Lymantria dispar
— scabriusculus	Tortrix viridana
— schaffneri	Dendrolimus pini
Heptamerocera lonchaeae	Lonchaea splendida
Heptasmicra lycaenae	Tmolus palegon
Herpestomus brunneicornis	Yponomeuta padella
Heterarthrellus australiensis	Scyrnus flavifrons.
Heterospilus bruchi	Bruchus quadridensatus
— —	Spermophagus robiniae
— leptostyli	Leptostylus collaris
— prosopidis	Bruchus sallaei
— —	— exiguus
— —	— prosopis
— —	— ochraceus
— —	— bisignatus
Hetroxys callidii	Callidium antennatum
Hexamerocera brasiliensis	Ceratitis capitata
Holocremna clandestina	Diprion simile
— —	Pteronius similis
— —	Croesus varus

Holocremnae cothurnata	Diprion pallidum
— erythrogya	Pristiphora geniculata
Homalotylus similis	Scyrnus cervicalis
— terminalis	— pini-abietis
— —	Coccinella quotata
— —	— sanguinea
— —	Hippodamia convergens
— —	Cyclopeda sanguinea
— —	Psyllocora vigintimaculata
Homocidus dimidiatus	Platycheirus albimanus
— tarsatorius	— —
Hoplismenus armatorius	Pararge maera
Horismenus microgaster	Peronea minuta
— productus	Bruchus amicus
— urichi	Cirphis humidicola
Hunterellus hookeri	Dermacentor marginatus
— —	— parumapertus
— —	Rhipicephalus texanus
Hymenobosmina verimaculata	Thyridopteryx hübnieri
Hypamblys transfuga	Pteronius sp.
Hyperallus caliroae	Caliroa amygdalina
Hypothereutes nigrolineatus	Heliothrips albilinea
Hypsantyx impressus	Diprion pallidum
Ichneumon albosignatus	Abraxas grossulariata
— balteatus	Dicranura vinula
— bimaculatus	Agrotis segetum
— —	Panolis griseovariegata
— brevipennis	Melana albilinea
— bucculentus	Charaetas grammis
— cessator	Vanessa polychloros
— cessator	Acronycta psi
— compulsoarius	Dasychira pudibunda
— deliratorius	Mamestra oleracea
— disparis	Lymantria dispar
— dumeticola	Panolis griseovariegata
— extrematis	Eriopus floridensis
— fusorius	Agrotis pronuba
— —	Hyloicus pinastri
— —	Mamestra pisi
— —	Pterostoma palpina

<i>Ichneumon fusorius</i>	<i>Smerinthus ocellata</i>	<i>Melittobia acasta</i>	<i>Leucospis intermedia</i>
— —	— populi	— —	<i>Odynerus laevipes</i>
— —	<i>Sphinx ligustri</i>	— —	<i>Osmia leucomelaena</i>
— —	— pinastri	— —	<i>Stelis nasuta</i>
— melanogonus	<i>Oenophthira pilleriana</i>	— —	<i>Trypoxylon figulus</i>
— ochropis	<i>Abraxas grossulariata</i>	— australica	<i>Pison spinolae</i>
— pachymerus	<i>Panolis griseovariegata</i>	<i>Meloboris rufiventris</i>	<i>Calamia lutosa</i>
— pallidifrons	— —	<i>Merisus destructor</i>	<i>Mayetiola destructor</i>
— pisorius	<i>Malacosoma neustria</i>	— —	<i>Phytophaga destructor</i>
— pistorius	<i>Dasychira pudibunda</i>	<i>Mesochorus dimidiatus</i>	<i>Hyponomeuta sp.</i>
— 4-albatus	<i>Colias edusa</i>	— diversicolor	<i>Tortrix fumiferana</i>
— raptorius	<i>Lymantia monacha</i>	— gemellus	<i>Dendrolimus pini</i>
— sexcinctus	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	— laricis	<i>Lophyrus pini</i>
— sugillatorius	<i>Lymantria monacha</i>	<i>Mesochorus nigripes</i>	<i>Phytonomus variabilis</i>
— variegatus	<i>Limnitis populi</i>	— —	<i>Pteronus sp.</i>
<i>Ichneutes reunitor</i>	<i>Nematini</i>	— nigrisignis	<i>Meliana albilinea</i>
<i>Inostemma naura</i>	<i>Schizomyia deverrae</i>	— pectoralis	<i>Simaethis pariana</i>
— piricola	<i>Contarinia pirivora</i>	— plusiaephilus	<i>Plusia agramma</i>
<i>Iphiaulax medianus</i>	<i>Diatraea canella</i>	— stigmaticus	<i>Pteronus ribesii</i>
— —	— saccharalis	— vittator	<i>Hyponomeuta cognatella</i>
— —	<i>Metamasius hemipterus</i>	— —	<i>Pieris brassicae</i>
<i>Ischnus truncatus</i>	<i>Eriogaster lanestris</i>	<i>Mesoleius aulicus</i>	<i>Croesus septentrionalis</i>
<i>Isocratus vulgaris</i>	<i>Aphis brassicae</i>	— —	<i>Nematus croceus</i>
<i>Itopectis conquisitor</i>	<i>Archips argyrospila</i>	— —	<i>Pristiphora sp.</i>
— masculator	<i>Phytonomus variabilis</i>	— —	<i>Selandria ovata</i>
<i>Ixodiphagus caucurtei</i>	<i>Ixodes ricinus</i>	— liosternus	<i>Lygaeonematus pini</i>
— texanus	<i>Rhipicéphalus texanus</i>	— multicolor	<i>Lophyrus polytomus</i>
<i>Labena apicalis</i>	<i>Chrysobothris femorata</i>	— —	<i>Pteronus ferrugineus</i>
<i>Laelius anthrenivorus</i>	<i>Anthrenus nussaeorum</i>	— —	<i>Pristiphora sp.</i>
— perrisi	<i>Anobium villosum</i>	— variegatus	<i>Nematus gallicola</i>
— tibialis	<i>Sinoxylon sexdentatum</i>	— —	<i>Pteronus pavidus</i>
<i>Lamachus marginatus</i>	<i>Diprion pini</i>	— wahlbergi	— sp.
— —	<i>Lophyrus pini</i>	<i>Mesoleptus pallida</i>	<i>Tenthredinidae</i>
— silvarum	— sertifex	<i>Mesopolobus fasciventris</i>	<i>Conchylis ambigua</i>
<i>Lamprotatus alpestris</i>	<i>Phytomyza asclepiadeae</i>	— —	<i>Oenophthira pilleriana</i>
<i>Lariophagus distinguendus</i>	<i>Calandra granaria</i>	<i>Mesostenus pomonellae</i>	<i>Carpocapsa pomonella</i>
— texanus	<i>Anthonomus grandis</i>	<i>Metastenus acanthocini</i>	<i>Acanthocinus obsoletus</i>
— —	<i>Bruchus sallai</i>	<i>Meteron archipsidis</i>	<i>Archips argyrospila</i>
<i>Laetostizus sternocerus</i>	<i>Pontania femoralis</i>	— chrysophthalmus	<i>Eurypara urticae</i>
<i>Lathromeris cicadae</i>	<i>Tibicen septendecim</i>	— icterius	<i>Anthonomus pomorum</i>
<i>Limneria blackburni</i>	<i>Phlyctaenia stellata</i>	— laphygmae	<i>Laphygma frugiperda</i>
— dubitata	<i>Laphygma frugiperda</i>	— lionotus	<i>Tenthredinidae</i>
— gracilis	<i>Plutella maculipennis</i>	— mamestrae	<i>Mamestra trifolii</i>
— hawaiiense	<i>Hymenia fascialis</i>	— niger	<i>Pericallia syringaria</i>
— tibiator	<i>Plutella maculipennis</i>	— pulchricornis	<i>Agrotis strigula</i>
<i>Limnerium majalis</i>	<i>Oenophthira pilleriana</i>	— scutellator	<i>Abraxas pantaria</i>
— validum	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	— trachynotus	<i>Tortrix fumiferana</i>
— —	<i>Hyphantria cunea</i>		(Fortsetzung folgt.)
— —	<i>Lymantria dispar</i>		
<i>Limnodytes gerriphagus</i>	<i>Gerris remigis</i>		
<i>Lissonota setosa</i>	<i>Cossus cossus</i>		
— varicosa	<i>Tetropium castaneum</i>		
<i>Litus cynipseus</i>	<i>Limnabates sp.</i>		
— krygeri	<i>Ocyptus olens</i>		
<i>Lochites auriceps</i>	<i>Lasioptera portulacae</i>		
<i>Lophyproctus oblongopunctatus</i>	<i>Lophyrus sertifer</i>		
<i>Macrocentrus infirmus</i>	<i>Hydroecia micanis</i>		
— plesius	<i>Crambus sp.</i>		
<i>Macrodyctium omiodivorum</i>	<i>Omiodes accepta</i>		
<i>Megastigmus nigrovariegatus</i>	<i>Clisiocampa plumalis</i>		
<i>Melittobia acasta</i>	<i>Anthidium caturigense</i>		
— —	<i>Chalicodoma muraria</i>		

57. 89 Parnassius (43. 36)

Parnassius-Aberrationen, Varietäten und Monstrositäten aus der Sammlung des Herrn Franz Philipps in Köln a. Rh.

Von Georg Haude.

Mit 2 Abbildungen.

Es ist ein Apollo ♂, welches im Jahre 1908 auf der Salletalpe am Königssee bei Berchtesgaden erbeutet wurde. Das Tier könnte also zur Bartholomäus-Rasse gehören, ohne daß deren Charakteristikum zum Ausdruck gekommen wäre.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte. 17-18](#)