

quite as long as the thorax. Tarsi 5-jointed. Propodeal spiracle minute, round.

Female: — Not known.

A genus resembling some Eulophini or Elacherinae, more especially because of the thin head with the face sunken and the axillae prominently advanced into the parapsides.

Type: *Ataneostigma pulchra* new species, described herewith.

1. *Ataneostigma pulchra* new species.

Male: — Length, 3.00 mm.

Black marked with bright lemon yellow as follows: All of the scutellum excepting cephalic margin and a broad, sagittate area along the median line; a conspicuous wedgeshaped area on each side of the abdomen at proximal third, its apex mesad; the lateral margins of the scutum, conspicuously and all of each parapside; the antennae (honey yellow); all of the head except most of the disk of vertex; and the legs (including the coxae), the distal tarsal joint dark. Head and thorax polygonally reticulated. Wings hyaline.

(From two specimens, enlarged as formerly.)

Female: — Not known.

Described from two males mounted on an unlabelled card in the collections of the Queensland Museum.

Habitat: Australia-Queensland.

Types: In the Queensland Museum, Brisbane, one male on a tag plus a slide bearing the other, to be continued.

57.89 *Tadumia* (57.6)

„Parnassiana“

XIV.

Ein neuer *acdestis*.

(*Tadumia acdestis* Gr. Gr. subsp. *priamus* B.-Hs. i. l.)

Von *Felix Bryk* (Finland).

(Mit 3 Originalzeichnungen des Verfassers.)

Tadumia acdestis Gr. Gr. subsp. *priamus* B.-Hs. (i. l.) (Fig. 1). Palpen weißlichgelb wie die Sphragis;



Fig. 1. *Tadumia acdestis* Gr. Gr. ♀ f. *priamus* (B.-Hs. i. l.) Bryk (Type: Koll. Bang-Haas, Blasewitz).

unten schwarz behaart. Stirnbusch schwarz. Thorax und Abdomen bei beiden Geschlechtern schwarz behaart, mit heller Melierung; Kragen grünlich auf-

gehell. Die erste Medianrippe entspringt aus der vorderen Zellecke ohne mit dem gegabelten Radialrippenpaare zu verwachsen¹⁾. Vorderflügelänge von der Wurzel zur Spitze (R_4) 27 mm. Vorderflügel form dreieckig am Apex und Hinterrandswinkel abgerundet. Antennen schwarz. (Es kommen bisweilen bei *delphius* gelblich beschuppte Antennen mit schwarzer Kolbe vor.) Beschuppung seichter als bei *T. delphius illustris* aus Wernoj (c. m.) mit dem ich den neuen *acdestis* vergleiche. Auf beiden Flügeln ist die Saumbefrandsung hell und die Randlinie dunkel. Vorderflügelzeichnung wie bei *delphius*. Das breite Subkostalband und der vier-eckige Hinterrandfleck aber nicht so dunkel beschuppt wie bei *v. illustris*, beim ♀ (Fig. 1) genau so hyalin wie die Submarginalbinde. Mittelzelleck oblong hinten zugespitzt, erreicht die hintere Mittelzellrippe nicht. Die Submarginalbinde der Hinterflügel ist beim ♂ in fünf lose graphitgraue Striche aufgelöst, beim ♀ zeichnen sie ein kontinuierliches Band, das die reine Grundsubstanzbinde vom sauber ausgeführten Glasrande scharf abgrenzt. Beim ♀ sind zwei weiße Punkte in den beiden letzten Submarginalbandelementen als Anfang oder Ende der blauen Randaugen erhalten. Die niedlichen, orangegelben Augenflecke sind noch nicht abgerundet und zeigen den Charakter der Auflösung der Prachtbinde in lose Flecke; sie sind wurzelwärts abgeplattet und erinnern an die Prachtflecke von *Felderi* oder *T. Szechenyi*



Fig. 2. *Tadumia delphius* Eversm. ♂ ab. *nordmannioides* Bryk (Type: Koll. Bryk).

(unterseits). Das ♂ zeigt den Kardinalsteg; seine Subkostalaugen sind beiderseits schwarz; wenn das nur aberrativ bei *priamus* auftritt, was sehr wahrscheinlich ist, so muß das Tier noch obendrein ab. *semicaeca* heißen. Das Analband ist zweizellig; beim ♂ sogar fast dreizellig. Die ganze innere Flügelhälfte wie bei *latonius* Bryk dunkel, beim ♂ in der Zelle aufgehell. Unterseits sind die flaubraunen Rippen nackt; auf den Vorderflügeln ist nur der Endzelleck beschuppt. Auf den Hinterflügeln sind nur die Augenflecke erhalten. Sonst ist der Grund nackt, wenn

¹⁾ Da dem Verfasser viele seltene Vertreter aus der *acco* und *delphius* Gruppe entweder nur aus Abbildungen oder nur aus einzelnen Exemplaren bekannt sind, und da alle Revisionisten bei der Diagnose die Stellung der ersten Medianrippe anzugeben versäumt haben, so kann eine Zuteilung der fraglichen Arten zur Gattung *Tadumia* Bryk im „Catalogus Lepidopterorum“ vorläufig nur eine konventionelle, nicht aber kritische sein.

wir die ganz seichte helle Randbeschuppung auf den Hinterflügeln abstrahieren. Wurzelflecke fehlen. Bei *delphius* ist das etwas aberratives; dort sind in der Regel drei Prachtwurzelflecke erhalten, die bisweilen auch schwarz sind. Ein ♂ (ex Ispajran; Alai sept. c. m.) Fig. 2, zeigt keine Spur von Wurzelflecken; ich benenne diese Form ab. *nordmannioides*.

Die Sphragis (Fig. 3 α_1 , α_2) ist kürzer als bei *delphius* (β_2) und es fehlt ihr der vollständige Ring, der bei *delphius* dorsalwärts das Hinterleibsende umklammert. Ob alle *priamus* ♀ solch eine ringlose Sphragis aufweisen werden, ist abzuwarten. Das Studium der Variabilität der Sphragis steckt noch in den Kinderschuhen! und ist daher



Fig. 3. Sphragis von *Tadumia* (vergrößert).
Fig. α_1 , α_2 von *Tad. priamus* (α_1 , schematischer Querschnitt).
Fig. β_1 , β_2 von *Tad. delphius* (β_1 , schematischer Querschnitt).

noch lange nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich wird *Parnassius latoni* Bryk eine ähnliche Sphragis besitzen; dann wäre er um so näher zu *acdestis* zu stellen. Freilich wäre dann die Berechtigung der Etablierung von *Tadumia* ganz unbegründet. Es könnte aber auch die Stellung der ersten Medianrippe der Type von *latoni* aberrativ sein!

Es ist ein Verdienst Verity's, *acdestis* als heterogene Art von *delphius* abgetrennt zu haben. Auch *cephalus* ist eine „gute“ Art, die ihren nächsten Verwandten in *Szechenyi* zu suchen hat.

Patria: Chantengrin (Aksu) Type 1 ♀♂ in coll. Bang-Haas, Blasewitz. Herrn Otto Bang-Haas meinen besonderen Dank für die entgegenkommende Uebersendung der seltenen Tiere.

57: 16. 9: 57

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.

III.

(Fortsetzung.)

Meterous versicolor	Dendrolimus pini
— —	Malacosoma neustria
— vexator	Diphyllus lunatus
Metobius scrobiculatus	Lophyrus pini
Microbracon hispae	Hispa callicantha
— hyslopi	Etiella zinckenella
— mellitor	Anthonomus grandis
— vestitica	— vestitus
Microcryptus basizonius	Diprion simile
— —	Lophyrus pallidus

Microdantomerus anthonomi	Anthonomus grandis
— —	Bruchus exiguus
Microdus calculator	Scardia boleti
— inedius	Mamestra trifolii
— ocellanae	Tmetocera ocellana
— pumilus	Coleophora laricella
— rufipes	Tortrix viridana
Microgaster albipennis	Trachys minuta
— auripes	Meliana albilinea
— congestus	Aporia crataegi
— fulvicrus	Pteronus ferrugineus
— globatus	Botys nubilalis
— glomeratus	Aporia crataegi
— nemorum	Dendrolimus pini
— solitarius	Lymantria dispar
— sticticus	Amauronematus sp.
Microplitis alaskensis	Autographa gamma californica
— mediator	Plusia gamma
— melianae	Meliana albilinea
— spinolae	Plusia gamma
— tuberculifer	Dibrachys setipennis
Microterys flavus	Ceroplastes rubens
— —	Coccus hesperidum
— —	Pulvinaria mammariae
— —	— psidii
— —	Saissetia hemisphaerica
— —	— nigra
— speciosissimus	Kermes pubescens
Microtoridea lissonota	Ophiura melicerta
Microtypus basigonus	Lophyrus pini
Mimatomus peltatus	Aleyrodes prunosus euphorbium
Monoblastus caliroae	Caliroa cerasi
— erythropygus	Dineura alui
— —	Pteronus ferrugineus
— exstirpatorius	Nematus wittenwaalli
— —	Pteronus pavidus
— —	— ribesii
— haemorrhoidalis	Diprion sertifer
— laevigatus	Nematini
Monodontomerus aereus	Euproctis chrysorrhoea
— capreus	Conchylis ambiguella
— —	Oenophthira pilleriana
— dentipes	Lymantria monacha
— nitidus	Oenophthira pilleriana
— —	Osmia cornuta
— obsoletus	Polychrosis botrana
Monolexis lavagnei	Synoxylon sexdentatum
Monotomerus cupraeus	Oenophthira pilleriana
Neochrysocharis albipes	Pinpla graminella
— immaculatus	Oscinella frit
Neopimplodes syleptae	Sylepta derogata
Neosigniphora nigra	Hemichionaspis minor
Neotheronia antheraea	Antheraea simplex
— teiae	Teia anartoides
Notanis omorpha ainsliei	Agromyza sp.
Olesicampe sternella	Hydroecia nictitans var. erythrostroma
Oligosita giraulti	Tomaspsis varia
Omorgus difformis	Grapholitha weberiana
— —	Olethreutes oblonga
— —	Polychrosis botrana
— ensator	Botys nubilalis

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Bryk Felix

Artikel/Article: [„Pariiassiana" Ein neuer acdestis. 24-25](#)