

- 1070) *Carabus violaceus herzegovinus* nov. subspec.,
nebst Notiz über interessante Cychrusfunde,
von Paul Born.
- 1071) *Cimex (Oeciacus) hirundinis* Jyns., die Schwal-
benwanze, von Fritz Hoffmann.
- 1072) Weiters über die Schwalbenwanze *Oeciacus*
hirundinis Jenyns. von Fritz Hoffmann.
- 1073) New Hybrids and Races of *Philosamia* and
Antherea (Saturniidae) by J Henry Watson.
- 1074) Die Käferausbeute von 1913 und die angewen-
dete Fangtechnik, von Dr. Gustav Wradatsch.
- 1075) Kreuzungen in freier Natur,
von Franz Bander mann.
- 1076) Zur Ueberwinterung von *Pyrameis atalanta*,
von Franz Bander mann.

57: 16. 9: 57

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte

IV.

(Schluß.)

<i>Xenopsylla cleopatra</i>	<i>Meriones schousboei</i>
— —	— shawi
— hirtipes	<i>Allactaga elater</i>
— —	<i>Meriones tamaricinus</i>
— isidis	<i>Procavia daemon</i>
— ramesis	<i>Dipodillus campestris rozsi-</i> kae
— —	<i>Meriones schousboei</i>
— —	— shawi
— somalicus	<i>Xerus debagala rufifrons</i>
<i>Xiphopsylla apriona</i>	<i>Tachyoryctes</i> sp.
— hippia	<i>Epimys jacksoni</i>
— —	<i>Lophuromys zena</i>
— —	<i>Otomys irroratus elgonis</i>
— —	<i>Tachyoryctes audax</i>
— hyperetes	<i>Lophuromys zena</i>

Entomophaga

<i>Acolus krygeri</i>	<i>Lycosa picta</i>
<i>Acerienus junceus</i>	<i>Odynerus birenimaculatus</i>
— seductor	<i>Pelopoeus spirifer</i>
— —	<i>Sceliphron destillatorium</i>
<i>Adelencyrtus odonaspidis</i>	<i>Odonaspis graminis</i>
<i>Agriotypus armatus</i>	<i>Phryganea</i> sp.
<i>Agrotherentes abbreviator</i>	Araneae
— ephippium	—
— fulvipes	—
<i>Akonda hipparchia</i>	<i>Phobetron hipparchia</i>
<i>Allotropa thompsoni</i>	<i>Pseudococcus</i> sp.
<i>Anagrus atomos</i>	<i>Tettigoniella viridis</i>
— ovijentatus	<i>Lygus pratensis</i>
<i>Anaphoidea latipennis</i>	<i>Horiola arcuata</i>
<i>Aneristus ceroplastae</i>	<i>Ceroplastes rubens</i>
<i>Anomopterus fasciipennis</i>	<i>Ectoedemia phloeophaga</i>
<i>Apanteles bordagei</i>	<i>Cemiostoma coffeella</i>
— —	<i>Gracilaria coffeifoliella</i>
— lateralis	<i>Galleria mellonella</i>
<i>Apanteles solitarius</i>	<i>Lymantria monacha</i>
<i>Apentelicus kotinskyi</i>	<i>Lepidosaphes</i> sp.
<i>Aphanognus floridanus</i>	<i>Tetranychus bimaculatus</i>

<i>Aphanomerus rufescens</i>	<i>Colgar peracuta</i>
<i>Apelinus asychis</i>	<i>Brachycolus noxius</i>
— atriplicis	<i>Aphis chenopodii</i>
— chaonia	— crataegi
— —	— evonymi
— diaspidis	<i>Aspidiotus camelliae</i>
— —	— perniciosus
— —	— rapax
— —	<i>Diaspis bromeliae</i>
— dubia	<i>Hemichionaspis minor</i>
— flavipes	<i>Macrosiphum convolvuli</i>
— hordei	<i>Toxoptera graminum</i>
— mali	<i>Brachycolus noxius</i>
— subflavescens	<i>Aphis</i> sp.
— toxopteraphidis	<i>Chaetophorus capreae</i>
<i>Aphidius chilensis</i>	<i>Toxoptera graminum</i>
— chrysanthemi	<i>Aphis</i> sp.
— phorodontis	<i>Apion hookeri</i>
— testaceipes	<i>Toxoptera graminum</i>
<i>Aphyeus terryi</i>	— —
<i>Aptesis brachypterus</i>	<i>Pseudococcus saccharifolia</i>
— spectabilis	Araneae
— sudeticus	—
<i>Aspidiotiphagus citrinus</i>	—
<i>Baeus castaneus</i>	<i>Chrysomphalus aonidium</i>
— seminulum	<i>Micryphantes</i> sp.
<i>Banchus femoralis</i>	<i>Theridion</i> sp.
<i>Bassus laetatorius</i>	<i>Panolis griseovariegata</i>
— —	<i>Toxoptera graminum</i>
<i>Biosteres caudatus</i>	<i>Xanthogramma scutellare</i>
— —	<i>Ceratites giffardii</i>
<i>Blepyrus insularis</i>	<i>Dacus brevistylus</i>
— —	<i>Pseudococcus aonidium</i>
<i>Boetomus subapterus</i>	— virgatus
<i>Bracon brevicornis</i>	<i>Phytophaga destructor</i>
— celer	<i>Galleria mellonella</i>
— dichroma	<i>Dacus oleae</i>
— meromyzae	<i>Myelois cribrella</i>
— satanas	<i>Meromyza americana</i>
— scutellaris	<i>Apion hookeri</i>
— variator	<i>Grapholitha strobilella</i>
— —	<i>Larinus leuzeae</i>
— —	— turbinatus
— —	<i>Microlarinus laerynnei</i>
<i>Caenocryptus bimaculatus</i>	<i>Myelois cribrella</i>
<i>Calliephialtes comstockii</i>	<i>Hoplomerus laevipes</i>
<i>Catolaccus thyridopterygis</i>	<i>Retinia comstockiana</i>
— —	<i>Thyridopteryx ephemerae-</i> formis
<i>Centistidea ectoedemiae</i>	<i>Ectoedemia castaneae</i>
<i>Cephalomyia formiciformis</i>	<i>Sinoxylon sexdentatum</i>
<i>Chalcis annulata</i>	Hesperidae
— —	<i>Perichares corydon</i>
— annulipes	<i>Lineodes</i> sp.
— —	<i>Mesococondyla concordalis</i>
— brevicornis	<i>Earias insulana</i>
<i>Chelonus caradrinae</i>	<i>Caradrina exigua</i>
— texanus	<i>Loxostege similalis</i>
<i>Chryseida inopinata</i>	<i>Oncideres putator</i>
<i>Chrysocharis ainsliei</i>	<i>Agromyza parvicornis</i>
— —	— pusilla
— parksi	— parvicornis
— —	— pusilla

<i>Closteroceros coffeellae</i>	<i>Leucoptera coffeella</i>	<i>Eupelmus meteori</i>	<i>Laphygma frugiperda</i>
— <i>trienetus</i>	<i>Agromyza parvicornis</i>	<i>Euphoriana uniformis</i>	<i>Meromyza americana</i>
— <i>utahensis</i>	— —	<i>Eurylabus vinulator</i>	<i>Dicranura vinula</i> var. <i>dela-</i> <i>voie</i>
<i>Coequerelia insidiosa</i>	— <i>pusilla</i>	<i>Eurytoma auriceps</i>	<i>Dryophanta erinacei</i>
— —	<i>Mantis prasina</i>	— <i>studiosa</i>	— —
<i>Coelinidea ferruginea</i>	— <i>pustulata</i>	<i>Evania abyssinica</i>	<i>Stylopyga orientalis</i>
<i>Cratichneumon dissimilis</i>	<i>Meromyza americana</i>	— <i>appendigaster</i>	<i>Periplaneta americana</i>
— <i>nigritarius</i>	<i>Bupalus piniarius</i>	— —	— <i>orientalis</i>
<i>Cremnops parvifasciatus</i>	<i>Banchus femoralis</i>	— <i>laevigata</i>	<i>Stylopyga orientalis</i>
— —	<i>Diatraea canella</i>	<i>Exallonyx ligatus</i>	<i>Quedius</i> sp.
<i>Cryptus analis</i>	— <i>saccharalis</i>	<i>Galesus silvestrii</i>	<i>Ceratitis anonae</i>
— <i>annulitarsis</i>	<i>Tarentula</i> sp.	— —	— <i>giffardii</i>
— —	<i>Araneae</i>	— —	— <i>nigerrima</i>
— <i>titillator</i>	<i>Araneae</i>	— — <i>robustior</i>	— <i>punctata</i>
<i>Cyrtatoneura undulata</i>	<i>Ocyale mirabilis</i>	<i>Gasteruption assectator</i>	<i>Prosopis</i> sp.
— —	<i>Lasiocampa trifolli</i> var. <i>mauretanica</i>	<i>Gonatocerus anomocerus</i>	<i>Horioia arcuata</i>
<i>Decatoma flava</i>	<i>Dryophanta erinacei</i>	<i>Habrobracon simonovi</i>	<i>Heliothis armigera</i>
— <i>querei-lanadorsalis</i>	— —	<i>Hedylus giffardii</i>	<i>Ceratitis giffardii</i>
— <i>varians</i>	— —	— —	— <i>punctata</i>
<i>Derostenus arizonicus</i>	<i>Agromyza pusilla</i>	<i>Hemiteles areator</i>	<i>Araneae</i>
— <i>diastatae</i>	— <i>parvicornis</i>	— <i>brunnipes</i>	—
— —	— <i>pusilla</i>	— <i>conformis</i>	—
— <i>fullowayi</i>	— <i>diminuta</i>	— <i>conarius</i>	—
— <i>pictipes</i>	— <i>pusilla</i>	— <i>fasciipennis</i>	—
<i>Derostenus punctiventris</i>	<i>Agromyza parvicornis</i>	— <i>fragilis</i>	—
— —	— <i>pusilla</i>	— <i>fulvipes</i>	—
<i>Diachasma fullawayi robustum</i>	<i>Ceratitis giffardii tritea</i>	— <i>hemerobii</i>	<i>Hemerobius nervosus</i>
— — —	— <i>punctata</i>	— <i>niger</i>	—
— — —	<i>Dacus bipartitus</i>	— <i>palpator</i>	—
— <i>tryoni</i>	— <i>tryoni</i>	— <i>persector</i>	<i>Hoplodonta viridula</i>
<i>Diaeretus rapae</i>	<i>Toxoptera graminum</i>	— <i>pulchellus</i>	—
<i>Diapria verticillata</i>	<i>Araneae</i>	— <i>rufocinctus</i>	—
<i>Diaulnopsis callichroma</i>	<i>Agromyza pusilla</i>	— <i>tristator</i>	—
<i>Diaulinus begini</i>	— <i>parvicornis</i>	<i>Labrorychus tenuicornis</i>	<i>Thais polyxena</i>
— —	— <i>pusilla</i>	— —	— <i>rumina</i> var. <i>maure-</i> <i>tanica</i>
— <i>pulchripes</i>	— <i>parvicornis</i>	<i>Linoceras juncensi</i>	<i>Odynerus</i> sp.
— <i>websteri</i>	— —	<i>Macrocentrus abdominalis</i>	<i>Retinia resinella</i>
— —	— <i>pusilla</i>	<i>Meniscus setosus</i>	<i>Cossus cossus</i>
<i>Dibrachys meteori</i>	<i>Laphygma frugiperda</i>	<i>Mesochorus araneorum</i>	<i>Araneae</i>
<i>Diospilus oleraceus</i>	<i>Ceutorrhynchus mixtus</i>	— <i>brevipetiolatus</i>	—
<i>Diplazon laetatorius</i>	<i>Adimonia rustica</i>	— <i>splendidulus</i>	—
— —	<i>Allograpta fracta</i>	— <i>tetricus</i>	<i>Agrotis strigula</i>
— —	— <i>obliqua</i>	— <i>vitticollis</i>	<i>Aran</i> a
— —	<i>Baecha clavata</i>	<i>Meteorus albiditarsis</i>	<i>Panolis piniperda</i>
— —	<i>Eupeodes volucris</i>	— —	<i>Taeniocampa gracilis</i>
— —	<i>Mesogramma polita</i>	— —	— <i>miniosa</i>
— —	<i>Syrphus americanus</i>	— —	— <i>pulverulenta</i>
— —	— <i>balteatus</i>	— —	— <i>stabilis</i>
<i>Dirhinus ehrhorni</i>	<i>Ceratitis giffardii</i>	— <i>atrator</i>	<i>Tinea biselliella</i>
— —	— <i>anonae</i>	— <i>bimaculatus</i>	<i>Agrotis agathina</i>
— <i>giffardii</i>	— —	— —	<i>Anarta myrtilli</i>
<i>Ellaonyx ligatus</i>	<i>Quedius puncticollis</i>	— —	<i>Asteroscopus sphinx</i>
<i>Elasmus apanteli</i>	<i>Apanteles harnedi</i>	— —	<i>Cheimatobia brunata</i>
<i>Encyrtus embryophagus</i>	<i>Araneae</i>	— —	<i>Ematurga atomaria</i>
<i>Ephedrus incompletus</i>	<i>Macrosiphum rosae</i>	— —	<i>Macrothylacia rubi</i>
<i>Epialtes albicinctus</i>	<i>Crabro cephalotes</i>	— —	<i>Nola cuculatella</i>
<i>Eucoila hunteri</i>	<i>Agromyza pusilla</i>	— —	<i>Cheimatobia brumata</i>
<i>Eulophus borbonicus</i>	<i>Cemistoma coffeella</i>	— <i>crassimanus</i>	<i>Gonodontis bidentata</i>
<i>Eumicrosoma benefica</i>	<i>Blissus leucopterus</i>	— <i>deceptor</i>	<i>Semiothisa liturata</i>
<i>Eupachylomma rileyi</i>	<i>Toxoptera graminum</i>	— —	<i>Hylophila bicolorana</i>
<i>Eupelmus allyni</i>	<i>Phytophaga destructor</i>	— <i>fragilis</i>	<i>Nola cuculatella</i>
— <i>cereanus</i>	<i>Galleria mellonella</i>	— —	

Meteorus ictericus	Peronea hastiana	Pezomachus zonatus	Araneae
— —	Tortrix pronubana	Phaenoserphus viator	Nebria brevicollis
— laeviventris	Tryphaena pronuba	Phanerotoma planifrons	Cateremna terebrella
— luridus	Grapholitha ornithopus	Phanurus benificiens	Araneae
— —	Mamestra nebulosa	— —	Grapholitha schistaceana
— —	Taeniocampa stabilis	Pimpla angens	Araneae
— —	Triphaena fimbria	— brevicornis	—
— melanostictus	Thera variata	— cervini	Aretia cervini
— niger	Ennomos quercinaria	— instigator	Acronycta rumicis
— pulchricornis	Hybernia leucophaearia	— ornata	—
— —	Cerostoma radiatella	— ovivora	—
— —	Cheimatobia brumata	— rufata	—
— —	Cilix glaucata	— scanica	—
— —	Eupithecia abbreviata	Plectocryphus arrogans	Banchus femoralis
— —	— nanata	Polysphincta boops	Araneae
— —	Nola euculatella	— carbonator	—
— —	Phibalocera quercana	— rufipes	—
— —	Poecilocampa populi	Prospaltella berlesci	Diaspis pentagona
— —	Thecla betulae	Psilomastax lapidator	Papilio machaon var. asia-
— —	— quereus	— —	tica
— scutellator	Agrotis fimbria	Pteromalus ater	Araneae
— —	— pronuba	— punctatus	—
— —	— strigula	Pterosemella viridis	Antheraea simplex
— —	Segetia xanthographa	Scutellista cyanea	Phenacoccus artemisiae
— —	Geometra papilionaria	Signiphora nigrita	Aspidiotus perniciosus
— versicolor	Araneae	Smicra mariae	Thyridopteryx ephemerae-
Micradelus rotundus	—	— —	formis
Microgaster araneorum	—	Synergus erinacei	Dryophanta erinacei
— deprimator	—	Telenomus saccharalis	Pentatoma sp.
— perspicuus	—	Tetrastichus oxyurus	Ceratitis tritea
Microplites rufiventris	Caradrina exigua	Theroseopus haemorrhoidalis	Araneae
Muscidifurax vorax	Musca domestica	— ing. ed. ens	—
Notanisomorpha ainsliei	Agromyza parvicornis	Thoron g. bbus	—
Omorgus bilobus	Grapholitha leplastriana	— gracilis	—
Opius diastatae	Agromyza parvicornis	Trichogrammoidea lutea	Enarmonia batrachopa
— succineus	— —	Zagrammosoma multilinea	Agromyza parvicornis
— utahensis	— —	Zelediscolor	Boarmia repandata
Ormyrus ventricosus	Dryophanta erinacei	— —	Cabera pusaria
Panagyrops aereus	Cheimatobia brumata	— —	Gonodontis bidentata
Perisemus prologatus	Crambus caliginosellus	— infumator	Boarmia repandata
Perisopterus pulchellus	Aspidiotus perniciosus	— —	—
Pezolochus longicauda	Araneae	— —	—
— rufipes	—	— —	—
Pezomachus acarorum	Araneae	— —	—
— araneicola	—	— —	—
— araneivorus	—	— —	—
— cantus	—	— —	—
— cursitans	—	— —	—
— distinctus	—	— —	—
— ephippium	—	— —	—
— fasciatus	—	— —	—
— geocharus	—	— —	—
— indolens	—	— —	—
— inquilinus	—	— —	—
— instabilis	—	— —	—
— kiesenwetteri	—	— —	—
— lugubris	—	— —	—
— neesii	—	— —	—
— puberatus	—	— —	—
— ratzenburgi	—	— —	—
— ruficeps	—	— —	—
— silvicola	—	— —	—
— stilatus	—	— —	—
— vulneratus	—	— —	—

Entomologische Neuigkeiten.

In Pretoria wurde in einer Moskito-Falle ein *Culex theileri* gefangen, der halb männlich und halb weiblich ist, ein ganz eigentümliches Tier.

Die Raupen von *Heliothis dispaccus* huldigen carniven Gewohnheiten, sie fressen die Puppen von *Pontia rapae*.

Die Ameise *Monomorium latinode* und die Blattide *Periplaneta americana* haben sich auf den Philippinen als Ueberträger der Cholera erwiesen.

Als Brutplätze des *Dermestes elongatus* Lec. werden die Brutkolonien des *Nycticorax nycticorax* bekannt gegeben. Die von den Vögeln noch besetzten Nester wimmeln von den Dermestes-Larven.

Auf Wurzeln von *Ranunculus alpestris* wurde im Gebiet des Großen Schiltkorn, im Sumpfgebiet des Grauseeli die Schildlaus *Orthezia cataphracta* Schaw. aufgefunden. Es ist wohl der bisher höchste Fundort (2570 m). Mit ihr zugleich lebt *Ovisium jugorum* Korb, ein Pseudoscorpion, der sich wahrscheinlich von den nackten ♂ Nymphen und den ♂♂ nährt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte 96-98](#)