

NOV 23 1887

Societas entomologica.

Journal de la Société entomologique
internationale.

Toutes les correspondances devront être adressées à Mr. le président **Fritz Rühl** à **Zürich-Hollingen**. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Organ für den internationalen
Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vorstand desselben Herrn **Fritz Rühl** in **Zürich-Hollingen** zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International-Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr. **Fritz Rühl** at **Zürich-Hollingen**. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

Sur quelques Hyménoptères de Madagascar.

Par M. Henri de Saussure.

II.

Sphegides.

Le genre *Larra* de Fabricius a été divisé en trois genres principaux :

Le genre *Stizus* Latr. et deux autres genres ont l'un et l'autre reçu le nom de *Larra* suivant les auteurs. En 1806 Latreille en effet conserva le nom *Larra* pour le genre voisin des *Stizus* qui a pour type la *Larra vespiformis*, Fabr. En 1815 au contraire Klug appliqua le nom fabriicien *Larra* à un genre voisin des *Tachytiens*, ayant pour type le *Larra ichneumoniformis*, Fabr. et Fred. Smith adopta cette nomenclature dans le catalogue des Hyménoptères du British Museum. Ainsi deux genres appartenant à des tribus différentes de Sphegides se sont donc trouvés porter le même nom et il devait en résulter des grandes confusions synonymiques. Afin de les éviter, Fred. Smith substitua le nom de *Larrada* au nom de *Larra*, pour désigner le second de ces genres, soit celui qui appartient au groupe des *Tachytiens*. Mais comme l'a fort bien fait remarquer Fr. Kohl, l'application du nom *Larra* fait par Latreille a droit à la priorité, à l'exclusion de celle qu'on doit à Klug et à Smith. Le nom *Larra* doit donc être conservé au genre qui fait partie de la tribu des *Tachytiens* à l'exclusion de celui qui appartient à la tribu de *Stiziens*. — Ce dernier doit donc recevoir un nom nouveau et nous proposons pour le désigner celui de *Stizolarra*, qui indique son affinité avec les *Stizus*.

Les deux genres *Larra* se distingueraient comme suit :

a. *Labrum prominulum*. *Tibiae intermediae calcaribus 2 armatae*. **Tertia areola cubitalis alarum**

lata, extus arcuata; secunda primam venam recurrentem in ejus media parte, secundam prope ejus apicem excipiens. G. **Stizolarra**, n.

a a. *Labrum haud prominulum, clypeus valde transversus. Tibiae intermediae calcare unico armatae. Tertia areola cubitalis alarum angusta, intus arcuata; secunda primam venam recurrentem prope ejus basin, secundam ad mediam partem excipiens.*

Larra F. Latr.

Genre *Stizolarra*:

Larra (ex parte) Fabr. — Klug. — Fr. Smith.

Espèces Europ.: *Ferrisii*, Duf. — *rufipes* Ol. *ornata* Lep. — *terminalis*, Dahlb. — *bifasciata*, Dahlb. — *repanda*, Jur.

Afrique: *fasciata*, F. — *vespiformis*, F. — *bizonata*, Spin. — *caffra*, Sauss. — *ruficornis*, Latr. — *tridentata* (*bifasciata*) F.

Asie: *blandina* Smith. — *vespiformis*, F. — etc.

1. ***Stizolarra spinicornis***, n. *Nigra, punctulata; flavo-multipicta, metathorace excavato, utrinque valde angulato et infra angulum spinoso-dentato; angulis flavis; abdomine flavo segmentis nigro-bimaculatis, vel nigro fasciis repandis maculisque flavis confluentibus; pedibus flavis, nigro-maculatis; alis hyalinis.* — ♂ *Antennis flavidis, superne fuscis, articulo 11^o subtus spina instructo, ultimo apice mucronato.* Long. 10 mm.

A côté du genre *Stizolarra* vient se placer le genre *Stizus*.

1. ***Stizus Grandidieri***, n. — *Obscure-ferruginea, fulvo-hirsuta; clypeo utrinque argentato; pronoto subtus et abdomine nigris, hoc basi ferrugineo-vario; alis hyalino-ferrugineis.* ♂ L. 22 mm.

2. ***St. cyanipennis***, n. — *Gracilis, nigra; capite rufescente; thorace plus minus rufescente; abdomine cinerò-sericante; pedibus nigris, rufescentibus; alis nigro-violaceis.* ♂ 22 mm.

(à suivre.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Saussure Henri Louis Frédéric de

Artikel/Article: [Sur quelques Hymenopteres de Madagascar 9](#)