

- B. andreae F., wie vorher.  
 B. angustatum Dej., an Bergbächen.  
 B. bistriatum Mg., eine sehr veränderliche Art, an den gleichen Stellen.  
 B. biguttatum F., nur an fließenden Gewässern.  
 B. bipunctatum L., nur unter Steinen, nicht unter 1500 Fuss, steigt bis 8500 Fuss  
 B. bisignatum Men., im Kieselgeröll an rasch fließenden Gewässern.  
 B. brunripes Dej., an Bergbächen, erreicht noch Höhen von 6000 Fuss.  
 B. caraboides Ol., unter Erlen und Weidengebüsch an fließenden Gewässern.  
 B. decorum Zenk., in angeschwemmtem Röhricht an fließenden Gewässern, variiert in bläulichem und grünlichem Colorit.  
 B. distinctum Dej., unter Steinen an Bergbächen bis über 5000 Fuss.  
 B. equestre St., an Gebirgsflüssen.  
 B. foraminosum Meg., unter Moos und Gestrüpp an fließendem Wasser.  
 B. femoratum Dej., an allen Teichen, Bächen, Flüssen.  
 B. fasciolatum Dft., wie vorige Art, überall gemein.  
 B. Felixianum Heer, in Nestern der Formica rufa bis 3500 Fuss.  
 B. flavipes L., allenthalben an Ufern gemein.  
 B. flammulatum Clair., an Seeufern unter niederliegendem Schilf.  
 B. fuscicorne L., unter Steinen an Flussufern.  
 B. glaciale Heer, auf 7000 – 8000 Fuss hohen Alpen unter Steinen.  
 B. guttula F., an See- und Flussufern.  
 B. impressum Ill., an Ufern grösserer Flüsse.  
 B. Kuesteri Schaum, auf Alpen unter Steinen bis auf 4000 Fuss.  
 B. lampros Hbst., allenthalben gemein an Ufern.  
 B. lunatum Andr., unter Erlengebüsch, namentlich unter Alpenrosen an feuchten Stellen.  
 B. laticolle Meg., an stehenden Gewässern unter niederliegendem Schilf.  
 B. littorale Ol., an Ufern grösserer Flüsse.  
 B. modestum F., unter angeschwemmtem Röhricht an Fluss- und Seeufern.  
 B. Milleri Duv., unter Moos auf Hügeln.  
 B. nigricorne Gyll, auf den Alpen unter Steinen bis 8000 Fuss.  
 B. Nanum Gyll, unter Buchen- und Erlenrinden bis 4000 Fuss.  
 B. nivale Heer, in den Alpen unter Steinen bis 8000 Fuss.  
 B. obsoletum Dej., unter Steinen an Berggewässern  
 B. parvulum Dej., an Flussufern.

- B. pygmaeum F., allenthalben an Ufern gemein.  
 B. pusillum Gyll. unter Moos an Seeufern.  
 B. pallipes Meg. unter Weidenrinden an Seeufern.  
 B. prasinum Dft. an Fluss- und Seeufern unter Sand.  
 B. pallidipenne Ill. an Flussufern unter Kieseln.  
 B. palludosum Pz. häufig in der Nähe von Torfstichen.  
 B. punctulatum Drap. an Bachufern.  
 B. quadrimaculatum L. unter dürrerem Gras, Heu auf Höhen.  
 B. quadriguttatum Creutz. allenthalben, häufig an See- und Flussufern.  
 B. rufipes Ill. unter Steinen auf den Alpen bis 9000 Fuss.  
 B. Sturmii Pz. an Berggewässern.  
 B. scapulare Dej. ebenfalls, aber noch 4000 Fuss erreichend.  
 B. silaceum Dej. an See- und Bachufern, etwa bis 2000 Fuss reichend.  
 B. tricolor F. gemein an fast allen Fluss- und Seeufern.  
 B. tibiale Meg. sowohl in Niederungen als im Höhengebiet, an Bächen häufig.  
 B. tenellum Er, unter feuchtem Moos auf mässig hohen Bergen.  
 B. velox Er. unter Weidenrinden, sowohl in der Ebene, als auch in der Höhe.

---

### Briefkasten der Redaktion.

H. A. N. Nr. 1 ist *Tabanus fulvus* Mg. gehört in die Abtheilung, in welcher die Vorderzinken der Flügel mit einem nach innen gehenden Fortsatz versehen sind, mich wundert das Vorkommen dorten, hier ist er selten. Nr. 2 ist *Sargus melampogon*. Nr. 3 *Chrysops relictus* Mg. eine der gemeinsten Stechfliegen. Nr. 4 *Conops quadrifasciata* Degeer, selten.

H. E. S. Dankend erhalten für nächste Nummer.

---

### Mittheilung.

Das Preisgericht über die in Nummer 13 des Blattes gestellte Preisaufgabe besteht aus den Herren: Professor Dr. Frey in Zürich-Oberstrass als Präsidenten, W. Maus in Wiesbaden, Otto Leonhard in Libnowes, Gabriel Höfner in Wolfsberg und Fritz Rühl in Zürich-Höttingen.

---

### Anmeldungen neuer Mitglieder.

Folgende Herren:

- Bruderer-Altherr, Trogen, Ct. Appenzell.  
 Paul Hölzl, Maler, Gries (Tyrol).  
 Paul Preiss, Geometer, Coblenz.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Briefkasten der Redaktion. 133](#)